This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD
T71 .D49 1857 STOR
Traite pratique des maladies de la peau
24503365111

LANE

LIBRARY

PER LANE FUND



R. W. Taylor.

TRAITÉ PRATIQUE

DES

MALADIES DE LA PEAU

TRAITÉ PRATIQUE

DES

MALADIES DE LA PEAU

Paris. — Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

TRAITÉ PRATIQUE

DES

MALADIES DE LA PEAU

PAR

Alph. DEVERGIE

MÉDECIN DE L'HÔPITAL SAINT-LOUIS,
PROFESSEUR AGRÉGÉ DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS,
MEMBRE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, ETC.

DEUXIÈME ÉDITION

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

Ouvrage accompagné de planches coloriées.

LANE MEDICAL LIBRARY
12171
SAN FRANCISCO

PARIS

LIBRAIRIE DE VICTOR MASSON

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE. 17.

MDCCCLVII

Droit de traduction réservé.

LAKE LIBRARY

D49
1857

L'accueil fait par le public médical à la première édition du *Traité pratique des maladies de la peau* me faisait un devoir de ne rien négliger de ce qui pouvait améliorer mon œuvre. J'ai apporté tous mes soins à la révision de la deuxième édition que je publie aujourd'hui, et, en y ajoutant ce qu'a pu m'enseigner ma propre expérience, j'ai tenu compte de tous les travaux faits depuis trois années par les médecins qui s'occupent de l'étude et du traitement des affections cutanées, quelle que soit l'école à laquelle ils appartiennent.

J'ai fait une part toute particulière à la micrographie, qui depuis longtemps avait fixé mon attention; mais j'ai cherché, tout en développant les connaissances qu'elle fournit, à la restreindre dans les limites d'une saine pratique. Une planche y a été spécialement consacrée. Les préparations qui ont servi de modèles ont été soumises au plus sérieux examen; et, bien que mes dessins diffèrent d'une manière assez notable de ceux antérieurement publiés, je les présente avec une confiance d'autant plus grande dans leur exactitude, que les sources en viennent, pour la plupart, de malades de mon service à l'hôpital.

Mon éditeur n'a d'ailleurs reculé devant aucun sacrifice. Les cuivres ont été retouchés; une des figures, celle de l'eczéma, a été refaite: elle n'a son analogue nulle part sous le rapport de la vérité. L'ouvrage est augmenté d'un tiers environ; les observations pratiques sont multipliées: en un mot, il n'aura pas dépendu de moi ni de mon éditeur que cette seconde édition ne trouve auprès de mes confrères toute la faveur avec laquelle ils ont accueilli la première.

24 mars 1857.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

A

Acarus..... 588
Achorion..... 516
Acné..... 372
— *indurata*..... 375
— *miliaris*..... 376
— *punctata*..... 377
— *rosacea*..... 374
— sébacé..... 798
— *sebacea* avec hypertrophie.. 381
— — sans hypertrophie.. 379
— *simplex*..... 372
— tuberculeux ombiliqué.... 382
— tuberculoïde..... 382
— varioliforme..... 382
Acor mucifluus..... 802
Acrochordon..... 793
Acrodynie..... 207
Acromie..... 452
Affections cutanées chez l'enfant à la mamelle..... 798
Affections exanthémateuses..... 189
— papuleuses..... 391
Affectio scorbutica pustulosa.... 298
Affections squammeuses..... 431
Alcalins..... 123
Alopécie accidentelle..... 811
Anatomie pathologique (classification des maladies)..... 38
Anatomie de la peau comparée à la pathologie..... 64
Anneau herpétique..... 267
Antispasmodiques..... 124

B

Bains..... 150
— aqueux..... 151
— aromatiques..... 94
— d'alun..... 93
— d'eau courante..... 154
Bains de Baréges artificiels.... 120
— d'étuve..... 160
— de sublimé..... 93
— de sulfure de sodium..... 121
— de vapeur..... 157
— de vapeur portatifs..... 160
— généraux..... 87
— (hygiène des)..... 165
— iodés..... 114
— locaux..... 87
— orientaux..... 164
— russes..... 164
— sulfureux artificiels des Pyrénées (M. Soubeiran)..... 121
Bouton d'Alep..... 781

C

Camphre..... 90
Canquoin (caustique de)..... 98
Cantharides (teinture de)..... 129
Causes des maladies de la peau.. 15
Caustiques..... 99
— de Canquoin..... 98
— de M. Pétrequin.... 99
— pâte de Vienne..... 100
Cnidosis..... 219
Cheveux (chute des)..... 808
Chloroforme..... 91
Chlorure d'or..... 99
— d'antimoine..... 100
— de zinc..... 98
— de zinc à la *gutta-percha* 101
Chute des cheveux..... 808
Classification d'Alibert..... 173
— de Baumès..... 182
— de Hardy..... 184
— de Plenck..... 174
— de Rayer..... 180
— de Willan..... 174
— de Willan modifiée 175

Classification des maladies de la peau..... 173
Coloration de la peau..... 793
Couperose..... 372-388
Croûtes de lait..... 798
Crusta lactea..... 231-798
Cryptogames (étude générale des) 51

D

Dartre crustacée flavescente.... 335
— écailleuse..... 464
— érythémoïde..... 190
— furfuracée volante..... 434
— phlycténoïde..... ... 267
— pustuleuse..... 372
— squammeuse..... 231
— — lichénoïde.... 464
— — sèche..... 464
— vive..... 231
Deuto-iodure de mercure..... 114
Diagnostic général des maladies de la peau..... 55-58
Doctrines sur les maladies de la peau..... 1
Douches de vapeur..... 157
— liquides..... 154

E

Ecdermoptosis..... 382
Ecthyma..... 357
— *cachecticum*..... 312,352
— *luridum*..... 312,360
— impétigineux..... 361
— *infantile*..... 360
— rupiforme..... 312
— (Traitement de l')..... 361
— *vulgare*..... 359
Eczéma amorphe..... 237
— (Causes de l')..... 246
— composé..... 264
— de la tête..... 242
— de la vulve..... 243
— des bourses..... 243
— des jambes..... 244
— des mamelons..... 242
— du nombril..... 243
— oreilles..... 242
— (Diagnostic)..... 249
— fendillé..... 238
— fugax..... 241
— impétigineux..... 264-798
— lichénoïde..... 401
— localisé..... 241
Eczéma numm
— *rubru*
— (Thér
— *unisq*
Eczémateux (I
Efflorescence.
Éléphantiasis
Engelures...
Éphélides hép
Erysipelas pu
— *ve*
Erythème...
— am
— circ
— exc
— fug
— liss
— ma
— ma
— not
— pap
— per
— tub
— liss
— *à s*
— pa
— pa
— pa
— pa
— pa
Essera.....
Exanthème.
Exubérance
Favus granul
— lupinc
— *scutul*
— squan
Febris bullos
— *urtic*
Fer.....
Feu de Saint
Feux de dent
Gale.....
— (*Acaru*
— (Caract
— des pay

aire	491
.....	742
actères des)	744
.....	392
rius	399
conscrit	394
lus	394
émateux	401
ormes composées du li-chen)	401
ratus	395
rpétiforme	402
ldus	399
aris	399
raitement du)	404
licans	401
Fowler	131
Pearson	131
ntiphlogistiques	83
sitement du)	644
.....	630
erculeux serpigineux	635
térébrant	641
reux	636
serpigineux	638
térébrant	637

M

mée	742
Rosa	728
.....	742
parasites animaux	560
— végétaux	499
les ongles	797
exotiques	727
papuleuses	391
pédiculaires	408, 616
s maladies de la peau	28
antilymphatique	106
antinerveuse	123
antipapuleuse	123
antiphlogistique	82
antiscrofuleuse	109
antisquammeuse	130
dérivative	94
perturbatrice	96
résolutive	87
sulfureuse	116
composées	144
.....	362, 551
le diagnostic des mala-la peau	58

Microsp
—
—
Mollusc
Morbus
—
—
—
Mucilag
Nævi...
Nitrate
-
Olophly
Onglade
Ongle (
Onyxis.
Oxyde d
Parasite
Pâte de
Patholo
Pedicul
Pellagre
Pemphig
Pemphig
Pemphig
—
Pemphig
Phthiria
Phthiria
Phlyzaci
Pian d'A
Pityriasi
-
—
—
—

[illegible] 55
[illegible] 540
[illegible] 111
[illegible] 219
[illegible] 78
[illegible] 96
[illegible] 414
[illegible] 139
[illegible] 131
[illegible] 291
[illegible] de la peau 793
[illegible] 792
[illegible] 746
[illegible] 95
[illegible] 96
[illegible] 110
[illegible] 392
[illegible] 392
[illegible] 417
[illegible] 415
[illegible] 426
[illegible] 427
Traitement du, 430
[illegible] 406
[illegible] 464
aigu 467
(Formes composées du) 472
capitis 475
chronique 468
eczemateux 472
herpétiforme 473
palmaris 474
plantaris 474
(Traitement du) 477
unguium 476
[illegible]tifs 95
[illegible] 616
[illegible]ura 323
ecchymotique 326
hémorrhagique 327
simplex 323
urticans 326
urticata 219

R

[illegible]zyge 742
[illegible]lutifs généraux 89, 93
pulvérulents 92
[illegible]worm 267
[illegible]ole 228

Rupia 382
— scharlachiforme 386
— impétigineuse 330
— non prurigineuse 384
— prurigineuse 383, 385

S

Scabies miliaire 331
— papuliforme 488
Scarlatines urticantes 219
Scorbut 335
Scrofules de la peau 654
Scrofulo-syphilides 654
Sirop antisecrétoire indé 112
Solution de Fowler 131
— minérale 134
— de Pearson 131
Soufre 117
Sulfure de calcium 119
— de chaux Formule du 610
— de potassium 118
— à l'extérieur 119
Sycosis 362, 363, 351
— capillitii 363
— (Formes composées du) 369
— herpétiforme 369
— impétigineux 330
— pilaris 365
— (Traitement du) 370
Syphilides 670
— bulleuses 685
— (Caractères des) 680
— exanthémateuses 680
— papuleuses 687
— pustuleuses 689
— squammeuses 691
— (Thérapeutique des) 703
— tuberculeuses 696
— varicelleuses 682
— vésiculeuses 682

T

Taches hépatiques 448
Tannes 377
Teigne 518
— achromateuse 523, 547
— (Cryptogame de la) 525
— décalvante 523
— (Description de la) 528
— faveuse 522
— mentagre 523

Lèpre vulgaire..... 491
Lèpres..... 742
— (Caractères des)..... 744
Lichen..... 392
— *agrius*..... 399
— circonscrit..... 394
— diffus..... 394
— eczémateux..... 401
— (Formes composées du lichen)..... 401
— *gyratus*..... 395
— herpétiforme..... 402
— *lividus*..... 399
— *pilaris*..... 399
— (Traitement du)..... 404
— *urticans*..... 401
Liqueur de Fowler..... 131
— de Pearson..... 131
Lotions antiphlogistiques..... 83
Lupus (Traitement du)..... 644
— 630
— tuberculeux serpigineux.. 635
— — térébrant.... 631
— ulcéreux..... 636
— — serpigineux..... 638
— — térébrant..... 637

M

Mal de Crimée..... 742
— de la Rosa..... 728
Malemort..... 742
Maladies à parasites animaux... 560
— — végétaux... 499
Maladies des ongles..... 797
— exotiques..... 727
— papuleuses..... 391
— pédiculaires.....408,616
Marche des maladies de la peau. 28
Médication antilymphatique.... 106
— antinerveuse..... 123
— antipapuleuse..... 123
— antiphlogistique..... 82
— antiscrofuleuse..... 109
— antisquammeuse.... 130
— dérivative..... 94
— perturbatrice..... 96
— résolutive..... 87
— sulfureuse..... 116
— composées..... 144
Mentagre.....362,551
Méthode de diagnostic des maladies de la peau..... 58
Microsporon *Audo*
— *furfu*
— *Grub*
— *menti*
Molluscum.. ....
Morbus papulosus
— *pedicularis*
— *phlyctenoïd*
— *vesicularis*
Mucilagineux....

Nævi.....
Nitrate d'argent.
— de merc

Olophlyctide milia
Onglade.....
Ongle (Chute des)..
Onyxis.....
Oxyde de zinc....

P

Parasites animaux..
— végétaux
rale de
Pâte de Vienne...
Pathologie générale
— spéciale
Pediculus pubis ..
Pellagre.....
Pemphigoïdes.....
Pemphigus .....
Pemphigus compos
— diutinus
— aigu gén
— hémorrh
— des nou
Pemphix .....
Phthiriase.....
Phthiriasis.....
Phlyzacia.....
Pian d'Amérique..
Pityriasis.....
— *alba*.....
— *nigra*....
— *pilaris*...
— *rubra*...
— versicolor.

Plique 557
Poils (Structure des)..... 508
Pommade d'Helmerich..... 610
Porcellenæ..... 219
Porreau..... 793
Poudres..... 86
Poux..... 616
Préparations antimoniales..... 139
— arsenicales..... 130
Préputiale (herpès preputialis).. 291
Productions accidentelles de la peau 793
— anormales de la peau. 793
— cornées 794
Protonitrate de mercure..... 98
Protosulfate de fer..... 90
Protoiodure de mercure..... 114
Prurigo furfurant..... 392
— lichénoïde..... 392
— non papuleux..... 417
— pédiculaire..... 415
— podicis..... 424
— *pudendi muliebris*..... 427
— (Traitement du)..... 430
Pruritus..... 408
Psoriasis 464
— aigu..... 467
— (Formes composées du). 472
— *capitis*..... 475
— chronique 468
— eczémateux 472
— herpétiforme..... 473
— *palmaria*..... 474
— *plantaria*..... 474
— (Traitement du) 477
— *unguium*..... 476
Purgatifs..... 95
Pulex..... 616
Purpura..... 323
— ecchymotique..... 326
— hémorrhagique 327
— simplex 325
— *urticans*..... 326
— *urticata*..... 219

R

Radezyge..... 742
Résolutifs généraux..... 89, 93
— pulvérulents 92
Ringworm..... 267
Roséole 228
Rupia.....
— *escharotica*.....
— impétigineux.....
— *non proeminens*.....
— *proeminens*..... 315,

S

Scabies miliaris.....
— *papuliformis* .....
Scarlatina urticata.....
Scorbut.....
Scrofules de la peau.....
Scrofulo-syphilides.....
Sirop antiscorbutique iodé.....
Solution de Fowler.....
— minérale .....
— de Pearson.....
Soufre.....
Sulfure de calcium.....
— de chaux (Formule du)..
— de potassium.....
— à l'extérieur.....
Sycosis..... 362, 363,
— *capillitii*.....
— (Formes composées du)...
— herpétiforme.....
— impétigineux.....
— pilaris.....
— (Traitement du).....
Syphilides.....
— bulleuses.....
— (Caractères des).....
— exanthémateuses.....
— papuleuses.....
— pustuleuses .....
— squammeuses .....
— (Thérapeutique des)..
— tuberculeuses.....
— varicelleuses.....
— vésiculeuses.....

T

Taches hépatiques.....
Tannes .....
Teigne.....
— achromateuse 523
— (Cryptogame de la).....
— décalvante.....
— (Description de la).....
— faveuse .....
— mentagre.....

Teigne tondante 5
— tonsurante..... 5
— (Traitement de la)..... 5
Teinture de cantharides..... 1
— de *meloë vesicatorius*... 1
Terminaison des maladies de la peau .....
Thérapeutique générale.....
Tonsurant (Herpès)..... 5
Trichoma..... 557, 5
Trychophyton (Malmstein)..... 5
Tumeurs folliculaires..... 5

U

Urticaire..... 5

PRÉCIS PRATIQUE

DES

MALADIES DE LA PE

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE

GÉNÉRALES.

PATHOLOGIE GÉNÉRALE.

L'étude spéciale des maladies de la peau ne saurait être fait fruit, si elle n'était précédée de l'exposition de doctrines gér en dermatologie. Le médecin sans doctrines n'a qu'une thérape d'empirisme et de tâtonnement; or cette thérapeutique tout exc nelle ne doit être appliquée qu'à ces états morbides *insolite* succès a justifié l'emploi des moyens, dans des circonstance logues. Non pas que nous prétendions, en parlant de doc rapporter à une *unité morbide* toutes les maladies cutanées ; ce alors un *système*, né d'une idée préconçue, devant lequel no rions plier toutes les maladies de la peau pour en expliquer gine, la nature, la forme, et poser les bases d'une thérape nouvelle. Loin de nous cette pensée ; rien n'est plus préjudici la pratique de la médecine qu'un système. Si, en général, quelque bien, s'il éclaire sur la nature de quelques malad cause toujours beaucoup de mal en s'étendant du domaine théorie à celui de la pratique.

Mais entre un *système* et des doctrines plus ou moins homo nées de l'observation des maladies, doctrines qui se lient groupent entre elles pour donner naissance à un ensemble d

ceptes thérapeutiques, il y a une distance énorm
point de vue que nous prétendons faire conna
d'envisager l'ensemble des maladies de la peau et

Lorsqu'il y a seize ans nous avons succédé à l
l'hôpital Saint-Louis, nous n'avions été l'élève
dermatologie. Chez nous le passé n'enchaînait
étions auprès du malade le médecin qui, après
ans de séjour dans les hôpitaux, a fait une mois
ample d'observations sur toutes les maladies en
catégorie nouvelle de malades venait impressic
Derrière nous, des hommes qui avaient fait éc
avaient été adoptées par tous leurs contempora
devait à ces hommes illustres d'avoir fait sortir
formes variées des maladies cutanées restées jusq

Nous identifier, par respect comme par besoi
trines, mais toutefois ne pas nous isoler *de nos*
trines sur les maladies en général, telle fut notr
telle a été la ligne que nous avons suivie ; et c'
nous sommes mis à explorer, sous ce double rap
malades qui avaient été confiés à nos soins. Nous
nous demander : *Pourquoi cette catégorie de mal*
la pathologie générale? — Pourquoi des doctrin
pour ce groupe de maladies? — Pourquoi cette
jours cachée qui les ferait naître? — La peau est
veloppe isolée du reste du corps? — A-t-elle do
dante? — N'est-elle plus le reflet au dehors du bi
frances du dedans? — Y a-t-il quelque virus qui,
diverses, la travaille et la dévore? — Est-ce qu
bides diffèrent des formes des autres maladies au
structure qui est propre à son tissu? — N'est-c
moins quant à l'aspect, l'élément inflammatoire
sionne? Cet élément inflammatoire ne subit-il
modifications en raison du tempérament, de l
l'individu, ainsi que de la cause qui l'entretient c
à l'égard des autres organes de l'économie, etc.?

Si donc ces analogies existent, pourquoi de t

Pourquoi cet isolement des affections cutanées? Y aurait-il d motifs puissants qui s'opposeraient à ce que ces maladies re trassent dans le cadre de la pathologie générale?

Selon nous, ces raisons d'être n'existent pas et nos doctrines dermatologie sont précisément basées sur cette pensée que nous fo mulons de la manière suivante :

Les maladies de la peau, communément désignées sous le nom dartres, ne sont autres que des états morbides tout à fait identiqu avec ceux des autres tissus.

Même origine, mêmes causes, même marche, même terminaiso même liaison, enfin, avec tous les autres organes de l'économie.

La conséquence de ces idées est, au point de vue thérapeutiqu toute une révolution dans les principes qui dirigent depuis cinquan ans les praticiens.

Comme eux, nous allons rechercher la cause du mal pour combattre et la détruire, si elle existe encore; mais, au lieu de chercher dans un élément morbide propre aux dartres, *un virus*, *être à part*, *une cause toujours la même*, agissant sur toute l'économi *être le plus souvent inconnu* que l'on combat au hasard par des *m dificateurs* dont l'administration est tout aussi hasardée, nous cherchons, nous, dans le tempérament du sujet, sa constitution, l'h rédité à laquelle il a été soumis, le climat qu'il habite, la professio qu'il exerce, les causes morales qui ont agi sur lui, les privatio auxquelles il a pu être soumis; dans l'état de tel ou tel organ intérieur en souffrance, et enfin dans les agents externes qui, suivar les conditions sociales où l'homme se trouve placé, ont pu fair naître les mêmes altérations cutanées qu'une cause interne aurai produites.

Toutefois, en dehors de ces conditions les plus généralement ob servées, il faut convenir que lorsque la même affection se généralis à la peau sans cause appréciable, il y a là dans le sang, dans le tissus, dans toute l'économie, une influence occulte, un princip morbide dont la nature nous fuit, nous échappe, et que nous attaquons quelquefois avec bonheur par un seul et même agent. Ce principe, qui constituait le virus des anciens, est appelé diathèse par le médecins modernes qui se rattachent volontiers à ces anciennes idées

Cependant il faut y prendre garde, si l'on ne r
doctrine des virus, on revient à celle des diathèses;
on peut aller fort loin et remplacer une même idée pa

Or rien de plus dangereux en médecine que les m
tout disposé que nous sommes à admettre des diathi
sitions (du grec διαθήσις), nous ne sous-entendons
un état occulte né d'un principe général morbide
le même, qui aura son antidote, comme le pourrai
La disposition morbide pourra avoir ses sources div
tacher à des conditions de tempérament, d'âge,
d'hérédité: ainsi la disposition strumeuse n'est que
de la prédominance exagérée du système lympha
que la diathèse lichénoïde n'est que le résultat de
exagérée du système nerveux général et de celui de
ticulier, de même encore, en dehors de ces conditions
des diathèses dont la nature et la cause ne peuvent
et que nous apprécions seulement par l'agent pro
battre, agent dont l'expérience nous a montré l'ef
y a loin de ces idées à la pensée qui rattache toujou
et même cause le principe morbide de plusieurs ma
grave de tous les inconvénients, c'est d'avoir un mo
à l'esprit et qui l'éloigne de l'effort propre à recon
d'un inconnu qui nous a jusqu'alors échappé.

Telles sont les idées qui constituent nos doctri
logie. Nous en tirons la conséquence que *la patholo*
diffère de la pathologie des autres tissus et organes
variée de ses productions morbides. Il y a identité
causes; par conséquent, il doit y avoir identité de thé

Mais il ne suffit pas de faire connaître nos doctri
logie, il faut encore chercher à prouver qu'elles so
d'une conviction intime, nous devons nous attache
tager, et réunir au moins tous nos efforts pour arriv
allons donc entrer dans la démonstration générale
donnant quelques développements à une série de
nous allons formuler, sauf à revenir d'une manière
sur chacun de ces faits en particulier.

PREMIÈRE PROPOSITION. — *La généralité des maladies de la peau pour* forme morbide ordinaire *l'élément inflammatoire.*

Parcourez l'échelle de ces maladies, depuis les exanthèmes, où forme inflammatoire est la plus prononcée, jusqu'aux maladies l'épiderme et des ongles, où elle l'est le moins, et vous trouve des traces évidentes de cette forme pathologique.

Inutile de vous citer les affections vésiculeuses, pustuleuses, bu leuses, papuleuses, tuberculeuses, où l'élément inflammatoire très dessiné; j'arrive tout de suite à ce que l'on pourrait regard comme des exceptions.

Le *psoriasis?* Mais sous ces squames argentées, la peau est roug tuméfiée; il en est de même pour la *lèpre vulgaire*. Le psoriasis l'extrémité des ongles est lui-même précédé à son début d'un cer inflammatoire très dessiné, ainsi que je l'ai souvent observé.

Le *pityriasis?* S'il ne se montre d'abord que par un état farine de la peau, qui entraîne avec lui un léger excès de sensibilité de tissu avec démangeaison plus ou moins vive, l'irritation vient-elle augmenter, alors la peau rougit franchement et l'inflammation mise hors de doute.

L'*herpès tonsurant* amène à la peau de la démangeaison et de rougeur, sans que l'une et l'autre soient vives. Dans le *porri decalvans*, comparez les couleurs de la peau dénudée avec le re du cuir chevelu, et vous lui trouverez une teinte rose très marqué avec une turgescence qui donne à ce tissu l'aspect de peau œd mateuse, à moins que la maladie ne soit fort ancienne.

Dans l'*albinisme accidentel et partiel*, où les cheveux paraisse seuls malades, la peau est quelquefois tuméfiée et colorée en rose

Le *pityriasis versicolor* cause à son début la sensation de d mangeaisons; s'il arrive à un degré plus élevé, il dessine un é inflammatoire.

Dans le *favus* (teigne) enlevez le godet, et vous trouverez la pe rouge, enflammée.

Certes, si vous prenez ces formes morbides quand elles datent plusieurs années, vous n'observerez plus les phénomènes de l'i flammation; mais il suffit pour nous de constater qu'il est une p riode d'invasion de la maladie où l'état inflammatoire est dessi

pour que nous n'isolions pas ces maladies des a
noter que nous avons pris à dessein des exemples a
les moins inflammatoires.

Il est maintenant des exceptions dans les ma
comme il en existe pour les maladies des autres o

L'*ichthyose* de naissance ne présente jamais
inflammatoire.

Les *productions cornées* sont dans le même cas.

Certaines formes de *molluscum* rentrent encore d

Certaines formes de *lèpre* peuvent être citées com
flammatoires, et encore n'avons-nous pas à nous
quelques-unes des maladies auxquelles nous faisons
blancs ne sont pas dans les mêmes conditions de

Nous ne voulons déduire de ces démonstration
chose, c'est l'identité morbide entre les formes de
peau et celles des maladies des autres organes, sans
cet égard pour la thérapeutique de ces maladies.

Mais, objectera-t-on, la conséquence inévitable de
pour vous, ce doit être l'adoption du traitement
dans le but de combattre ces affections.

Loin de nous cette pensée. De ce qu'une maladie d'u
forme élémentaire l'inflammation, s'ensuit-il qu'en
traite nécessairement et toujours par des antiphlogisti
séquence serait bonne à adopter au point de vue d'un
que l'avait établi Broussais ; elle est mauvaise au poi
analogie de forme pathologique ; elle ne saurait con
pour les maladies cutanées ce que l'on fait seulement
maladies, c'est-à-dire à leur appliquer la méthode a
à la naissance, au début du mal, et c'est justement la
que je veux en tirer, sans préjudicier en rien aux d
traitement employés contre ces affections quand la
vient à prendre une marche décroissante.

Cette marche thérapeutique diffère essentiellement
perturbatrices que beaucoup de praticiens mettent en
aujourd'hui au début des affections de la peau.

DEUXIÈME PROPOSITION. — *Les maladies de la peau*

déterminées par toutes les causes qui produisent les maladies des au tissus ou organes : causes physiques, causes morales, hérédité, cli sous lequel vit l'individu, tempérament, constitution du sujet, organisation spéciale de la peau, etc.

Développons cette seconde proposition. Il est de principe gé ralement admis en médecine, que toute cause morbide venue dehors porte son influence plus spéciale sur l'organe de l'econo qui est plus impressionnable à cette cause; c'est alors cet org qui devient malade si la cause agissante s'exerce assez puissa ment pour produire une maladie.

La peau ne saurait être séparée, sous ce rapport, des autres ti ou organes, et l'on en trouve un exemple bien tranché dans états érythémateux ou fluxionnaires de la face, qui, chez cert sujets, se reproduisent si fréquemment sous l'influence de l' pression de l'air, indépendamment, d'ailleurs, de l'état généra la santé.

Certes les causes générales extérieures, refroidissement, supp sion de transpiration, etc., exercent plus d'influence sur les orga parenchymateux de l'économie que sur le tissu de la peau, pe que la congestion sanguine y est plus facile; mais il n'est pas r de voir des maladies sécrétantes, *impétigo*, *ecthyma*, *érythè* sécrétant de la sérosité et du pus, survenir après la suppress de la transpiration.

Il est des agents physiques dont le contact constant avec la p développe des maladies spéciales de ce tissu; de là un cer nombre d'affections cutanées propres à certaines professions. A la *gale* dite *des épiciers* (*eczéma lichénoïde des mains*); l'*he phlycténoïde* et le *pemphigus* de cause externe, assez comm chez les teinturiers; les *ulcères* et l'*eczéma* des jambes que l'on se développer chez les débardeurs de bateaux, l'*érythème chron* des mains des filles de comptoir des liquoristes, etc.

Les causes morales qui agissent sur l'ensemble de l'econo pour développer des maladies générales peuvent aussi deveni source d'affections cutanées. Il est fréquent de voir surgir tou coup, et à la suite d'un violent accès de colère, un *érythème*, *érysipèle*, un *impétigo*, un *herpès phlycténoïde*, un *purpura*,

syphilide papuleuse, comme sous l'influence de l
voit se manifester un ictère ou une fièvre quelco

De même que les chagrins, l'abstinence, les pı
engendrent des fièvres graves; de même ces cau
rupia, l'*ecthyma cachecticum*, le *purpura chroniqu*

L'*hérédité*, qui propage la phthisie, les maladie
tions intestinales, la scrofule, développe à la peau
brune ou *cornée*, le *psoriasis* ou la *lèpre vulgaire*,
lequel vit l'individu fait naître la *lèpre* des régio
celle des *tropiques*, la *pellagre*, comme il fait naître
la peste.

Au *tempérament* il faut rattacher le *lichen* et l
individus éminemment nerveux; l'*impétigo*, l'*ecth*
pour les individus chez lesquels le tempérament
domine; le *pityriasis versicolor*, les *taches hépa*
aux personnes dont le tempérament bilieux est tr
on rattache à chacun de ces tempéraments certai
du tube digestif, soit de tout autre appareil d'o
ces maladies coïncident le plus généralement avec
tempérament prononcées à un très haut degré.
de la *constitution forte* du sujet, qui développe des
franchement inflammatoires de la peau avec mai
tense, maladies qui se guérissent au moyen de q
sanguines générales et d'applications émollientes lc
en cela aux affections inflammatoires des autres
nomie qui cèdent à un traitement analogue.

Par rapport à l'*âge*, n'y a-t-il pas à la peau des
fance, de l'adulte et du vieillard, ainsi qu'on en dé
de la pathologie interne? Les affections cutanée
désignées sous le nom de *croûtes de lait*, *eczéma*
qinodes, le *strophulus* ou feu de dents, les *favu*
autant de maladies qui se guérissent le plus sou
mesure que l'enfant prend de l'accroissement. I
maladies cutanées qui lui sont propres, le *pr*
l'*ecthyma cachecticum*, le *rupia*, le *scorbut des jaml*
le *psoriasis* et les autres affections *squameuses;* le *sy*

l'*eczéma des organes génitaux*, le *prurigo de l'anus*, l'*intertrigo*

Enfin, l'*organisation spéciale de la peau* devient elle-mêi source de maladies cutanées comme celle d'un organe in devient la source d'affections de ces organes. Rien de plus con que de voir la membrane muqueuse intestinale dans un ma état de santé par suite de l'accomplissement imparfait des fon de la peau, sous l'influence d'une organisation toute spéciale tissu, et qui nous échappe. C'est sur ce fait bien démontré qu posent les succès de l'hydrothérapie, et il en est d'incontest De même, c'est à certaines conditions, soit d'organisation ac ou modifiée par le temps, qu'il faut attribuer quelques affe cutanées, dont la forme et le développement sont soumis à ces ditions. Ainsi, un *impétigo* va se montrer chez deux sujets de r âge, il sera survenu dans les mêmes conditions. Chez l'un, il s de quelques applications émollientes pour en arrêter les pro chez l'autre, impossible de tarir la source du pus : c'est un lement qui traverse d'heure en heure les pansements dont recouvre. Mais dans ces derniers cas, la peau est épaisse, bla et opaline, elle transsude la sécrétion huileuse ; chez l'autre, la est sèche, ferme, épaisse et consistante.

Un individu est sain, sa santé générale a toujours été bonne, sa peau a développé une odeur plus ou moins forte ; cette ode devenue tellement infecte, que cette personne, de la haute s même, ne peut rester une demi-heure dans un salon sans qu le monde en soit chassé, et cependant aucune altération patholog aucune apparence morbide à la peau ! La cause, vous la de deriez en vain ; elle est tout entière dans certaines cond d'organisation de la peau inappréciables à nos sens. La maladi développée lentement, et tous les traitements préconisés pa hommes les plus expérimentés dans le traitement des affection tanées ont été sans succès. L'analogue en pathologie est, à cet é dans la membrane muqueuse des voies respiratoires qui exh pendant toute la vie d'un individu une respiration fétide, dont la formation ne porte aucune atteinte à la santé. J'ai c une personne qui avait cette infirmité portée au plus haut degr le jeune âge, et qui est morte à quatre-vingt-sept ans.

Ainsi, analogie parfaite de *causes et d'effets* entre l
la peau et les maladies des autres organes ; y compr
nous sont encore inconnus dans quelques cas, et que
portés à appeler diathésiques.

TROISIÈME PROPOSITION. — *Les maladies de la peau su
évolution la même marche, et présentent les mêmes te
les maladies des autres organes.*

Ici nous n'éprouvons pas plus de difficulté à établir
que nous n'en avons rencontré à l'égard des proposition

Toutes les affections cutanées ont leur période
d'accroissement, leur période stationnaire et leur pé
sante ; comme toutes les autres maladies elles se présen
observation, ou avec une marche aiguë, ou avec une
nique ; elles peuvent, comme elles, se terminer par rés
puration, gangrène, etc.

Mais il est une objection de quelque portée à faire
tion, c'est que les maladies de la peau ont en général
n'est pas en rapport avec leur peu d'importance : (
perpétuent des années ; que parfois elles sont incur
récidive est très communément observée, et que s
rapports elles se différencient, en apparence au m
néralité des maladies des autres tissus.

Nous ferons connaître un peu plus loin les causes q
conditions en apparence exceptionnelles pour les
peau, et nous démontrerons qu'elles tiennent à l
la peau, à ses fonctions et à ses rapports avec tous
l'environnent.

Quant à présent, nous dirons d'une manière somm
tissu malade qui n'est pas en contact avec l'air ou
extérieurs, guérit cent fois plus vite que celui qui est
ditions opposées. Voyez les fractures comminutives
dehors, et comparez-les à celles qui ne sont pas av
peau : tandis que celles-ci guérissent dans un espace
court et sans accidents, celles-là vont suppurer des
des portions d'os vont se nécroser, et l'amputation
pourra être même jugée nécessaire au début. — Pour

putation dans laquelle la réunion est faite par première intention exige-t-elle moitié moins de temps pour la guérison ? C'est que la plaie est à l'abri du contact de l'air. — Si les ophthalmies sont souvent fort rebelles, c'est que la conjonctive est en contact avec l'air. Il en est de même des bronchites durant les variations de température. — La phlébite traumatique est souvent mortelle ; la phlébite spontanée l'est rarement.

Eh bien ! pour la peau, non-seulement on trouve cette condition de contact de l'air, mais encore on y rencontre la mobilité permanente de la peau dans les mouvements d'extension et de flexion, les frottements incessants des vêtements, le contact continuel avec les corps qui nous environnent, les congestions nées des mouvements musculaires durant la marche, ainsi que l'extension du tissu de la peau durant ces contractions : toutes causes qui tendent à entretenir la maladie cutanée par les mouvements du tissu et les frottements qu'elles déterminent, et sur l'influence desquelles nous reviendrons en particulier en traitant de la marche générale des maladies de la peau.

A ces causes de permanence et de durée de la maladie, il faut ajouter que l'affection de la peau n'est souvent qu'un reflet de la maladie d'un organe interne, puisque souvent il suffit de traiter l'organe interne malade pour voir céder l'affection cutanée ; que les maladies de la peau sont, comme nous l'avons démontré, le plus souvent liées au tempérament et à la constitution de l'individu ; qu'elles ne peuvent guérir qu'à la condition de les modifier l'un et l'autre par les médications prolongées ; qu'elles peuvent être héréditaires ; et en groupant ainsi toutes ces circonstances, on explique facilement leur durée qui, eu égard aux autres maladies, semble faire une exception, qui n'est réellement qu'apparente.

Les praticiens ne portent pas assez leur attention sur ces conditions de la peau ; ils prescrivent des traitements locaux et généraux sans joindre à ces moyens les conditions de repos auxquelles ils astreignent les autres malades, et c'est ainsi qu'en mettant de côté l'hygiène qu'ils font observer ordinairement dans les autres maladies, ils perpétuent les affections cutanées.

QUATRIÈME PROPOSITION. — *Si les formes morbides sont beaucoup variées dans les maladies cutanées, c'est que le tissu de la peau plus complexe de tous les tissus de l'économie.*

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la description succinc nous ferons de l'anatomie de la peau pour voir combien est f cette proposition. Envisagée par les anciens comme un des tiss plus simples et comme n'étant formée que par l'épiderme derme, la peau s'est plus tard compliquée du réseau de Malp puis Gautier est venu y joindre ses quatre couches. Plus Breschet et Roussel de Vau[illegible]ont examinée au microsco supprimant les couches [illegible]r, ils y ont ajouté leurs app diapnogène, blennogène, [illegible]ogène, celui d'inhalation, vrothèle ou corps papillaire[illegible] etc. Puis sont venus les de micrographes plus m[illegible]qui ont détruit ce qu'avai ces anatomistes, en sim[illegible]-mêmes la structure de Mais est-ce bien là le derm[illegible] de la science ?

Que prouve d'ailleurs [illegible]nde divergence dans l de la peau, si ce n'est l'éta[illegible]mplexe, si difficile à a séparer, à isoler assez co[illegible]nent pour que l'anato rendre compte des éléme[illegible]bides si variés que l dans ce tissu. Et, en effet, o[illegible]le siége de cette infla éphémère que l'on nomme *ér[illegible]me?* Évidemment dar la plus superficielle de la peau, et cependant, dans cer eux, la peau et le tissu cellulaire sont malades à la fo venir l'*eczéma*, maladie bien superficielle encore qui n'a pas de turgescence à la peau, mais qui engendre des vé mement ténues. Plus loin, des pustules plus profondes de l'*ecthyma*, puis de plus profondes encore, comme da d'*acné*, et enfin de grosses pustules qui ressemblent à et où la peau et le tissu cellulaire sont malades [illegible] *sycosis* ou *mentagre*. Il en est ainsi pour l'état papuleu degré si superficiel dans le *prurigo*, à une profonde dans le *lichen*, à un degré plus avancé et plus profor *lide papuleuse*, dans le *tubercule syphilitique*, etc. maladies, dont nous pourrions singulièrement éten ture, n'ont-elles pas chacune un siége différent, et

chacune parcourir leurs phases et leur évolution dans ce point de profondeur donnée de la peau sans jamais aller au delà, n'y a-t-il pas lieu de croire qu'elles siégent sur un tissu spécial de la peau et diffèrent en raison de la forme morbide? Dès lors les tissus élémentaires de la peau ne sont-ils pas extrêmement complexes, et si complexes que l'anatomie ne peut en préciser la nature ni la disposition, circonstance qui rend compte alors des formes si variées des maladies qui affectent la peau, contrairement à celles des autres tissus dont les éléments sont beaucoup moins compliqués ?

Nous avons cherché à démontrer que, par rapport à la cause, à la forme, au développement, à la marche, à la terminaison, les maladies de la peau étaient identiques avec les maladies des autres tissus et organes de l'économie; qu'elles devaient par conséquent, rentrer dans le cadre général de la pathologie, non comme exceptionnelles, mais comme se pliant facilement à toutes les classifications admises aujourd'hui pour les autres maladies.

Quelles conséquences faut-il tirer de ces analogies au point de vue de la thérapeutique ? C'est : 1° Qu'il faut appliquer au traitement des affections cutanées les règles de thérapeutique qui dirigent le médecin dans le traitement des maladies des autres organes ;

2° Qu'il y a lieu de répudier cette sorte d'empirisme qui, jusqu'à présent, a été sans cesse invoqué pour la guérison des maladies de la peau, sauf à conserver les agents dont l'expérience a consacré les succès et l'efficacité.

Donnons quelque extension à ces deux dernières propositions.

Du temps de Lorry, d'Alibert, de Biett même, une maladie de la peau était généralement réputée dartre. C'était, aux yeux des médecins, une conséquence nécessaire d'un état général. Cet état général, il fallait le modifier pour obtenir la guérison de la dartre, et pour arriver à cette modification, on employait une série de moyens, tisanes amères ou sudorifiques, sirops amers, soufre, antimoine, arsenic, mais surtout emploi continuel et constant, pour tous les cas, des tisanes et sirops dépuratifs et des sulfureux. Que la maladie fût récente, qu'elle fût ancienne, qu'elle eût une forme plus ou moins aiguë, plus ou moins chronique, c'était le miroir d'un état général qu'il fallait modifier à tout prix.

A quel caractère reconnaissait-on la nécessité d'employer ces mod ficateurs? A quel genre d'état général avait-on affaire? Quelle ci constance dirigeait dans le choix de ces dépuratifs? C'est ce qu'o n'a jamais pu préciser, et il faut le dire, c'est ce que le praticien plus exercé n'a jamais fait que par tâtonnement. — De là une in fluence souvent inutile ou même nuisible portée sur toute l'économi ou sur l'estomac et les intestins en particulier ; une surexcitati des affections dartreuses par l'emploi de moyens énergiques, ta à l'extérieur qu'à l'intérieur, et tant, l'entretien ou la prolon gation d'une maladie de la peau , prise au début et traitée p une médication simple, aurait p érir dans un espace de tem très court.

Quant au traitement local, les ions cutanées étaient aux ye de la généralité des praticiens de tables *noli me tangere* qu'il lait toujours respecter, qu'ell n fussent la cause et l'orig et c'est ainsi que l'on perpétuait s les familles des maladie se reproduisaient de génération e énération.

Que demandons-nous depuis temps? Qu'une maladie peau soit envisagée au même p de vue que les malad autres organes; que le médecin en erche avant tout l'origi cause; qu'il étudie surtout les rapports qui peuvent exist l'affection cutanée et la lésion d'un organe interne c général de l'économie. — Qu'il examine si la maladie est séquence du tempérament, de la constitution, de la profe habitudes et de la manière de vivre du sujet. — Qu'il re début et sa marche, comme il le fait à l'égard des autres et qu'il emploie, dans ces premières périodes, un traitem ou local en rapport avec la forme aiguë ou chronique

Que les sudorifiques, les amers, les préparations sulf timoniales, arsenicales, iodées, mercurielles, etc., soient armes puissantes entre les mains du praticien : mais que en dispose seulement en raison des conditions dans trouve le sujet; de l'expérience qu'il a acquise de l'eff moyens dans telle forme de maladie cutanée, et lor d'*inconnue*, pour ainsi dire, vient à se révéler au méde puissance des moyens ordinaires.

Alors, on fait une médecine sage et rationnelle; on arrive peut-être encore, dans beaucoup de cas, à l'empirisme, mais on ne s'expose à altérer la santé et la constitution du malade, pour obtenir la guérison de la maladie de la peau, qu'après avoir consacré l'impuissance des moyens ordinaires. C'est assez dire que, comme nos devanciers, nous attachons une grande valeur aux médications préconisées de tout temps; seulement nous en signalons l'abus et nous n'en demandons l'application que lorsqu'elle devient nécessaire. Tel est l'ensemble de nos doctrines en dermatologie. Pour en prouver le fondement, il nous faut étudier avec soin et d'une manière générale les causes, le développement, la marche et la terminaison de ces affections. Nous exposerons ensuite la thérapeutique générale à laquelle nous sommes conduit par nos idées, thérapeutique que nous formulerons sous le titre de *Médications*. Et comme nous relions les formes morbides à certaines conditions de tempérament et de constitution; comme nous groupons autour de ces médications les maladies en raison même des causes qui les font naître, nous espérons faire sortir les praticiens de la thérapeutique presque banale qu'ils ont suivie jusqu'alors.

I. Des causes des maladies de la peau.

Depuis 1841, nous avons mis entre les mains de nos élèves internes des feuilles de relevés en tête desquelles nous avons établi des colonnes d'entrée, de noms, d'âge, de profession, d'habitation, d'état, de tempérament et de constitution, de localité affectée, etc., etc., le tout pour chaque maladie; nous avions pu recueillir ainsi, il y a deux ans, dix-huit cents cas de maladies de toute sorte. C''était bien peu relativement à un service de cent trente lits, à raison de dix à quinze malades entrant par semaine; depuis cette époque ce chiffre d'ensemble a été confirmé par de nouveaux faits statistiques recueillis depuis la publication de la première édition de cet ouvrage. Nous ne les ajoutons pas à ce nombre, parce que, sans changer les rapports proportionnels, ils entraîneraient le changement des chiffres numériques applicables à chaque espèce de maladie. Ce chiffre d'ensemble est venu confirmer entièrement les

idées générales que nous nous étions formées d'après l'observat soutenue des malades confiés à nos soins, idées générales qui s devenues la clef de notre thérapeutique : à savoir, que certai *formes morbides sont liées à certains tempéraments*, à certaines c stitutions, de sorte qu'en employant des agents thérapeutiq connus pour être des modificateurs de ces tempéraments, on gu l'affection cutanée qui n'en est qu'un reflet. Ainsi, les mala sécrétantes, et surtout celles à forme purulente, l'*impétigo*, l'*eczé* l'*eczéma impétigineux*, l'*intertrigo*, etc., sont essentiellement liées tempérament lymphatique; le *lichen* et ses variétés, le *prur* affections papuleuses non sécrétantes, se trouvent toujours chez sujets à tempérament nerveux; le *pityriasis versicolor*, les *ta hépatiques*, chez les sujets bilieux : d'où la nécessité de l'usage ferrugineux, des amers, des antiscorbutiques, des sulfureux, d les maladies sécrétantes; des alcalins sous toutes les formes d les affections papuleuses ou lichénoïdes. Et comme sur dix-l cents cas de maladies cutanées on en trouve huit cent cinqua deux qui sont des affections sécrétantes, on conçoit commen médication amère et sulfureuse ait pu jouer de tout temps et l'absence de toute théorie un si grand rôle dans la thérapeutique affections de la peau. Cette liaison de la forme morbide av tempérament a pour nous une telle portée, qu'à la vue d'u lade atteint d'une affection de la peau et chez lequel le tempér est nettement dessiné, je pourrais pressentir la forme de v cutanée dont il est atteint, sans voir la maladie elle-même.

D'une autre part, on ne peut nier, et c'est un fait d'obs commune à tous les médecins, qu'il est des maladies de âges, que l'âge seul peut guérir, et où il y a même qu danger de guérir.

D'autres affections sont essentiellement liées à l'hér que l'*ichthyose*, la *lèpre;* pour celles-là la médecine toujours impuissante.

Il en est qui dépendent de l'organisation même de la l'*acné sébacée* et plusieurs variétés d'*acnés*. Quelques- chent essentiellement à la menstruation : l'*erythema* exemple; à l'âge critique chez les femmes, l'*intertri*

oreilles ; d'autres, à la misère, à la malpropreté, comme le *rupia*, le *prurigo*, le *prurigo pédiculaire ;* ou bien à la mauvaise nourriture, au défaut de nourriture ou aux chagrins prolongés, comme le *rupia*, l'*ecthyma cachecticum*, le *scorbut*, le *purpura*. Il en est qui sont un reflet des lésions gastriques ou intestinales, et principalement de gastralgies, comme l'*herpès* et le *pityriasis*.

Les causes prédisposantes des affections cutanées doivent donc être rattachées :

1° Au climat ;

2° A l'hérédité ;

3° Au tempérament ;

4° A l'âge ;

5° A l'organisation de la peau ;

6° Aux agents extérieurs mis en contact avec elle ;

7° Aux affections morales ;

8° Aux maladies, infirmités ou états acquis ;

9° A un état soit des liquides, soit des solides de l'économie, que nous ne pouvons pas saisir, et qui à nos yeux doit constituer un huitième ordre, auquel nous donnons le nom de *diathèses* dans l'acception simple de ce mot.

Donnons quelque développement à ces huit ordres de causes.

Le climat engendre certaines maladies de la peau telles que la lèpre des Arabes, des Hébreux, des Grecs, le pian d'Amérique, comme il engendre dans d'autres contrées la peste et la fièvre jaune : sous ce rapport analogie parfaite.

L'hérédité est *relative* ou *absolue*. Absolue, quand l'enfant apporte en naissant, ou peu de temps après la naissance, la maladie de l'un de ses parents : exemple, l'enfant né avec une *ichthyose*. Relative, quand il naît avec les *conditions d'organisation* du père ou de la mère atteints l'un ou l'autre d'une maladie de la peau. Cette différence est capitale. Dans le premier cas, l'affection est *innée*, elle est incurable ; dans le second, au contraire, l'enfant apporte en naissant la prédisposition à son développement ; on peut souvent en prévenir la manifestation en soumettant l'enfant à des conditions hygiéniques données. Ainsi l'enfant né d'un père ou d'une mère affectée de *psoriasis* n'est pas condamné à avoir un *psoriasis ;* il y est

prédisposé. Prenez plus de soin de sa peau que vous n'en pren pour tout autre; graissez-la de temps en temps; multipliez les l habituez l'enfant à se laver la surface du corps à l'eau froide les matins; employez, en un mot, les moyens hygiéniques vous mettriez en usage pour éviter le retour du psoriasis, et préviendrez le développement de cette maladie. On ne sau cet égard se dissimuler l'influence de l'hérédité; elle est inm On voit quelquefois une affection cutanée passer sur une géné sans l'atteindre et se refléter sur la génération suivante : c'es remarque que j'ai eu l'occasion de faire très souvent; c'est dire que le médecin a un grand intérêt à ne pas laisser sul les affections cutanées durant de longues années, chez les e et chez les jeunes gens, ainsi que le font encore aujourd'hui coup d'entre eux, puisqu'ils ouvrent la porte à l'hérédité: en ces maladies finissent par prendre tellement domicile sur le ti la peau qu'elles semblent s'identifier avec l'organisation tout e et devenir quelques années plus tard l'origine d'une transmissi parents à leurs descendants. — Mais ce n'est pas seulement à l' des affections squameuses que se manifeste l'hérédité comme de maladies, l'eczéma et l'eczéma impétigineux du père se re fréquemment sur les enfants; il en est de même du lichen qu a été conservé pendant longtemps sous une forme chroniq l'égard de la syphilis constitutionnelle, elle se transmet de gé tion à génération sous deux formes : ou sous celle de s franche, ou sous celle de scrofule syphilitique. L'attention decins n'a pas encore été suffisamment appelée sur ce pass syphilis à cette forme. Bon nombre d'enfants atteints de cari ont une scrofule syphilitique provenant d'une affection sy constitutionnelle mal soignée chez les parents, ou bien modifiée revêt chez eux, en raison même de leur tempér leur constitution, une forme insidieuse du genre de cell térise les accidents tertiaires. J'ai vu un très grand no de ce genre, et il est rare que je n'aie pas toujours da deux ou trois personnes dans ces conditions; ce n'est pl avec ses formes accentuées et régulières, c'est q d'anormal entre la scrofule et la syphilide. Ainsi tro

nombre de lupus qui ne sont ni des lupus tuberculeux, ni des *lupus exedens*, et qui sont héréditairement syphilitiques. Les préparations mercurielles qui, dans le traitement de la scrofule, jouissent d'une certaine efficacité, ne la doivent probablement qu'à la nature syphilitique de cette forme scrofuleuse qui n'a pas encore été suffisamment étudiée et dont nous nous occupons depuis plusieurs années. M. Bazin partage notre manière de voir à cet égard.

Nous avons dit que la cause prédisposante de la généralité des maladies sécrétantes résidait dans le tempérament et dans la constitution du sujet. Nous avons établi par des données statistiques que la moitié des affections cutanées recevait une influence directe et puissante du tempérament lymphatique; et nous avons expliqué comment se trouvait justifié l'emploi, nous dirions presque l'abus que l'on fait depuis longues années des sulfureux dans le traitement des maladies de la peau. Cette remarque est importante, car si cette circonstance justifie l'emploi de ces médicaments, elle pose un terme à leur usage; elle prouve que les sulfureux doivent être exclus de la thérapeutique des maladies cutanées qui n'ont pas pour siége un sujet de tempérament lymphatique. Mais nous avons été plus loin, et nous avons avancé qu'à chaque tempérament se rattachait une série de dermatoses à élément uniforme. Or chaque tempérament ayant son modificateur : l'eau et les émissions sanguines pour le tempérament sanguin; les amers, les sulfureux, les ferrugineux et l'iode pour le tempérament lymphatique; les alcalins pour le tempérament bilieux; les sédatifs externes et internes pour le tempérament nerveux, il en découle toute une thérapeutique nouvelle des maladies de la peau, thérapeutique plus rationnelle et qui ne repose plus sur la routine de l'empirisme. Ce sont des faits que nous développerons dans notre thérapeutique générale, et dont nous prenons acte dès à présent.

Après le *tempérament* invoqué comme cause prédisposante des affections cutanées, nous avons cité l'*âge*. Prouvons son influence sur le développement et l'entretien de certaines dermatoses. Mais auparavant allons au-devant d'une objection que l'on peut nous faire tout d'abord : Que peut le médecin, dira-t-on, contre l'âge

comme cause de maladie? Nous n'avons pas à recherche l'*étude des causes* ce que le médecin peut ou ne peut pas; ce nous devons nous attacher, c'est de savoir si réellement l' une cause prédisposante. Personne ne nie l'influence de dité comme cause, et cependant que peut le médecin l'hérédité?

Il est d'abord un fait admis par tout le monde, c'est qu'il maladies de la peau qui ne se rencontrent qu'à certains âge vie. Ainsi les eczémas, eczéma impétigineux, impétigo, du cu velu et de la figure (croûtes de lait), dans la première enfan lichens dans l'enfance, les érythèmes dans la jeunesse, le lupu l'adolescence, le psoriasis, la lèpre vulgaire, dans l'âge viril ; l rigo, le scorbut, le rupia, dans la période décroissante de la bien d'autres affections que j'aurais pu citer. Or un certain n de ces maladies, pour la première enfance, peuvent guérir par le fice seul du temps ; l'âge en est donc la cause prédisposante C'est qu'en effet l'économie n'a pas la même organisation ou telle époque de la vie, et comme pour nos besoins nou dons la vie sous ce rapport en une série de phases dura quelles l'organisation progresse en modifiant la texture des puis devient stationnaire et finit par décroître ; on comprend que des maladies survenues au voisinage de la naissance p être modifiées et guérir avec le seul secours du temps. On que les tissus puissent être affectés différemment durant ces périodes de la vie, et c'est ainsi que l'âge qui les représente une cause prédisposante des affections cutanées.

L'*organisation de la peau* est aussi une cause puissante loppement de certaines dermatoses. Remarquons, sous combien la peau diffère suivant les individus. Tout en que l'organisation de ce tissu varie selon le tempéramen blanche et épaisse dans le cas de tempérament lymphati et sèche chez les sujets bilieux ; blanche et fine chez sanguins, il existe, indépendamment de ces distinctio certaines conditions d'organisation de peau, partic ques personnes, et qui se font remarquer soit dans t de la peau, soit seulement dans certaines régions d

il est des enfants qui naissent avec une peau épaisse, blafarde, huileuse, *opaline* en général. Dans ce cas, il est rare de ne pas voir apparaître dès les premières années de la vie ou dans l'adolescence une maladie sécrétante, et sécrétant principalement du pus. Si la peau du visage est seule dans cet état, la maladie sera le plus souvent bornée à cette partie, ou si elle ne survient pas, la peau ainsi organisée sera plus tard le siége des diverses variétés d'*acne rosacea* ou *indurata*. Si c'est la peau du dos, on y verra surgir dans l'âge de l'adolescence de gros boutons qui apparaissent successivement sur les épaules des jeunes gens, et dont on observe tant d'exemples sur les baigneurs des bains de rivière en été; c'est encore de l'*acné*. Sont-ce les aisselles dont la peau présente cette organisation, il s'y présentera chez les jeunes filles un *intertrigo* plus ou moins *purifluens*, ainsi que je l'ai dénommé; et plus tard, chez les femmes à l'âge critique, un *intertrigo*. Jamais on ne trouvera de semblables maladies sur la peau sèche et brune, qui est l'apanage du tempérament bilieux; mais on observera les *pityriasis alba*, *versicolor*, *nigra*; le *lichen* affectera la peau fine et mince, qui appartient au tempérament nerveux.

Il est donc des conditions d'organisation de la peau qui favorisent le développement de certaines maladies cutanées. Celles que nous venons d'indiquer sont appréciables, mais il en est d'inappréciables: telle est, par exemple, cette structure de la peau qui exhale l'odeur fétide dont nous parlions précédemment. Telle est aussi cette particularité que nous signalerons plus loin à l'occasion des médications, à savoir, qu'il est certains individus dont la peau ne peut pas supporter le moindre corps gras chez les uns, un cataplasme émollient chez les autres, sans qu'il s'y développe aussitôt un érythème. Impossible d'ailleurs de reconnaître à la vue ces différences de sensibilité qui sont une conséquence de l'organisation spéciale du tissu.

On peut donc établir en principe qu'il existe d'abord des maladies cutanées de causes externes et des maladies de causes internes. Parmi les premières, il faut ranger celles qui résultent du contact de tous les agents extérieurs avec la peau; ainsi l'*erythema solare*, les divers érythèmes non sécrétants qui proviennent de frictions ou

lotions avec des acides, des alcalis, des pommades trop fort base de potasse, de soude et d'ammoniaque ; des application liqueurs alcooliques, comme l'érythème des mains des filles comptoir chez les marchands de liqueurs ; ou celui qui rés des frictions avec l'eau sédative ; l'eczéma lichénoïde et impé neux des épiciers, le pemphigus des teinturiers, etc., etc. ; e du dépôt sur la surface de la peau des insectes qui peuvent y v et s'y propager pour développer la gale, la maladie pédicula le prurigo, le pediculus du p[illegible]ou des cryptogames qui les contacts passent d'une tête à une autre pour y faire naît teigne ou l'herpès tonsurant, si [illegible]errain est propre à la ge nation des spores qui ont été [illegible]ées. En dehors de ces cau il faut qu'il y ait une prédispo[illegible] c'est celle qui a son poin départ dans les conditions stat[illegible]ues que nous venons de t connaître.

Il est un ordre spécial de causes qui influent singulièrement su développement de quelques maladies cutanées, je veux parler *causes morales*, et en particulier des *chagrins* de tout genre : le *p phigus diutinus*, le *rupia*, l'*ecthyma cachecticum*, le *purpura*, le *s but*, les *furoncles*, sont autant d'affections qui reconnaissent p causes prédisposantes les peines morales. Si c'est à un âge a avancé de la vie que ces maladies s'observent, ce n'est aussi cet âge que nous subissons réellement l'influence de cet ordre causes : les exemples en sont d'ailleurs journaliers. Leur actio est d'autant plus grande qu'en supprimant l'appétit, elles amèn la cachexie. — Mais les émotions vives, comme la colère, frayeur, développent rapidement les maladies à forme éruptive, a qu'elles développent la jaunisse. Ces jours derniers, un manuf rier de C..... me consultait pour un psoriasis herpétiforme g qu'il portait à la peau depuis dix mois. La maladie s'était n tout à coup après l'impression produite par un accident gra venu dans sa manufacture : la chaudière de la machine à ayant éclaté, sept ouvriers avaient succombé à la suite de b On voit donc que plus nous avançons dans cette étude des causes, plus l'assimilation que nous avons faite entre ladies de la peau et celles des autres tissus ou organes

nomie tend à faire reposer ce rapprochement sur des bases plus solides.

A l'égard des causes prédisposantes, il nous faut aussi invoquer les *indispositions, infirmités, ou états acquis* dans la santé générale, que l'on considère avec raison comme des causes propres à développer d'autres maladies dans l'économie. A leur tête nous placerons, pour la femme, trois conditions importantes : le moment où va s'opérer la menstruation, celui où elle se dérange accidentellement, celui où elle cesse naturellement ; et pour l'homme, l'époque de la vie où il entre dans l'âge de la puberté, et celle où il se trouve dans un âge que j'appelle *critique*, comme chez la femme, quoiqu'il n'y ait pas chez lui de menstruation. Il existe en effet chez l'homme, à l'âge de la puberté, et à un âge correspondant à celui de l'âge critique de la femme, une corrélation parfaite dans le développement des mêmes maladies, ainsi qu'on va le voir dans les faits suivants. Parlons d'abord de ce qui est relatif à la femme. Lorsqu'une jeune fille va se régler, non-seulement il se montre un dérangement dans la santé générale qui annonce cette nouvelle phase de la vie, mais encore elle est fréquemment sujette à une espèce d'érythème qu'on appelle *noueux* (*erythema nodosum*) ; de sorte qu'une petite évacuation sanguine devient presque toujours indispensable pour arrêter l'affection, sans quoi elle se prolonge durant un mois, six semaines, avec des malaises et un état général souvent fort préjudiciable à la santé. La même affection, exigeant le même traitement, se montre au même âge, c'est-à-dire vers quinze ou seize ans, chez le jeune homme.

Je ne veux pas attacher pour cela trop d'importance à l'établissement de la menstruation chez les jeunes filles, ou au moins plus d'importance que de droit ; sous ce rapport, je combattrai de toutes mes forces un préjugé généralement répandu chez les médecins à l'égard de l'établissement de la menstruation envisagée comme *moyen* ou *circonstance curative* des affections de la peau déjà existantes. Une jeune fille a dès l'enfance une affection cutanée rebelle ; le médecin tient alors ce langage aux parents : *Attendez, la menstruation va s'établir et la maladie guérira sans agents thérapeutiques*. Les règles se montrent et la maladie ne guérit pas. Alors on

se rejette sur le mariage et l'on dit : Viendra une grossess
débarrassera la mère de sa vieille affection cutanée. Le ma
arrive, et il ne peut rien pour la maladie de la peau. La gros
s'établit, la maladie de la peau disparaît, mais à peine l'accou
ment a-t-il eu lieu qu'elle reparaît avec autant d'intensité qu'a
ravant, à moins que la jeune mère n'allaite ; mais une fois l'all
ment terminé, l'affection prend le dessus. Ce qu'il y a de
fâcheux encore, c'est que la mère transmet alors très fréquem
à son enfant la prédisposition à la maladie ou même la maladie
elle était atteinte depuis de longues années. Ainsi, pour avoir né
de traiter de bonne heure une affection cutanée chez une j
fille, on perpétue cette affection dans une famille. Loin de m
pensée qu'à tout âge et à tout prix il faille guérir. Dans l'enfa
ces maladies sont en général *sécrétantes* de leur nature ; c'est
sorte d'exutoire qui garantit l'enfant d'affections plus graves
organes internes. Il faut alors les respecter par deux motifs
premier, c'est celui que je viens de faire connaître à l'instant
second, c'est que jusqu'à l'âge de cinq ou six ans l'enfant n'est
encore assez fort, il n'est pas encore assez développé pour perm
l'emploi de moyens médicamenteux suffisamment énergiques p
guérir une maladie d'une certaine durée ; mais lorsque l'enfa
pris un développement suffisant, il y a faute, je dirai presque il
crime à abandonner l'enfant à lui-même dans cet état, et aux s
efforts de la nature qui ne fait rien ou presque rien pour la guéri
Je n'hésite donc pas à heurter de front ce préjugé avec to
conviction et la conscience d'un homme qui a vu journelle
depuis longtemps les conséquences déplorables d'une tell
tion médicale, et le lecteur me pardonnera ce langage énerg
présence des conséquences désastreuses qu'entraîne une
conduite pour toute une famille stigmatisée et flétrie dan
cendants à divers degrés.

L'âge critique chez l'homme et chez la femme est la caus
sieurs affections cutanées. Nous citerons l'*eczéma* des
celui du cuir chevelu, l'*eczéma* du bout des seins, l'*in*
sein, celui des aines et des cuisses, le *prurigo* de la v
femme ; et chez l'homme, l'*eczéma* des bourses, le *pruri*

l'*eczéma* des oreilles, maladie moins commune, il est vrai, que chez la femme.

Nous en dirons autant des affections cutanées qui reconnaissent pour cause prédisposante et déterminante les dérangements dans la menstruation, l'aménorrhée ou la suppression d'un flux hémorrhoïdaire. Ici pas de maladies spéciales; elles varient dans leur forme en raison du tempérament et de la constitution du sujet.

Enfin, c'est surtout dans l'état malade de certains organes internes, et notamment des membranes muqueuses, qui ont des rapports si intimes avec la peau, qu'il faut rechercher la cause de bon nombre de maladies cutanées: les gastralgies ou entéralgies, les gastrites ou gastro-entérites chroniques, les hypérémies ou subirritation des voies biliaires, le catarrhe chronique de la poitrine et l'asthme, sont autant d'états qui prédisposent aux maladies de la peau. Il est peu de formes d'*herpès* ou de *pityriasis* qui ne soient liées à l'un ou à l'autre de ces états, de sorte que, dans certains cas, en remédiant à l'affection primitive, on guérit l'affection secondaire sans employer aucun des moyens que l'on dirige habituellement contre ces maladies cutanées : c'est ce qui arrive souvent pour l'*herpès* (ceci envers et contre les idées émises par les micrographes, qui ne voient dans ces affections que des cryptogames à détruire). Le *purpura* n'est fréquemment que le reflet d'une affection intestinale. Il est des *prurigo* qui sont une source de bien-être pour l'asthmatique; tant que la démangeaison est à la peau, la respiration est libre. Il en est de même du *prurigo* de l'anus, souvent lié à des bronchites ou coïncidant avec des poitrines assez délicates, pour que la guérison de cette maladie puisse être un danger. J'ai vu un magistrat qui, peu de temps après la guérison d'un prurigo de l'anus, a été pris d'hémoptysie; l'hémoptysie a cessé quand les voies urinaires se sont affectées à leur tour; puis a succédé une gastralgie qui a fait disparaître l'état des voies urinaires. Eh bien! tout en l'ayant débarrassé d'un *prurigo* de l'anus tellement incommode que ce magistrat ne pouvait plus siéger, j'ai un moment regretté la guérison que j'avais opérée. Heureusement l'avenir ne m'a plus laissé l'ombre d'un regret, car il jouit depuis plusieurs années d'une excellente santé.

C'est qu'en effet ce n'est pas par la suppression seule d'une m ladie sécrétante que l'on peut compromettre la santé et la vie d malade, il suffit souvent de la suppression d'une démangeai habituelle, surtout lorsque l'organe souffrant dont l'état coïnc avec la maladie prurigineuse se trouve être l'organe pulmonaire s'opère alors des congestions moitié séreuses, moitié sanguines d le tissu des deux poumons; on n'y entend pas de râle crépita mais tous les râles sonores qui accompagnent et l'asthme avec c gestion et la congestion elle-même; le pouls ne dénote pas de p nitude dans la circulation, il est petit et fréquent; que l'on sai les malades, et *on les tue;* une dérivation puissante par une érupt artificielle confluente dans toute l'étendue du dos, des épaules des lombes, à l'aide de l'huile de *croton tiglium*, de larges si pismes ou des vésicatoires promenés sur la poitrine en même ten que l'on rappelle la démangeaison au point primitivement affec voilà la véritable thérapeutique.

A toutes ces causes, il faut ajouter la misère, la malpropreté, vie errante et la débauche qui engendrent les maladies pédiculai de la tête et du corps, le prurigo, le rupia, l'ecthyma *cachecticu* et peut-être aussi un certain nombre de ces affections psoriqu avec production végétale ou animale, telles que la gale, teigne, l'herpès tonsurant, etc. C'est assez dire que malgré tout qui a été écrit à ce sujet, nous croyons encore à la spontanéité développement de certains corps organisés qui occupent les de niers degrés de l'échelle végétale ou animale. Leur origine, le semence, leurs ovules sont-ils transportés dans l'air ambiant po venir prendre naissance sur un terrain devenu favorable à le éclosion, comme la gale qui se développe sur les animaux mala ou comme l'oïdium qui a attaqué certains végétaux dans tou France dans des années mauvaises où ces végétaux souffre eux-mêmes dans leurs végétations? Cela est possible, mais démontré comme règle absolue. Quoi qu'il en soit, l'histoire relle seule ne peut pas résoudre une pareille question s concours de la pathologie; et, nous devons le dire, les faits pa giques sont loin d'être toujours d'accord avec les lumières fo par l'histoire naturelle.

Enfin, pour compléter ce tableau, il nous reste à rappeler qu'il est des cas où la cause est inappréciable ; elle échappe aux investigations les plus sérieuses, et cependant des agents thérapeutiques puissants administrés à l'intérieur, d'après ce que l'expérience peut avoir appris, c'est-à-dire d'après un empirisme éclairé, parviennent à la combattre et à la détruire. C'est dans ces sortes de cas que l'on a appelé cette cause cachée des noms de *virus dartreux*, *diathèse dartreuse*, *inconnu des dartres*, etc. Quelle est la nature de cette cause? Nous l'ignorons. Est-elle diverse? Cela est possible et même probable, puisque dans un cas elle est détruite par une médication, et dans un autre par une médication d'un autre genre. Mais nul ne saurait dire ce qu'elle est, où elle réside ; si c'est dans le sang ou les humeurs, si c'est dans les solides. Jusqu'à ce que la science ait fait un pas de plus, il faut nous satisfaire de ce qui est acquis à cet égard, c'est-à-dire de la certitude d'une cause inconnue qui nous échappe. Démontrons-en l'existence par des exemples : Le psoriasis est une des affections les plus communes ; il se perpétue dans les familles, se transmet de génération en génération à des degrés différents. Dans la très grande généralité des cas, il affecte des individus fort bien constitués chez lesquels ne prédomine aucun tempérament ; il arrive à un âge où le développement de l'homme est presque complet ; il a ses lieux d'élection toujours constants ; mais bientôt il s'étend à toute la surface du corps. Administrez à l'intérieur l'arsenic sans aucun traitement externe, et le psoriasis va guérir, je ne dirai pas dans tous les cas sans le secours d'aucun moyen externe, mais au moins dans la généralité des cas. — Un eczéma ne se borne pas à paraître sous la forme d'une plaque plus ou moins étendue de la surface de la peau, mais par une série de plaques morbides disséminées soit sur les membres, soit sur le tronc, et avec une certaine symétrie, en ce sens que les deux membres supérieurs et inférieurs sont affectés dans les mêmes régions. Tout cela s'est opéré le plus souvent sans cause appréciable, à la manière d'une éruption exanthémateuse. Est-ce que toute l'économie n'est pas malade dans ce cas? Aussi l'arsenic, l'iodure de soufre, l'orme pyramidal font-ils souvent justice de ces affections. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que de tous les agents ainsi employés l'arsenic et le soufre,

principes minéralisateurs par excellence, sont aussi les antidotes le plus énergiques à opposer à ces causes inconnues, ce qui peut nous rendre compte peut-être des résultats si remarquables qu'amène l'emploi des eaux minérales dans le traitement de certaines maladies cutanées. Il en est de même de la teinture de cantharide contre les lichens généraux chroniques de la jeunesse. Ce sont là ces états pour lesquels on a créé un nom particulier, qui est aujourd'hui celui de *diathèse*, et que nous repoussons comme une expression propre à fausser l'esprit en ce sens, que si on lui fait exprimer la nature de la cause, on se satisfait à l'aide d'un mot, et l'on empêche ou l'on arrête des investigations qui tôt ou tard doivent tendre à une appréciation plus saine et plus directe de la cause morbide. Cependant, pour combler une lacune, il a bien fallu en faire l'objet de notre huitième espèce de causes éloignées ou prédisposantes.

Ainsi, comme on peut le voir par ce coup d'œil rapide sur l'ensemble des causes prédisposantes et déterminantes des maladies de la peau, il n'y a aucune différence entre ces causes et celles qui développent les maladies des organes internes; l'analogie, sous ce rapport, est aussi complète que possible.

II. Invasion, marche, terminaison des maladies cutanées.

Les maladies de la peau se développent avec la forme aiguë ou avec la forme chronique. Ce n'est pas que je prétende que toutes les affections cutanées puissent toujours présenter l'une et l'autre forme; cependant il en est bien peu qui fassent exception à cette règle si généralisée à l'égard des maladies des autres organes: je ne connais que l'*ichthyose*, la *pellagre*, le *pityriasis nigra*, le *vitiligo* et quelques *lèpres* qui fassent exception. Si les affections cutanées se montrent souvent à l'état chronique aux yeux du médecin, c'est que le malade a recours à ses soins quand l'état aigu est passé. Tandis que les transitions brusques de température, le passage du chaud au froid, la suppression de la transpiration sont des causes puissantes de maladies aiguës pour les organes internes; elles n'ont pas ou n'ont que peu d'influence sur la p

elle-même qui n'est pas un organe parenchymateux; de là les formes aiguës moins fréquentes à la peau: celle-ci est une enveloppe avec des fonctions de transsudation nécessaires à la régularité des fonctions des organes internes, nécessité qui ne se rencontre pas au même degré pour la peau elle-même. Lorsque des conditions inverses s'observent, c'est-à-dire lorsqu'à l'égard de la peau il y a reflet d'un organe interne souffrant sur son tissu sain, cette influence ne se fait sentir que lentement et graduellement; elle ne surexcite la peau ou ne reflète son état morbide que peu à peu; peu à peu aussi la maladie qu'elle fait naître dans le tissu cutané se développe avec une marche plus ou moins subaiguë et même chronique. Ainsi, d'une part les médecins ne sont consultés que fort tard, parce que l'affection cutanée n'est pas compromettante pour la santé; d'une autre part, les maladies de la peau reflétant souvent un organe interne souffrant, le développement de la maladie est lent à se faire, comme est lente l'action qu'exerce sur la peau la cause déterminante.

Cependant il est des affections cutanées qui se rapprochent beaucoup sous ce rapport des maladies que nous venons de citer. Ainsi: le zona, qui a toujours trois à quatre jours de prodromes; l'herpès phlycténoïde, précédé de deux jours de douleurs dans la partie qui sera le siége de l'éruption; l'*herpès multiple*, dont l'anorexie, l'inappétence, la lassitude générale sont les avant-coureurs. L'*érythème*, quel qu'en soit la forme, est dans le même cas. Nous citerons encore l'*urticaire*, le *rupia*, l'*ecthyma cachecticum*, le *scorbut*, le *purpura*, qui sont précédés depuis six à huit jours de fatigue générale, de courbature de lassitude dans les membres. Quant à préciser d'une manière plus complète cette incubation des maladies de la peau, l'observation du passé ne permet pas de le faire; c'est là un sujet d'observation qui constitue une certaine lacune à remplir. Ainsi aujourd'hui, que l'on ne voit qu'observations microscopiques, bonnes sans doute puisqu'elles éclairent sur la nature des maladies, mais qui ont l'inconvénient de conduire leurs auteurs à faire découler, *dans tous les cas*, de ces observations la thérapeutique des maladies, on ignore le temps d'incubation nécessaire soit aux productions végétales, soit aux productions animales. Combien de jours faut-il pour qu'une

sporule de teigne développe le godet teigneux? De même aussi pour l'*herpès tonsurant*, le *pityriasis* et la *mentagre*, selon certains micrographes. Combien de temps l'insecte de la gale met-il à opérer ce que j'appelle l'*évolution de la gale?* On sait bien qu'en deux ou trois jours il peut tracer un sillon, même parfois en vingt-quatre heures; mais un sillon isolé, ce n'est pas là l'évolution galeuse. De même pour la maladie pédiculaire.

Quant aux affections de cause externe, tantôt elles se manifesteront dans un espace de temps court, comme les érythèmes produits par le soleil; ceux produits par le contact de matières irritantes avec la peau à la suite de l'emploi des acides, de l'eau de javelle, de l'eau sédative, des liquides alcooliques; leur apparition dépend de l'intensité d'action des corps irritants et de la susceptibilité de la peau avec laquelle ils ont été en contact. Un épicier, un maçon, un teinturier peuvent rester des années sans voir se développer d'*eczéma impétigineux et lichénoïde* des mains, puis la maladie se manifester assez brusquement sous des influences qu'il est bien difficile d'apprécier. Mais n'en est-il pas de même pour toutes les causes qui produisent les maladies des organes internes?

Une maladie de la peau a-t-elle ses périodes régulières, son temps limité d'évolution et de décroissance, comme les maladies des autres organes?

Avant de résoudre cette question, je pourrais poser la suivante et dire : Si, parmi les maladies qui affectent les autres organes de l'économie ou l'économie en général, il en est un certain nombre qui parcourent des périodes régulières, n'en existe-t-il pas un nombre bien plus considérable où la durée ne saurait être limitée et où les phases de la maladie ne pourraient être précisées par des septénaires ou par un nombre de jours donné. Il y a plus, l'observation de ces maladies à septénaires réguliers n'a-t-elle pas pris naissance dans les affections cutanées mêmes? N'est-ce pas d[illegible] fièvres éruptives qu'on en a fait en premier la remarque? H[illegible] pocrate, qui a tant insisté sur telle ou telle maladie qui se jug[illegible] une période donnée de temps, n'a-t-il pas appliqué aux autres [illegible]ladies ce qu'il observait pour les éruptions cutanées? Mais laisse[illegible]

de côté ces questions qui pourraient nous conduire trop loin, et bornons-nous à prouver ce fait, qu'il est un certain nombre de maladies de la peau qui se jugent dans une période de temps limitée comme les autres maladies, et que s'il en est un assez grand nombre qui paraissent se soustraire à cette règle, cela ne dépend pas entièrement de ces maladies, mais bien des conditions dans lesquelles la peau se trouve placée par rapport aux autres tissus ou organes. Les maladies de peau qui se jugent dans un temps donné sont nombreuses : nous citerons comme exemples tous les *exanthèmes*, les *érythèmes*, l'*urticaire*, l'*impétigo*, l'*ecthyma*, le *zona*, le *purpura aigu*, le *pemphigus aigu*, l'*herpès phlycténoïde*, le *lichen urticans*. Ce qui ne veut pas dire que ces diverses maladies ne puissent passer à l'état chronique, mais ce qui signifie qu'abandonnées à elles-mêmes avec des conditions de repos et d'hygiène convenables, elles peuvent suivre une certaine régularité dans leur marche, et guérir sous l'influence de moyens simples. Mais nous allons plus loin, et nous n'hésitons pas à déclarer que si, pour guérir une maladie de la peau, le malade se plaçait dans les conditions où il se place lorsqu'il s'agit de traiter une affection d'un autre organe, on verrait beaucoup moins de maladies chroniques, on ne rencontrerait pas si souvent de récidives, et ces affections ne feraient pas le désespoir et du malade et du médecin. Expliquons à cet égard toute notre pensée, et faisons comprendre les mauvaises conditions topographiques dans lesquelles se trouve la peau, par rapport aux autres tissus ou organes de l'économie.

Et d'abord, elle sert d'enveloppe : à ce titre, elle est en contact avec l'air extérieur ; elle est recouverte de vêtements ; elle doit se prêter à tous les mouvements d'extension, de flexion, d'expansion et de resserrement. En vain dirait-on que l'air extérieur, et par conséquent aussi les variations atmosphériques, ne sauraient avoir d'influence sur la peau parce qu'elle est habituée au contact de l'air. D'abord la peau n'est pas habituée au contact de l'air d'une manière absolue quand elle est saine ; cette habitude n'est que relative : d'ailleurs la peau n'y est plus habituée lorsqu'elle est malade. On a l'exagération de cette influence de l'air par la souffrance que cause l'excoriation de la peau, même longtemps après qu'elle a été opérée.

Les variations atmosphériques d'humidité, de froid, de sécheresse, etc., sont très puissantes à l'égard de la peau malade; et cela est si vrai, que, dans les moments où le temps passe subitement de l'humidité au sec, nous voyons nos malades tenir le lendemain un langage tout opposé à celui qu'ils avaient tenu la veille : tous accusent une grande amélioration dans leur état, soit sous le rapport de la sécrétion morbide, soit sous celui de la démangeaison. Le contraire a lieu dans des conditions opposées. Il y a plus, du moment que l'on fait tomber à l'aide d'un bain ou d'un cataplasme certaines concrétions morbides qui recouvrent la surface affectée, on amène de la douleur, et une douleur si vive, que le malade la témoigne quelquefois par des souffrances aiguës, ainsi que cela a lieu dans le pemphigus ou le rupia.

La peau saine est un tissu souple, extensible, qui se prête sans douleur aux efforts de tension et de relâchement, d'extension et de retrait; mais aussitôt qu'elle devient malade et enflammée, même d'une manière chronique, il n'est pas possible de se refuser à admettre que son extension et son relâchement ne contribuent puissamment à entretenir et à perpétuer la maladie dont elle est atteinte par la douleur qu'ils développent. Il est des affections qui ne guérissent qu'à la condition de repos absolu; les maladies du larynx en sont l'exemple par excellence. Quelques personnes n'ont échappé à la phthisie laryngée qu'en se condamnant au silence le plus absolu, c'est-à-dire à l'immobilité la plus complète de la partie malade. L'honorable Gerdy, de regrettable mémoire, s'était condamné au silence le plus absolu pendant plus d'une année dans sa chambre, alors qu'il était chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, et c'est à cette circonstance qu'il a dû de prolonger ses jours jusqu'à une phase de la vie trop courte sans doute, mais très longue en présence de la maladie dont il était atteint, et des fonctions du professorat qu'il remplissait. Les affections intestinales chroniques, et celles de tous les organes en général, marchent d'autant plus vite vers la guérison que la condition de repos est mieux observée. Pourquoi donc vouloir qu'une maladie de la peau guérisse *quand même*, et comment ne pas tenir compte de cet usage de nos malades, de vaquer à leurs occupations habituelles, quoique l'affection cutanée existe,

d'exiger cependant du médecin une guérison que l'exercice ne fait que reculer? Mais n'accusons pas seulement le malade; disons que les dermatologistes eux-mêmes n'ont pas assez tenu compte de ces conditions de vie sociale pour leurs malades, et ne soyons plus surpris de la ténacité de bon nombre d'affections, dites dartreuses, en présence de traitements faits dans de pareilles conditions.

Les vêtements entretiennent sur les surfaces malades une excitation continuelle, soit par les frottements qu'ils exercent, soit par la nature de leur tissu. Ainsi, on est souvent obligé de faire doubler de toile des gilets de flanelle, ou même de les enlever pour guérir certaines maladies de la peau; les gants de peau sont généralement nuisibles au traitement des affections des mains. Comme aussi les perruques, les faux toupets, les têtes emmaillottées de bonnets qui enferment la peau et s'opposent à l'évaporation de la sueur, ou qui a retiennent et facilitent sa fermentation, ne permettent pas de uérir les maladies du cuir chevelu; il en est ainsi pour d'autres parties du corps.

Faut-il maintenant ajouter qu'un malade, qu'un médecin même ne comprend pas que, sous le rapport des aliments et des boissons, il faille modifier entièrement le genre de vie; qu'en un mot, toutes les conditions d'hygiène doivent être observées dans le traitement des maladies de la peau comme dans celui des autres maladies? La peau n'est-elle pas une partie du tout comme les poumons, le foie et l'estomac? ses fonctions ne se relient-elles donc pas avec tout l'ensemble? ne souffre-t-elle pas aussi quand l'économie est en souffrance? Et pourquoi donc ne pas puiser alors dans les règles de l'hygiène les mêmes secours thérapeutiques que pour le traitement des autres maladies?

Ne soyons donc pas surpris de la chronicité des maladies cutanées en présence d'une méthode de traitement tout à fait contraire à la guérison des dartres; il n'y a là rien que de très naturel avec les préceptes thérapeutiques anciens si étranges pour des maladies si conformes aux autres. Avons-nous besoin de dire que, dans la presque totalité des maladies de la peau, on retrouve les trois périodes d'état aigu, stationnaire et décroissant, et que par consé-

quent, dans l'invasion, la marche et dans la terminaison de ces affections, rien ne diffère?

Nous ne saurions trop appeler l'attention sur la circonstance suivante. En se perpétuant à la peau, la maladie y prend domicile, elle modifie entièrement la vitalité de ce tissu; il semble que la partie affectée remplisse là des fonctions à part: les fluides sécrétés sont d'une nature différente; l'absorption se fait dans d'autres conditions; et si la maladie a quelque étendue, si elle s'est généralisée, alors elle paraît devenir constitutionnelle, en ce sens qu'elle se transmet de parents à enfants, ou au moins que les parents transmettent des conditions d'organisation qui prédisposent à des affections analogues. Au surplus, c'est un ordre d'idées sur lequel nous reviendrons en traitant de la thérapeutique générale.

En résumé, nous pensons avoir démontré qu'en présence de la situation de la peau, de ses fonctions comme enveloppe, de ses rapports avec les vêtements et de ses contacts avec les corps extérieurs; de l'insouciance des malades à l'égard des affections dont ils sont atteints; des conditions fâcheuses dans lesquelles ils se placent sous le rapport de l'hygiène, on a plutôt lieu d'être étonné que les maladies de la peau ne soient pas encore plus souvent chroniques qu'elles ne le sont. Mais il est évident qu'à tout prendre elles ne diffèrent pas dans leur invasion, dans leur marche et dans leur terminaison, des maladies des autres organes, mieux protégés que la peau, dont les efforts du malade concourent avec ceux du médecin à amener la guérison.

III. Anatomie pathologique des maladies cutanées.

On est surpris, au premier abord, des formes si variées que présentent les maladies de la peau par rapport à celles des autres tissus; mais pour s'en rendre compte il suffit de prendre en considération deux ordres de faits.

1° La texture si compliquée de la peau, qu'elle n'a pas d'analogue dans l'économie. Cela est si vrai, que le tissu muqueux, dont l'organisation est la plus compliquée après la peau, est aussi celui dans lequel le médecin constate plus de formes morbides diffé

° S a situation, qui permet de voir le mal dans toutes se

dans toutes ses formes, tandis que nous n'observons jamais les formes morbides des autres tissus que dans l'état le plus avancé de la maladie, et lorsque la mort nous conduit à son examen.

Non pas que je prétende expliquer les diverses formes morbides de la peau par les connaissances anatomiques acquises actuellement à l'égard de ce tissu; je considère au contraire l'anatomie de la peau comme ne pouvant expliquer que fort peu de choses en pathologie cutanée. Il y a neuf ans environ, j'eus le premier la pensée de rapprocher les formes morbides cutanées de l'anatomie de la peau faite par Breschet et M. Roussel de Vauzème; je produisis ce rapprochement dans un de mes cours cliniques de l'hôpital Saint-Louis, mais je ne tardai pas à m'apercevoir que j'étais dans l'erreur la plus complète. L'année suivante, un de mes honorables collègues, M. Cazenave, commettait la même méprise dans un enseignement qu'il fut autorisé à faire passagèrement à la Faculté de médecine. Et voyez cependant comme cette idée était séduisante! Maladies de l'épiderme : *psoriasis*, *ichthyose*, *lèpre vulgaire*, *pityriasis;* — maladies de l'appareil chromatogène : *pityriasis versicolor* et *nigra*, *vitiligo ;* — maladies du névrothèle ou corps papillaire : *lichen*, *prurigo;* — de l'appareil diapnogène, sueur fétide, *intertrigo;* — de l'appareil blennogène : *acné sébacé*, etc., etc. Or, malheureusement, les organes auxquels se rattachent ces maladies sont, d'après l'anatomie que nous venons de citer, profondément placés quand la maladie est tout à fait superficielle, et *vice versâ;* de sorte qu'il n'y a plus aucun rapport entre ces maladies et leurs siéges.

Aujourd'hui la structure de la peau est envisagée comme se réduisant à deux couches : l'épiderme et le derme. Le premier, composé de deux lames, l'une interne dans laquelle se trouvent les cellules pigmentaires, c'est le corps muqueux ; ainsi que les cellules épidermiques à noyau. Le second, ne comportant que les lames épidermiques dans lesquelles tout noyau a disparu. On y admet de plus des glandes sudorifères, des glandes sébacées et les poils. Cet état simple ne saurait rendre compte des formes morbides cutanées. Or l'anatomie pathologique, les transformations organiques exceptées, est, suivant moi, le contrôle le plus certain d'une

anatomie bien faite. Quand un tissu comme la peau est composé de plusieurs tissus élémentaires, chacun d'eux peut être malade isolément. S'il y existe de plus des appendices glanduleux ou autres, ils peuvent aussi devenir malades indépendamment du tissu où ils siégent, de sorte que dans ces divers cas la forme pathologique représentera l'élément anatomique. Aujourd'hui on regarde l'épiderme et le corps muqueux comme étant le produit d'une exhalation des capillaires sanguins du derme, et non pas comme dérivant d'organes spéciaux cutanés. Comment donc alors expliquer le siége de toutes ces formes variées de maladies ? Breschet, prenant pour point de départ les fonctions de la peau, avait cherché les origines diverses de ces fonctions; son anatomie satisfaisait à la physiologie. Nul anatomiste n'a eu la pensée de prendre la forme morbide élémentaire pour but de ses recherches, et cependant c'est le point de comparaison le plus certain. En présence d'une divergence si grande dans les idées émises par les anatomistes, il nous faut prendre la forme morbide telle qu'elle se présente à notre observation, sans trop nous préoccuper de son siége, puisque nous manquons d'éléments suffisants pour pouvoir le faire découvrir. On est convenu de donner des noms particuliers à chacune de ces formes; nous allons les faire connaître ainsi que la signification des noms qui s'y rapportent.

Depuis Plenck, qui le premier conçut la pensée de ranger les maladies de la peau dans une classification basée sur l'anatomie pathologique (productions morbides cutanées); depuis Willan, qui a restreint les formes morbides de Plenck à huit classes, on admettait généralement, et avec raison, des affections vésiculeuses, bulleuses, papuleuses, tuberculeuses et squameuses.

Les progrès dans l'observation des altérations de tissu des maladies de la peau nous ont conduit à compléter ce tableau imparfait, et à faire connaître que, sous le rapport de l'anatomie pathologique, il existe des maladies à formes élémentaires *simples* et des maladies à formes élémentaires *composées*.

A ce point de vue, les maladies de la peau constituent d'abord trois ordres d'états morbides : maladies de la peau, maladie ongles, maladies des poils. Les premières, à formes simples

portent onze classes, ainsi qu'elles sont énumérées dans le tableau ci-joint; quant aux formes composées, elles constituent autant d'espèces de maladies.

Disons tout de suite, par rapport aux formes composées, que, suivant nous qui les avons fait connaître en presque totalité, elles sont aussi *primitives* que les formes simples, opinion que M. Cazenave n'a jamais admise, et dont il nous faut donner la preuve autant qu'il nous est possible de le faire; mais déjà on saura que si nos collègues de l'hôpital Saint-Louis ne partagent pas toutes nos idées à cet égard, ils en sont très rapprochés. Ainsi ils reconnaissent qu'il est possible de voir réunies les formes morbides que nous avons décrites, et qui étaient restées pour la plupart inconnues; mais quelques-uns regardent ces formes morbides *composées* comme des maladies *compliquées* d'autres maladies, tandis que je soutiens que non-seulement elles sont primitives, et que beaucoup d'entre elles se montrent bien plus souvent que les maladies à forme *simple*. Quelle peut donc être la cause de cette opposition? Et d'abord, par un sentiment de vénérable souvenir pour Biett, par une sorte de respect ou de vénération presque filiale, M. Cazenave a laissé la dermatologie, en fait de classification, là où Biett l'avait posée, dans les mêmes termes, avec les mêmes idées. Il semble que l'élève ait été dominé par la crainte de toucher à une des pierres de l'édifice, alors qu'il aurait pu y ajouter un fronton. Ce sentiment a été porté si loin, que M. Cazenave, pour la teigne, par exemple, ne s'est décidé qu'avec la plus grande peine à accepter les progrès de la science à cet égard. Il considère encore les pustules secondaires comme des pustules primitives, et le *mycélium* comme consécutif à l'état pustuleux. Il a donc repoussé les innovations, et il ne s'est pas laissé aller à ses propres inspirations pour l'ensemble.

En ce qui concerne les maladies composées qu'il considère comme des maladies compliquées, il faut que l'on sache qu'il en est au moins deux dont la description remonte à une époque assez éloignée: c'est l'*eczema impetiginodes* ou impétigineux, décrit par Willan, et le *lichen urticatus* du même auteur. Que si l'on ouvre l'ouvrage de M. Cazenave, article *Eczema impetiginodes*, on lit: « Soit que l'on ait *primitivement observé des vésicules d'eczema rubrum*,

MALADIES DE LA PEAU CLASSÉES D'APRÈS L'ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

Maladies de la peau.

ÉRYTHÉMATE[illegible].

Érythè[illegible].
Urticair[illegible]
Roséole.

VÉSICULEUSES ET BULLEUSES.

Herpès à petites vésicules.
ci[illegible]ciné.
n[illegible]
à gros.

[illegible]pu[illegible]
Eczéma.
Pemphigus.
Rupia.
Gale aqueuse.

PUSTULEUSES.

Impétigo.
Ecthyma.
Sycosis pustuleux.
Acné miliaire.
rosacea.
indurata.
Gale pustuleuse.

PAPULEUSES.

Strophulus.
Lichen.
Prurigo.
Gale lichénoïde ou canine.

TUBERCULEUSES.

Lupus.
Sycosis tuberculeux.
Lèpre tuberculeuse.
Éléphantiasis des Grecs.

ÉPIDERMIQUES, SQUAMEUSES ET CORNÉES.

Pityriasis
Psoriasis.
Psoriasis pilaris.
Lèpre vulgaire.
Ichthyose.
Cors et verrues.
Productions cornées.
Pellagre.

SÉBACÉES.

Acne punctata.
Acne sebacea.
Acné tuberculoïde ou mollusceu[illegible]

CHROMATEUSES.

Pityriasis versicolor.
Pityriasis nigra.
Achromie.

HÉMATEUSES.

Purpura.
Scorbut.

[illegible] PRODUCTIONS VÉGÉTALES.

Favus ou teigne.
Herpès tonsurant.
Porrigo decalvans.
Herpès ?
Pityriasis versicolor?

[illegible] PRODUCTIONS ANIMALES.

Gale.
Maladie pédiculaire.
capitis.
corporis.
pubis.

Formes composées.

Lichen	urticans.
Herpès	eczémateux.
Herpès	lichénoïde.
Eczéma	impétigineux.
Pemphigus	herpétiforme.
Rupia	impétigineux.
Impétigo	ecthymateux.
Sycosis	impétigineux.
Sycosis	herpétiforme.
Lichen	eczémateux.
Lupus	herpétiforme.
Psoriasis	herpétiforme.
Psoriasis	eczémateux.

Maladies des poils.

Plique.
Canitie.
Alopécie.

Maladies des ongles.

Hypertrophie.

comme cela arrive le plus ordinairement, soit que la marche de l'inflammation *ait été tellement rapide* que ses produits ne se soient montrés à nous qu'à un degré plus avancé, *il arrive souvent* que l'eczéma se présente à un état qui *tient à la fois* et des affections vésiculeuses et des affections pustuleuses. » Nous voilà bien rapprochés, on en conviendra, par cette phrase; car, suivant M. Cazenave, on n'a même pas le temps de voir les vésicules de l'eczéma, qui sont comme si elles *n'existaient pas ou n'avaient jamais existé*. De là à la forme composée primitive il n'y a qu'une nuance à peine appréciable. Mais comme les formes composées primitives détruiraient toutes les idées de Willan admises et propagées par Biett, M. Cazenave s'arrête à ce point, et préfère supposer une complication qui, en thèse générale, ne se présente que dans le cours des maladies, pour les maladies des autres organes de l'économie.

Eh bien, il en est des autres formes comme de celle-là. Ainsi le *lichen urticatus* débute par une papule au centre d'une plaque d'urticaire; celle-ci disparaît pour laisser persister la papule lichénoïde; mais, au lieu de durer comme le lichen, elle se guérit beaucoup plus facilement.

Or si ces faits sont constants pour deux formes cutanées composées et connues depuis soixante ans, pourquoi ne le seraient-ils pas pour les analogues que nous avons fait connaître, dont on ne nie pas d'ailleurs l'existence, mais que par des idées systématiques on regarde comme des complications.

Dans le pemphigus herpétiforme, ce n'est ni le pemphigus proprement dit, ni l'herpès. Les bulles de pemphigus sont beaucoup moins volumineuses en général. Elles sont symétriquement disposées par couronnes ou courbes presque complètes, qui gagnent de plus en plus du terrain par la circonférence. Or la forme composée de ces affections, en général, implique une modification du traitement d'où dépend la guérison. C'est pour cela que nous insistons sur ces formes composées, qui dès leur manifestation conduiront le médecin à modifier sa thérapeutique.

Ceci posé, entrons dans la partie descriptive de l'anatomie pathologique des affections cutanées.

PREMIÈRE CLASSE. — *Maladies érythémateuses*. — Tout état érythé-

mateux de la peau suppose une inflammation efflorescente de tissu, caractérisée par une rougeur *rosée* apparaissant brusquement et disparaissant dans un espace de temps assez court. La rougeur disparaît sous la moindre pression du doigt; elle est avec ou sans turgescence de la peau; elle cesse d'exister soit en quelques heures, soit en quelques jours; elle ne laisse pas de traces de son passage et n'amène aucun produit de sécrétion.

En pathologie cutanée, on ne compte que trois affections de ce genre : l'érythème, l'urticaire et la roséole; mais plusieurs fièvres éruptives présentent aussi les mêmes caractères.

Chose remarquable, dans certains états érythémateux, la peau est tuméfiée dans la totalité de son épaisseur, au point de faire parfois des saillies considérables, et cependant ce n'est là qu'une efflorescence passagère. Ainsi le mode de rougeur avec absence de toute sécrétion humorale ou épidermique constitue le cachet de l'état érythémateux.

Deuxième classe. — *Maladies à formes vésiculeuse et bulleuse.*

Chacune de ces expressions a sa signification propre qu'il faut peindre, car elle devient, aux yeux du médecin, un élément de diagnostic.

On entend par *vésicule* une production morbide formée par une enveloppe épidermique remplie de sérosité limpide, mais dont le volume est assez ténu dans certaines affections, l'eczéma par exemple, pour que les plus grosses vésicules ne puissent être aperçues à l'œil nu qu'en y portant le plus grand soin, ou avec le secours de la réflexion de la lumière du soleil; il y a plus, il existe des maladies vésiculeuses dans lesquelles la loupe permet seule de distinguer les vésicules, ainsi qu'on l'observe dans les variétés d'herpès nummulaire et circiné. Mais la vésicule peut être assez volumineuse pour égaler le volume d'un grain de millet, comme dans la gale dite papuleuse; celui d'un grain de chènevis ou d'une petite lentille, comme dans la gale aqueuse, l'herpès phlycténoïde et le zona, et surtout dans le rupia. Ainsi le caractère commun, c'est une petite *vessie* remplie de sérosité limpide, depuis le plus petit diamètre non appréciable à l'œil nu, jusqu'au volume d'une petite lentille. Au delà, la forme morbide constituée par les mêmes éléments change de nom et prend

celui de *bulles*. Ici la plus petite bulle a le volume d'une lentille; les bulles les plus communes dépassent celui d'un haricot; quelques-unes acquièrent les dimensions de l'ampoule d'un vésicatoire d'assez grande dimension. Il n'existe qu'une seule maladie que l'on dise bulleuse, c'est le pemphigus; mais comme dans le *rupia* le volume de la vésicule est très voisin de celles des plus petites bulles de *pemphigus*, il est des auteurs qui ont compris le rupia dans les affections bulleuses. Alors pourquoi n'y pas comprendre le *zona*, l'*herpès phlycténoïde*, la *gale vésiculeuse*, maladies dans lesquelles les moindres vésicules sont très appréciables? on scinderait ainsi avec beaucoup plus de justesse les deux catégories d'affections, et l'on dirait alors : maladies *vésiculeuses*, celles dans lesquelles les vésicules ne sont pas ou sont à peine appréciables à l'œil nu, *eczéma*, *eczéma impétigineux*, *herpès circiné*, *nummulaire*, *herpès longitudinal*, *herpès iris*, *gale canine*; maladies *bulleuses*, celles dans lesquelles les vésicules sont très appréciables à la vue et peuvent même acquérir le volume d'une forte ampoule, *zona*, *herpès phlycténoïde*, *gale aqueuse*, *rupia*, *pemphigus*. Si en général la vésicule n'est formée que par une lame épidermique soulevée par de la sérosité dont la nature est toujours alcaline, il en est qui contiennent une autre production morbide, je veux parler d'une fausse membrane qui se rencontre assez fréquemment dans les vésicules du zona, et parfois dans quelques bulles de pemphigus. L'existence de la fausse membrane, toujours secondaire d'ailleurs, dénote une affection plus profonde qui entraîne avec elle l'ulcération du derme, et qui devient appréciable, lorsque l'on a mis à nu la production pseudo-membraneuse par la déchirure de la vésicule. Aussi dans les éruptions vésiculeuses sans production pseudo-membraneuse, la superficie du derme est seule affectée; il ne se sécrète et ne s'écoule jamais que de la sérosité (eczéma, herpès circiné ou nummulaire, labial, phlycténoïde, gale aqueuse). Dans le cas contraire, la sérosité devient bientôt lactescente, puis purulente (zona, pemphigus). Enfin dans le rupia, où une plus ou moins grande épaisseur de peau est malade et quelquefois même sa totalité, il se sécrète à la fois, et mêlés ensemble, de la sérosité, du pus et de l'ichor; de là une croûte d'un gris sale qui reflète la nature des trois sécrétions.

Troisième classe. — *Maladies à forme pustuleuse.* — Que doit-on entendre par l'expression de pustule? Au premier abord cette question paraît oiseuse, et cependant on va bientôt juger de son importance. A part la nature du fluide qui soulève l'épiderme dans la pustule, rien ne ressemblerait plus à une vésicule qu'une pustule, si ce n'était encore l'engorgement inflammatoire du tissu de la peau qui l'accompagne; aussi les caractères essentiels de la pustule consistent-ils dans l'existence du pus, production morbide particulière, et dans l'engorgement. Cet engorgement, qui ne se rencontre pas dans les affections vésiculeuses en général, suppose une peau plus profondément affectée au [illegible] maladie. Aussi ouvrez une pustule à sa naissance, [illegible] épiderme, et vous trouverez le tissu de la peau érodé, [illegible]mme dans l'ulcération. C'est qu'en effet l'ulcération es[illegible]e obligée de la formation du pus. Or les pustules se pr[illegible]us deux aspects tout à fait différents, qui deviennent des ca[illegible]s diagnostiques des maladies cutanées. Dans les unes il y a pr[illegible]nance très grande de la vésicule purulente sur l'engorgement, [illegible]nedans l'impétigo, l'ecthyma; dans les autres l'état inverse [illegible]si qu'on l'observe dans l'*acné* et le *sycosis pustuleux*. Cette disposi[illegible] s'observe à un tel point, que dans les deux premières affections on aperçoit à peine l'engorgement, et dans les dernières on voit peu la vésicule purulente; aussi la première catégorie est-elle formée par des pustules plates, et la seconde par des pustules conoïdes. Dans l'impétigo, les pustules sont tellement petites, qu'on leur a donné une dénomination particulière; on les nomme *psydraciées*, petites pustules. Elles sont presque toujours confluentes agglomérées. Dans l'*ecthyma*, les pustules sont larges, isolées, ombiliquées à leur centre par un point noirâtre, qui à sa base se relie à une fausse membrane. Aussi l'ecthyma donne-t-il lieu à des cicatrices comme la variole La gale pustuleuse est dans le même cas, mais à un moindre degré. Les pustules de la gale ne présentent jamais de fausses membranes. C'est donc à tort que l'on dit que la gale est compliquée d'ecthyma: c'est une forme spéciale que nous nommons *gale purulente*. Dans ces trois affections, peu ou pas d'engorgement dans chaque p[illegible] Dans l'acné, au contraire, dans le sycosis pustuleux, on obse[illegible]

engorgement considérable, de forme conique, qui est terminé par une vésicule purulente. C'est toujours aux dépens d'un follicule sébacé que se produit la pustule de l'acné ; aussi lorsque cette pustule est arrivée à maturité, on en fait sortir comme d'un furoncle une sorte de bourbillon formé par du pus et de la matière sébacée. Lors de la guérison de ces pustules, il reste une cicatrice toujours plus ou moins allongée, très apparente, ou du moins apparente au dos et à la figure, et d'autant plus visible que la peau est plus épaisse. La pustule du sycosis comprend toute l'épaisseur de la peau, et ne saurait produire les mêmes phénomènes ; elle est d'ailleurs très volumineuse, et elle acquiert quelquefois le volume d'une noisette.

Dans ces diverses affections, le produit morbide est du pus, qui dans l'impétigo est moins purulent que dans l'ecthyma, et qui possède la propriété de se concréter sous la forme d'une croûte d'un jaune doré, ressemblant un peu à du miel concret : de là le nom de *mélitagre* donné à cette affection.

Le siége du sycosis au menton ou dans la barbe vient éclairer complétement le diagnostic différentiel.

Quatrième classe. — *Maladies à forme papuleuse.* — Que doit-on entendre par *papule?* Ce mot pourrait être synonyme de *bouton sans pus ;* c'est un petit engorgement inflammatoire à forme pyramidale dans quelques cas, arrondi dans d'autres, mais qui n'a ni vésicule séreuse complète, ni vésicule purulente. La disposition conique des papules l'a fait assimiler aux papilles de la peau ; quelques personnes pensent même que ce sont les papilles de la peau à l'état inflammatoire. C'est la une erreur que M. Cazenave a accréditée et qu'il a commise : ni dans le *lichen*, ni dans le *prurigo*, ni dans le *strophulus*, ni dans les *syphilides papuleuses* que comporte cette catégorie de maladies, il n'y a de papules malades et hypertrophiées. Ce qui le prouve, ce sont les considérations suivantes.

Les papilles de la peau sont généralement disposées par paires et en lignes courbes, dans un ordre parfaitement symétrique. Or quelle que soit l'espèce d'affection papuleuse, elle n'est jamais symétrique que dans un seul cas, celui de syphilide, où les papules sont disposées sous la forme de lignes courbes elliptiques ; mais

d'abord toutes les papules sont très éloignées les unes des autres, et la courbure de leur disposition n'a aucun rapport avec les lignes papillaires auxquelles nous faisons allusion. Ensuite il y a si peu de ressemblance entre la papule morbide et la papille, qu'il est impossible de les assimiler entre elles. D'ailleurs cette ligne courbe peut se présenter dans toutes les directions, dans la longueur comme dans la largeur des membres, et rien de semblable ne se montre dans la disposition des papilles.

Le *lichen* est une affection de la partie interne des membres et de la partie antérieure du tronc. Le *prurigo* est une maladie de la partie externe des membres et de [illegible]artie postérieure du dos, de sorte qu'il faudrait scinder en d[illegible] catégories les affections des papilles, tout en faisant deux [illegible]es à part. Si dans ces deux affections les papilles étaient [illegible] du mal, comment leur état pourrait-il constituer deux [illegible] fort distinctes d'ailleurs. Le lichen est une maladie de la [illegible]esse, le prurigo une maladie de l'âge avancé. La surface de la [illegible]pe des doigts est hérissée de papilles; elle n'est jamais atteint[illegible]r le lichen. Évidemment ce siége présumé est mal fondé. On l[illegible]pposé tel en raison de l'excitation générale que les maladies a[illegible]me papuleuse entraînent, et parce qu'on a tenu à faire de ces affections des maladies du système nerveux en général. Mais il nous est impossible de trouver la moindre analogie entre l'état anatomique et l'état morbide. Quoi qu'il en soit, la forme papuleuse se montre dans cinq maladies : le *strophulus*, le *lichen*, le *prurigo*, la *syphilide papuleuse* et la *gale lichénoïde*. C'est un bouton ou élevure conoïde inflammatoire dans laquelle les expansions nerveuses doivent entrer pour quelque chose, car la démangeaison en forme généralement l'un des caractères ; je dis généralement : et en effet, dans le strophulus, la démangeaison est peu marquée; elle est nulle dans la syphilide papuleuse. L'organisation pathologique de ces papules n'est donc pas la même dans toutes, et ce qui le prouve d'ailleurs, c'est que si l'on écorche une papule de lichen, il n'en survient qu'un suintement séreux ; si l'on excorie par le grattage une papule de prurigo, il s'en écoule du sang. Enfin, si la papule pathologique n'était qu'une inflamm[illegible] de la papille, comment expliquerait-on le prurigo sans papule

›duit les démangeaisons les plus vives et les plus violentes, ıs qu'il y ait la moindre altération à la peau? Il semble na- el d'admettre que dans ce cas la peau devienne hérissée de ›illes enflammées. Comment enfin, dans la gale lichénoïde, papule est-elle toujours terminée par une petite vésicule euse?

:INQUIÈME CLASSE. — *Maladies tuberculeuses.* — *Tubercules.* On ;t donner du tubercule à peu près la même définition que celle : nous avons produite pour la papule, à la différence du volume; le tubercule est un gros bouton charnu sans vésicule séreuse sans pus, mais, comparativement à la papule, le volume est rme. Lorsque la papule atteint le diamètre d'une petite lentille, ıut que ce soit une papule syphilitique; or il est des tubercules ont le volume de la plus forte noisette, ainsi que cela a lieu ıs le sycosis. Il est surtout très important de ne pas attacher à mot la signification qu'on lui accorde généralement. Il ne s'agit du tubercule, au point de vue de la nature de la matière orga- ue qui le forme, mais seulement d'un état d'apparence charnue nflammatoire de la peau, dont le volume est assez considérable rarie d'un gros pois à une noisette.

ı part la syphilide tuberculeuse et la lèpre tuberculeuse, il est ı d'affections de la peau qui puissent retracer l'image des affections › l'on nomme tuberculeuses en dermatologie. Le lupus est géné- ement pris pour type; or dans le lupus les tubercules propre- nt dits sont rares : on y rencontre plutôt une peau épaissie, rnue, compacte et uniforme, qu'une saillie limitée, circonscrite, c épaississement de la peau, comme l'indique la dénomination nous occupe. Dans la lèpre, au contraire, les tubercules cutanés t beaucoup plus dessinés; et quant au sycosis tuberculeux, ce t des tumeurs inflammatoires plus ou moins confluentes, plus moins circonscrites, avec une sécrétion variable à la surface. sorte que le mot tubercule, en fait de pathologie cutanée, doit › surtout interprété en raison de la forme et de l'induration du ı de la peau, plutôt qu'en raison de la *nature* des saillies qui en ment le caractère. La peau n'a pas été transformée organiquement, e n'est dans quelques lèpres fort anciennes. Ici donc aucune idée

des tubercules cancroïdes ou scrofuleux : c'est la forme qu'il faut voir plutôt que le fond.

Sixième classe. — *Maladies épidermiques, squameuses et cornées.* — Cette catégorie comporte sept maladies à forme primitive, dans lesquelles la sécrétion épidermique joue un rôle principal. Ainsi, *pityriasis*, *psoriasis*, *lèpre vulgaire*, *ichthyose*, *cors* et *verrues*, *productions cornées* et *pellagre*, sont autant de maladies dans lesquelles, sous une forme ou sous une autre, le symptôme dominant est la sécrétion épidermique ou cornée. La forme de l'épiderme sécrété ou produit en constitue en g[illegible]tie les caractères principaux. D'une autre part, dans ces sort[illegible]ections, ou la peau est superficiellement atteinte, ou [illegible]ndément, sans que la nature du produit morbide soit [illegible] là la nécessité de faire connaître tout d'abord les [illegible]s de ce produit, sauf à chercher l'explication de [illegible]rme.

La peau peut se borner à pr[illegible] une poussière farineuse à sa surface; c'est ce que l' [illegible]s le pityriasis le plus superficiel, ou dans l'ichthyo[illegible] au [illegible]le degré. Dans les deux cas, apparence de peau saine, s[illegible]ù, comme dans le pityriasis versicolor, qui amène souvent ce état farineux, la peau est colorée.

A part cet état farineux ou de poussière, la peau ne paraît pas malade, et cependant l'affection peut persister pendant longtemps dans cet état. Il y a plus, sous l'influence d'une cause variable, la maladie peut prendre un caractère beaucoup plus tranché, et donner lieu à de petites lamelles qui se détachent facilement, ou même à de nombreuses lamelles qui se superposent et qu'on enlève à l'état de grosse poussière. Enfin elle peut prendre un caractère aigu, comme dans le *pityriasis rubra*, et alors la peau s'enflammer, s'épaissir, exhaler une certaine transpiration séreuse et engendrer un grand nombre de lamelles épidermiques plus ou moins larges.

Ainsi, quel que soit l'état plus ou moins profond de l'affection, quel que soit son état aigu, la sécrétion reste la même, de [illegible]derme, toujours de l'épiderme.

Comment ne pas voir là des organes spéciaux qui

et qui auraient pour fonctions d'engendrer l'épiderme, ainsi que l'avaient avancé Breschet et Roussel de Vausème ; car si l'épiderme n'est qu'une exhalation des vaisseaux capillaires sanguins de la surface de la peau, comme on l'admet aujourd'hui, la production épidermique est peu explicable quand la peau est saine ; et la peau est trop profondément affectée dans le pityriasis rubra quand son tissu est malade ! Enregistrons cependant tout de suite ce fait, qu'à part le *pityriasis rubra*, le *psoriasis* et la *pellagre*, dans lesquels la peau est évidemment le siége d'une inflammation aiguë ou chronique, c'est là un phénomène fort remarquable que cette faculté de la peau à sécréter de l'épiderme sous des formes diverses. Ici, et au premier degré, comme je le disais tout à l'heure, poussière ou état farineux de la peau ; puis, dans un autre cas, lamelle en grosse poussière ; dans un troisième, squames ; dans un quatrième, écailles ; dans un cinquième, tubercules cornés ; dans un sixième, productions allongées, ressemblant à des cornes ou à des prolongements cornés semblables à ceux de la peau du porc-épic. Indiquons maintenant les produits morbides que chacun de ces mots exprime.

L'état *farineux*, de *poussière fine*, se traduit de lui-même à la pensée. Une *lamelle*, ou lame épidermique, suppose une surface plus ou moins large d'épiderme détaché, mince, partout uniforme, ressemblant à une pelure d'oignon, pour prendre un terme de comparaison qui, quoique vulgaire, exprime pourtant parfaitement la pensée. Une *squame* est une superposition irrégulière de plusieurs lames épidermiques qui donne à ces lames un aspect blanc opaque, mais non pas nacré. L'*écaille* suppose une superposition plus ou moins étendue de lamelles épidermiques, dont le nombre est si considérable et où les lamelles sont si étroitement unies, que la surface de l'écaille a pris un aspect nacré, qui a conduit à leur comparaison avec une écaille de poisson.

On nomme *verrue* un épaississement limité et lenticulaire de la peau, à forme généralement arrondie, car il en est d'ovoïdes, d'étalées, ayant une assez grande étendue sur la face palmaire des doigts ; mais tandis que dans les variétés précédentes l'épiderme semble être soustrait à la vie de la peau, dans celle-ci au contraire il conserve encore de la vitalité ; aussi la verrue saigne-t-elle

quand on la coupe au centre même de l'épiderme qui la constitue, ou au moins quand on approche de la surface du derme, et voit-on une pluie sanguine suinter à la surface de la section, sang qui paraît indiquer la section des vaisseaux qui servent à la production de la verrue. Il règne aussi dans les *cors* une certaine organisation : si les uns ne paraissent que le résultat de la compression, et s'ils ne consistent que dans un épiderme épaissi pour constituer les *cors* dits *plats*, il en est d'autres, nommés *cors à clous*, dans lesquels il y a évidemment une organisation vitale morbide toute particulière.

Quant à ce que l'on appelle [illegible] ne sont des saillies ou protubérances plus ou moins [illegible] siformes et conoïdes, tantôt uniques, tantôt multiples, e[illegible] fois assez nombreuses pour tapisser toute la surface du [illegible]

Elles vivent et s'entrete[illegible] dépens d'une organisation vasculaire spéciale de la peau [illegible] contractent des adhérences si prononcées avec ce tissu, q[illegible] mpossible de les en détacher autrement que par la section a[illegible] de l'instrument tranchant. Telle est d'ailleurs la densité [illegible] productions, qu'elles produisent parfois par leur percussion [illegible] lle un bruit très sonore.

Septième classe. — *Maladies sé[illegible]es.* — Au point de vue de l'anatomie pathologique, les maladies sébacées ont pour caractère anatomique une hypersécrétion de matière grasse, jusqu'à l'état morbide, sans que la matière *soit altérée* au point de changer de nature. Ainsi il existe trois maladies de ce genre, ce sont l'*acne punctata*, l'*acne sebacea* et l'*acné tuberculoïde* ou varioloïde de M. Bazin. Dans ces trois affections, les follicules sébacés sont malades; ils sécrètent de la matière grasse dans une proportion plus grande que dans l'état normal. Cette matière a peut-être pris elle-même des qualités spéciales qui la rendent plus ferme, plus épaisse, plus solide, mais elle reste à l'état graisseux. Dans deux autres maladies, le follicule est malade, mais il s'enflamme très franchement, tourne à l'état de suppuration et donne naissance à des pustules, c'est ce qui a lieu dans les *acne rosacea* et *indurata*. Dans les trois premières maladies sébacées que nous signalons ici, il en est une où l'hypersécrétion de la matière est très lente et très épaisse; de l'état d[illegible] elle a passé à l'état de matière concrète; elle a peu à peu r[illegible]

outre mesure le canal excréteur du follicule, l'a dilaté et est venue se faire jour à son ouverture extérieure. Là, au contact de l'air, cette matière noircit et se montre par un petit point très visible, et en même temps très dense. Cette coloration est-elle l'effet du contact avec des corps sales? Cela est douteux, quoique ce ne soit pas impossible. Toujours est-il que si l'on vient à presser la peau sur deux points opposés, on chasse cette matière du canal du follicule sous la forme d'un petit ver, à l'extrémité duquel un micrographe, M. Simon, prétend avoir trouvé un insecte plus ou moins analogue à celui de la gale. Il reste le canal folliculaire très dilaté, qui ne se rétrécit jamais assez pour reprendre ses dimensions premières. Quant au follicule lui-même, il y a tout lieu de croire qu'il est détruit. En effet, une fois le canal folliculaire complétement vidé, il ne se remplit plus.

Dans une seconde variété, celle de l'acné *sebacea*, l'hypersécrétion de matière grasse est incessante; mais ce n'est plus la matière huileuse de la sueur grasse, c'est une matière grasse qui transsude à peine, et se concrète à la surface de la peau pour y former une couche sale que l'on enlève avec l'ongle; et telle est l'abondance de cette sécrétion, que la maladie a pu, dans certains cas, s'étendre à la fois à toute la surface du corps, quoique généralement elle soit limitée à la figure. Il en résulte toujours un aspect hideux. Si l'on gratte cette sécrétion avec les ongles, on observe que la peau elle-même n'a pas notablement perdu de sa teinte ordinaire, et qu'elle n'est pas très sensiblement épaissie.

Enfin dans la troisième variété, qui se montre de préférence sur le tronc, la matière folliculeuse hypersécrétée se rassemble en lobules ou saillies arrondies sous l'épiderme qu'elle distend, dont elle se fait une enveloppe assez mince pour apercevoir la couleur, d'un blanc jaunâtre, de la sécrétion. Si l'on vient à fendre cette enveloppe, on en fait sortir la matière sébacée. Toutefois, dans l'enveloppe, l'épiderme n'est pas seul; il semble que le follicule en s'hypertrophiant ait soulevé une couche superficielle du derme, qui d'ailleurs donne un peu de sang par la section de la carotide.

Il y a donc dans ces trois formes morbides, non-seulement une hypersécrétion, mais un changement dans la consistance de la ma-

tière sécrétée, qui a pour effet une concrétion anormale moindre dans l'acné *sebacea*, plus grande dans l'acné *punctata*, plus grande encore dans l'acné *tuberculoïde*.

Huitième classe. — Que dire au point de vue de l'anatomie pathologique des maladies *chromateuses*, aujourd'hui que la matière colorante de la peau n'est considérée que comme un produit d'une exhalation des capillaires de la surface du derme? Pourquoi cette matière colorante s'accumule-t-elle dans des points et des surfaces variables de la peau pour y former des taches circonscrites tantôt d'un jaune verdâtre, comme dans les taches *hépatiques* et le *pityriasis versicolor*; tantôt noirâtres, co[illegible]s le *pityriasis nigra?* Et puis pourquoi, dans d'autres cas, cette [illegible]loration complète de la peau (acromie, *vitiligo*), qui dans les q[illegible]-vingt-dix-neuf centièmes des cas est accompagnée d'un cercle de [illegible]atière verte ou brunâtre, très foncé, autour de la décoloration de [illegible]eau et décroissant d'intensité au fur et à mesure que l'on s'en [illegible]igne? Plus tard, cette sorte d'accumulation d'une matière colo[illegible]te, que l'on peut dire anormale, va accidentellement prend[illegible] un certain caractère aigu, amener des démangeaisons, produi[illegible]n état furfuracé de la peau et, suivant certains micrographes, développer des parasites végétaux; tout cela est encore bien vague, au point de l'anatomie pathologique : bornons-nous donc à enregistrer les faits sans pénétrer plus avant, dans la crainte d'entrer dans de vicieux errements.

Neuvième classe. — *Maladies hémateuses.* — Ici la comparaison de l'état pathologique est plus complète; on sait que dans le purpura le sang transsude des vaisseaux capillaires au dehors, en s'arrêtant très probablement au tissu cellulaire qui enveloppe ces vaisseaux; tandis qu'il s'infiltre dans le tissu cellulaire ambiant dans le scorbut pour y former des taches ecchymotiques, et parfois des épanchements sanguins. Dans les deux cas, la coloration qui en résulte ne disparaît pas par la pression du doigt, ce qui différencie ces deux maladies de toute rougeur inflammatoire. Le purpura est limité au tissu de la peau, et souvent aux couches les plus superficielles; le scorbut, au contraire, peut pénétrer très profondément dans le tissu cellulaire.

Que cet état tienne à la fluidité du sang ou à toute autre

plutôt générale que spéciale à ce fluide, cela importe peu au point de vue du diagnostic et de l'anatomie pathologique; toujours est-il que le caractère de l'infiltration sanguine devient le cachet de ces affections.

Dixième classe. — *Maladies à productions végétales.* — Depuis l'application du microscope à l'étude des produits de sécrétion morbide, on a constaté qu'il existait un certain nombre de maladies dans lesquelles il se développait à la peau une série de végétaux analogues aux champignons ou productions mucédinées; telles sont les variétés de teigne et, suivant certains pathologistes, la mentagre, les variétés d'herpès, le chloasma, etc., toutes ces productions sont composées de tubes simples ou ramifiés, contenant des spores ou granules, et de tubes vides sans sporules, offrant d'ailleurs l'aspect de chapelets articulés ou non articulés.

Cette matière organique contenue, constitue la matière fécondante de la maladie, en ce sens qu'elle peut se transmettre par sa poussière organisée (spores) d'individu à individu. Peut-elle se produire spontanément chez un sujet? C'est là une question repoussée par les naturalistes; mais nous pensons qu'à cet égard la science n'a pas dit son dernier mot Les faits pathologiques ne sont nullement en rapport avec cette manière de voir; et malheureusement il est difficile d'aborder la question en présence des repaires que se sont créés à cet égard les naturalistes. Si, par exemple, nous disons qu'il existe des faits où l'inoculation était impossible d'individu à individu, on répondra que le contact n'est pas nécessaire, puisque les spores sont transportés par l'air ambiant! Si l'on ajoute que des maladies à champignon ne se transmettent pas par contact ou autrement, comme le *pityriasis versicolor*, on dira : c'est que dans les contacts le sujet contaminé n'était pas dans des conditions suffisamment maladives pour permettre aux spores de se développer! Que répondre à de pareils moyens échappatoires! Quoi qu'il en soit, faisons connaître d'une manière sommaire ces productions végétales.

Les végétaux qui croissent sur les animaux vivants sont tous des cryptogames, et ils ne comportent que des algues et des champignons. Il ne peut se développer à la peau que des champignons.

Le champignon est formé par des filaments, d'abord simples puis

ramifiés, composés d'une cellule allongée sans cloisons, et contenant çà et là des spores.

Lorsque les filaments sont cloisonnés bout à bout, on donne à ce champignon le nom de *mycelium*.

Le champignon des animaux présente deux espèces de mycelium : le mycelium nématoïde ou filamenteux, et le mycelium membraneux.

Le mycelium filamenteux est le plus commun de tous ; il est formé de fibres lâchement entrecroisées. Dans le mycelium membraneux les filaments sont tellement rapprochés qu'ils constituent une sorte de membrane plus ou n[illegible]s épaisse. Le système reproducteur se compose d'un récept[illegible], *sporange* ou *thèque*, et de *spores* contenues dans les sporan[illegible]. Les spores sont tellement ténues qu'on ne peut les voir à l'o[illegible]u, et qu'elles constituent une poussière fécondante susceptible d[illegible]nétrer dans les ouvertures et les plicatures les plus déliées de la[illegible]au.

Leur forme est ovoïdale, sphéro[illegible], fusiforme ou triangulaire à angles arrondis. Elles sont extrên[illegible]ent dures et très difficiles à aplatir. Leur couleur varie ; elle est l[illegible]ne, jaunâtre, grise ou presque incolore. Toutes sont formées de cellules dépourvues de noyau. Leur enveloppe extérieure (cellulose) est celle qui offre de la résistance ; elle est tapissée d'une utricule azotée qui renferme un liquide tenant des granulations en suspension.

On appelle *réceptacle* l'organe sur lequel reposent les sporanges, lorsque les spores ne sont pas nues, et où se trouvent les spores, lorsque celles-ci sont à nu.

Enfin le réceptacle peut être supporté par un pédicule (pédoncule, stipe, tronc).

Tout champignon ne peut vivre qu'aux dépens de produits animaux plus ou moins altérés et contenant des principes azotés. Plus les produits renferment ces principes azotés dans une proportion considérable, plus le développement des champignons est rapide.

Il ne peut pas se montrer de champignons sur un tissu parfaitement sain, au dire des naturalistes. Il faut que les fluides sécrétés ou que la peau elle-même soit dans de mauvaises conditions [illegible] pour que le champignon déposé par contact, ou transmis par

ambiant. vienne à germer. Il en est sous ce rapport de l'homme comme des végétaux. D'où la conséquence que dans le traitement d'une maladie végétante il y a toujours deux indications à remplir : détruire ce végétal, détruire l'état de l'organe ou de l'organisme qui a donné lieu à son développement ou qui l'a favorisé. Stilling et Hannover ont montré que l'inoculation des *soprolegnia* réussissait toujours quand elle était faite sur des animaux déjà malades. Les expériences de MM. Bourguignon et Renault sur la gale des *animaux* viennent encore à l'appui de cette opinion.

Quant au milieu ambiant, si l'acide carbonique est nécessaire aux algues qui se développent dans les cavités, l'oxygène de l'air est un des éléments de nutrition des champignons qui croissent sur la peau.

Une fois la spore à l'état de germination, elle prend un développement considérable et sa reproduction a lieu avec une rapidité effrayante. Elle donne naissance au champignon qui, au moyen de ses ramifications, se propage. Cette extension s'opère non-seulement à l'extérieur, mais encore à l'intérieur de la peau et des poils. Notons d'abord que la ténuité des spores est telle, qu'elles peuvent pénétrer à travers les ouvertures les plus fines, les plus petites, et que les filaments auxquels elles donnent lieu par leur germination sont tout aussi ténus; de là chez les insectes la mort rapide par la pénétration du mycelium dans le tissu même de l'insecte; de là pour la peau de l'homme l'introduction du mycelium autour des cheveux dans la partie implantée dans la peau jusqu'au bulbe, là où se réfléchit l'épiderme, comme aussi la pénétration du *trichophyton* jusque dans le canal médullaire des cheveux. Dans l'herpès tonsurant cette pénétration a lieu par plusieurs moyens : 1° ce corps pénétrant (spore) est plus dur que le tissu; 2° il est probable qu'il contracte des adhésions fortes avec le tissu au fur et à mesure qu'il se multiplie; 3° il est extrêmement ténu ; 4° il végète, s'étend, chasse tout devant lui, s'enfonce entre les cellules et se propage en avant en vertu du point d'appui qu'il a contracté par-derrière; aussi détermine-t-il quelquefois des congestions allant jusqu'à la suppuration sous l'influence de ce travail incessant.

M. Ch. Robin admet de plus, en dehors de ces conditions, une

résorption de la matière organique sous l'influence de la pression du corps plus dur que le tissu.

Quoi qu'il en soit, les maladies dans lesquelles on a reconnu, à l'aide du microscope, la présence de productions organiques végétales sont au nombre de six : le *favus*, l'*herpès tonsurant*, le *porrigo decalvans*, la *mentagre*, le *pityriasis versicolor* et l'*herpès circiné*. Chez toutes on a constaté la présence d'un champignon plus ou moins complexe, auquel on a donné les noms suivants : pour la teigne, *porrigo favosa*, *scutulata*, l'*achorion* de Link et Remak, champignon voisin du genre o[illegible]*erme* de la teigne, Gruby ; il est formé d'un *mycelium mem*[illegible]*mposé* de tubes *sporophores* et de *spores*. — Pour l'*herpès tom*[illegible]*izo* phyto-alopécie, *Gruby*), le trichophyton de θρίξ, τριχὸς, cheve[illegible]*ὸν*, plante (*Malmsten*), végétal uniquement formé de sp[illegible]es, q[illegible]*se* développant ou en se multipliant, donnent naissa[illegible]*ents* articulés formés par des spores enchaînées en filaments m[illegible]*ormes* qui, en se développant, rampent dans la substance [illegible] en en suivant la direction et la longueur, et pénètrent n[illegible] leur canal central. — Pour la mentagre, le *microsporon menta*[illegible]*hyte* (Ch. Robin) ou *mentagrophyte* (Gruby) ; il diffère du microsp[illegible]on d'Audouin par ses spores plus volumineuses, ses filaments et ses ramifications plus grandes, comme aussi par le siége qu'il occupe, en ce que placé dans la profondeur du follicule pileux de la barbe, entre le poil et la paroi du follicule, il ne pénètre jamais dans la substance du poil comme le trichophyton tonsurant. — Pour le pityriasis versicolor, c'est le *microsporon furfur*, Ch. Robin (*fungus*, s. *epiphytus*, *pityriasis versicoloris*, Th. Sluyter) à spores très ténues, dont les amas adhèrent à l'épiderme. — Enfin pour le *porrigo decalvans*, le *microsporon Audouini*, Gruby ; *trichophyton decalvans* et *trichomica decalvans*, Malmsten, qui diffère du *trichophyton tonsurant* par le plus petit volume de ses spores et par ses branches nombreuses courbées et ondulées.

Quant à l'herpès circiné, M. *Baerensprung* y a découvert récemment une espèce particulière de mycelium incolore, formé de petits éléments articulés, ressemblant à un collier de perles, et forma[illegible] filaments étendus et ramifiés qui s'anastomosent parfois. Ces

ents sont ronds, ovales ou allongés, et contiennent de petits gra-
ules ou spores.

Nous renvoyons, pour la micrographie spéciale à chacun de ces
yptogames, à l'article consacré à la description de chacune des
aladies auxquelles ils se rapportent. (Voir aussi la planche consa-
ée à la micrographie.)

Onzième classe. — *Maladies à production animale.* — Enfin, dans
uelques maladies, on observe des insectes particuliers : dans la
le, l'*acarus ;* dans la maladie pédiculaire, le *pediculus capitis*, le
diculus corporis, et pour la région du pubis, le *pediculus pubis.*
ous décrirons ces insectes à l'occasion de chacune de ces ma-
dies. Toutes ont cependant ce caractère commun, c'est de se
ger sous l'épiderme et d'y faire leur ponte en plus ou moins
ande abondance, et en y traçant dans quelques cas des sillons.
ous aussi font naître des démangeaisons avec ou sans états papu-
ux, vésiculeux ou pustuleux.

Douzième classe. — *Maladies composées.* — Leurs éléments patho-
giques rappellent ceux que nous avons fait connaître à l'occasion
s formes élémentaires que nous avons décrites.

IV. DIAGNOSTIC GÉNÉRAL DES MALADIES DE LA PEAU.

Il y a deux manières d'établir le diagnostic d'une maladie de la
au : ou par la *forme anatomico-pathologique primitive* de la ma-
die, ou par ses *productions morbides secondaires.* La première mé-
ode est sûre, non sujette à erreur ; elle pose un diagnostic à l'abri
e toute méprise. Mais malheureusement la forme anatomico patho-
gique de la maladie est trop souvent éphémère ; elle n'a parfois
ue quelques heures de durée, et comme le médecin n'est généra-
ment pas consulté au début de l'affection, mais bien après plu-
eurs semaines, plusieurs mois, le phénomène primitif a disparu
our faire place à un produit de sécrétion permanent. Ainsi l'*ec-
ema*, l'*eczéma impétigineux*, l'*impétigo*, les variétés d'*herpès*, le
pia, l'*ecthyma cachecticum*, l'*ecthyma* et bien d'autres affections,
nt dans ce cas. Cependant les maladies que je viens de citer sont
s plus communes. Ainsi, pour les variétés d'*eczéma*, les vésicules

primitives sont remplacées par un état de la peau criblée de petites ouvertures d'où transpire, sous forme de pluie, de la sérosité jaune et limpide. Dans l'*impétigo*, dès le troisième ou le quatrième jour, ce n'est plus qu'une croûte purulente que représentent les nombreuses pustules confluentes de cette maladie. Dans le *rupia* et dans l'*ecthyma cachecticum*, ce sont des croûtes noirâtres d'aspect gangréneux qui remplacent des vésicules ou bulles primitives qui ne durent que quelques jours, et ainsi de suite. De sorte qu'en regardant comme une source d'appréciation fort exacte, et comme donnant au diagnostic quelque chose de très positif, l'élément morbide, si le médecin n'a pour donn que cet élément, il lui fera le plus souvent défaut.

C'est parce que j'ai été frappé de fait que j'ai cherché à trouver une méthode de diagnostic basée les produits morbides secondaires; voie dans laquelle Alibert t déjà entré en partie dans sa première classification, en fondant r eux quelques-uns de ses groupes. Cette donnée a un très gr d avantage, car le produit morbide est *permanent* tant que la r ladie existe; si des onctions, des pommades, l'ont fait disparaître il suffit d'abandonner la maladie à elle-même sans application d'aucun topique pendant quelques jours, pour voir reparaître la sécrétion qui lui est propre. D'ailleurs, dans les cas les plus difficiles et dans l'incertitude entre deux ou trois affections, rien n'empêche de se rattacher en second lieu à l'élément anatomico-pathologique; mais par ma méthode, qui est disposée par voie d'exclusion, ou l'on arrive de suite et du premier coup à diagnostiquer l'affection, ou l'on est amené à un groupe de deux ou trois maladies que des circonstances de localité, de siége, de disposition générale, permettent de distinguer facilement. Depuis neuf ans, au moins, elle est soumise à l'appréciation des élèves qui suivent ma clinique à l'hôpital; je lui ai donné la publicité des journaux; et j'ai toujours vu un tel empressement à l'adopter, qu'elle doit avoir des avantages sur celle donnée par Willan; la méthode de Willan étant plutôt une classification qu'une méthode de diagnostic.

Je divise les maladies en deux grandes classes: maladies s tantes, maladies *non sécrétantes*. Rien de plus facile à résoudre

cette question. Y a-t-il croûte? les linges sont-ils tachés? le médecin reconnaît de suite la sécrétion. S'il n'y a pas d'apparence de ce genre, le malade, quelque peu intelligent qu'il soit, répond toujours à la question de savoir si la maladie *a jeté* ou n'a *pas jeté;* il dit même ce que la maladie *a jeté.*

Ceci posé, et dans l'hypothèse où l'affection est sécrétante, il faut chercher à reconnaître ce qu'elle sécrète. Ce sera de la *sérosité*, de la *sérosité purulente*, de la *sérosité purulente et sanieuse*, du *pus*, de la *matière grasse*. Chacune de ces catégories de sécrétion comprend un groupe de maladies, comme on peut le voir dans le tableau suivant. Rien de plus facile, d'ailleurs, à distinguer que ces produits de sécrétion. La *sérosité* ne fait pas naître de croûtes, elle salit le linge, l'empèse, y imprime une tache d'un gris roussâtre ; la *sérosité purulente* peut produire une croûte, mais cette croûte, peu épaisse d'ailleurs, est d'un jaune grisâtre ; ce n'est pas la croûte de pus desséché, avec sa couleur d'un jaune dit purulent. Quant à la sérosité purulente et sanieuse, ce n'est ni le reflet jaune du pus, ni le reflet jaune grisâtre du pus et de la sérosité, ni le noir de la sanie gangréneuse ; c'est une croûte d'un gris noirâtre qu'il suffit d'avoir vue une fois pour la reconnaître toujours, et qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir vue. — La *matière grasse* se reconnaît à son aspect d'un gris sale, poisseux, mou, s'enlevant avec l'ongle et s'écrasant entre les doigts.

Prenons donc un exemple pour diagnostiquer une maladie sécrétante. Soit un malade qui se présente au médecin affecté d'une maladie de la peau à la jambe avec *croûte purulente;* en se reportant au tableau, on trouve cinq maladies qui peuvent donner du pus : l'*acné*, la *gale pustuleuse*, le *sycosis pustuleux*, l'*impétigo* et l'*ecthyma*. Ainsi, dès l'abord par ce premier fait que la maladie est sécrétante, par cette seconde circonstance qu'elle sécrète du *pus*, voilà quarante maladies écartées, et le diagnostic n'a plus à porter que sur cinq affections de la peau ; vous raisonnerez alors par voie de localisation en disant : La maladie n'existe qu'à la jambe, donc ce n'est ni la *gale*, maladie générale et siégeant principalement aux mains, aux jointures, etc. ; ni le *sycosis*, maladie du menton ; ni l'*acné*, maladie de la figure ou du dos. Donc ce ne peut être qu'un impétigo ou un

MÉTHODE

POUR SERVIR AU DIAGNOSTIC DES MALADIES CUTANÉES LES PLUS COMMUNES.

Maladies sécrétantes.

Sérosité.

Eczéma.
Pityriasis [illegible] bra aigu.
Eczéma li[illegible]énoïde.
Herpès phlycténoïde.
Zona.
Gale séreuse.
Pemphigus.
Intertrigo sécrétant.

Sérosité purulente.

Eczéma *impetiginodes*.

Sérosité purulente et sanieuse.

Rupia.
Ecthyma cachecticum.

Pus.

Acné purulent.
Gale pustuleuse.
Sycosis pustuleux.
Impetigo.
Ecthyma.

Matière grasse.

Acne sebacea.
Acne punctata.

Maladies non sécrétantes.

Rougeur fugace.

Érythème.
Urticaire.
Roséole.
Intertrigo non sécrétant.
Couperose érythémateuse.

Rougeur persistante.

Purpura.
Scorbut.

Rougeur arrondie avec furfures.

Herpès circiné.
Herpès nummulaire.

Rougeur diffuse avec furfures.

Pityriasis.

Coloration jaune verdatre.

Pityriasis versicolor.

Coloration brune.

Pityriasis nigra.

Décoloration.

Achromie.

Furfures.

Pityriasis.

Squames *avec épaississement de la peau et rougeur.*

Psoriasis.
Lepra vulgaris.

Squames *sans rougeur.*

Ichthyose.

Papules *avec rougeur.*

Lichen aigu.
Strophulus.

Papules *avec rougeur et squames.*

Lichen pilaris.

Papules *sans rougeur.*

Lichen chronique.
Prurigo.

Tubercules.

Sycosis tuberculeux.
Lupus.

Productions végétales.

Favus.
Herpès tonsurant.
Porrigo decalvans.

Productions animales.

Pediculus.
Pulex.
Acarus.

ecthyma. Reportez-vous alors aux caractères distinctifs de ces deux affections, et vous reconnaîtrez facilement celle à laquelle vous avez affaire. Eh bien, j'ai pris là, à dessein, un des cas les plus compliqués.

Si nous nous adressons à la catégorie des maladies non sécrétantes, nous verrons que le médecin doit tenir compte de phénomènes divers. La *rougeur* de la surface malade qui ne se dessine que par ce phénomène ; la *coloration jaune verdâtre*, *brune*, ou la *décoloration :* ce sont des conditions qui frappent tout d'abord ; mais pour la rougeur il faut voir si elle est *persistante ;* ou si elle *disparaît* sous une pression très légère du doigt ; si sa forme est nettement *circonscrite* et *régulière*, ou si, au contraire, elle est *diffuse*. Sont-ce des *squames* ou des *papules* ou des *tubercules* qui frappent tout d'abord à la vue de la maladie, voilà autant de catégories d'affections dans lesquelles on trouve une ou deux maladies, et par conséquent le diagnostic en est d'autant plus facile.

Seulement, en procédant au diagnostic ce tableau à la main, il faut que le médecin résolve nettement la question de *sécrétion ;* et il ne s'agit pas ici d'une sécrétion temporaire, accidentelle, d'un moment, mais d'une sécrétion qui a une certaine durée et qui a été sensible pour le malade. Cette première question vidée, il faut bien observer, ou la nature de la sécrétion, et la caractériser, ou le phénomène apparent du mal dans l'affection non sécrétante. Nous ne doutons pas qu'avec quelque soin le médecin ne puisse facilement arriver au diagnostic : or, dans l'état actuel de la pratique médicale, c'est, suivant nous, rendre un grand service que de mettre les médecins en état de connaître à quelle affection cutanée ils ont affaire, afin de ne pas formuler une prescription banale contre une *dartre*, ainsi qu'on l'a fait si souvent jusqu'alors.

V. PRONOSTIC.

Envisagées au point de vue du pronostic, les maladies de la peau en général sont rarement mortelles, surtout en ne comprenant que les maladies propres à nos climats. En effet, si l'on excepte le *pemphigus diutinus*, le *rupia*, *l'ecthyma cachecticum* et le *pityriasis rubra*, la presque totalité des autres affections de la peau ne porte pas une

atteinte réelle à la santé. Mais le *pemphigus diutinus chronique* est toujours grave, et d'autant plus grave qu'il naît d'une cause générale asthénique physique et le plus souvent morale et que nous n'avons aucune médication interne bien efficace à lui opposer ; que nos moyens externes, étant tous plus ou moins résolutifs, tendent à supprimer une éruption bulleuse et une sécrétion abondante de la peau, qui, dans la généralité des cas, se reporte alors sur la membrane muqueuse intestinale, et y fait naître une sécrétion diarrhéique considérable qui épuise rapidement les forces du malade et le conduit au tombeau.

C'est d'ailleurs dans des con[illegible] analogues, c'est-à-dire par le fait d'une diarrhée non provo[illegible]e le malade succombe ; c'est là le phénomène contre lequel il [illegible]tter sans cesse dans le cours de la maladie ; qu'il faut préve[illegible]'il faut arrêter à tout prix quand il se manifeste.

Mais si la généralité des affe[illegible]cutanées n'est pas grave, on peut établir comme proposition géné[illegible]e que la disparition brusque, *répercussion accidentelle provoquée* [illegible] *non provoquée*, de la plus simple maladie de peau, est un fai[illegible]ne grande gravité.

Il se manifeste alors des phénomè[illegible]s généraux ou locaux variables suivant la force et la constitution du sujet, suivant son idiosyncrasie, c'est-à-dire suivant qu'il a ou qu'il a eu un organe souffrant, ou enfin un organe plus faible, et vers lequel se reflète la répercussion, comme se reflète la douleur d'une impression morale vive.

Le danger de la répercussion dépendra, soit de l'état général développé, soit de l'importance de l'organe affecté. En fait d'état général il est difficile de le décrire : il s'annonce par la fièvre, mais sans intensité, de l'abattement, du malaise, de l'affaissement ; un état, en un mot, qui n'est pas franchement dessiné et qui se rapproche un peu de ces formes insidieuses typhoïdes que l'on voit survenir sous l'influence d'une tout autre cause. Le cerveau et les organes gastriques sont pris à la fois ; ce n'est pas une arachnitis avec fièvre, délire, etc., c'est un état de somnolence fébrile qui dénote que le cerveau et ses enveloppes sont malades. Qui n'a vu, par exemple, les conséquences funestes de la suppression brusque [illegible] poux chez un enfant ? Celui-ci est à deux doigts de sa perte, si [illegible]

uelques cas même il ne succombe. Vous employez des sangsues, e la glace sur le front, des vésicatoires aux extrémités, les moyens s plus énergiques, et dans certains cas vous n'enrayez pas les ac-dents. Eh bien, la suppression d'une sécrétion à la surface d'une etite étendue de peau malade peut amener le même état que la ppression des poux.

Ici ce sera le tube intestinal qui se prendra, là les organes bi-aires, ailleurs les poumons, mais jamais d'état phlegmasique net-ment dessiné. Et comme je le faisais observer précédemment pour s poumons, ce sont des congestions à moitié sanguines, à moitié reuses, subinflammatoires, que les antiphlogistiques ne font u'exaspérer; et l'on ne guérit généralement ces affections qu'en ppelant à la peau l'éruption là où elle existait, et cela par des oyens artificiels, à la tête desquels je place l'huile de *croton tiglium*, arce que cette huile développe toujours une inflammation sécré-nte. Heureux encore quand la révulsion peut être opérée; dans uelques cas j'ai employé en vain l'huile de croton, la pommade ispastique, les sinapismes répétés, les vésicatoires. Il semble que peau soit tombée dans un état d'insensibilité qui la rende inac-ssible aux irritants les plus énergiques.

Singulier phénomène que celui de la répercussion ou de la mé-stase, car il peut y avoir l'une ou l'autre, suivant les circon-ances. Ainsi un malade sort d'un bain chaud; il reçoit l'impres-on de l'air froid, l'affection cutanée disparaît ou s'atténue nota-ement: il y a répercussion. Mais dans beaucoup de cas, sans cause préciable connue, la maladie cutanée s'éteint pour être remplacée r un état morbide général ou local plus ou moins grave: c'est ors de la métastase dont la cause nous échappe.

C'est ici le lieu de faire connaître un fait que nous avons établi esque en axiome depuis quelques années: à savoir, que toute aladie de peau disparaît ou peut disparaître sous l'influence d'un at morbide général de l'économie. Et, chose remarquable, si cette fection cutanée donne lieu à quelque production animale ou vé-tale, tous les insectes ou les productions organiques disparaissent un tel point que le malade se croit guéri de sa maladie de peau, que le médecin est disposé à entrer dans cet ordre d'idées. Ainsi,

plus de traces de gale ou d'acarus, ou de poux, si la maladie était la gale ou une affection pédiculaire; plus de productions végétales de la *teigne*, de l'*herpès tonsurant*, si ces affections préexistaient à l'état fébrile général. Les maladies sécrétantes et non sécrétantes sont dans le même cas.

Tant que durera cet état morbide interne, qui pourra être avec ou sans fièvre, l'affection de la peau sera maintenue à l'état de disparition : ainsi, soit une fièvre typhoïde, qui dure cinq à six septénaires, la gale, la teigne ou toute autre maladie cutanée, auront complétement disparu dur[illegible] de temps.

Le malade vient-il à entr[illegible] alescence, celle-ci n'est réellement franche que lorsqu[illegible] de la peau reparaît. J'ai pris pour exemple la gale et l[illegible] rce qu'il est fort surprenant qu'une maladie produite [illegible] cte s'anéantisse durant une maladie générale pour se rév[illegible] ite à la convalescence : telle est donc la puissance de cet[illegible] l qu'elle enchaîne l'évolution même d'un animal parasite [illegible] forte raison enchaîne-t elle l'évolution d'une maladie de la [illegible] Mais dans l'un comme dans l'autre cas la maladie *sommei*[illegible] n me passe cette expression ; puis à la convalescence elle se mont[illegible] avec les mêmes caractères, sauf l'intensité, qui généralement est moindre.

Telle est d'ailleurs la ténacité de certaines affections cutanées chroniques, qu'une maladie *exanthémateuse* n'en fait pas toujours justice, et cependant c'est une nouvelle affection cutanée *générale*, succédant à une affection cutanée toute locale et limitée à une très petite surface. L'exemple suivant en est une démonstration bien évidente.

Un homme est depuis trois mois traité dans nos salles pour une *urticaire* chronique datant de dix-huit mois ; il est pris de phénomènes généraux ou prodromes d'une affection exanthémateuse, et, en effet, au bout de deux jours on voit apparaître une *roséole générale*. Néanmoins l'*urticaire* persiste, les prodromes ne cèdent cependant pas, et le surlendemain apparaît un *purpura* aigu ; puis au cinquième jour se montre une *variole confluente :* alors cesse l'urticaire. La variole parcourt toutes ses phases, et sa gravité [illegible] grande, qu'elle met les jours du malade en danger à cause de

nènes cérébraux qui accompagnent la fièvre de suppuration. ıx larges vésicatoires aux cuisses en font justice, et la convales- ıce s'établit. La desquamation arrive. Le malade se croyait dé- rassé de son urticaire *diurne*, ce dont il se réjouissait beaucoup, ıqu'un matin, à la visite, il nous montre des petites plaques ro- ı et surélevées au-dessus du niveau de la peau, qui se sont déve- pées à l'état discret : c'était l'urticaire qui revenait, et qui peu à ı a repris son intensité première.

'e cas est fort remarquable; il prouve toute l'influence de la onicité sur la continuité des maladies de la peau. Et que l'on ne ıpose pas qu'il existait chez cet homme une cause interne, un or- ıe souffrant qui perpétuât l'affection cutanée. Non, la santé gé- ıale a toujours été excellente et les organes digestifs avaient pu ıporter sans inconvénient plusieurs médications énergiques.

ıprès un tel exemple, qu'on ne soit pas surpris non plus de la parition des dartres durant une maladie générale quelconque ; ıs toute l'économie est en souffrance et l'état local cède en pré- ıce de l'état général.

Disons actuellement que cet état général est le plus souvent un n pour la maladie de la peau, et dans quelques cas même il en ninue très notablement l'intensité, il en permet la guérison dans espace de temps beaucoup plus court. C'est ce qui a lieu même ır les maladies les plus rebelles : l'érysipèle de la face, par ımple, contribue puissamment à la guérison du lupus ; et si ıs le cours d'un traitement de lupus il se montre deux, trois éry- ıles, chacun d'eux procure au malade un certain bénéfice pour guérison. Nous avons été à même d'observer très fréquemment faits à l'hôpital Saint-Louis. Si l'érysipèle n'y est pas épidémique, ıst cependant des saisons où il se montre sur beaucoup d'indi- ıus à la fois, surtout chez ceux qui séjournent à l'hôpital. Il est e que dans une salle de cent lits, quand des érysipèles se décla- ıt, ils n'affectent pas successivement sept, huit ou dix malades : st ainsi que nous avons pu juger de l'influence de cette affection diverses maladies cutanées. S'agit-il d'une affection d'une tout tre nature, la maladie de peau reparaît lors de la convalescence, ıis toujours à un plus faible degré d'intensité.

VI. ANATOMIE DE LA PEAU COMPARÉE A LA PATHOLOGIE.

Pendant longtemps la peau fut regardée comme un tissu composé de deux couches superposées, l'épiderme et le chorion. Après les travaux de Malpighi, les anatomistes s'accordèrent à reconnaître comme intermédiaires à ces deux tissus le corps muqueux et le corps papillaire.

Le derme était le canevas de la peau; le corps papillaire s'y trouvait superposé et résul[illegible]blage de petites éminences formées par les extrém[illegible]t des vaisseaux, qui, après avoir passé par les trous [illegible]blé le chorion, se groupaient en petits pinceaux dans un [illegible]ieux érectile; organes essentiellement nerveux sui[illegible] les [illegible]rveux et vasculaires suivant les autres, parce qu'ils y [illegible] existence de vaisseaux exhalants et absorbants.

Quant au corps muqueux, c[illegible] produit sécrété par les papilles et destiné à les lubrifier. Il [illegible]ermait en outre la matière colorante.

Bichat mit en doute l'existence du corps muqueux comme tissu propre, et le considéra comme une couche vasculaire chargée de la triple fonction d'exhalation, d'absorption et de production de matière colorante.

Gaultier émit sur le corps muqueux de nouvelles idées. Il le regarda comme étant formé de quatre couches: la plus profonde, à *bourgeons vasculaires* ou *sanguins*; la deuxième, *albuginée profonde*; la troisième, *membrane brune*; et la quatrième, *albuginée superficielle*. La première et la troisième seules douées d'organisation et remplissant les fonctions d'exhalation et d'absorption.

Chaussier a constamment nié l'existence de ces quatre couches.

Enfin, MM. Breschet et Roussel de Vauzème furent conduits à revenir aux idées anciennement émises en considérant la peau comme formée de deux feuillets superposés, le chorion et l'épiderme.

Quoi qu'il en soit de ces divergences sur les tissus lamelleux de la peau, on admettait l'existence de vaisseaux exhalants et absorb[illegible] On avait même mesuré leurs orifices dans un espace donn[illegible]

uwenhoek avait porté le nombre des vaisseaux sudoripares jusà 14,400 pour une ligne carrée. Verheyen et Sténon décrivirent glandes sudoripares; Bidloo les fit dessiner (*Anatomie du corps ain*, etc., Utrecht, 1750, in-folio, tab. 4, fig. 6). Il les considét comme concourant à former des papilles. Monro, Fontana, Proska, Cruikshank, Albinus, Meckel, Mojon, décrivirent des tractus ueux et spiroïdes qui se détachent de la face interne de l'épime, mais ils nièrent qu'ils fussent canaliculés. Henri Eichorn, Gœttingue, chercha à démontrer pourquoi tant d'auteurs en ient nié l'existence.

Enfin Breschet et Roussel de Vauzème, reprenant l'étude comte et microscopique de la peau tant chez l'homme que chez les acés, donnèrent une description qui satisfaisait plus complétement aux fonctions de ce tissu, mais qui nous parut encore bien inmplète en regard des formes variées que présentent les maladies tanées. A leurs yeux, la peau est composée d'une trame solide, st le derme, recouvert d'épiderme engendré lui-même par un appareil dit *blennogène*, qui se compose de glandes sous-dermiques et un canal qui va verser à la surface du derme une matière solidible. La sueur serait sécrétée par des glandes d'une autre espèce acées dans l'épaisseur du derme, ayant aussi leurs canaux exhants et constituant l'appareil *diapnogène*. Les liquides seraient abrbés par des vaisseaux d'inhalation qui se perdraient dans l'épaisur du derme. La matière huileuse de la peau serait fournie par s follicules sébacés, ainsi qu'on l'admet depuis longtemps; et enfin matière colorante serait produite par un appareil dit *chromato*ne formé d'un tissu parenchymateux et glanduleux avec des vaisaux exhalants très courts.

Certes, rien de plus satisfaisant au point de vue physiologique que tte description. Elle répond à tout, elle rend compte de l'accomlissement de toutes les fonctions. Malheureusement elle ne satisfait s à la pathologie cutanée, puisqu'elle place très profondément des rganes qui donnent lieu à des maladies très superficielles; et, pour 'en citer qu'un exemple, elle met les organes sécréteurs de l'épiderme au-dessous du derme, alors que les variétés de *pityriasis*, ans lesquelles l'épiderme est le principal produit de sécrétion, sont

les maladies les plus superficielles de la peau. Au surplus, les anatomistes plus modernes en ont fait justice. Malheureusement s'ils ont détruit un échafaudage qu'ils regardent comme imaginaire, ils ont mis à la place quelque chose de moins satisfaisant encore, ainsi qu'on va le voir.

Il n'y a réellement, suivant eux, dans la peau, que deux couches, le derme et l'épiderme. Le derme contient dans son épaisseur les follicules, les glandes, les vaisseaux et les nerfs, et à sa surface les papilles. L'épiderme est composé par une substance homogène. Le derme est un tissu aréolaire à mailles plus ou moins larges, suivant les diverses parties du corps les sont remplies par un tissu cellulaire adipeux, et traver es vaisseaux et les nerfs de la peau. Les papilles, que l'on ropos décrites comme des appendices distincts du derme, nnent à sa face superficielle. Ce sont de très petites saillies nences conoïdes parfaitement visibles à la langue ; disposées en bles lignes très distinctes à la peau des mains, à la plante des surtout à la pulpe des doigts ; elles sont si ténues sur la génér la surface de la peau, qu'elles y ont plutôt été admises par anal que *de visu*.

Là où elles sont très distinctes, es constituent des saillies du derme, pénétrées par beaucoup de nets nerveux et de ramuscules vasculaires à tissu presque érectile. L'œil, armé du microscope, reconnait d'ailleurs dans le derme une fibre cellulaire proprement dite, une fibre de noyau, et une troisième espèce de fibre qui appartient au tissu fibreux élastique. Ces diverses fibres entrent aussi dans la composition des papilles, car au point où celles-ci se détachent du derme, on voit les fibres de ce dernier tissu se diriger en masse dans le plan horizontal et se relever dans le plan perpendiculaire pour constituer les cônes papillaires.

On trouve d'ailleurs dans le derme les follicules sébacés ; ils y existent dans toute l'étendue de la peau, excepté à la paume des mains et à la plante des pieds. Ils abondent surtout là où il y a des poils, aux environs des orifices, dans les plis de l'aine et de l'aisselle. Leurs orifices viennent se montrer très distinctement à la surface de la peau. De la grosseur d'un grain de millet et s beaucoup plus petits (de 1/2 millimètre à 1 millimètre), ils

forme d'une petite ampoule; ils sont en général simples et discrets, excepté au nez, où ils sont très rapprochés; quelques-uns sont très agglomérés.

Partout où il y a des poils, les conduits des follicules sébacés s'ouvrent dans la gaîne du poil lui-même, et chaque poil reçoit souvent dans sa gaîne le produit de plusieurs follicules sébacés qui l'entourent avec symétrie.

Les anatomistes modernes admettent encore l'appareil sudoripare découvert par Breschet et Roussel de Vauzème, appareil glanduleux formé par un enroulement vasculaire dont le canal excréteur vient s'ouvrir en traversant les papilles du derme et l'épiderme jusqu'à la surface de la peau. Ces appareils glanduleux existent partout, aussi bien à la paume des mains qu'à la plante des pieds, et tel est leur nombre, qu'Eichorn compte cinquante ouvertures de canaux sur une surface d'une ligne carrée, ou douze ouvertures sur 1 millimètre carré.

On nie l'existence de l'appareil blennogène ou sécréteur de l'épiderme, ainsi que celle de l'appareil chromatogène.

Suivant les anatomistes modernes, l'épiderme est un produit exhalé à l'état liquide par les capillaires sanguins à la surface du derme. Cette exhalation n'est pas amorphe, elle est formée par une multitude de vésicules ou cellules accolées les unes aux autres, et d'autant plus déformées qu'on les observe plus près de la surface extérieure de la peau, où elles donnent lieu à l'épiderme solide, consistant, espacé d'*épithélium pavimenteux stratifié*. Chaque cellule contient un noyau qui s'efface de plus en plus au fur et à mesure que les vésicules se rapprochent de la surface libre de l'épiderme, en même temps que les parois des cellules s'accolent, se déforment pour devenir lamelleuses et presque rhomboïdales, de rondes ou de polygonales qu'elles étaient. L'analyse démontre qu'elles sont composées par une substance cornée analogue à la composition des poils, de la laine et des plumes.

C'est à la portion encore molle de la partie profonde de l'épiderme que Malpighi a donné le nom de *corps muqueux*. Celui-ci n'existerait donc pas réellement comme tissu, puisqu'il ne serait formé que du produit d'exhalation des vaisseaux capillaires san-

guins chargés d'exhaler la matière albumineuse qui doit plus tard l'épiderme solide.

Quant à la matière colorante, ou pigment, ce serait, comm derme, un produit du *plasma* du sang exhalé des vaisseaux san Le pigment ne serait pas seulement infiltré dans les couches fondes de l'épiderme, mais il serait renfermé dans des cellules quelles on donnerait le nom de *cellules pigmentaires*. *Henle* que la matière colorante des cellules pigmentaires est group molécules très fines sur le noyau de ces cellules. *Gunther* afi au contraire, que cette disposition, vraie pour la choroïde, fausse pour la peau. Suivant lui, les cellules pigmentaires ne que des cellules de la couche prof de l'*épiderme* qui *man de noyau* et qui contiennent un liquide uniformément coloré en b foncé chez le nègre. A mesure que ces cellules se développent, même temps qu'elles se déforment pour constituer l'épiderme, e porter à la surface, elles deviennent de moins en moins colorées p la *disparition progressive* de leur uide intérieur ; parvenues à surface, elles ne forment plus que des lamelles ou écailles semb bles aux autres.

Lorsque le pigment est *persistant*, comme dans le nègre, c'est qu mesure que les cellules pigmentaires se décolorent et se détachent à la surface de l'épiderme, il s'en forme sans cesse de nouvelles. Lorsque le pigment est *temporaire*, c'est que le développement des cellules pigmentaires disparaît avec la cause occasionnelle qui leur a donné naissance.

C'est à la production des cellules pigmentaires dans les couches profondes de l'épiderme que seraient dues les taches de *rousseur* et les *éphélides*. (Mais voilà qu'aujourd'hui les éphélides sont constituées par un cryptogame spécial !)

Telles sont donc les données actuelles de l'anatomie sur la peau ; et chacun conviendra avec nous qu'elle laisse beaucoup à désirer. Il y a plus : pour tout médecin qui aura fait une certaine étude des affections cutanées, cette anatomie est sinon à refaire, au moins à modifier. Et d'abord n'est-il pas extraordinaire de voir les vaisseaux sanguins de la peau produire des corps organisés par exh c'est-à-dire des cellules épidermiques avec ou sans pigment

qui [illegible], comme Henle, admettant des cellules pigmentaires d'un [illegible] différente de celles de l'épiderme, ce qui fait pour les vais-[illegible] sanguins deux éléments *organisés* de diverse nature, qui sont [illegible] par les mêmes vaisseaux. Gunther, il est vrai, ne croit pas [illegible] existence de ces deux espèces de cellules; mais il vous dit: Il y a [illegible] cellules épidermiques à noyau sans pigment, et des cellules [illegible] au avec pigment, et suivant qu'elles se trouvent dans des rap-[illegible] relatifs plus ou moins inverses, on a des peaux plus ou moins [illegible] dans les diverses races. Et il n'hésite pas à ajouter: C'est [illegible] cès de cellules colorées qui forme les éphélides ou taches.

[illegible] is, en pathologie cutanée, il existe des maladies de l'épiderme, [illegible] plusieurs variétés de *pityriasis*. On connaît diverses espèces [illegible] taches que l'on a nommées de noms différents, *taches de rous-[illegible], éphélides, pityriasis versicolor, pityriasis nigra*, et ces taches [illegible] nettement circonscrites, à bords arrêtés, faisant contraste avec [illegible] peau saine. Il y a plus : il existe une maladie de la matière colo-[illegible] de la peau que l'on nomme *vitiligo*, et dans laquelle on trouve [illegible] décolorations complètes, parfaites de la peau, entourées d'un [illegible] cle plus ou moins large d'un brun gris et verdâtre, de sorte qu'il [illegible] mble que dans cette maladie la matière colorante ait été chassée [illegible] un centre vers la circonférence, pour, en s'ajoutant à la matière [illegible] orante de la circonférence, rendre la peau beaucoup plus foncée, [illegible] comme s'il s'était fait un transport de la matière co orante de la [illegible] partie décolorée à celle qui l'est le plus. C'est ainsi qu'on voit la moitié inférieure de la surface de la peau de la verge d'un blanc [illegible] mat, tandis que tout le dos de la verge est d'un gris verdâtre [illegible] foncé; de même pour les doigts; même disposition très arrêtée pour la surface du dos. Comment les anatomistes modernes expliquent-ils ces faits avec l'origine qu'ils donnent à la matière colorante? Où sont donc les vaisseaux malades? La peau est parfaitement saine; d'ailleurs les malades n'éprouvent aucune sensation, pas de démangeaison. L'épiderme est doux et lisse, etc. Évidemment les anatomistes ont détruit l'appareil chromatogène, mais ils ne l'ont pas remplacé.

Quant à l'épiderme, si c'est un produit d'exhalation, comment d'abord est-ce un produit organisé? Comment, si c'est un produit d'exhalation sans organes spéciaux exhalants, devient-il malade

...ement et indépendamment du tissu de la peau? Expliquez, s'il vous plaît, ces plaques farineuses de la peau (pityriasis) chez les jeunes gens, à l'époque du printemps, sans sécrétion aucune? Pourquoi ces maladies de la peau dans lesquelles il n'y a que sécrétion d'épiderme : *psoriasis*, *lepra vulgaris*, *ichthyose?* Ce sont cependant les capillaires sanguins de la peau qui devraient alors être malades, et pourquoi, comme dans l'ichthyose blanche, brune, cornée, le tissu de la peau est-il parfaitement sain, alors que tous les vaisseaux capillaires sanguins seraient malades?

Une anatomie de la peau réelle, ...e, doit pouvoir rendre compte des formes variées des affection... nées, lorsque ces formes sont constantes, quand elles se rep... sent toujours les mêmes: or voyez les lacunes sous ce rapport... existe une maladie de la peau qui se caractérise par l'exhalation ...e odeur tellement fétide, que le sujet ne peut pas demeurer da... ne pièce sans l'infecter ; c'est en plus ce que l'on observe en r... s chez beaucoup de personnes qui, aussitôt qu'elles se déshabi..., répandent une odeur désagréable. Après les preuves donnee... par M. Collard de Martigny, il a bien fallu admettre l'absorption ... zeuse cutanée. Quelques physiologistes doutent encore aujourd'hui de l'exhalation gazeuse. Si l'odeur n'est là qu'une émanation odorante, où sont les organes de cette sécrétion odorante? C'est la sueur, pourra-t-on dire, qui porte cette odeur. La plupart de ces personnes ne transpirent pas, elles ont la peau plus ou moins brune, plus ou moins sèche.

Il existe une maladie de la peau qu'Alibert a désignée sous le nom de *prurigo sans papules*, et dans laquelle les grattages sont incessants et horribles; cependant on ne voit rien à la peau, pas même une excoriation. C'est là, dira-t-on, une névralgie! Ces sujets sont les moins nerveux du monde; ils ont une peau épaisse, brune, sèche, que rien n'écorche. Ce ne sont pas les papilles qui sont malades, car la peau est parfaitement lisse. Mais voici venir le lichen, affection *papuleuse*, parce que la forme de l'éruption morbide ressemble assez bien à la disposition conique des papilles de la peau. Dire que dans cette maladie, ainsi que dans le prurigo, autre forme d'affection papuleuse, les papilles soient malades, c'est comme une erreur grave, et nous avons déjà fait observer que : 1° Les p

pilles de la peau siégent principalement à la surface interne des membres ; si c'est le siége du lichen en général, ce n'est pas celui du prurigo, qui est toujours placé en dehors ; 2° que les papilles de la peau sont disposées par paires sur des lignes courbes et régulières ; rien de plus diffus que le lichen qui se montre par des élevures papuleuses disséminées, sans aucune régularité, sans aucune harmonie. Affecte-t-il la forme de plaque, même état diffus des élevures papuleuses du lichen dans la plaque elle-même, et de plus la maladie présente toujours la forme parfaitement nummulaire ; elle siége sur le dos de la main, à la partie externe des membres. Enfin, c'est surtout à la pulpe des doigts que l'on trouve le plus de papilles, et l'on ne voit jamais de lichen à la face palmaire des doigts, on en trouve fréquemment à la face dorsale. Je ne demanderai pas quel est l'élément anatomique de la forme tuberculeuse ; je me contente d'avoir démontré le peu d'analogie qu'il y a entre les papilles et les papules du lichen.

Quel est le siége de l'herpès à vésicules miliaires et de l'eczéma dans les diverses couches de la peau ? Du temps où l'on admettait l'existence du corps muqueux, on disait ce dernier malade à cause de l'état si superficiel de ces maladies et de leurs vésicules si ténues ; aujourd'hui nous sommes en présence de cinq maladies qui toutes ont la forme vésiculeuse : l'herpès, l'eczéma, l'herpès phlycténoïde, le pemphigus, affections dans lesquelles les éléments morbides sont les mêmes (épiderme soulevé par de la sérosité de même nature), mais où la vésicule, à peine perceptible dans l'herpès, devient plus sensible dans l'eczéma, très visible dans l'herpès phlycténoïde et acquiert des dimensions considérables dans le pemphigus. A part le diamètre de la vésicule, ces maladies semblent pareilles ; toutes sont superficielles, toutes paraissent siéger dans le corps muqueux sans que le derme soit affecté. Avec les mêmes apparences, la maladie a un siége profond dans le zona, où sous la vésicule existe une fausse membrane dont la chute donne lieu à un ulcère qui laisse une cicatrice. Certes, avec de pareilles analogies morbides, comment ne pas admettre qu'il est un élément commun particulier de la peau qui soit affecté dans toutes ces maladies ?

Que si, en regard de ces affections vésiculeuses, nous plaçons les

maladies pustuleuses, nous observerons des phénomènes qui peuvent donner lieu à la même observation. La vésicule purulente de l'eczéma impétigineux, la pustule de l'impétigo, celle de l'ecthyma, offrent entre elles la plus grande analogie, à différence d'intensité et de volume près ; seulement celle de l'ecthyma est plus profonde que celle de l'impétigo. Ce sont là des affections pustuleuses identiques, quant à l'aspect et quant à la proportion de la vésicule par rapport à l'engorgement de la pustule. Si c'étaient les seules pustules de la peau, on pourrait les considérer comme étant le résultat d'une inflammation du derme, et encore aurait-on à se demander pourquoi la même inflamm[illegible]ène-t-elle jamais le pus dans l'eczéma, l'herpès et le per[illegible]lais il est d'autres maladies pustuleuses de la peau qui [illegible]une analogie avec les précédentes : ce sont l'acné, l'im[illegible]siforme, le sycosis pustuleux. Dans ces variétés l'engo[illegible]er[illegible]titue les 9/10es du volume de la pustule, condition tout opposée [illegible] premières dont les 9/10es sont formés par les vésicules. Objecter [illegible]on que le siége de l'acné est dans les follicules sébacés? Mais le [illegible]roncle, mais le sycosis, n'ont plus le même siége. Ainsi, l'infla[illegible]ation pustuleuse de la peau doit avoir aussi son siége tout pa[illegible]iculier, ce ne saurait être le même tissu affecté que dans l'inflammation vésiculeuse non suppurante. Ce ne sont pas seulement les affections de la peau dites dartreuses que nous aurions pu citer ; les éruptions exanthémateuses nous en auraient encore fourni de nombreux exemples.

Ce sont ces considérations qui nous font dire que Breschet et Roussel de Vauzème avaient pris dans leurs recherches anatomiques une voie meilleure que ceux qui les ont suivis, en adoptant pour point de départ les fonctions de la peau, et en recherchant les éléments ou organes qui les accomplissent ; ils ont pu se tromper, mais leurs successeurs ont préféré fournir une anatomie qui ne rend pas compte ni de la physiologie ni de la pathologie de la peau.

L'inflammation du tissu doit être, suivant nous, le contrôle de l'anatomie de la peau, aussi bien et mieux peut-être encore que la physiologie ; car les formes inflammatoires variées ne peuvent être que le résultat d'éléments anatomiques différents *enflammés*. [illegible] se trouvent justifiés, à notre point de vue, les détails dans le

nous venons d'entrer. Puissent-ils appeler l'attention et donner ouverture à des recherches nouvelles.

Terminons par quelques considérations sur l'influence des qualités physiques et vitales de la peau ; nous serons conduit à quelques remarques qui viendront justifier ce que nous avons dit de l'existence de certaines maladies qui dépendent de la structure spéciale de ce tissu chez les divers individus. Et d'abord son *épaisseur*. La considération de l'épaisseur de la peau conduit à une remarque assez importante, à savoir, qu'à moins d'hérédité, une peau fine ne sera jamais affectée d'une maladie squameuse du genre du psoriasis, de la lèpre vulgaire et de l'ichthyose. Il y a plus, le siége de ces maladies est toujours en dehors des membres, parce que l'épiderme et la peau ont plus d'épaisseur dans ce point. De là aussi la fréquence du psoriasis palmaire et du psoriasis plantaire. Cette circonstance si frappante ne détruit-elle pas à elle seule l'hypothèse des anatomistes modernes, qui considèrent l'épiderme comme un corps mort, comme une matière coagulable, inerte et rien de plus?

Par contre, toute peau fine sera le siége des lichens, et ceux-ci se développeront sur les parties du corps où la peau a moins d'épaisseur, où elle jouit de plus de sensibilité.

Coloration. — Plus la peau est blanche, moins elle est disposée aux maladies cutanées qui se dessinent par des anomalies dans la matière colorante : ainsi les *pityriasis versicolor* et *nigra*, qui sont l'attribut de la peau colorée.

Une peau blafarde, opaline, est une peau essentiellement sécrétante de sa nature, en même temps qu'elle est plus chargée de follicules sébacés ou qu'elle est le siége du plus grand développement de ces follicules. C'est aussi sur cette sorte de peau que se montrent les *acne rosacea*, *indurata*, *punctata*, *sebacea*.

Sécrétion. — Toute peau dont la sérétion huileuse est abondante ne saurait jamais être atteinte d'une affection squameuse.

Si la sécrétion de la sueur *aqueuse* est considérable, alors se maintiennent fréquemment les affections vésiculeuses, *eczéma*, *herpès* de toute sorte, ainsi que les *intertrigo* qui proviennent presque toujours de la sueur devenue alcaline, et par cela même irritante, puisque la sueur est naturellement acide.

Un excès de sensibilité de la peau prédispose aux maladies lichénoïdes ou avec démangeaison.

Enfin les plicatures de la peau ont une grande influence, soit sur la durée, soit sur la forme de certaines affections cutanées. Elles engendrent les crevasses dans les *psoriasis palmaires* et *plantaires;* elles changent l'aspect des ichthyoses brunes qui ont généralement leur siége aux articulations; elles s'opposent à la guérison des *intertrigos*, et particulièrement de ceux qui ont pour élément la scrofule ou au moins le tempérament lymphatique.

[illegible]ÉNÉRALE.

Avant de traiter de la t[illegible] générale, il est une question préalable qu'il faut résoudr[illegible] suivante : *Existe-t-il des maladies qu'il faut savoir re[illegible] dont le traitement doive être reculé, dans la crainte de porter u[illegible]einte plus ou moins grave à la santé générale?*

Les maladies de la peau peuvent se montrer à tout âge; elles affectent la très jeune enfance comme l'âge le plus avancé de la vie, deux périodes de l'existence qui se touchent. Dans l'une et dans l'autre, faiblesse des organes. Pour le jeune âge, cette faiblesse tient à un accroissement encore imparfait, mais où le système sanguin jouit d'une grande activité. Pour la vieillesse, cette faiblesse résulte de l'usure des organes, et alors la vie ayant peu d'activité, la moindre perturbation portée dans son harmonie suffit pour amener un trouble grave, et compromettre ainsi la santé; de là doivent découler les préceptes que nous allons faire connaître.

Durant l'allaitement, on voit naître sur la tête des enfants ou sur la figure, et plus rarement sur le corps, des maladies que l'on désigne vulgairement sous le nom de *croûtes de lait*, c'est ou un acné sébacé (croûte sèche), ou un eczéma (*achor mucifluus* d'Alibert), ou un eczéma impétigineux. Des soins minutieux de pr[illegible] les agents les plus simples, comme des cataplasmes, une pom[illegible]

très légèrement résolutive, suffisent pour faire disparaître ces affections. Alors peuvent se développer tout à coup les accidents les plus graves, soit du côté du cerveau, soit dans l'économie en général, qui mettent aussitôt la vie de l'enfant en danger, et causent parfois la mort. Et cependant il n'est que trop fréquent de voir des parents, des mères surtout, solliciter le médecin pour faire disparaître ce qu'ils regardent comme pouvant imprimer une tache à la beauté de leur enfant. Il faut que le médecin sache respecter ces maladies, qu'il fasse entrevoir tous les dangers d'une guérison et qu'il résiste aux obsessions, fussent-elles les plus impérieuses, par cela même qu'elles sont compromettantes. Le temps, dans la généralité des cas, fera justice du mal, ou si la maladie ne guérit pas par le bénéfice de l'âge, le médecin obtiendra une guérison facile et non dangereuse lorsque le développement de l'enfant aura pris assez d'accroissement.

Toutefois il ne faudrait pas pousser trop loin ce conseil, et aller jusqu'à attendre l'époque de la menstruation pour les jeunes filles, leur mariage ou leur grossesse, ainsi que le conseillent quelques praticiens : c'est là une exagération trop souvent préjudiciable ; mais il suffit d'attendre l'âge de six, sept ou huit ans pour agir. Il y a plus, il est des eczémas impétigineux chroniques, plus ou moins circonscrits de la tête, qui forment des croûtes tenaces, adhérentes aux cheveux, ne tombant qu'à des intervalles très éloignés ; et comme ces croûtes s'accroissent sur la surface du cuir chevelu, comme elles ont pris point d'appui sur elle au milieu des cheveux avec lesquels elles forment une sorte de feutre, il en résulte qu'elles compriment la peau et les bulbes pileux, et qu'elles finissent par amener une véritable alopécie. J'ai vu, il y a peu de temps, un inconvénient tout opposé. C'était une plaque d'herpès qui s'était développée sur le côté gauche du front d'un enfant de treize ans, tout près de la racine des cheveux, et qui par sa permanence avait fait croître des poils très appréciables à la vue sur toute l'étendue de l'affection. Une plaque de cheveux de 5 centimètres existait sur le front ; l'herpès circiné n'était pas d'ailleurs guéri. Nous nous sommes d'abord attaché à en arrêter les progrès, sauf à pratiquer plus tard une ou plusieurs épilations. Ici il est évident qu'il eût fallu guérir

tout d'abord pour éviter l'inconvénient que nous venons de signaler. En résumé, toutes ces affections de l'enfance que l'on évite de guérir dans le bas âge doivent être traitées à partir de l'âge de neuf à dix ans, c'est-à-dire à une époque où l'organisation de l'enfance permet l'emploi de médicaments sans nuire à la santé. Il y a faute à différer le traitement et à compter sur l'avenir.

Les maladies de la vieillesse réclament souvent de grandes précautions dans leur thérapeutique, et quelquefois l'abstention la plus absolue de toute médication. A cet égard, c'est l'âge d'une part, l'état sain ou maladif d'un des organes de l'économie qui doivent être les règles du traitement. [illegible] ces maladies, il faut établir des distinctions. Les unes, comm[illegible] *urpura*, le *scorbut*, le *rupia*, doivent être traitées *quand m*[illegible] sont une conséquence d'un état général du sang que l'on [illegible] à faire cesser, parce que la maladie de la peau n'en est qu[illegible]flet, et que cet état du sang influence d'une manière fâcheuse [illegible] l'économie. Mais il n'en est plus de même du prurigo génér[illegible] de la maladie pédiculaire, comme aussi d'un prurigo lo[illegible] l'une plaque d'eczéma localisée. On ne saurait prendre [illegible] précautions pour diminuer la démangeaison que procure ces mal[illegible]es, ou la sécrétion légère que l'une d'elles amène. Dans ces états m[illegible]rbides, la santé générale est parfaite, l'appétit est augmenté, les forces sont plus grandes. Tout ce bien-être disparaît si la maladie est guérie. Aussi lorsqu'on cherche à opérer cette guérison, lorsque des raisons toutes spéciales y conduisent, faut-il employer des moyens qui tous tendent à faire fonctionner la peau.

Restent les maladies qui se développent entre ces deux périodes extrêmes de la vie. Le médecin est naturellement conduit à chercher les moyens de les guérir; toutefois il ne doit jamais perdre de vue l'état général du malade et ses antécédents. Il faut qu'il interroge son passé comme son présent, qu'il pèse les inconvénients qui pourraient résulter d'une suppression de maladie cutanée, car elles peuvent se relier avec toutes les autres affections. Ainsi je fus consulté pour une demoiselle jeune encore, c'est-à-dire de trente ans environ, et qui avait un acné à la figure depuis plusieurs anne[illegible] faiblesse de l'intelligence me frappa tout d'abord, et je ne

s à apprendre qu'elle avait donné les signes d'une aliénation passagère. Je m'opposai à tout traitement, je résistai à fournir toute dication qui aurait pu la débarrasser de cette maladie. J'ai déjà é un exemple de prurigo de l'anus dont la guérison fut suivie des cidents les plus compromettants. On trouvera surtout dans les iteurs anciens de nombreux faits plus ou moins analogues.

Une seconde question préliminaire à résoudre est celle de savoir *il convient d'appliquer un traitement purement externe aux maladies causes externes, ou au moins réputées telles.* Ici trois ordres de aladies, celles qui résultent uniquement du contact peu prolongé matières reconnues irritantes et caustiques de leur nature; lles qui se rattachent à une profession exercée depuis un temps us ou moins long; enfin celles dans lesquelles on trouve des proctions végétales ou animales que l'on considère comme ayant été ansmises d'individu à individu, ou par l'intermédiaire d'un milieu l que l'air.

La première catégorie de maladies ne saurait faire question. Ce nt des affections purement locales nées sous l'influence de causes rectes et de nature connue. Il n'en est pas de même de la seconde. il est vrai, par exemple, que la gale des épiciers soit très comune chez ceux qui exercent cette profession, il faut autre chose ue la profession pour la faire naître, sans quoi tous les épiciers uraient cette maladie. Il faut donc un terrain, un sol propice, omme le disent les naturalistes, ce qui peut se traduire en médeine par une prédisposition née d'une organisation, d'un tempéraent donné. D'où la conséquence que si le traitement est plus xterne que dans une autre affection qui n'est pas survenue dans le semblables conditions, il n'est pas indifférent de combattre la rédisposition morbide lorsqu'on peut l'atteindre. Et il faut bien le ire afin de combattre les tendances trop marquées du jour, ce raionnement peut et doit s'appliquer à toutes les affections dans lesquelles il se développe ou dans lesquelles existent des parasites égétaux ou animaux. Si dix enfants sont en contact avec les spores lu cryptogame de la teigne, il n'y en aura peut-être qu'un chez equel la germination s'opérera; ainsi de suite pour les maladies arasitaires.

Les micrographes ont bien soin, pour expliquer la contagion dans un cas, la non-contagion dans un autre, de se retrancher dans ces deux conditions, à savoir : 1° que s'il n'y a pas eu contact, l'affection a été produite par des spores transmises par l'air ; 2° si une maladie parasitaire n'est pas transmise d'un individu à un autre, c'est que chez cet autre le sol, le tissu n'était pas favorable à la germination. Ce sont, il faut le dire en passant, des hypothèses derrière lesquelles ils se retranchent pour expliquer les faits, et derrière lesquelles aussi ils sont invulnérables. Que répondre, en effet, à de pareilles explications? Mais voici venir après ces explications une conséquence pratique que nous v[illegible]nbattre, à savoir, que du moment qu'un parasite quelc[illegible]nstaté par le microscope dans une maladie, il s[illegible] de [illegible]arasite pour voir guérir l'affection? De sorte qu[illegible] préoccuper de la cause qui a fait naître ce parasite, [illegible]rtu de laquelle il a pu germer sur les parties affectées. Ils ne [illegible] donc plus conséquents avec eux-mêmes; car s'il faut un [illegible]al pour favoriser la germination d'un cryptogame, et si, [illegible] admettent les micrographes, ce sol doit être malade, il se [illegible]rel en saine pathologie que le médecin traitant s'occupe de deux [illegible]oses, la destruction du parasite, et celle de la cause qui, en re[illegible]nt la partie affectée malade, a ainsi favorisé le développement du [illegible]yptogame. Eh bien, les idées que je cherche à combattre prennent tous les jours de l'extension ; elles sont acceptées avec faveur par les jeunes médecins et les élèves, comme tout ce qui est simple de raisonnement et comme tout ce qui mène à une pratique facile. C'est là un *leurre*, et je n'hésite pas à employer cette expression. (Voy. les art. TEIGNE, PITYRIASIS VERSICOLOR, HERPÈS.)

Hâtons-nous d'ajouter qu'en présence d'une maladie tout externe, le médecin doit diriger les trois quarts du traitement sur cette cause, et qu'une fois le malade gu[illegible], il doit l'engager à se soustraire de nouveau à la cause première et permanente qui a déterminé le développement de son affect[illegible]n.

Maintenant dans les autres malad[illegible] il y a toujours deux ordres de causes : des causes prédisposa[illegible]ses déterm[illegible]. Le médecin doit donc dans sa th[illegible]se préoccuper [illegible]

a maladie en elle-même et des phénomènes généraux qu'elle développe ; 2° de la cause qui l'a fait naître.

Relativement à la cause morbide, en pratique, la cause déterminante a cessé d'être dans les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des cas, lorsque la maladie est développée ; et s'il n'y a plus lieu de combattre cette cause, au moins faut-il en tenir compte en raison de ses effets sthéniques ou asthéniques. Quant à la cause prédisposante, il est bien rare que l'on puisse l'attaquer dès l'abord, lorsqu'il s'agit d'une maladie aiguë ; mais on le fait presque toujours dès le moment où l'on traite le malade, quand il s'agit d'une affection chronique. Ces principes, qui nous paraissent avoir reçu la sanction de l'expérience de tous les temps, sont tout à fait applicables aux maladies de la peau. C'est, il faut le dire, pour ne pas les avoir observés, que bon nombre de praticiens ont aggravé ou aggravent des affections cutanées à l'état aigu par l'administration intempestive de dépuratifs, d'antiscorbutiques, de sulfureux, moyens qui ne sont propres qu'à combattre la cause éloignée de ces maladies ; ils les auraient guéries avec ces mêmes agents s'ils avaient été mis en usage après l'emploi préalable des antiphlogistiques. Nous sommes et nous serons toujours des premiers à dire : Il faut attaquer la cause des maladies de la peau pour les guérir, si on le peut, à tout jamais ; mais il faut établir une distinction très tranchée entre la cause déterminante et la cause prédisposante. Qu'est-ce qu'une cause déterminante ? C'est un refroidissement, une suppression de transpiration, un exercice violent, un grattage de la peau, etc. Cette cause, elle va développer une maladie à forme plus ou moins aiguë, en raison de son intensité même, et en raison du tempérament et de la constitution du sujet. L'état aigu se montre-t-il au début de la maladie, commençons par le faire tomber à l'aide d'une émission sanguine, si le sujet s'y prête et si l'état morbide de la peau est très intense : telle est aussi la doctrine de M. Rayer, qui, le premier parmi les dermatologistes, n'a pas hésité à propager ces idées.

Ce n'est pas seulement par les émissions sanguines que l'on combat un état inflammatoire de la peau ; les émissions sanguines dans ces maladies sont l'exception et non pas la règle : c'est au moyen du repos et des émollients à l'extérieur ; de la cessation des occupa-

tions; d'une diminution dans les aliments; de l'usage des viandes blanches et des légumes, chez des sujets même qui conservent habituellement tout leur appétit; il faut entrer ensuite dans la voie des résolutifs, et au besoin dans l'emploi de modificateurs propres à changer le mode de vitalité des tissus malades : de là un ensemble de moyens qui constitue à nos yeux ce que nous désignons sous le nom de *médication antiphlogistique*. Nous la détaillerons ci-après, et nous la diviserons en quatre catégories d'agents, applicables à l'état aigu, stationnaire ou décroissant de l'affection cutanée.

Dans la période décr[illegible] le praticien, prenant en considération la nature de la c[illegible]te, administrera à l'intérieur des médicaments qui [illegible]és à celle-ci et qui devront varier comme la caus[illegible] là les médications *sulfureuse*, *iodée*, *ferrugineuse*, [illegible] *curielle*, *arsenicale*, qui seront exposées d'une man[illegible]ais aussi complétement que possible.

Reste une grande série [illegible] i se rattachent à un état morbide acquis et dont l'a[illegible]au n'est qu'un reflet, de sorte qu'en guérissant la m[illegible]a maladie de la peau disparaît souvent seule ou à [illegible]lques agents locaux de peu d'importance. Sous ce rapport, [illegible] ne saurions trop appeler l'attention des médecins sur la liaison [illegible]es affections cutanées avec les gastralgies et les entéralgies, les ga[illegible]algies surtout. En ne tenant pas compte de l'organe interne souffrant, on peut bien, dans ces sortes de cas, à l'aide de certains moyens locaux appropriés, faire disparaître l'affection cutanée; mais cette guérison n'est qu'éphémère, et très peu de temps après la cessation des soins, la maladie reparît avec tout autant d'intensité.

D'où résulte cette conséquence, que plus encore peut-être que dans les autres maladies le médecin dermatologiste doit interroger tous les organes du malade avant de prescrire un traitement. Il faut qu'il le questionne sur tous ses antécédents, non-seulement au point de vue de la cause mor[illegible]le, mais encore à celui de la question de savoir si la maladie [illegible]tanée doit être traitée, avec quelle rapidité il faut la traiter, qu[illegible]ns doit en usage.

Comme on le voit, la thérapeutique des maladies cutanées est loin de devoir être empirique; nul n'est praticien dermatologiste, s'il n'est essentiellement médecin.

Il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait un certain empirisme en dermatologie comme dans toute autre branche de l'art de guérir : à quoi serviraient l'expérience et la pratique médicale, si elles n'apprenaient qu'il est des médicaments qui guérissent plus rapidement et plus complétement que d'autres ? Cet empirisme existe pour toutes les maladies, l'émétique dans la pneumonie, les purgatifs dans la fièvre typhoïde, l'opium dans les névroses, etc., etc. Nous reconnaissons donc avec les médecins qui nous ont précédé la valeur des médications empiriques, et nous plaçons à leur tête les médications arsenicales et antimoniale, celle par la teinture de cantharides, etc. ; nous aurons le soin de les faire connaître indépendamment des autres médications générales.

Mais un fait sur lequel nous tenons à appeler l'attention, c'est la conséquence des principes généraux que nous avons posés à l'égard des causes ; à savoir, que telle ou telle forme morbide est presque toujours liée avec tel ou tel tempérament, et que tel ou tel tempérament réclame telle ou telle médication : c'est là la base de notre thérapeutique. Ces idées neuves et d'une application importante au traitement des maladies de la peau, que nous avons émises depuis longtemps, justifieront les détails dans lesquels nous allons entrer pour chacune des médications qu'il nous faut exposer dans leur ensemble, et auxquelles nous renverrons fréquemment le lecteur dans le cours de cet ouvrage. Cette exposition d'ensemble nous épargnera d'ailleurs bien des redites, car nous n'aurons plus qu'à faire connaître pour chaque maladie les moyens particuliers qu'elle réclame.

La manière dont nous exposons chacune de ces médications est telle qu'il ne s'agit pas de simples formules, mais que nous cherchons à rattacher l'ensemble de moyens à tel ou tel degré morbide. Nous nous sommes demandé s'il ne serait pas plus convenable de reporter leur histoire après la description de toutes les affections cutanées ; mais nous avons tenu à donner au commencement de cet ouvrage un ensemble de pathologie et de thérapeutique générales

qui se lient et s'enchaînent, afin d'en faire le préliminaire obligé de l'étude spéciale des maladies de la peau.

Nous avons cherché à démontrer que, considérées dans leurs causes générales, dans leur marche, dans leur terminaison, les affections de la peau ne sont pas aussi radicalement différentes des autres maladies qu'on le croit généralement. Mais c'est surtout la thérapeutique qui fait connaître la nature d'une maladie : *Naturam morborum curationes ostendunt*. Or, ici encore, on peut se convaincre que les affections cutanées rentrent dans le cadre nosologique général.

I. Médication antiphlogistique.

Dans les maladies de la peau, comme dans les autres maladies, l'inflammation doit être envisagée, au point de vue thérapeutique, dans sa période aiguë, dans sa période stationnaire et dans sa période décroissante. A ces trois états différents correspondent divers ordres de moyens. L'état aigu doit toujours être combattu par les antiphlogistiques proprement dits ; à l'état stationnaire s'adressent les résolutifs faibles, les dérivatifs ; et à la période décroissante, les résolutifs puissants, les révulsifs et les agents perturbateurs ou modificateurs, que nous regardons, contrairement aux habitudes classiques, comme faisant partie de la méthode antiphlogistique, puisque leur emploi a pour objet de terminer le traitement de l'inflammation.

1° *Médication antiphlogistique pure.*

Les agents sont internes et externes. Les premiers comprennent les tisanes émollientes, acidules, etc. ; les seconds sont la saignée, les sangsues, les applications émollientes locales, etc.

Saignées. — Toutes les fois qu'une maladie de peau débute brusquement et s'accompagne de symptômes de pléthore et de congestion, on ne doit pas hésiter à pratiquer une émission sanguine par la saignée ; la guérison sera prompte et facile dans un espace de temps très court. Si, au contraire, vous négligez les émissions sanguines générales, vous verrez la maladie traîner en longueur et ne céder que difficilement aux autres moyens. C'est ainsi que devront

être traités l'*eczéma*, l'*ecthyma*, l'*impétigo* dans leur période aiguë, et même certains pemphigus franchement inflammatoires. Les tisanes rafraîchissantes et le régime hygiénique complètent souvent le traitement.

Sangsues. — Les sangsues ne doivent jamais ou presque jamais être employées dans les maladies sécrétantes de la peau. La sangsue, en effet, agit de deux manières : par la perte de sang qu'elle occasionne et par l'irritation que produit la piqûre. Or celle-ci provoque presque toujours l'apparition de la maladie cutanée dans le lieu même où elle a été opérée. C'est assez dire que nous proscrivons les sangsues autour de la partie malade ; tout au plus peut-on les autoriser à l'anus, ou très loin du lieu où existe l'affection cutanée. Elles agissent donc en partie à l'instar de ces vésicatoires que quelques médecins prescrivent pour détourner et détruire les sécrétions purulentes, et autour desquels on voit bientôt se développer l'affection même que l'on a voulu combattre.

Applications locales. — Elles sont aqueuses, mucilagineuses, amylacées, graisseuses, réfrigérantes, ou sous forme de bains locaux.

Lotions. — On fait les lotions avec les eaux de sureau, de son, de guimauve, de graine de lin, etc. On les étend à des applications permanentes dans quelques cas, et l'eau seule en compresses peut, dans beaucoup de circonstances, rendre de grands services, notamment dans les eczémas et les eczémas impétigineux aigus.

Irrigations. — On ne doit presque jamais les mettre en usage en hiver, dans la crainte de provoquer une répercussion de la maladie cutanée et le développement consécutif d'une affection interne.

En été, ce danger n'est pas à craindre. Pour les appliquer, on place à un mètre environ au-dessus du lit un vase contenant de l'eau ; le fond est percé d'une ouverture à laquelle s'ajuste un robinet qui se continue par une bande de linge qu'on divise à sa partie inférieure en deux lanières ; ces lanières sont étendues sur les jambes ou sur les bras malades, seules parties qu'on soumette aux irrigations. On les continue pendant une, deux, trois heures, une fois ou même deux fois par jour. C'est par ce moyen, que nous avons employé le premier, qu'on voit tomber en quinze jours ou

trois semaines l'*eczema rubrum*, si rebelle aux traitements ordinaires.

Mucilagineux. — Ce sont des compresses trempées dans la décoction de graine de lin, ou des cataplasmes. Généralement la peau se trouve très mal des cataplasmes faits avec la farine de graine de lin ; c'est là un fait d'observation. Aussi la remplace-t-on avec avantage par la fécule de pomme de terre ou la farine de riz. La fécule renferme souvent, quand elle n'est pas bien lavée, un principe âcre qui peut quelquefois augmenter l'irritation cutanée. La farine de riz ne présente pas cet inconvénient ; les cataplasmes faits avec cette substance sont, de tous, les meilleurs, mais leur prix plus élevé ne les met pas à la portée de tout le monde.

Un fait assez singulier, mais que nous observons constamment, c'est que, suivant les individus, la même maladie se trouve bien ou mal des cataplasmes. L'eczéma, par exemple, sera guéri chez l'un par ce moyen, tandis qu'à côté on verra la même maladie, dans des conditions tout à fait identiques, exaspérée par son application.

Ce fâcheux effet des cataplasmes sera annoncé par l'augmentation de la sécrétion et des démangeaisons, et par l'extension de la maladie en surface ; supprimez-les alors, et avec eux toute espèce d'application aqueuse, pour en venir aux poudres, aux fécules sèches ou aux corps gras, alors l'inflammation décroîtra comme par enchantement. Il est des affections qui ne peuvent supporter que des poudres, ainsi l'*herpès phlycténoïde*, le *zona*, le *pemphigus*, le *rupia* ; elles sont aggravées par tout autre agent. Il en est de même des érysipèles et des érythèmes. Pour citer un fait observé de tout le monde et qui vienne à l'appui de nos assertions, il suffit de rappeler ce que tout praticien a pu remarquer, à savoir : qu'un cataplasme de farine de graine de lin peut faire naître en sept ou huit heures un érythème sur la peau saine de certaines personnes. D'où, en résumé, la conséquence que, dans une affection cutanée qui exige l'emploi des émollients, le médecin ne saura dire à première vue si les cataplasmes, les lotions ou les poudres pourront être efficaces ; il faut nécessairement qu'il en fasse l'essai.

Graisses. — Il en est de plusieurs espèces : le suif, la graisse de porc, le saindoux, le *cold-cream*, la glycérine. Le suif est pour certaines éruptions le médicament par excellence. Le contact de l'air, en

une grande influence sur beaucoup d'entre elles; s'il est né-
e à quelques maladies, il est très nuisible à d'autres. Il en
qu'indépendamment de sa nature l'agent qui abritera le mieux
ı du contact de l'air produira l'effet le plus salutaire sur beau-
e maladies cutanées, en évitant ce contact le plus souvent
able; il faut en excepter les maladies du cuir chevelu.
plus dense de ces corps gras est le suif. Les onctions de suif
sent merveille sur le lichen, et en général sur les affections
euses. Le saindoux est moins dense que le suif, mais c'est
oins une bonne graisse. Dans la forme aiguë du *pityriasis*
du *psoriasis aigu*, du *lichen*, les onctions sur toutes les sur-
alades avec le saindoux font cesser presque subitement les
geaisons et favorisent ainsi singulièrement la guérison. En
e grattage, en activant l'irritation cutanée qui le provoque,
ine l'extension continuelle de la maladie.

old-cream, formé d'un mélange de blanc de baleine et d'huile
ides douces, quoique moins dense et par suite moins efficace
graisses précédentes, est cependant très avantageux dans les
ns qui siégent à la figure, surtout chez les dames, à cause de
ce de toute mauvaise odeur; mais on doit recommander aux
s de faire usage du cold-cream simple, et non de celui que
t la plupart des parfumeurs, qui y ajoutent des substances
u moins irritantes, et quelquefois même de l'extrait de
e ou du sublimé.

beaucoup préconisé dans ces derniers temps un corps gras
sayé depuis une dizaine d'années en Angleterre, où il avait
de faveur: je veux parler de la *glycérine*. Il y a quelques
out était à la glycérine, pansements, applications locales, etc.
conisait déjà des pommades avec cet agent, et l'axonge allait
trôné, voire même l'*huile de foie de morue!* J'ai employé la
ne sur une grande échelle; j'en ai fait connaître les effets dans
letin de thérapeutique pour le mois de mars de cette année.
s gras se produit toutes les fois qu'on saponifie des graisses;
ı ne l'obtient pur que de la saponification des graisses par la
e. Or il est assez difficile de la préparer de cette manière pour
oins du commerce; et comme c'est un des résidus des fabri-

ques de savon, c'est là où la droguerie va le chercher. Cette huile contient des sels, des alcalis; on la purifie au moyen de l'acide sulfurique, qu'on y laisse généralement en excès, tout en ne la débarrassant pas complétement des sels qu'elle renferme. Il en résulte une huile qui n'est jamais pure, et dont l'altération varie infiniment dans le commerce, au point qu'on ne sait jamais sur quel produit compter.

Cependant c'est un corps gras qui, en vertu de ses propriétés très liquides et de la faculté qu'il a d'absorber l'humidité de l'air, ainsi que d'être légèrement résolutif, peut être employé avec avantage dans certains cas, et qui doit être repoussé dans d'autres. Il entretient une humidité permanente; il abrite peu les surfaces malades du contact de l'air. Les linges sont très difficiles à laver. (Voyez pour chaque cas en particulier l'eczéma, le lichen, le pemphigus, le psoriasis.) Là où elle réussit le mieux, c'est dans l'eczéma chronique.

Poudres. — L'amidon de blé est la poudre émolliente par excellence. On sait qu'en chirurgie on parvient souvent à enrayer les érysipèles traumatiques en les saupoudrant d'amidon. Quant à la manière de l'employer, ce ne sont pas des couches épaisses qu'il faut entasser sur l'éruption ; on doit se contenter de la saupoudrer. Une quantité considérable d'amidon formerait bientôt, par l'absorption des liquides sécrétés, une pâte qui, en se desséchant, donnerait lieu à des croûtes étendues; ces croûtes produiraient le resserrement, la crispation de la peau, et par suite s'opposeraient à une utile sécrétion. La poudre de riz offre les mêmes avantages.

Émollients réfrigérants. — Ici se présentent l'eau en lotions, les compresses ou les irrigations, l'eau vinaigrée; nous en avons déjà parlé. Mais, avec l'éther et le chloroforme, on compose des pommades qui amènent les meilleurs résultats. (Voy. *Formulaire.*)

Les démangeaisons de l'eczéma, du lichen, sont calmées par la réfrigération salutaire que produit le chloroforme en se volatilisant sous l'influence de la chaleur cutanée. On pourrait employer l'éther de la même manière. A défaut de ces substances, 2 à 3 grammes de vinaigre incorporés à 30 grammes d'axonge peuvent amener la sédation.

Bains locaux. — Ils sont rarement employés dans les maladies la peau. C'est qu'en effet le malade est presque toujours obligé tenir pendant longtemps le membre baigné dans une position dé- re qui favorise l'afflux et la stase du sang; de là presque toujours roissement de l'inflammation cutanée. Il est cependant un cas ces bains sont utiles : c'est dans le *psoriasis palmaire.* Je prescris rs avec grand avantage des bains d'eau de vaisselle; les eaux de age les plus grasses sont aussi les plus favorables. Ces bains, bservation le démontre, produisent dans ces cas des effets mer- lleux. On emploie aussi dans le même but, mais peut-être avec peu moins de succès, de l'eau dans laquelle on a fait bouillir *tripes.*

Bains généraux. — Ce sont les bains gélatineux, ceux d'amidon de son. Il faut au moins 500 grammes d'amidon pour un bain yez *Formulaire*, BAINS). Une précaution qu'on doit prendre, st de mêler d'abord l'amidon avec de l'eau froide, puis de porter mélange à l'ébullition avant de le jeter dans la baignoire, sans a la vésicule amylacée qui renferme le principe mucilagineux ne uvrirait pas, et, au lieu d'un bain émollient, on aurait un bain au simple avec des grains de fécule au fond de la baignoire.

Il faut pareillement 500 grammes de gélatine pour un bain géla- eux, qu'on prépare de la manière suivante :

La veille, ou trois ou quatre heures avant le bain, on place dans vase quelconque la gélatine avec de l'eau bouillante ; avec cette ecaution, quand on voudra prendre le bain, on trouvera la gé- ine sous forme de gelée molle, qui se dissoudra dans l'eau du n avec la plus grande facilité.

Quant aux bains de son, il faut en mettre une grande quantité si n veut qu'ils acquièrent des propriétés émollientes.

Bains de vapeurs. — Voyez article BAINS EN GÉNÉRAL.

2° *Médication résolutive.*

Les moyens d'action sont locaux, car il n'existe pas de médica- n résolutive interne, à moins qu'on ne considère comme telle le qui a pour base quelques astringents, la décoction de feuilles

[illegible] quelques gommes astringentes, etc., [illegible]

[illegible] sont généralement empruntés aux [illegible] tante, et ce n'est qu'en les étendant dans [illegible] communique des propriétés résolutives. [illegible] par exemple, s'il est appliqué seul, provo- [illegible] d'un état inflammatoire ; étendu d'eau, au [illegible] résolutif. Il en est de même de l'alcool cam- [illegible] minéraires. — Les excipients ordinaires sont [illegible] poudres.

[illegible] — Il est trois substances résolutives que nous [illegible] en dissolution dans l'eau : le *sous-acétate* [illegible] *ammé*

[illegible] a démontré que généralement la dissolution [illegible] plomb ne doit pas dépasser 1/300e de son poids [illegible] eut pas qu'il cesse d'être résolutif. On devra com- [illegible] dissolution à 1/400e pour arriver graduellement à

[illegible] peut débuter par une dissolution au 300e, en [illegible] à 1 200e et même à 1/150e. L'action de l'alun n'est [illegible] avec celle de l'extrait de Saturne. En quoi consiste la [illegible] gnore ; mais l'expérience prouve tous les jours que [illegible] se trouvent mieux de l'une que de l'autre de ces [illegible] par des essais, des tâtonnements qu'on découvre [illegible] cutanée.

[illegible] plus résolutive des trois substances ; mais il est [illegible] es autres, aussi on débutera par une dissolu- [illegible] gramme de bichlorure d'hydrargyre, par exem- [illegible] grammes d'eau, en recommandant au malade [illegible] à l'eau bouillante, car cette substance [illegible] l'eau froide. Beaucoup de pharmaciens, [illegible] la faire bouillir, se servent d'alcool pour [illegible] mais certaines maladies de la peau sup- [illegible] cool ; en outre, si l'esprit-de-vin a été mis en [illegible] un mélange d'alcool et d'eau dans lequel [illegible] se volatiliser : la dissolution de sublimé en

plus concentrée, nouvelle cause d'irritation. Nous avons dit llait commencer par 1/1500e; mais souvent on s'apercevra ue cette dose est trop forte, et il faudra descendre à 1/2000e, 0e. Pour employer ces solutions, on en imbibe des com- qu'on applique sur les régions de la peau où siége l'affec- r il est des malades qui humectent à chaque instant leurs sses. Qu'arrive-t-il? Ces linges, desséchés par l'évaporation seule, retiennent une certaine quantité de sublimé, et si retrempe dans la dissolution à 1/1500e, je suppose, ils se ont en réalité imbibés d'une dissolution à 1/1450e; une seconde on augmentera encore la dose proportionnelle du sublimé: que, si la même compresse est employée de cette façon plu- ours de suite, elle se trouvera, vers la fin, chargée d'une proportion de bichlorure. Il faut donc avoir soin que le ma- retrempe sa compresse que deux ou trois fois par jour au qu'il en change le lendemain, ou bien qu'on lui lave celle de . Cette précaution est de la plus haute importance, et c'est ivoir omise qu'on a souvent eu des insuccès et même des tions de la maladie. Un eczéma, par exemple, est à sa pé- croissante; on s'est bien trouvé de l'alun, mais il ne suffit ı veut essayer le sublimé, et l'on voit augmenter le mal, 'on ait débuté par une dissolution faible: la cause n'en est ne la négligence de la précaution dont je viens de parler.

un autre résolutif susceptible d'être employé en dissolution au, qu'on regarde comme très puissant: c'est le chlorhy- ammoniaque. Je le mets peu en usage; et cependant son effi- 'est révélée souvent dans la résolution des tumeurs, des en- ents: il agit d'une manière analogue à l'alun.

utifs graisseux. — Comme on sera souvent obligé de les tous avant d'obtenir un résultat avantageux, il faut débuter plus doux.

nnin doit être mis en tête sous ce rapport. Malgré sa béni- n fera bien néanmoins de ne pas employer tout d'abord la qui se trouve dans la plupart des livres: tannin, 4 gram- :onge, 30. Cette pommade est trop active, et ne doit venir ; un usage de quelque temps. C'est, du reste, une remar-

que qui s'applique à tous les médicaments. Si l'on débute par la dose *maxima*, le médicament ne sera pas toléré, ou bien l'économie s'y habituera, et alors il ne produira bientôt plus d'effet. Toutes les fois qu'un remède doit être longtemps continué, il faut procéder par doses graduellement croissantes. C'est ainsi que pour le tannin on débutera par 1 gramme pour 30 d'axonge, puis 2, 3, et l'on dépassera rarement cette dose. J'associe à cette pommade de 15 à 25 centigrammes de camphre, mais pas davantage, et j'ai soin de recommander au pharmacien de dissoudre le camphre dans quelques gouttes d'alcool avant son incorporation ; sans cela il se mêlerait imparfaitement à l'axonge.

Oxyde de zinc. — Comme pour le tannin, la dose des formulaires est trop forte. Ne l'employez jamais au delà de 1, 2 ou 3 grammes pour 30 d'axonge, et ajoutez une petite quantité de chloroforme ou de camphre. Quelques praticiens font usage du *cérat calaminaire*, qui est formé d'oxyde de zinc naturel; il est moins actif que l'oxyde artificiel. C'est, du reste, ce qui a lieu pour la plupart des produits chimiques; ceux que fournit la nature ont toujours une activité moindre que ceux qui sont le produit de l'art: le sulfure d'arsenic naturel, par exemple, est inerte, tandis que le sulfure artificiel est doué d'une grande activité. Appliquant cette remarque à la calamine, nous en concluons qu'on peut l'employer au début à la dose de 3 à 4 grammes.

Protosulfate de fer. — J'ai introduit dans la thérapeutique des maladies de la peau (voy. *Bulletin de thérapeutique*, janvier 1855) un nouveau résolutif qui me donne les résultats les plus favorables: c'est le protosulfate de fer, vitriol vert. Après l'avoir lavé et dissous à l'aide de quelques gouttes d'eau, on l'incorpore à l'axonge à la dose de 5 décigrammes à 1 gramme pour 30 grammes d'axonge. (Voy. Eczéma.)

Camphre. — C'est un résolutif puissant, et qui, dans les maladies de la peau, a l'avantage d'éteindre les démangeaisons. C'est pour cela que nous l'associons presque toujours aux pommades de tannin et d'oxyde de zinc. Si l'on voulait formuler une pommade au camphre seul, on en mettrait de 35 à 75 centigrammes pour 30 grammes d'axonge.

oforme. — Il est employé avec avantage dans les maladies de
pour la propriété qu'il a, comme le camphre et plus que lui,
re les démangeaisons. Quoi qu'il en soit, la dose est de 1 à
nes pour 30 d'axonge.

de cade. — Pour compléter l'histoire des corps gras, nous
dire un mot de l'huile de cade préconisée par M. Serre,
C'est une huile empyreumatique obtenue par la distillation
vrier. Je l'ai employée sur une grande échelle (voy. *Bulletin*
peutique), comparativement à l'huile distillée de goudron,
ɔtenu des succès de l'une et de l'autre ; cependant je donne
érence à l'huile de cade, pourvu toutefois qu'elle soit

mes expériences, j'ai toujours procédé du simple au com-
ai commencé par de petites doses, en augmentant gra-
ıent ; mais j'ai bien vite reconnu qu'à haute dose l'huile
: accroît l'intensité de la maladie cutanée, loin de l'amé-

ɔropos, je citerai l'observation suivante. Il s'agit d'une jeune
: j'avais presque guérie d'un impétigo de la tête, et que j'avais
: dans le midi de la France pour y fortifier sa constitution.
ecin qui lui donna des soins, dans le but d'assurer la gué-
rut devoir appliquer sur la tête de grandes quantités d'huile
, et la maladie reprit bientôt une nouvelle intensité. La
lle me fut ramenée à la période décroissante de la maladie ;
nmençai, mais à faible dose, l'usage de l'huile de cade, et la
fut définitivement guérie.

la meilleure manière d'employer cette huile.

n étend une couche sur toute la surface malade à l'aide d'un
ı de charpie ; puis, avec du coton sec, on enlève tout l'excé-
e l'huile autant qu'on le peut, sans frotter néanmoins la
ɔelle-ci reste légèrement colorée, et cette onction si superfi-
ıffit pour obtenir un bon résultat.

:t de l'huile de cade sera d'autant plus salutaire, que la ma-
: sera mieux trouvée de l'usage des graisses. Si les poudres
mieux supportées, l'huile de cade comptera moins de succès.
ıs, malgré l'opinion contraire de M. Serre, qui l'emploie à

toutes les périodes de la maladie, que c'est seulement à la dernière période, lorsque l'eczéma ne fournit que des squames, et pour faire disparaître cet état écailleux qu'il laisse quelquefois à sa suite, qu'il me paraît convenable de la mettre en usage. M. Serre recommande encore de l'appliquer tous les jours, je n'en renouvelle l'application que tous les deux ou trois jours. Chaque application, en effet, est suivie d'un sentiment de chaleur, de cuisson, d'une irritation dont la durée n'est, il est vrai, que de dix minutes à un quart d'heure, mais qu'il importe néanmoins de ne pas provoquer trop fréquemment. On doit en outre s'abstenir de toute médication externe pendant les douze heures qui suivent une onction avec l'huile de cade.

Poudres résolutives. — Il est des maladies cutanées qui ne se trouvent bien ni des résolutifs liquides, ni des graisses. Ces affections font le désespoir du médecin, car il est difficile de composer des résolutifs pulvérulents. Il faut bien s'y résoudre cependant, et voici les choix que nous recommanderons.

Parmi les poudres résolutives, les unes le sont de leur nature, comme le *lycopode*, le *tan*, la *poudre de vieux bois ;* les autres ont pour base une substance très active mitigée par une poudre inerte qui sert d'excipient. Le lycopode, dont on saupoudre avantageusement les érythèmes, si fréquents chez les nouveau-nés, sera également employé avec succès contre l'*érythème*, l'*herpès circiné*, l'*eczéma des bourses, des seins*, etc. La poudre de *tan* est moins rude, plus onctueuse que le lycopode; quand on l'a tamisée, elle est fine, impalpable. Mais ce qu'il y a encore de meilleur dans ce genre, c'est la *poudre de vieux bois*. Rien de mieux contre toutes ces petites érosions du prépuce, de la figure, des oreilles. Autrefois tous les pharmaciens en avaient dans leur officine, et les dames n'usaient pas d'autre poudre pour leur toilette. Aujourd'hui on ne la trouve que dans les pharmacies de date ancienne : c'est que les parfumeurs se sont emparés de la préparation de ces sortes de poudres; cependant la poudre de vieux bois ou bois de chêne vermoulu est bien préférable à tout ce que l'on a fait depuis. L'amidon et le tan mêlés à parties égales donnent une poudre résolutive excellente.

Le tannin, l'alun, l'oxyde de zinc, le sous-nitrate de bismuth, etc.,

ent la base de poudres résolutives plus actives. Le meilleur ient de ces poudres, c'est l'amidon. Si ces substances ne sont mployées seules comme poudres résolutives, c'est qu'elles sont énergiques et que leur contact produirait une irritation dont nsité croîtrait en proportion de l'étendue et de la conti- de la surface affectée, ce que l'on évite en les associant à de don.

présence de l'amidon diminue sans doute cet inconvénient, elle est loin de le détruire. Quelque étendue, en effet, que soit udre active, il y aura toujours 100, 200, 1000 molécules, par ple, qui agiront comme si elles étaient seules sur la partie de e cutanée avec laquelle elles sont en rapport, et qui l'irrite- dans la proportion de leur contact. Car le mélange n'atténue immédiat de la poudre qu'en rendant les contacts moins mul- s. Voilà pourquoi il est si difficile d'avoir une poudre résolu- ui ne soit pas nuisible, l'irritation en étant presque toujours séquence. Aussi est-on quelquefois obligé de renoncer aux mé- s pulvérulents. Il faut donc débuter par des doses faibles, et rire, par exemple, 1/400e et souvent même 1/1000e seulement udre d'alun ou d'oxyde de zinc à l'amidon; de plus il faut lre une précaution que j'ai adoptée depuis quelques années et r'a été très utile : c'est non-seulement de prescrire la porphy- on du mélange, mais encore de recommander au pharmacien sser ces poudres mêlées quatre ou cinq fois au tamis de soie de les délivrer au malade.

olutifs généraux, ou appliqués à toute la surface cutanée. — On rendra qu'il s'agit ici des bains. Les plus simples sont com- avec 125 à 300 et même 400 grammes d'alun dissous dans la ité d'eau nécessaire pour un bain ordinaire. Les malades les rtent très bien.

s bains de sublimé sont plus difficiles à manier. On doit com- er par 2 grammes, augmenter de 1 gramme tous les deux ou bains, et s'arrêter à 12 grammes, dose *maximum* qu'on ne devra s dépasser. Si l'on voit quelquefois prescrire des bains avec 0, 30 grammes de bichlorure de mercure, c'est dans les affec- syphilitiques, lorsque le malade ne veut ou ne peut prendre

constituées. En ville, par exemple, il est beaucoup de malades qui ne peuvent pas supporter plus de 2 grammes de ces follicules, et encore est-on souvent obligé d'en suspendre l'emploi. En général il faut obtenir deux ou trois garderobes par jour, sans aller au delà.

Nous venons de spécifier la période des maladies de la peau dans laquelle il convient d'employer les purgatifs. Dans quelle mesure faut-il en user? En thèse générale, il faut prescrire deux laxatifs toutes les semaines en hiver et un toutes les semaines en été; au delà on fatiguerait l'estomac et les intestins, et l'on amènerait une perturbation dans les fonctions nutritives.

Il est trois affections qui, quoique sécrétantes, excluent absolument les purgatifs : ce sont le *pemphigus*, le *pityriasis rubra aigu* et le *rupia*. Ces maladies, en effet, et ce sont peut-être les seules parmi les affections cutanées, peuvent être mortelles par elles-mêmes. Si les personnes qui en sont atteintes éprouvent le plus léger refroidissement, soit à la sortie du bain, soit à la promenade, la sécrétion cutanée diminue aussitôt, les intestins se prennent, et il survient une diarrhée tellement liquide, pour le cas de *pemphigus* surtout, qu'Alibert croyait qu'il s'établissait à l'intérieur une véritable sécrétion pemphigoïde qui fournissait les éléments de cette diarrhée ; il disait même avoir vu des bulles de pemphigus dans le côlon. Dans certains cas de répercussion, les malades atteints de cette diarrhée ont jusqu'à dix, vingt, trente garderobes par jour, et rendent huit, dix litres de liquide dans les vingt-quatre heures. Ce flux séreux si abondant conduit bien vite le malade au tombeau. On doit donc, chez les malades atteints de pemphigus ou de rupia, surveiller avec soin le tube digestif, en évitant tout ce qui pourrait l'irriter ; de là l'exclusion absolue des purgatifs dans le traitement de ces maladies, d'autant plus que le pemphigus se développe toujours à la suite d'un état asthénique plus ou moins prononcé.

4° *Médication modificatrice ou perturbatrice.*

Les maladies cutanées chroniques peuvent, par leur durée et leur siège permanent sur la même surface de la peau, changer à tel point la vitalité du tissu, qu'il en résulte une habitude morbide; sem-

blable, en cela, à ces vieux ulcères que l'on ne guérit qu'à la condition d'en modifier la vitalité par des caustiques ; de là la partie de la médication antiphlogistique que nous appelons *perturbatrice*.

Ce sont les charlatans qui usent surtout de cette méthode, et, il faut l'avouer, ils ont quelques succès. Les agents de leur médication perturbatrice sont les pommades ; il y en a un grand nombre : les principales ont pour base le cinabre, le sulfate de cuivre, le sous-nitrate de mercure, l'oxyde rouge de mercure, quelques-unes le sulfate de fer à haute dose. Ces pommades produisent, en général, une suppuration sur les parties où on les applique, en vertu du principe irritant qui les compose ; puis la suppuration se tarit, et la guérison de l'affection cutanée en est souvent la conséquence, lorsque la maladie est ancienne. Si cette méthode est mauvaise en thèse générale, elle est bonne quelquefois, et l'on peut dire même qu'elle n'est pas nouvelle. Les anciens avaient vanté le vésicatoire contre certaines dartres ; or les pommades agissent d'une manière analogue, mais plus lente : elles transforment la surface malade en une plaie ordinaire par la modification profonde qu'elles impriment au mode de vitalité des tissus. Je regarde l'huile de cade, dont il a été parlé, comme produisant déjà un léger effet de ce genre.

Les agents modificateurs que j'emploie d'ordinaire sont surtout la solution de nitrate d'argent cristallisé à trois degrés de concentration différents ; jamais ou presque jamais la pierre infernale, c'est-à-dire le nitrate fondu, excepté dans la *mentagre*, quand il existe des boutons indurés, stationnaires, indolents : ici la cautérisation légère au crayon de nitrate d'argent provoque la résolution rapide de ces engorgements. Pour en revenir aux solutions, la plus concentrée dont je fasse usage contient parties égales de nitrate d'argent et d'eau distillée ; la deuxième est au cinquième, la troisième au dixième, de nitrate d'argent. Notons qu'il s'agit de nitrate d'argent *cristallisé* et non *fondu ;* car celui-ci, ne contenant pas d'eau de cristallisation, donnerait des solutions plus concentrées. Pour appliquer ces solutions, on en imbibe un petit pinceau de charpie avec lequel on touche légèrement les surfaces malades. Mais, tandis que quelques médecins font usage de la méthode perturbatrice au début de la maladie et pour la faire avorter, nous ne l'employons

que lorsque l'affection a résisté à tous les traitements rationnels.

La solution de nitrate acide de mercure a produit quelquefois d'heureux effets. Récamier a beaucoup insisté sur son usage pour combattre les ulcérations du col de l'utérus et celles que détermine au sacrum le décubitus dorsal prolongé. Je substitue à cette solution, dont on trouve la formule dans le *Codex*, un composé d'acide nitrique et de nitrate acide de mercure :

Protonitrate de mercure cristallisé. . . . . 4 grammes.
Eau distillée . . . . . 8 grammes.

Réduisez le nitrate en poudre, mêlez à l'eau et portez le tout jusqu'à la température de l'ébullition, mais sans faire bouillir, ce qui transformerait le protonitrate en deuto. Ajoutez dans l'eau chaude et goutte à goutte :

Acide nitrique. . . . . 2 grammes.

(L'eau seule ne pourrait pas dissoudre tout le protonitrate.)

On a ainsi une liqueur limpide avec beaucoup moins d'acide nitrique en excès, et c'est un très énergique modificateur de la peau, qui exerce principalement son influence par le sel mercuriel qu'il contient.

Un autre agent puissant de la médication modificatrice, c'est le vésicatoire ou la pommade épispastique. J'ai souvent fait voir à l'hôpital des exemples de leurs bons effets chez des malades qui portaient depuis longtemps sur le dos de la main une plaque de lichen rebelle à tous les traitements; la surface, après une suppuration de quelques jours, redevient lisse, et il ne reste sur les bords que quelques papules qui cèdent à une nouvelle application de pommade épispastique. Cette pommade ne doit être employée que sur des surfaces malades peu étendues et qui ont résisté à l'emploi d'autres moyens.

Enfin, il est des modificateurs d'une grande activité que nous appliquons surtout aux formes tuberculeuses des maladies cutanées; les pommades ne suffisent pas, en effet, pour résoudre les engorgements tuberculeux. Les agents dont il s'agit sont à la fois caustiques et modificateurs. Plusieurs composés chimiques jouissent de ces propriétés; celui que je préfère, c'est le caustique de Canquoin, chlorure de zinc cristallisé. Ce chlorure, dissous dans l'eau, est peu

ais si on laisse ouvert le flacon qui le renferme, il absorbe
:u l'humidité de l'air, devient déliquescent, et c'est alors un
it caustique. On fait une pâte avec le chlorure de zinc ainsi
et de la farine de froment de première qualité (la farine de
nférieure s'allie assez mal avec le chlorure de zinc pour que
uisse être un moyen de reconnaître la farine de bonne qua-
ı applique cette pâte sur la surface malade. On la préparera
moins molle, suivant qu'on voudra obtenir une cautérisa-
une modification plus ou moins profondes. On pourra même
:fois employer le chlorure pur. Le contact de cette pâte dé-
: autour de la partie cautérisée une irritation érythémateuse
ıtense, mais qui est passagère, car au bout de vingt-quatre
rante-huit heures l'inflammation tombe, et il reste une croûte
non suppurante. Les avantages de ce caustique sont donc
as amener de suppuration, mais bien une croûte qui se sèche
ıe au bout de quinze jours sans laisser au-dessous d'elle la
e trace de cicatrice, pourvu que le malade n'y touche pas
a chute. Il faut, en outre, que le mélange soit fait par l'opé-
lui-même au moment où il veut s'en servir, car la pâte
ıit très vite.

parmi les caustiques et les modificateurs en général, il y a
ınces très variées, aussi allons-nous en traduire le tableau.
ns énergique est la suspension du bi-iodure de mercure dans
lution concentrée de gomme adragante dans l'eau (voy. *For-*
:). Cette liqueur épaisse se dessèche sur la surface malade, y
dhérente, cautérise très légèrement, se détache peu à peu, et
par parcelles dans l'espace de huit à dix jours, sans laisser
: plaie. M. Hardy se sert d'une pommade contenant la moitié
poids de ce sel.

té de ce caustique, il faut placer le chlorure d'or préconisé il
ıx ans par M. Pétrequin, de Lyon ; mais ce caustique a ses
es d'action en raison de son mode d'emploi. Son plus grand
d'énergie réside dans le sel tombé en déliquescence au con-
: l'air. et associé ainsi liquide à de la farine sous la forme
pâte, comme le chlorure de zinc. A cet état, il enflamme les
comme tous les caustiques, et cause une douleur plus ou

moins vive, quoique l'on ait écrit qu'il produisait peu de douleur et qu'il amenait peu d'inflammation. L'eschare qu'il produit est sèche, et après sa chute, qui a lieu du dixième au douzième jour, on trouve quelquefois une plaie qu'il faut cicatriser, et qui est de la largeur de l'eschare. Ajoutons que cette cautérisation est loin d'être aussi profonde que celle du chlorure de zinc, d'antimoine ou de la pâte de Vienne; de sorte qu'en définitive, comme caustique énergique, nous le plaçons en dernière ligne.

Mais il n'en est plus de même des solutions de chlorure d'or sans addition de farine; on obtient avec elle des cautérisations superficielles qui modifient très avantageusement les surfaces malades. Elles se dessèchent, forment une petite croûte noire qui tombe peu à peu, et qui ne laissent pas de plaie, aussi ce caustique est-il très facile à manier et très commode lorsqu'il s'agit de cautérisations superficielles. Il est beaucoup moins actif que le chlorure de zinc tombé en *déliquescence*, mais on en a exagéré les avantages, et il est loin de le valoir dans les autres circonstances.

Nous ajouterons qu'il a un très grave inconvénient que nous avons reconnu depuis que nous avons multiplié son emploi dans beaucoup de cas d'ulcérations très superficielles : quand on touche la plaie à plusieurs reprises avec le chlorure d'or liquide, ce caustique est absorbé; il s'introduit dans les couches les plus superficielles de la peau, et alors il en résulte une cicatrice d'un bleu violacé indélébile, qui provient de l'action de la lumière sur le chlorure d'or.

Le chlorure d'antimoine ou beurre d'antimoine tombé en déliquium et employé pur ou associé à la farine, produit presque tous les effets du chlorure de zinc, mais il se prête moins à des nuances d'action que le chlorure de zinc, parce qu'il s'associe beaucoup moins bien à la farine, et qu'il donne lieu à des pâtes moins homogènes et de consistance moins variée.

Quant à la pâte de Vienne, dont l'emploi est si répandu en chirurgie, elle a, comme la potasse caustique et comme tous les caustiques alcalins en général, l'inconvénient de laisser des plaies qu'il faut panser et cicatriser ensuite. Leur action est, il est vrai, plus prompte; ils font souffrir les malades plus vivement, mais beaucoup moins longtemps; ils ne peuvent pas être gradués et maniés comme

lorures; et ils laissent enfin des cicatrices qui, dans quelques euvent être plus ou moins difformes.

lobiquet a proposé récemment une association du gutta-percha e chlorure de zinc pour en faire des lames d'épaisseurs s, que l'on détrempe avec un peu d'alcool, et que l'on chauffe nent ensuite pour l'appliquer sur la surface malade. Je n'ai pas eu l'occasion de juger ce caustique, qui à première vue ne me pas maniable comme la pâte de chlorure de zinc et de farine. est le résultat de notre expérimentation sur les caustiques ; e livrons au jugement des praticiens.

Résumé général de la médication antiphlogistique.

e maladie de la peau à l'état aigu réclame les antiphlogisti- nt à l'intérieur qu'à l'extérieur ; il faut en excepter les exan- , dans lesquels l'évolution cutanée, étant toujours en rapport s prodromes qui la précèdent, n'est jugée qu'à la condition sera parfaite et complète. Aussi, pour en favoriser le déve- nent, doit-on faire exception à la règle que je pose, en pres- des tisanes plus ou moins diaphorétiques.

ait néanmoins qu'au début des varioles, par exemple, une favorise quelquefois singulièrement une éruption qui sem- rayée dans sa marche. Mais il faut user de ce moyen avec , et seulement dans les cas où les prodromes ont une telle té qu'ils peuvent compromettre la vie des malades. On pourra, de la saignée, appliquer des sangsues à l'anus. En même on ordonnera quelques boissons acidules ; mais, dès que ion se sera franchement déclarée, on en viendra à la bour- au tilleul, à la violette.

des maladies qui, quoique à la période aiguë, et bien qu'elles nt pas de la classe des exanthèmes, excluent absolument les ns sanguines : ce sont celles dont le développement recon- ur cause un *appauvrissement* du sang. Les circonstances qui nt cette débilitation générale de l'économie sont principale- chagrin, qui, en diminuant l'appétit, rend la nutrition in- te ; la mauvaise alimentation, un logement humide, mal-

sain ; l'excès de travail, la vieillesse. Le *rupia*, l'*ecthyma cachecticum* et le *pemphigus* sont les principales maladies qui doivent leur origine à ces influences.

A part les maladies exanthémateuses et les quelquess exceptions dont nous venons de parler, toutes les autres seront traitées à leur période aiguë par les antiphlogistiques purs, quelle que soit d'ailleurs la forme, vésiculeuse, bulbeuse, papuleuse, pustuleuse.

Quand nous parlons des antiphlogistiques purs, nous ne voulons pas dire qu'on devra toujours employer les émissions sanguines, mais bien les émollients, les tempérants, etc. Les émissions sanguines ne trouveront leur application que chez les sujets jeunes, vigoureux, avec état pléthorique ou fébrile marqué. Souvent même, dans ce cas, les boissons rafraîchissantes et acidules, aidées du régime, suffiront pour faire tomber tous les phénomènes de réaction. Les maladies où la saignée se montre le plus souvent utile sont les *ecthyma* et les *impétigos* plus ou moins étendus qui se développent au printemps et à l'automne.

Quels sont maintenant, parmi les divers agents de la médication antiphlogistique, ceux qui sont réclamés spécialement par chaque groupe de maladies cutanées en particulier ?

Généralement tout ce qui est vésiculeux ou pustuleux (herpès, eczéma, herpès phlycténoïde, pemphigus, rupia, impétigo, ecthyma, zona) se trouve à merveille de l'emploi des corps pulvérulents, dont le meilleur est l'amidon en poudre. Il en est de même de quelques inflammations érythémateuses ou érysipélateuses qui ont de la tendance à prendre un certain accroissement.

Les corps gras conviennent aux maladies squameuses, lichénoïdes, tuberculeuses, même dans l'état aigu : ainsi le pityriasis, le psoriasis, les mentagres, les lupus, etc. C'est la graisse seule qu'on doit employer et non associée à des substances résolutives, car il s'agit ici de la période aiguë de ces maladies.

La médication antiphlogistique pure sera continuée jusqu'à la période stationnaire de la maladie et jusqu'au moment où se montre un commencement de résolution. C'est pour vouloir employer trop tôt les résolutifs qu'on éternise souvent les maladies cutanées, car l'excitation qu'ils produisent fait sans cesse reparaître la période

Si l'on continuait suffisamment les émollients, l'eczéma lui-
affection souvent si rebelle, se jugerait en trois semaines,
ois au plus, tandis qu'on le fait durer trois ou quatre

que l'état aigu d'une maladie cutanée est décidément tombé,
l'on arrive à l'emploi de la médication résolutive, il faut tou-
y joindre les dérivatifs. Si la maladie reconnaît une cause
le, c'est aussi le moment de prescrire un traitement général.
ons, par exemple, un jeune homme lymphatique, ayant eu
u trois ans de suite un impétigo à la figure, et toujours dans
e saison, au printemps, par exemple, ce qui est l'ordinaire.
comme on le voit, une maladie très tenace ; elle est cependant
quand elle se montre, car elle est accompagnée de phéno-
inflammatoires, formation abondante de pus, etc. On don-
l'abord des rafraîchissants pour calmer l'état aigu, et plus
comme cette maladie tient à la nature du tempérament et de
titution, on soumettra le malade à un traitement interne mo-
eur de ce tempérament, en même temps que des agents légè-
t résolutifs seront mis en usage. Au surplus, ce traitement
l sera en rapport avec la nature de l'affection et de la cause
u la produire ; mais ce n'est jamais durant l'état aigu qu'il
mbattre cette cause.

précaution importante pour retirer des résolutifs tout le
e qu'on peut en attendre, c'est de mettre la puissance réso-
du médicament en rapport avec le degré d'acuité de la
e. A mesure que celle-ci avance vers la guérison, l'énergie
ent médicamenteux doit augmenter. Ainsi, par exemple, on
pour l'oxyde de zinc, le tannin, le sulfate de fer, des for-
qui sont toujours les mêmes dans les formulaires ; il en est
ne des bains à l'alun, au sublimé, des lotions résolutives, etc.
oit pas y avoir une seule et même formule pour chaque mé-
nt. La dose de l'agent actif, le tannin, l'oxyde de zinc, etc.,
être plus faible par rapport à la même dose d'axonge quand
mence l'emploi des résolutifs, et l'on doit la rendre de plus
s forte au fur et à mesure que la maladie approche vers la
on ; ainsi de suite pour les lotions, les bains, etc. La peau s'ha-

bitue, en effet, peu à peu à l'action de l'agent médicamenteux, et celle-ci finit par devenir nulle.

Toutes les fois que l'on emploie un agent résolutif, de deux choses l'une : ou il produit une stimulation à la peau, ou son effet paraît négatif. Dans le premier cas, il faut le cesser tout de suite ; dans le second, continuer et augmenter progressivement la dose. Cette stimulation, qu'on doit éviter dans toute circonstance, sera annoncée par des picotements, un sentiment de brûlure que le malade accusera. Lors même qu'il vous dirait que ces excitations sont passagères, ne durent qu'un quart d'heure, cessez le résolutif pour y revenir plus tard ; le moment n'est pas encore venu, car il reste un peu d'acuité : loin de retirer un bénéfice des résolutifs, dans ce cas, on rappellerait l'état aigu et l'on prolongerait ainsi la durée de la maladie.

Nous avons dit précédemment que la médication dérivative devait marcher de front avec les résolutifs. C'est qu'en effet la répercussion d'une maladie cutanée peut entraîner les conséquences les plus graves, la mort même en très peu de temps. Un individu a une maladie de la peau ; une portion plus ou moins grande de la surface de cet organe est depuis quelque temps le siége d'une sécrétion habituelle assez abondante. Un médecin inexpérimenté ou bien un charlatan cherche à tarir au plus vite cette sécrétion par des résolutifs. Or un matin, en arrivant auprès de son malade qu'il a laissé bien portant la vieille, il le voit oppressé, la figure anxieuse, les traits profondément altérés. Il se demande ce qui s'est passé ; il examine la maladie de la peau et il n'y trouve plus de sécrétion. S'il ausculte la poitrine, il constate un peu de tumulte dans les battements du cœur et des râles sibilants et muqueux dans les poumons. Puis quelquefois, au bout de quarante-huit heures, le malade est mort sans autres symptômes qu'un accroissement dans les premiers phénomènes. Si le mouvement fluxionnaire supprimé ne se porte pas sur la poitrine, ce sera sur les intestins, et c'est alors qu'on verra le malade rendre par jour vingt-cinq, trente garderobes liquides, séreuses, et mourir souvent d'épuisement.

Que faire en pareil cas ? Ne pas s'exposer d'abord à voir ces accidents, et dans ce but user avec de grandes précautions de la médi-

cation résolutive. Si, nonobstant ces précautions, la maladie se répercute, on ne devra pas songer aux antiphlogistiques, car ils ne peuvent rien dans l'espèce. Tous les efforts devront tendre à rappeler à la peau la sécrétion supprimée. Les excitants, les stimulants les plus prompts dans leurs effets seront mis en usage. On fera des frictions avec l'huile de *croton tiglium* sur la partie malade, moyen héroïque en pareil cas, car il produit, même sur la peau saine, une éruption vésiculeuse sécrétante; des sinapismes seront promenés sur la poitrine, des vésicatoires ammoniacaux appliqués aux extrémités. On donnera en même temps les stimulants à l'intérieur. Ces observations et ces préceptes s'appliquent aussi aux maladies non sécrétantes, qui sont accompagnées de vives démangeaisons ou de démangeaison habituelle.

Le lichen, le psoriasis et même le prurigo peuvent être rangés dans la même catégorie. Qu'est-il besoin enfin de citer la gale? Chacun de nous a pu observer quelques cas de fâcheux accidents survenus à la suite d'une gale trop promptement disparue. Que d'affections organiques attribuées par les malades à une gale *rentrée!* Et si cette opinion vulgaire, contre laquelle s'élève si fort une école moderne qui, pour le traitement de la gale, ne se fonde que sur les recherches microscopiques, ne doit pas être acceptée dans tous les cas, nul doute cependant qu'elle ne soit fondée dans un grand nombre. C'est qu'en effet, dans les maladies cutanées chroniques qui s'accompagnent de démangeaison, l'habitude qu'a prise le malade de se gratter régulièrement tous les jours a rendu cette excitation cutanée presque aussi nécessaire à l'économie qu'une sécrétion, qu'un cautère.

Les purgatifs sont l'agent principal de la médication dérivative. Cette médication aura d'autant plus de succès que le malade sera antérieurement plus constipé. Si le canal intestinal est délicat, usez de précautions. Abstenez-vous de purgatifs pendant les épidémies de diarrhée, de choléra, dans la crainte de disposer vos malades à contracter ces affections. Traitez alors avec plus de lenteur la maladie cutanée par les moyens appropriés, de manière à ne la supprimer qu'à la longue, et sans que l'économie en reçoive d'influence.

II. Médication antilymphatique.

Une foule de maladies de la peau sont liées à la prédominance du tempérament lymphatique et dérivent de ce tempérament. Si, en effet, nous consultons la statistique que nous avons faite à l'hôpital Saint-Louis, on verra que sur cent *eczémas* impétigineux, quatre-vingt-cinq se sont montrés chez des individus dont le tempérament se trouve qualifié de lymphatique; à plus forte raison, si l'on prend cent *impétigos* francs, maladie liée par excellence à ce tempérament. Or, l'eczéma impétigineux et l'impétigo simple constituent près de la moitié des maladies de la peau qu'on observe à l'hôpital Saint-Louis *au printemps et à l'automne*. Il suit de là que, si le changement de saison et les variations de température qui l'accompagnent peuvent être regardés comme une des *causes déterminantes* de ces maladies, il est rationnel de se reporter au tempérament lymphatique pour en trouver la cause prédisposante. Et, en effet, après l'âge de trente ans, quand la prédominance de ce tempérament cesse de se faire sentir, que l'individu est devenu plus fort, plus énergique, plus sanguin par suite du développement de ses muscles au moyen de l'exercice et du travail, on observe plus rarement ces affections cutanées, et principalement l'une d'elles, l'*impétigo*. D'où cette conséquence pratique, que le médecin doit s'efforcer de faire, par les moyens hygiéniques et médicamenteux, chez les sujets lymphatiques jeunes, ce que font plus tard chez eux l'âge et la nature; que la véritable cause à combattre est réellement la prédisposition : ce que l'on atteint en cherchant à modifier le tempérament et la constitution, ainsi que les effets auxquels ils donnent lieu. De là la médication que nous appelons antilymphatique, spécialement applicable aux maladies que ce tempérament fait naître.

Jetons un coup d'œil rapide sur chacun des médicaments qui ont été tour à tour préconisés pour combattre les maladies qui ont pour point de départ le tempérament lymphatique.

Les anciens n'employaient contre la prédominance lymphatique, portée dans quelques cas jusqu'à la maladie, qu'un nombre assez limité de principes médicamenteux, les amers, les antiscorbutiques

et le soufre ; les formules en étaient d'ailleurs très variées, et il ne nous est guère resté dans la pratique que quelques-unes d'entre elles, sous forme de tisanes, de vins, de sirops. De là les décoctions de houblon, bardane, fumeterre, chicorée sauvage, etc.; les sirop et vin antiscorbutiques, le vin de gentiane et les formules des préparations sulfureuses. Ce n'est pas que d'autres agents n'aient été mis en usage, car le calomel et diverses préparations mercurielles, le sous-carbonate de potasse, le chlorure de cuivre ammoniacal, le chlorure de calcium, le chlorure de baryum, ont, à des époques plus ou moins rapprochées de nous, été tour à tour employés.

Mais ce n'est réellement que vers 1820, époque à laquelle Coindet, de Genève, introduisit l'iode dans la thérapeutique du goître d'abord, de la scrofule ensuite, que ces médicaments furent abandonnés, puis successivement remplacés par l'iode, la décoction des feuilles de noyer, l'hydrochlorate de baryte, le chlorure d'or, le chlorure de calcium, et enfin l'huile de foie de morue. Nous ne pouvons relater ici toutes les phases par lesquelles ces diverses préparations ont passé. Elles ont été chaudement préconisées chacune par leurs auteurs; mais quand ces préparations ont été employées par des praticiens autres que ceux qui les avaient préconisées, ou elles n'ont eu aucune valeur, ou elles ont été considérées comme jouissant d'une grande énergie et comme devant amener d'immenses résultats dans la pratique médicale. Il nous suffira de prendre l'une d'elles comme exemple. L'hydrochlorate de baryte, annoncé par Adair Crawford, en 1784, comme guérissant la grande généralité des scrofuleux, est porté aux nues par Hufeland jusqu'en 1825; Fournier, Hébréard Verdier (de Bordeaux) et Mollet, en signalent les excellents effets, tandis que cet agent médicamenteux ne produit aucun résultat avantageux entre les mains de Chaussier, de Pinel et d'Alibert. Il n'en a pas été de même pour l'iode et la décoction de feuilles de noyer, soumis au contrôle de la pratique par Baudelocque et Guersant père; ces deux savants observateurs ont été conduits, comme pour la plupart des médicaments d'une certaine valeur, à la statistique finale suivante: un tiers de guérisons, un tiers de soulagés, un tiers d'insuccès. Ce sont les résultats que donnent aussi, et assez généralement, le fer, le soufre, l'huile de foie de morue.

C'est qu'en effet, quand on contrôle un médicament, on le donne indistinctement à tous les individus affectés de la même maladie à des degrés divers ; et comme, quelle que soit la maladie, elle cède ou elle est rebelle aux traitements, fussent-ils les plus variés, on doit fatalement être conduit à des résultats semblables pour tous les médicaments qui ont une action réelle sur la maladie. Mais cette statistique d'un tiers de guérisons, d'un tiers de soulagés, d'un tiers d'insuccès, tout en prouvant qu'on s'est livré à une administration impartiale d'un agent donné, démontre que cet agent a une certaine valeur ; car si, au lieu de l'employer dans les phases les plus avancées de la maladie pour laquelle tout est alors impuissant, on ne l'eût donné qu'à des malades réellement curables, on aurait eu seulement deux catégories : individus guéris, individus soulagés : aussi je considère comme des antilymphatiques réels ceux qui peuvent conduire à un pareil résultat. Ils ne guérissent pas toutes les scrofules, mais ils en guérissent la moitié et soulagent l'autre.

A ce point de vue, il est deux agents principaux que nous pouvons citer en première ligne, ce sont l'iode et l'huile de foie de morue. Nous les regardons comme des médicaments par excellence, et cependant nous n'accordons pas à l'iode, par exemple, toute la portée d'action que Lugol lui a donnée. Mais, à côté de ces deux médicaments, nous trouvons le fer, les antiscorbutiques proprement dits, les amers, la décoction de feuille de noyer, le soufre auquel il est difficile de ne pas reconnaître une part d'action puissante sur l'économie.

C'est en raison de ces grandes données d'observation générale que nous appliquons, depuis plusieurs années, au traitement de toutes les formes de maladies qui ont pour cause prédisposante le tempérament lymphatique, porté dans bon nombre de cas jusqu'à l'état morbide qualifié de scrofule, une médication que nous appelons *mixte* ou *composée*, parce qu'elle réunit dans ses éléments les agents qui comptent le plus de succès.

Ce n'est pas seulement de cette époque que nous avons employé des médications composées ou mixtes ; il y a plus de quinze ans que nous unissons l'iodure de potassium au mercure pour combattre les accidents secondaires et tertiaires de la syphilis. Nous y asso-

cions, dans quelques cas de forme cachectique, le fer à assez haute dose; nous y ajoutons l'huile de foie de morue, quand la forme lymphatique est prédominante; et enfin l'arsenic dans certaines circonstances où le malade a fait usage de presque tous les antisyphilitiques, mais d'une manière isolée et quand il s'agit surtout d'affections des os. De sorte que nos médications *mixtes* sont parfois assez compliquées, puisque nous donnons à la fois et au même individu des sudorifiques, du mercure, du fer, de l'iode, de l'iodure de potassium, de l'huile de foie de morue et de l'arsenic; tout cela sans qu'il en résulte aucun trouble pour l'économie: c'est ce que nous exposerons sous le titre de médications *mixtes* ou *composées*.

Quoi qu'il en soit, il faut, avant tout et suivant nous établir une distinction tranchée entre la généralité des médicaments qui constituent la médication antilymphatique et les sulfureux, qui peuvent aussi y être rangés à juste titre. Ceux-ci sont essentiellement excitants; ils ont une action toute particulière qui en constitue des spécifiques. Ils n'agissent pas sur les ganglions et le système lymphatique, comme l'iode et l'huile de foie de morue, par exemple; mais ils exercent une influence marquée sur certaines maladies cutanées. Aussi scindons-nous en deux catégories distinctes la médication antilymphatique: la première, qui comprend l'ensemble des antiscrofuleux proprement dits, ou médication antiscrofuleuse; et la seconde, qui comporte seulement des sulfureux, médication excitante qui est plus spécialement applicable aux diverses formes d'herpès et que l'on peut nommer aussi antiherpétique.

1° *Médication antiscrofuleuse.*

Je la compose de tisanes amères, d'un vin ou d'une liqueur spiritueuse amère, d'iodure de fer avec plus ou moins d'excès d'iode, d'iodure de potassium et d'huile de foie de morue. Le houblon, la décoction de feuilles de noyer sont les deux tisanes que je préfère; elles sont toutes deux bien supportées par l'estomac: l'une d'elles, la décoction de feuilles de noyer, me semble même avoir une action toute spéciale sur le système lymphatique. C'est qu'en effet ces deux tisanes ont deux principes tout différents: dans l'une c'est le principe amer,

dans l'autre c'est le principe astringent, le tannin, qui agit. Cette différence d'action est même telle, que M. Psorpson, de Chambéry, qui a préconisé cette décoction, en a obtenu des effets fort remarquables durant sa seule administration, résultat que le houblon n'a jamais amené. On doit prescrire aux malades trois verres de l'une ou de l'autre, dans la journée. Je donne, matin et soir, un mélange : 1° de sirop d'iodure de fer plus ou moins iodé ou de sirop antiscorbutique (voy *Formulaire*) ; 2° de vin de gentiane ou de liqueur amère antiscrofuleuse de M. Demaulon, pharmacien à Compiègne, et de l'huile de foie de morue, le tout battu et mêlé. Enfin, j'ajoute parfois l'iodure de potassium au sirop d'iodure de fer. Arrêtons-nous un moment sur la valeur de chacun de ces médicaments.

Lorsque l'iode fut employé à l'intérieur de prime abord, on le donna à l'état de liberté, soit en substance sous forme pilulaire, soit en teinture, ou en dissolution dans l'eau additionnée d'un peu de chlorure de sodium (sel marin) ; dans tous ces modes d'administration l'iode libre irritait l'estomac, amenait de l'anorexie, faisait maigrir les malades et finissait par ne plus être supporté. L'iodure de potassium fut découvert par la chimie ; on s'empara aussitôt de ce nouveau composé pour remplacer l'iode, sans tenir compte de ce fait, que l'iode à l'état de combinaison n'était plus qu'un sel sinon inactif, au moins dans lequel l'iode ne jouait plus qu'un rôle secondaire, eu égard à l'iode donné à l'état de liberté, semblable en cela aux combinaisons des acides et des sels. L'engouement pour ce médicament fut complet et d'autant plus marqué, que les malades pouvaient supporter des doses très fortes d'iodure de potassium, comparativement à celles d'iode, sans en être incommodés. Mais bientôt on ne tarda pas à s'apercevoir que l'iodure de potassium ne guérissait pas comme l'avait fait l'iode.

D'une autre part, personne ne nie l'efficacité du fer comme modificateur avantageux du sang des scrofuleux. J'ai eu la pensée de l'associer à l'iode à l'état d'iodure, combinaison beaucoup moins fixe et beaucoup moins stable, et par conséquent susceptible de mettre peu à peu de l'iode à l'état de liberté, soit dans le tube digestif, soit dans le sang, sauf à faire même prédominer l'iode dans certains cas ; j'ai introduit l'iodure dans du sirop de sucre, comme étant

excipient le plus favorable à l'administration des médicaments en énéral, parce qu'il les enveloppe et qu'il atténue notablement les fets qui résultent de leur contact immédiat avec l'estomac : de là s deux formules de sirop que l'on trouve dans notre formulaire ous les numéros 1 et 2, ainsi que le sirop composé d'iodure de fer t d'iodure de potassium. Je donne de chacun de ces sirops une uillerée le matin, une cuillerée le soir. Cette préparation agit sur es dents de quelques personnes en même temps qu'elle semble leur rriter les gencives, mais ce sirop est très bien supporté par l'estomac. Il suffit de le mettre dans de la tisane pour voir disparaître es inconvénients. On a beaucoup préconisé depuis quatre ans le er réduit par l'hydrogène. C'est en effet une excellente préparaion, mais elle n'agit que comme préparation ferrugineuse, tandis que l'iodure de fer, dont la composition est peu fixe, agit sur l'économie par l'iode et par le fer. Mais le fer réduit par l'hydrogène, el qu'il est journellement prescrit, irrite très souvent l'estomac t les intestins et donne lieu à des douleurs stomacales ou à des oliques, aussi ne peut-on en prescrire qu'une dose généralement rès faible, soit 25 milligrammes à 5 centigrammes au plus, par repas. Pour éviter ces inconvénients, je l'associe au miel et à la gomme à l'état pilulaire et je le fais toujours prendre avec des aliments. C'est d'ailleurs, il faut bien le dire, des composés ferrugineux le plus assimilable et le plus sûr dans ses effets. A côté de lui viennent naturellement se placer les pilules de Vallet, à la condition d'augmenter la dose proportionnellement aux deux préparations dont je viens de parler.

L'huile de foie de morue est un médicament par excellence, qui nous paraît agir d'une manière toute spéciale sur les ganglions engorgés en même temps qu'elle modifie la constitution. Elle n'augmente pas l'appétit, elle le diminue; elle n'active pas la circulation comme l'iode, le fer, les liqueurs amères; et cependant elle fait engraisser; sous son influence, les ganglions engorgés diminuent de volume et finissent par disparaître. On a dit, il y a trois ans, que l'huile de foie de morue agissait en vertu de l'iode qu'elle renferme; et l'on s'est mis à préparer un mélange d'huile d'olive et d'iode que l'on vend sous la dénomination de son auteur, M. Per-

sonne. J'ai essayé cette huile à l'hôpital Saint-Louis sur une assez grande échelle, et pour la généralité des malades j'ai été obligé d'en revenir à mon traitement mixte, non pas que je prétende que l'huile iodée n'ait pas d'action : elle agit comme l'iode et en vertu de l'iode qu'elle renferme, par conséquent elle produit les mêmes effets que lui ; mais elle n'agit pas comme l'huile de foie de morue et ne guérit pas comme elle. C'est qu'en effet, s'il y a dans l'huile de foie de morue des traces d'iode, ce ne sont que des traces ; il y existe d'autres principes dont l'analyse démontre l'existence, et aussi d'autres éléments que nous ne pouvons reconnaître par l'analyse, malgré les progrès de la chimie. Il faut bien avouer qu'il est bon nombre de matières animales qui nous échappent : peut-on compter pour rien cette saveur et cette odeur toutes particulières à l'huile de foie de morue *brune?* Les praticiens reconnaissent que cette huile, purifiée par la filtration et décolorée par le charbon, n'a plus les mêmes propriétés, ou qu'elle possède des propriétés beaucoup moins actives : ainsi l'odeur et la matière colorante que l'analyse ne saurait éliminer jouent déjà un rôle très puissant dans son mode d'action, à plus forte raison pour d'autres éléments qui ne nous sont pas connus. Je vais même plus loin, en disant qu'alors même que nous les connaîtrions, leur mélange *artificiel* ne saurait remplacer l'huile naturelle. Nous ne pouvons admettre en thérapeutique ces divers mélanges préconisés par quelques personnes que comme une réunion d'éléments isolés qui agissent chacun en raison de leur vertu particulière, mais qui ne peuvent jamais remplacer un *produit naturel*, semblables en cela aux eaux minérales artificielles qui sont à cent lieues des eaux minérales naturelles.

Quant au mode d'administration de l'huile de foie de morue, il est très difficile. Jusqu'ici on n'est pas parvenu à masquer son odeur et sa saveur. Cette huile, prise seule, est très désagréable au goût, surtout pour les adultes, car les enfants s'y habituent assez facilement. J'ai cherché avec beaucoup d'autres médecins le moyen de la rendre moins repoussante, mais sans y parvenir. On a conseillé de faire rincer la bouche avec un peu d'eau-de-vie ou du rhum ; ce moyen est insuffisant, même pour la bouche, dans laquelle il laisse la saveur de l'huile, et il ne peut rien contre les renvois qui suivent en-

re son ingestion dans l'estomac après plusieurs heures écoulées. e mélange d'huile, de sirop d'iodure de fer et de vin de gentiane, le ut battu ensemble, est encore ce qu'il y a de plus supportable. ernièrement on a conseillé de verser l'huile dans un peu d'eau, e mouiller au préalable toute la bouche avec de l'eau et d'en avaler ième un peu, puis de boire l'huile avec l'eau dans laquelle elle est ersée. Ce mode d'administration permet d'éviter ainsi le contact de huile dans la bouche; on prend d'ailleurs le soin de se la rincer mmédiatement. Ce procédé ne saurait parer aux renvois de goût l'huile qui se montrent pendant un certain temps. Nous en dirons ntant d'une sorte de biberon à double écoulement, d'où l'huile sort nveloppée d'eau. Un moyen qui réussit assez bien à combattre les envois de goût d'huile, consiste à faire avaler une petite tasse de hé immédiatement après son ingestion dans l'estomac.

Quant à la dose, elle doit varier en raison des conditions lympha- iques que l'on a à combattre. Trois ou quatre cuillerées par jour uffisent pour agir sur tout le système lymphatique. Il faut élever la ose jusqu'à six ou sept cuillerées, quand on veut obtenir la réso- ution d'engorgements; et pour le lupus, nous en portons la dose usqu'à dix cuillerées par jour; nous avons été jusqu'à seize, mais ette dose nous paraît actuellement exagérée et inutile. Quelle que soit a dose, mieux vaut la faire prendre moitié le matin et moitié le soir, t commencer par une cuillerée matin et soir, sauf à augmenter ous les deux ou trois jours d'une cuillerée par jour, jusqu'à atteindre la dose la plus élevée.

On peut faire prédominer tel ou tel agent dans la médication. Le uccesseur de M. Dorvaut a fait voir qu'en incorporant l'iode au irop antiscorbutique *préparé à froid*, l'estomac pouvait en sup- porter des doses plus fortes; ainsi, jusqu'à 2 grammes d'iode pour 00 grammes de sirop. La médication antiscrophuleuse doit être rès limitée dans ses doses et dans sa forme composée, lorsqu'il 'agit de modifier très légèrement la constitution. Ainsi pour les nfants le sirop antiscorbutique ou le vin de gentiane suffisent. omme moyens excitants de l'appareil digestif et un peu aussi de l'état énéral. On joint plus tard à ces moyens l'huile de foie de morue à petite dose, ou un peu de sirop d'iodure de fer, lorsque quelques gan-

glions du cou, par exemple, sont le siége d'un léger engorgement.

Je n'hésite pas à donner le vin de gentiane, le sirop d'iodure de fer à la dose d'une cuillerée matin et soir, et l'huile de foie de morue portée à quatre cuillerées par jour en commençant par deux, quand l'affection cutanée a une forme lymphatique locale qui se dessine toujours par un épaississement des tissus, un empâtement, un état anormal, eu égard à la forme morbide ordinaire.

Enfin, j'entre franchement dans les doses plus élevées de chacun de ces agents quand il s'agit d'un état scrofuleux très prononcé. Mais ce que le médecin ne doit jamais perdre de vue, c'est qu'il faut doser les médicaments par rapport aux âges : ainsi, c'est par cuillerées à café que l'huile, le vin et le sirop doivent être donnés dans l'enfance, et ainsi successivement.

Quelques-uns des médicaments que nous venons de citer contribuent puissamment aux résultats que l'on obtient de la médication antilymphatique, si on les emploie à l'extérieur conjointement avec l'usage intérieur : telles sont surtout les préparations d'iode. L'iode a été préconisé à l'état libre pour rendre les bains médicamenteux, et pendant longtemps Lugol a fait prendre tous les deux jours des bains iodés aux malades scrofuleux qui étaient confiés à ses soins. Il y a huit ans environ que l'on a reconnu, je ne dirai pas l'inutilité de ces bains, car c'était introduire l'iode dans l'économie de la manière la plus heureuse, mais le peu de bienfait que l'on en retirait par rapport à la dépense considérable qu'ils occasionnaient, et l'on n'a pas hésité à en suspendre l'administration. (Voy. BAINS IODÉS, *Formulaire*.) Il ne faut pas cependant se dissimuler que c'est là un des modes le plus avantageux pour faire pénétrer l'iode libre ou combiné dans l'économie, à la condition que l'enfant y reste un temps suffisant. Ces bains ne sont d'ailleurs pas affaiblissants comme les bains ordinaires ; ils stimulent la peau et les organes respiratoires, car il se fait toujours à leur surface une émanation iodée que l'on respire avec avantage. Ils peuvent donc être prescrits lorsque la fortune des malades en permet l'emploi.

Un effet médicamenteux analogue à celui que procurent les bains se produit lors des applications de solution iodée sur la peau, quand même l'iode est incorporé à l'axonge; on retrouve alors

l'iode dans l'urine et dans les autres produits de sécrétion, mais la solution iodée agit de plus comme résolutif. Toutefois l'absorption, et par conséquent l'action de l'iode, est bien plus énergique quand cet agent est appliqué en solution que lorsqu'il est incorporé à l'axonge. Sous ce rapport, la généralité des pommades exige des doses bien plus considérables de médicaments pour produire les mêmes effets. La plus active est sans contredit celle dans laquelle l'iode se trouve à l'état de liberté; déjà la préparation en peut être dix fois moins active, si au lieu d'iode on se sert d'iodure de potassium. L'effet en devient presque nul si l'on emploie l'iodure de plomb, sel tout à fait insoluble. Aussi faut-il sans contredit donner la préférence aux solutions aqueuses d'iode, alors même que l'application ne pourrait pas avoir la même durée. Le seul inconvénient de l'usage de ce médicament, c'est celui qui résulte de l'emploi d'une préparation trop chargée d'iode. Celui-ci agit alors comme caustique, il tanne la peau, la dessèche, détermine l'exfoliation de l'épiderme, et cette circonstance s'oppose à l'absorption d'une manière absolue. Ces lotions doivent contenir depuis 1/10000e d'iode jusqu'à 1/5000e. (Voy. *Formulaire*, LOTIONS et POMMADES IODÉES.) Au surplus, la lotion doit varier dans les doses des éléments qui la constituent, selon l'âge et la peau du sujet.

Ces applications locales jouissent d'une grande puissance résolutive dans les engorgements, et nous ne saurions trop en recommander l'emploi. Il faut prendre la précaution de recouvrir les compresses imbibées de solution d'un morceau de taffetas gommé ou de gutta-percha, non-seulement pour éviter le dessèchement du linge et l'évaporation de l'iode, mais encore la transformation de cet agent en acides iodique et iodhydrique.

L'axonge ne sert pas seulement d'excipient à l'iode et à l'iodure de potassium. Les praticiens, formulant en général des pommades trop actives, ont eu la pensée d'employer des pommades à l'iodure de plomb, dans l'hypothèse probable où, réunissant deux agents résolutifs, ils obtiendraient un effet plus marqué. C'est là une de ces erreurs si nombreuses commises par la généralité des médecins qui n'appliquent pas leurs connaissances chimiques à la thérapeutique, au moins dans l'art de formuler. L'iodure de plomb est une sub-

stance tout à fait insoluble et qui n'est pas absorbée : aussi ne trouve-t-on pas de traces de ce sel dans les produits des sécrétions. C'est au moins ce qui résulte d'un travail très consciencieusement fait sur l'absorption des diverses préparations d'iode par M. le docteur Titon, ancien interne des hôpitaux de Paris. La pommade à l'iodure de plomb n'a pas les inconvénients locaux des pommades iodées ; elle ne développe aucune irritation de la peau, mais c'est un résolutif d'une très faible énergie. (Voy. *Formulaire*, POMMADES.)

Il n'en est pas de même du proto-iodure de mercure incorporé à l'axonge : c'est là une pommade trop active, et que l'on trouve indiquée à dose élevée dans les formulaires. Elle est très résolutive, mais nous pensons qu'elle doit la presque totalité de ses propriétés au mercure. En effet, elle amène la salivation aussi souvent que les onguents mercuriels. La dose d'iodure de mercure que l'on fait entrer dans sa composition doit varier en raison de l'usage auquel on la destine. Elle doit être formulée à dose beaucoup plus élevée s'il s'agit d'amener la résolution d'un engorgement, et au contraire l'iodure doit y entrer à dose très faible quand on emploie cette pommade contreu ne maladie de la peau. (Voy. *Formulaire*, POMMADES.)

Il n'en est pas de même du deuto-iodure de mercure : c'est une combinaison très fixe et très insoluble, mais qui devient très soluble dans l'iodure de potassium, de sorte que si l'on ajoutait ce dernier sel au premier dans une pommade, on aurait une formule très active . C'est d'ailleurs un excellent résolutif, un modificateur puissant de certaines surfaces depuis longtemps malades, et dont il est nécessaire de changer la vitalité pour en amener la guérison. (Voy. *Formulaire*, POMMADES.)

2° *Médication sulfureuse ou antiherpétique.*

Il est peu de médicaments qui aient joué un plus grand rôle dans la thérapeutique des maladies de la peau que le soufre et ses composés. Que l'on reporte ses souvenirs à une époque qui n'est pas encore fort éloignée de nous, et l'on conviendra qu'alors le soufre était le médicament par excellence de la dartre ; c'est-à-dire de toutes les maladies cutanées, puisque toutes recevaient cette déno-

nination banale. Biett est, dit-on, celui qui a le premier combattu es tendances : les dermatologistes modernes l'ont suivi dans cette oie, et cependant, encore aujourd'hui, un grand nombre de médeins n'hésitent pas à prescrire cet agent, quel que soit l'état aigu ou hronique de l'affection, et quelle que soit aussi la forme morbide.

Je suis loin, pour ma part, de rejeter les préparations sulfureuses, e les emploie tous les jours ; je tiens seulement à limiter leur usage ux maladies qui les réclament. Or le soufre et ses composés exerent sur les fonctions digestives et sur toute l'économie une excitaion plus ou moins marquée en raison de la préparation que l'on prescrit et de la dose que l'on administre. Cette stimulation toute péciale, nous en traduisons l'effet en disant : c'est un médicament xcitant, mais nous ne pouvons pas encore établir de différence ntre le mode d'action que le soufre exerce et celui de l'iode, par xemple ; dès lors nous nous trouvons conduit à l'employer par une orte d'empirisme, parce que l'expérience nous apprend qu'il guérit elle ou telle maladie de préférence à telle autre que l'iode guérit noins ou même ne guérit pas. Ce qui ressort cependant de notre xpérience, c'est que les sulfureux ne conviennent dans le traitenent des affections cutanées que dans les cas où le sujet affecté de a maladie a un tempérament lymphatique plus ou moins dessiné. C'est la condition principale que nous posons à son administration, ndépendamment de la maladie elle-même. Nous ne comprenons as ici les maladies qui en réclament plus particulièrement l'emploi ; un eczéma, un herpès, peuvent survenir chez des personnes de empéraments différents. S'il y a une certaine liaison du tempéranent avec la forme morbide dans la généralité des cas, cette circontance n'est pas absolue, elle souffre des exceptions qui justifient ce ue nous venons d'avancer à l'égard du soufre.

La médication sulfureuse peut être *artificielle* ou *naturelle*, en ce ens que l'on s'adresse au soufre et à ses préparations, ou bien aux aux minérales sulfureuses. — Le soufre peut être administré à intérieur et à l'extérieur. La pharmacie présente peu de ressources our son emploi intérieur. La fleur de soufre en poudre, en pilules u à l'état de tablettes, et le foie de soufre, sont les seuls composés ue l'on puisse prescrire. Or on ne donne guère le soufre à l'état de

fleur de soufre lavée; ce médicament à l'état pilulaire ne contient pas assez de substance active, car il en faut une certaine dose pour produire des effets. Chaque tablette ne renfermant qu'un décigramme de fleur de soufre, il faut donc donner 5 à 12 décigrammes pour obtenir une action stimulante; le malade est ainsi obligé de prendre chaque jour dix à douze tablettes soufrées. On aurait, il est vrai, une action plus énergique si l'on se servait de soufre dit *anglais*, ou soufre précipité des hydrosulfates par des acides, car, dans cette préparation, le soufre est dans un état de division extrême et son action a beaucoup plus d'énergie; elle doit certainement être trois ou quatre fois plus active que celle de la fleur de soufre : aussi ai-je eu la pensée de faire formuler des pilules au soufre précipité, qui peuvent être prises soit le matin, soit le soir, soit dans le cours de la journée, entre les repas, à l'instar des tablettes. (Voy. *Formulaire*, TABLETTES et PILULES.)

Reste donc le sulfure de potassium que Chaussier a mis en évidence dans son sirop formulé au Codex; mais ce sirop est composé de telle manière qu'il constitue un médicament repoussant, et par son odeur, et par son aspect. Il s'altère à l'air avec une rapidité extrême; le sulfure se décompose, donne lieu à un sirop d'un blanc jaunâtre qui perd peu à peu de son énergie. Un pharmacien de Paris, M. Crosnier, obtient cette préparation limpide et capable de se conserver : son sirop renferme le quart du sulfure de potassium du sirop du Codex. A la dose d'une cuillerée matin et soir, trois cuillerées au plus par jour, il donne lieu à une action médicamenteuse très suffisante pour les adultes. L'eau de goudron sert d'ailleurs d'excipient à la dissolution, ce qui n'est qu'un avantage. J'emploie souvent ce sirop et j'en obtiens d'excellents effets. (Voy. *Formulaire*.) Ce choix dans les modes de préparation est loin d'être indifférent : avec des médicaments déjà peu agréables de leur nature, puis repoussants par leur mode de confection, les malades ne font que des traitements incomplets et insuffisants, parce que l'estomac répugne à l'ingestion de ces médicaments. Je ne parle pas à dessein des eaux de Baréges, faites artificiellement avec le sulfure de potassium : elles constituent une tisane que les malades ne veulent pas prendre. Quant aux eaux artificielles de sulfure de sodium

cristallisé, évidemment moins désagréables, elles ont l'inconvénient de leur quantité, et dès lors je préfère m'adresser aux eaux minérales naturelles.

Nul doute que les eaux sulfureuses naturelles ne doivent avoir la préférence sur tous les médicaments artificiels, mais c'est à la condition que les malades en feront usage à la source même. En effet, elles sont alors prises dans des conditions toutes différentes; elles sont tièdes, dans toute leur pureté, sans aucune altération de séjour; chacun prendra deux, trois et quelquefois quatre verres d'eau, c'est un usage général; chacun s'y soumet par imitation ou par exemple. A l'eau naturelle s'ajoute l'influence du climat pour toutes les personnes qui n'habitent pas le Midi, et cette influence est immense; car à une température plus élevée, à un climat meilleur, viennent se joindre un air plus vif, des promenades dans les montagnes, une alimentation confortable, toutes conditions qui prêtent leur concours à la médication sulfureuse.

Les agents sulfureux externes doivent venir en aide à la médication sulfureuse et la compléter; sous ce rapport, les formes d'administration sont beaucoup plus variées: uni à l'axonge, on fait avec le soufre seul, ou le soufre et les carbonates de potasse et de soude, des pommades soufrées et sulfo-alcalines. Nous pensons que les formulaires ont préconisé ces agents à doses généralement trop élevées. La fleur de soufre ne doit pas dépasser 1 à 4 grammes pour 30 grammes d'axonge, et quant aux carbonates de potasse et de soude, il faut établir à leur égard une distinction: l'un de ces sels est plus actif que l'autre, de là les doses de 5 décigrammes à 2 grammes de carbonate de potasse, et 1 gramme à 3 grammes de carbonate de soude pour produire le même effet. Ce fait, que nous avions signalé, vient d'être mis en évidence par les agents que M. Wleminsk met en usage en Belgique pour combattre la gale. On sait combien les lotions de Dupuytren au sulfure de potassium sont irritantes; M. Wleminsk leur a substitué des lotions au sulfure de calcium, et ce changement de base a suffi pour éviter ces stimulations de la peau. (Voy. *Formulaire*, POMMADES.)

On associe encore les *sulfures de potassium*, de *sodium*, de *calcium*, à l'axonge, pour en faire des pommades, ou à l'huile, pour en com-

poser des liniments. (Voy. *Formulaire*, POMMADES, et LINIMENTS.) Ces préparations sont surtout employées contre la teigne ou la gale. On fait aussi des lotions avec ces mêmes substances: telles sont celles de Baréges artificielles, de Dupuytren, de Barlow (voy. *Formulaire*, POMMADES, LINIMENTS, LOTIONS); elles ont l'inconvénient de se décomposer rapidement au contact de l'air, elles sont par cela même peu employées.

Enfin, les bains artificiels de Baréges au sulfure de potassium soit seul, soit associé à un carbonate alcalin, et même au sel commun, constituent des bains excitants d'une grande efficacité. Toutefois ces bains ont surtout pris faveur par rapport aux affections rhumatismales, pour lesquelles ils jouissent d'une grande vertu. Mais les praticiens commettent la faute de les donner à la même dose, c'est-à-dire à raison de 125 grammes par bain, dans le traitement des maladies de la peau. Or il faut établir ici une grande différence entre la peau saine que l'on désire surexciter pour combattre l'affection rhumatismale des muscles ou des ligaments, et la peau malade dont il s'agit seulement de modifier la vitalité morbide. D'ailleurs un bain excitant ne jouit de cette propriété que pendant un certain laps de temps; peu à peu la sensibilité des tissus s'y habitue, et tel bain qui était fortement excitant devient bientôt presque de nul effet par l'usage. Par ces diverses considérations, il faut débuter par des bains sulfureux faibles, 45 grammes d'abord, augmenter de 15 en 15 grammes la dose de sulfure tous les quatre ou cinq bains, et, en tout cas, ne jamais dépasser 75 à 80 grammes. A l'hôpital tous nos malades qui sont traités par la médication sulfureuse ne prennent jamais de bains au delà de 60 grammes de foie de soufre, et encore ils en éprouvent souvent des effets de surexcitation.

Quelle que soit la dose, quels que soient le mélange ou la nature des substances employées, on n'imite jamais les eaux minérales sulfureuses naturelles, et dans beaucoup de cas on ne les remplace pas. Cependant on obtient en hiver d'immenses succès de l'emploi de ces eaux et de ces bains artificiels. Dans quelques cas même j'ai vu des malades me dire que les bains d'Enghien qu'ils avaient pris après l'usage des eaux et bains sulfureux artificiels avaient eu un résultat moins efficace que ces derniers.

rminons par une observation relative aux bains sulfureux arti-
ls. C'est encore sous l'influence d'une sorte de routine que les
ous baigneurs font prendre les bains sulfureux le plus chaud
ible. Rien de plus préjudiciable que cette pratique. On surex-
les maladies cutanées, on les ramène à l'état aigu, et l'on pro-
e ainsi plusieurs d'entre elles. Ce n'est pas que je rejette ce
le d'administration d'une manière absolue. Lorsque l'affection
ée a une marche chronique, quand elle date de très loin, elle
avent besoin de cette surexcitation pour être modifiée ; mais ce
t là de ces cas exceptionnels dont le médecin reconnaît l'oppor-
té.

elle était la manière dont nous nous exprimions dans la pre-
re édition de cet ouvrage. Un mémoire de M. Soubeiran sur les
s, dans le *Bulletin de thérapeutique* pour le mois de mai 1856,
venu confirmer toutes nos assertions et répandre une vive
ière sur la préparation des bains sulfureux artificiels. Après
ir fait remarquer que la prétention de ceux qui ont composé des
s artificiels a toujours été de se rapprocher de la composition
eaux naturelles, M. Soubeiran fait remarquer qu'à cette époque
ignorait la composition réelle des eaux minérales, ce que des
lyses plus récentes ont fait connaître depuis. En conséquence,
avant chimiste établit : 1° Que le *sulfure de sodium* (monosulfure
odium, sulfure sodique) est l'agent minéralisateur des eaux des
énées ; qu'Anglada a démontré que les eaux artificiellement
parées avec ce sel sont les seules qui se rapprochent des eaux
érales sulfureuses ; qu'Anglada a publié une formule qui cor-
pond à la moyenne de sulfuration des diverses sources des Pyré-
ées ; que les formules données par M. Félix Boudet et par le
lex constituent une eau aussi forte que les sources les plus fortes
Pyrénées. D'où nous croyons devoir tirer les formules suivantes,
f à ce que les médecins les appliquent suivant les cas :

℞ Sulfure de sodium cristallisé.	32 à 42 grammes.
Carbonate de soude.	32 à 42 grammes.
Sulfate de soude.	8 a 16 grammes.
Eau.	200 litres.

où la preuve de ce que nous avançions plus haut, puisque aujour-

d'hui, dans les bains sulfureux artificiels ordinaires on fait entrer 125 grammes de foie de soufre.

Mais dans ces bains on a l'habitude d'ajouter de l'acide sulfurique étendu qui met à nu une grande proportion d'acide sulfhydrique (hydrogène sulfuré). M. Soubeiran a voulu savoir si ces bains étaient plus actifs lorsque l'hydrogène sulfuré est mis à nu, que lorsqu'il reste allié à sa base sans addition d'acide, à l'état de sulfure de sodium.

Il a remarqué sur lui-même que toutes les fois qu'il faisait ajouter un acide aux bains de sulfure de sodium, il en sortait plus excité; or c'était de l'acide tartrique, et par conséquent l'action stimulante ne pouvait provenir que de l'hydrogène sulfuré libre. M. Soubeiran fait observer qu'il est préférable d'ajouter de l'acide tartrique cristallisé, et de laisser dégager peu à peu l'hydrogène sulfuré, c'est le moyen d'avoir un bain plus actif.

Arrivant aux bains préparés avec le sulfure de potasse, il fait remarquer que ce sel est un composé de trisulfure de potassium et d'hyposulfite de soude, qui tous deux contribuent à la sulfuration du bain. — Que 50 grammes de sulfure de potasse équivalent à 44 grammes de monosulfure de sodium, c'est-à-dire à la force des eaux les plus sulfureuses des Pyrénées. Ces bains avec addition d'acide sont plus actifs, et les malades en établissent eux-mêmes la différence. Ils disent qu'ils conservent plus longtemps l'odeur sulfureuse quand ils ont pris un bain de ce genre, que lorsqu'il n'a pas été ajouté d'acide. L'eau de la Reine, à Luchon, qui est dans ce cas, est très recherchée par les malades.

On voit par ce qui précède combien la médication sulfureuse est variée, combien elle offre de ressources au praticien quand il sait s'en servir et en graduer les effets en raison des doses et des formes de la médication. Bornons-nous, quant à présent, à établir d'une manière générale les maladies qui en réclament l'usage et les conditions principales dans lesquelles elles peuvent convenir.

A la tête de toutes les maladies de la peau, je citerai sous ce rapport les *herpès* à forme subaiguë ou chronique; les *pityriasis versicolor* et *nigra;* les *eczémas* chroniques, chez les sujets d'un tempérament éminemment lymphatique. Toute forme composée, soit

eczémateuse, soit lichénoïde, qui dérivera de l'herpès, qui se reliera avec lui, se trouvera à merveille de cette médication, et cela va si loin, que le *psoriasis*, qui ne reçoit en général aucune influence des eaux minérales sulfureuses, guérit parfaitement par les pommades sulfo-alcalines et les bains sulfureux, si le psoriasis est *herpétiforme*, c'est-à-dire s'il se dessine par des plaques à bourrelet avec dégagement de peau au centre ; et c'est pour cela que j'insiste tant sur les formes composées des maladies de la peau, que les auteurs n'ont pas décrites, car ces formes mêmes deviennent la source d'indications thérapeutiques. Voici un fait entre cent qui prouve l'utilité de ces distinctions dans les formes composées. Un malade me fut adressé à l'hôpital Saint-Louis par un médecin de Strasbourg. Entré par accident dans un autre service, après avoir d'ailleurs été soumis à l'usage des préparations arsenicales, du goudron et d'autres moyens propres à combattre les affections squameuses, il fut traité par l'huile de cade, mais sans succès. Peiné de ne pas se trouver sous la direction du médecin auquel il avait été adressé, il parvint à se faire admettre dans mes salles. Il avait un psoriasis herpétiforme ; il fut soumis à la médication sulfureuse externe et interne, et il sortit deux mois après parfaitement guéri.

Au surplus, j'aurai soin d'insister sur les applications de la médication sulfureuse, lorsque je traiterai de chaque maladie en particulier ; je n'ai voulu que poser des jalons et faire connaître en général les ressources que cette médication peut offrir au médecin.

III. Médication antinerveuse ou antipapuleuse.

Nous lui donnons la dénomination d'antinerveuse ; car elle est dirigée surtout contre les affections lichénoïdes, apanage presque exclusif des tempéraments secs, nerveux, soit que le tempérament nerveux existe comme type, soit qu'il se trouve lié, chez l'individu, aux tempéraments sanguin ou lymphatique bilieux. Les agents de cette médication comprennent les antiphlogistiques et les antispasmodiques, les *alcalins*, le plus souvent seuls, et quelquefois associés au soufre : la *teinture de cantharides*, et l'*hydrothérapie*. Il est d'autres moyens accessoires qu'on ne doit pas négliger, et qui acquièrent

parfois une importance majeure : ce sont le *chloroforme* et le *camphre*, sédatifs puissants d'une complication de ces dermatoses, la *démangeaison*, et du système nerveux en général. En fait d'eaux minérales, la presque totalité des médecins prescrit les eaux sulfureuses comme pour les autres maladies de la peau. Cette sorte d'eau exaspère presque constamment l'affection papuleuse, le prurigo et la maladie pédiculaire exceptés. Il en est tout autrement des eaux de Louesche, de Vichy, de Néris, de Bourbon-Lancy, de Plombières, qui sont plus spécialement applicables aux affections lichénoïdes. Cette circonstance d'appropriation de certaines eaux à des affections essentiellement liées à tel ou tel tempérament vient encore à l'appui de nos doctrines : or on voit que dans chaque catégorie de maladies il y a des eaux minérales qui leur conviennent plus spécialement ; nous aurons le soin de les faire connaître.

La médication antipapuleuse est donc complexe ; nous allons successivement aborder chacune de ses parties.

1° *Antiphlogistiques.* — Les affections papuleuses, le strophulus, le lichen, le lichen urticatus, et l'eczéma lichénoïde en particulier, peuvent offrir très fréquemment à leur début un état aigu qui ne réclame d'autre médication que les antiphlogistiques ordinaires, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est ainsi que chez les enfants, chez les femmes et chez quelques jeunes gens on arrête très facilement ces éruptions à l'aide de ces moyens simples, et on les conduit souvent à la guérison sans le secours d'aucune autre médication. Je rapporterai à l'article LICHEN une observation très remarquable qui se rattache à ce fait.

2° *Antispasmodiques.*— L'extrait d'aconit est considéré, par M. Cazenave principalement, comme un des agents généraux les plus propres à guérir le lichen chronique et les autres affections papuleuses. Il est vrai qu'il regarde ces éruptions comme étant tout à fait symptomatiques de l'état du système nerveux. Pour moi, je n'en ai jamais obtenu des effets marqués. Je crois que le système nerveux est souvent tout aussi secondairement affecté, qu'il l'est primitivement. C'est alors l'éruption cutanée, et surtout les grattages qu'elle entraîne, qui amènent la démangeaison, et celle-ci entraîne à son tour la surexcitation nerveuse. Pour mieux en juger, il faut

procéder du simple au plus composé. Or, quand on observe ce qui se passe dans un lichen diffus des membres, par exemple, on le voit souvent sans aucune surexcitation nerveuse. Plus tard, lorsque l'affection prend de l'étendue, et lorsque les démangeaisons deviennent plus vives, l'insomnie, passagère d'abord, soutenue ensuite, commence à exercer de l'influence sur l'état général; et les malades, arrivés à cet état où la maladie de la peau est déjà très avancée, vous disent très bien qu'ils deviennent plus excitables, plus impressionnables, plus irascibles. Le contraire devrait avoir lieu si le système nerveux était affecté primitivement, et le développement de l'éruption devrait suivre cet état général. Mais il n'en est ainsi que dans les prurigos sans papules, et c'est ce qui nous fait dire que ces sortes d'éruption sont aussi bien primitives que les autres, ce qui n'exclue pas l'emploi des antispasmodiques dans la période où le système nerveux est généralement affecté.

3° *Alcalins.* — L'observation a démontré que bon nombre d'affections papuleuses étaient avantageusement modifiées par les alcalins, à la condition qu'il s'agira d'un individu d'un tempérament bilioso-nerveux et d'une médication d'ensemble, c'est-à-dire de l'usage des alcalins à l'intérieur et à l'extérieur; mais il importe de les employer convenablement. Parmi les alcalins, on n'administre guère que le *bicarbonate de soude*, le *carbonate de soude* et le *carbonate de potasse*. Le premier et le dernier sont trop irritants pour l'usage interne; mais le bicarbonate de soude peut être pris sans inconvénient à doses assez élevées.

Pour instituer une médication alcaline complète, il faut, dans l'usage interne, chercher à associer le bicarbonate de soude à une boisson. Or il y a des plantes qui contiennent de la soude, ou au moins une matière savonneuse. De ce nombre est la saponaire. On prescrira donc le bicarbonate de soude dans la tisane de saponaire, en ayant soin de doser graduellement le sel. Ainsi on débutera par 1 gramme, et l'on pourra aller jusqu'à 2 et même 4 grammes par litre de tisane, que le malade boira en totalité ou en partie dans les vingt-quatre heures, soit entre les repas, soit aux repas. Toutefois, pour ne pas saturer les malades de tisane, on la remplace par de l'eau de Vichy naturelle aux repas, ou de l'eau artificielle faite à

raison de 2 grammes de bicarbonate de soude par litre d'eau, que l'on rougit de vin, sauf à faire usage de vin blanc qui ne change pas de couleur par son mélange.

L'eau de Vichy contient par litre plus de 5 grammes de bicarbonate de soude; or certains malades en boivent quelquefois jusqu'à trente verres par jour, ce qui fait une dose considérable de bicarbonate. Ne croyez pas cependant qu'on pourrait sans inconvénient faire prendre à un malade dans un jour trente verres de tisane de saponaire ou d'une eau alcaline artificielle à raison de 5 grammes de bicarbonate par litre, il n'en saurait être ainsi; et ce fait vient à l'appui de ce que nous disions précédemment, que les eaux naturelles ont dans les éléments qui les constituent des combinaisons toutes particulières que nous ne pouvons réaliser dans nos laboratoires : les principes actifs y sont *minéralisés*, tandis que dans nos tisanes artificielles ils ne sont que mélangés et conservent une action plus irritante.

Enfin on donnera des pastilles de Vichy, douze à quinze dans l'intervalle des repas, car chacune renferme seulement 5 centigrammes de bicarbonate de soude.

Pour compléter la médication alcaline, on joindra aux moyens internes les pommades alcalines et les bains alcalins. Ceux-ci sont employés concurremment avec les antispasmodiques dans la période où le système nerveux général est affecté : on les compose de carbonate de potasse; mais comme ce corps est plus actif que le carbonate de soude, ce dernier est préférable. Ajoutons encore qu'il est moins cher, nouveau motif de préférence. On prescrira donc des bains avec le carbonate de soude à la dose de 100 à 200 grammes. Si l'on voulait user du carbonate de potasse, il ne faudrait pas dépasser 80 à 100 grammes. Dans les cas de lichen eczémateux, on associe avec avantage à ces bains 30 grammes de sulfure de potassium, avec une certaine quantité de gélatine, s'il y a quelques apparences de lymphatisme chez l'individu; on obtient par là un excellent bain, actif et doux en même temps, sauf à réduire toutefois la dose de carbonate de soude. Le séjour dans le bain devra se prolonger une heure, une heure et demie, si le malade peut le supporter, car il faut songer à l'absorption pour en obtenir tout l'effet désirable, et il est

on de donner à celle-ci le temps de se faire : d'ailleurs ces sortes de alades, en raison de leur tempérament, supportent parfaitement les ains prolongés. A Vichy on compte peu sur l'effet des bains, à cause u peu d'abondance des sources par rapport au nombre des baigneurs, t le plus souvent l'eau naturelle y est additionnée d'eau simple.

Les pommades alcalines des formulaires sont composées de : carbonate de potasse, 4 grammes ; axonge, 30 ; plus un peu de chloroforme ou de camphre. Nous ferons observer d'abord que cette dose le carbonate est trop forte, et en second lieu qu'on doit en exclure e carbonate de potasse, à moins toutefois qu'on ne l'emploie comme noyen empirique dans quelques cas de lèpre vulgaire, dans certains psoriasis invétérés et qui ont résisté à tous autres moyens de raitement, même à l'usage interne des solutions arsenicales. Dans es cas de lichen, on ne doit pas dépasser 5 décigrammes à 1 gramme de carbonate de soude pour 30 grammes d'axonge ; cette dernière dose ne sera prescrite que dans les lichens chroniques : en agissant autrement, on s'exposerait à surexciter la maladie qui commence à s'éteindre. Une précaution pratique qu'on ne devra pas omettre en ormulant la pommade, c'est de recommander au pharmacien de issoudre le carbonate de soude dans quelques gouttes d'eau avant le l'incorporer à l'axonge ; s'il se bornait à l'incorporer en poudre, l y aurait contact direct de molécules du sel libre avec la peau, et ur suite irritation plus ou moins vive de ce tissu.

Parfois on se sert aussi de lotions alcalines, c'est surtout dans les as où l'on craint que la graisse ne rancisse. Ainsi, chez les femmes ui ont les cheveux longs, on ne peut guère employer une pommade our le cuir chevelu ; car la graisse, emprisonnée au milieu des heveux plus ou moins serrés et couverts, s'échauffe, rancit, se mêle avec l'exsudation morbide, et forme un corps étranger dont la résence irritante perpétue la maladie au lieu de la guérir. Même hez les personnes qui ont les cheveux assez courts, on doit user vec discrétion des pommades, et en tous cas prescrire tous les deux ours un lavage avec une solution alcaline ou au moins savonneuse, ar l'usage prolongé des solutions alcalines décolore les cheveux et les fait rougir. (Voy. *Formulaire*, LOTIONS.)

Les agents de la médication alcaline, que nous venons de faire

connaître d'une manière sommaire, peuvent être appliqués à trois ordres différents de maladies de la peau : l'état papuleux principalement, ou les diverses variétés de lichen chronique, le *lichen agrius* excepté ; au moins réclame-t-il de préférence un autre agent médicamenteux ; en second lieu, certaines formes de psoriasis ; en troisième lieu, la teigne.

Survenant presque constamment sur des sujets nerveux et sanguins, ou nerveux et bilieux, se montrant tantôt sous la forme aiguë, tantôt sous la forme chronique, le lichen est souvent lié à des gastralgies avec productions acides, qui guérissent sous l'influence des alcalins en entraînant la guérison de l'affection de la peau qu'elles ont fait naître. C'est là, il faut bien le dire, la cause la plus commune des succès de cette médication, mais en dehors même de ces conditions les alcalins réussissent encore.

On sait d'ailleurs qu'en thèse générale les alcalins conviennent parfaitement aux sujets de tempérament nerveux et bilieux, les opiacés exaspérant à la longue ces démangeaisons. L'aconit est employé par certains praticiens dans ces sortes de cas ; notre collègue M. Cazenave le prescrit souvent ; il ne nous a jamais amené d'amélioration notable dans l'état général ou local.

Dans certaines formes squameuses de psoriasis ou de lèpre vulgaire qui ont résisté au goudron, ou pour lesquelles les malades répugnent à l'usage de cet agent, on emploie avec avantage la médication alcaline ; mais, tandis que dans le lichen la peau est d'une irritabilité extrême, dans les affections squameuses, au contraire, elle est épaisse et presque insensible. L'affection squameuse n'amène aucune démangeaison, de sorte que les doses alcalines peuvent être fort élevées sans inconvénients ; ce n'est même qu'à cette condition que l'on obtient la guérison de la maladie de la peau.

Quant à la teigne, on sait que les alcalins forment la base de la poudre, ou cendre, ainsi que de la pommade employées par les frères Mahon. Leur traitement est généralement suivi de succès, mais à la condition, d'une part, qu'il soit mis en usage pendant un temps qui varie de huit à quinze mois, et qu'il soit employé avec des soins de propreté tout particuliers ; aussi ne réussit-il pas entre toutes mains, et nous aurons plus tard occasion de faire connaître les ré-

ultats comparatifs de diverses méthodes propres à guérir la teigne, éthodes essayées sur des sujets malades depuis longues années, et ux lesquels la médication par les alcalins a été tout à fait insuffi-nte. (Voy. TEIGNE.)

Parmi les sédatifs les plus puissants de la démangeaison dans les fections papuleuses, on peut citer le chloroforme, l'éther et le cam-hre. Le médecin retire des avantages immenses de l'emploi de ces ents, en les associant à l'axonge dans la proportion de 1 à 2 gram-es pour les deux premiers, et de 25 centigrammes à 5 déci-grammes pour le dernier. Mais ces trois médicaments ne doivent as agir de la même manière : les deux premiers sont, en effet, très olatils ; le second est fixe comparativement aux deux autres. Or le hloroforme et l'éther, en se volatilisant, amènent un refroidisse-ment de la peau, entraînant une soustraction très grande de calo-rique qui doit exercer une influence très puissante sur la démen-geison ; d'une autre part, ils doivent agir aussi par leur influence édative sur le système nerveux, quand le malade est couché et placé dans une atmosphère de chloroforme. Aussi est-il bon de recommander l'usage de la pommade, le malade étant au lit et parfaitement couvert.

Quant au camphre, il a certainement un autre mode d'action, mais il nous échappe. Quoi qu'il en soit, nous ne saurions trop pré-coniser ces médicaments qui s'associent parfaitement aux alcalins, et, en général, à tous les agents que l'on incorpore aux graisses.

Teinture de cantharides. — Biett est celui qui a surtout mis en vigueur l'emploi de ce médicament, et nous devons lui en savoir gré, car il rend de grands services. C'est dans les *lichens chroniques* qu'on en tire des avantages. Je le prescris fort souvent. Je le donne aux enfants comme aux jeunes gens, et loin d'en redouter les effets, je n'ai qu'à m'applaudir tous les jours de son usage.

Le mot *teinture de cantharides* impressionne généralement d'une manière fâcheuse les parents et les malades qui sont en âge d'en connaître les effets aphrodisiaques possibles. Une mère craindra d'éveiller dans sa fille des plaisirs précoces, ou de voir surgir des accidents durant son emploi. C'est pour remédier à cette opposition si grande que l'on trouve auprès des malades ou auprès des per-

sonnes qui les entourent, que je prescris cette teinture sous le nom de *teinture de meloe vesicatorius*. Je la donne par gouttes en commençant par 1 goutte le matin, 1 goutte le soir, augmentant d'une seule goutte pour la journée et pour chaque jour, de manière à arriver à 10 gouttes pour les enfants de sept ou huit ans, 15 gouttes pour un âge plus avancé, et 20, 25 et même 30 gouttes pour l'âge de vingt-cinq à trente ans. C'est dans un julep simple, ou dans un verre d'eau sucrée, ou dans une tasse de tisane, que je fais prendre ce médicament; la dose de la journée toujours en deux fois, moitié le matin, moitié le soir. Ces sortes de gastralgies en vertu desquelles un enfant a, comme on le dit communément, l'estomac capricieux, ne s'accommodant que de friandises ou de mets qui excitent l'appétit, cessent comme par enchantement sous l'influence de cet agent. Un appétit franc se dessine, et l'usage des viandes et des aliments ordinaires devient un besoin pour le petit malade. En même temps, s'il s'agit d'un enfant lymphatique, pâle, décoloré, porteur d'ailleurs d'un *lichen agrius* si souvent lié à un pareil état, l'affection lichénoïde diminue peu à peu et se guérit à merveille.

Je ne nie pas les accidents possibles qui peuvent résulter de l'emploi de doses exagérées de ce remède, même de son usage continué à 20 ou 25 gouttes, tels que de la difficulté à uriner, allant parfois même jusqu'à rendre un peu de sang avec les urines; mais cet effet est tellement passager, en même temps qu'il est si peu fréquent, qu'il ne saurait arrêter dans l'administration de cette teinture. Au surplus, ce n'est pas l'éréthisme qu'il amène, mais la dysurie douloureuse allant jusqu'à la suppression de l'urine. Il suffit de cesser tout à coup son emploi pour voir disparaître en quelque temps tous ces accidents, surtout si l'on enduit les parties génitales d'un peu de pommade camphrée. En résumé, c'est un de nos moyens les plus héroïques et dont je ne saurais trop préconiser l'usage dans les affections papuleuses à forme chronique, et surtout quand il s'agit de jeunes gens et de jeunes filles.

IV. Médication antisquameuse.

Préparations arsenicales. — Les préparations arsenicales sont pour le médecin dermatologiste une source très puissante de médi-

s. Elles s'appliquent à un grand nombre de maladies ; il en est
ies qui les réclament d'une manière spéciale : ce sont les af-
ns à forme squameuse, *psoriasis*, *lèpre vulgaire*, *pityriasis*, que
ladies soient a l'état chronique ou à l'état aigu, mais dans ce
r cas à une période décroissante. A l'égard des autres affec-
e la peau, c'est ordinairement l'*ultimatum* de la généralité des
ins, c'est-à-dire que lorsque les autres agents médicamen-
nt échoué, on a recours en dernier ressort aux préparations
cales, et l'on ajoute : J'ai tout employé, voire même l'arsenic.
convenir que si ces préparations sont le médicament par ex-
ce pour combattre les affections squameuses, elles sont aussi
grande ressource dans certaines formes morbides cutanées,
ment dans celles *eczémateuses*.

croyons avoir contribué, pour notre part, à préciser et à ré-
er le mode d'emploi des préparations arsenicales par l'expé-
tation que nous avons faite de ces préparations sur une grande
e. C'est en solution qu'on les donne ordinairement, et deux
t sont usitées : la solution de Fowler, la solution de Pearson.
mière est un *arsénite de potasse ;* la seconde, une *arséniate de*

solution de Fowler se compose de :

Acide arsénieux	5 grammes.
Carbonate de potasse.	5 grammes.
Eau.	500 grammes.
Alcoolat de mélisse composé.	12 grammes.

composition de celle de Pearson est telle qu'il en faut 5 gouttes
faire l'équivalent d'une goutte de solution de Fowler. Il en ré-
an inconvénient pour son administration, car on est obligé de
er la dose jusqu'à 40, 50, 60, 80 gouttes par jour, et il est dif-
et long de compter un si grand nombre de gouttes. C'est une
n de préférer la solution de Fowler, puisque d'ailleurs elle a
mes propriétés que l'autre. Mais un autre motif de préférence
nous, c'est que nous n'avons jamais pu porter la solution de
on à des doses proportionnellement aussi élevées que l'autre,
provoquer des accidents ; aussi nous n'employons plus que la
on de Fowler. 18 gouttes de solution de Fowler contiennent

1/6e de grain d'acide arsénieux, environ 8 milligrammes ; or, en règle générale, un malade ne peut supporter plus de 15 à 18 gouttes de solution par jour, c'est-à-dire plus de 1/6e de grain d'acide arsénieux en combinaison avec la potasse, ce qui est tout différent de l'acide arsénieux solide ou même en dissolution dans l'eau : voilà donc une dose qu'on ne devra pas dépasser. En effet, toutes les fois que nous avons été au delà, les sujets les plus forts n'ont pas tardé à en être incommodés. Certes, il y a quelques exceptions, mais elles sont rares, et cependant M. Boudin, qui a préconisé l'acide arsénieux contre les fièvres intermittentes, a pu donner jusqu'à 1/4 de grain, 1/2 grain, 1 et même 2 grains d'acide arsénieux par jour. On peut s'expliquer une pareille tolérance en ayant égard à deux circonstances : 1° que l'intoxication paludéenne apporte dans l'économie une modification particulière en vertu de laquelle le malade supporte des doses d'arsenic qui le tueraient s'il était bien portant ; modification analogue, sans doute, à celle qui, dans la pneumonie, produit la tolérance du tartre stibié à haute dose ; 2° que c'est l'acide arsénieux libre, substance peu soluble, que M. Boudin donne à ses malades, et non l'arsénite de potasse, qui est très soluble. Or nous devons faire cette remarque générale, connue depuis longtemps du reste, que les médicaments agissent d'autant mieux qu'ils sont mieux dissous. Ainsi, que sur le derme dénudé chez deux animaux de même espèce, on applique, chez l'un de l'arsénite de soude, chez l'autre de l'acide arsénieux : le premier mourra rapidement, tandis que non-seulement le dernier sera plus lentement atteint, mais encore il faudra des doses d'acide arsénieux six à huit fois plus fortes pour amener la mort. C'est que l'arsénite, très soluble, est bien plus promptement absorbé que l'acide arsénieux, qui l'est moins. Il se peut donc, quand on ingère de l'acide arsénieux dans l'estomac à dose élevée, qu'une partie non dissoute soit expulsée avec les selles, tandis que l'arsénite de soude ou de potasse, très solubles, sont absorbés en totalité.

La solution de Fowler est connue depuis longtemps, mais son mode d'administration actuel n'a pas une date aussi ancienne. Du temps de Biett, ce qui n'est pas bien loin de nous, on la donnait encore de la manière suivante : on commençait par 1 goutte par jour

et l'on augmentait de 1 goutte tous les six ou huit jours seulement. Biett dit être arrivé ainsi jusqu'à l'administration de 40 gouttes par jour. On voit combien le traitement devait être long, et, en effet, il ne durait quelquefois pas moins de huit à dix mois. Désireux de fixer notre opinion sur la rapidité de progression avec laquelle on pourrait arriver à des doses réellement médicamenteuses, nous avons fait, il y a dix à douze ans, des expérimentations à ce sujet à l'hôpital Saint-Louis. Nous avons reconnu d'abord qu'on pouvait rapprocher l'augmentation des doses de manière à arriver à 12 gouttes en onze jours, à 15 en seize jours, sans accidents pour l'estomac du malade. Nous donnons en conséquence 2 gouttes le premier jour, 3 le deuxième, 4 le troisième, ainsi de suite. Nous gagnons donc ainsi beaucoup de temps.

Le second résultat important auquel nous sommes arrivé, c'est qu'il faut un homme fort, doué d'un bon estomac, pour supporter par jour 18 gouttes de liqueur de Fowler. On ne saurait dépasser cette dose sans s'exposer à voir survenir, après un certain laps de temps, des accidents graves; c'est pour cela, que nous ne pouvons nous empêcher de conserver un peu d'incrédulité au sujet des 40 gouttes que les malades pouvaient prendre sans inconvénient, fait que certains médecins de nos jours regardent comme parfaitement authentiques. Les prescriptions n'auraient-elles pas été exactement remplies à la pharmacie? Le malade prenait-il le médicament, du temps de Biett? C'est ce que nous ignorons ; mais nous avons si souvent été trompé par la négligence de nos élèves en pharmacie, ou par l'incurie de nos malades, que l'une et l'autre supposition sont très admissibles.

Nous avons motivé la préférence que nous accordons à la solution de Fowler sur celle de Pearson. Quant aux autres préparations arsenicales à l'état pilulaire, telles que les pilules asiatiques, par exemple, nous ne les employons jamais, par la raison que l'acide arsénieux y est donné en substance. Or, dans un service d'hôpital, les pilules, faites souvent à l'avance, peuvent s'être durcies au point de traverser le canal intestinal sans produire aucune action. En deuxième lieu, l'acide arsénieux étant peu soluble dans l'eau, la dose absorbée variera suivant l'état de sécrétion plus ou moins

grande de la membrane muqueuse stomacale qui absorbe toujours en raison inverse de cette sécrétion, l'état de l'estomac, la bonne ou mauvaise digestion alimentaire, la quantité d'aliments pris ; de sorte que si l'on sait ce que l'on donne, on ne sait pas ce qui est porté dans le torrent de la circulation. Au contraire, une préparation soluble, telle que les arsénites de potasse ou de soude en solution dans un liquide, et prise à jeun, sera absorbée dans l'espace de trois quarts d'heure ou d'une heure au plus, et par suite on connaîtra d'une manière certaine la dose qui va passer dans les secondes voies.

Dans les hôpitaux, en raison du nombre de malades qui peuvent prendre la solution de Fowler, et du temps qu'exige le dosage de ces gouttes, il y a souvent des erreurs volontaires ou involontaires. Ainsi, un élève peut se tromper de 2 ou 3 gouttes, il peut même, s'il fait sa distribution de gouttes dans une série de juleps, mettre dans la même fiole deux fois la dose, dans la supposition où il croirait n'avoir rien mis. On conçoit dès lors la source de ces accidents d'empoisonnement que l'on voit se développer inopinément. C'est pour obvier à ces dosages résultant de la négligence, que j'ai formulé une solution tout à fait identique avec la solution de Fowler, quant à la composition, sauf les doses respectives des éléments (voy. *Formulaire*, SOLUTIONS): elle est telle, que 1 gramme correspond à 1 goutte de la solution de Fowler. Pour la mesurer, on prend une petite éprouvette graduée à intervalles de 1 gramme et pouvant contenir 18 grammes. Il suffit alors de verser la liqueur arsenicale, sans la mesurer autrement que d'emplir le vase jusqu'à atteindre le point de repère qui correspond à la dose.

Mais une objection plus sérieuse à l'emploi de la solution de Fowler, c'est celle-ci : Qu'est-ce qu'une goutte? La goutte varie suivant les dimensions du tube ou du goulot du vase avec lequel on la fait tomber; de sorte que dans 18 gouttes retirées d'un large flacon et 18 gouttes d'un très petit flacon, il y a en poids une différence énorme. Aussi chaque praticien dermatologiste a-t-il sa formule de préparation arsenicale. Toutefois il ne faut pas exagérer cet inconvénient; la goutte pharmaceutique est à peu près uniforme, et nous devons dire qu'en général, en ville comme à

l'hôpital, on se sert de flacons de 20 à 30 grammes pour doser les médicaments.

La liqueur dont nous avons donné la formule, et que l'on a appelée solution minérale, est d'un dosage fort exact, puisqu'il se fait au poids. Il ne peut pas y avoir d'erreur avec elle; c'est ce qui nous engage à en préconiser l'emploi.

Nous avons dit plus haut que si l'on dépassait la dose de 18 gouttes de solution de Fowler, on s'exposait à voir se manifester des accidents; mais ces accidents sont bien différents de ceux que produit l'arsenic à haute dose, avalé par imprudence ou administré par une main criminelle. Dans ces derniers cas, en effet, l'empoisonnement se manifeste par des nausées, des vomissements, des coliques, de la diarrhée, des convulsions, la petitesse, la lenteur du pouls, la suppression des urines. La solution de Fowler à petites doses graduées ne produit rien de tout cela; ce sont des phénomènes tout nerveux qui peuvent passer inaperçus si le malade et le médecin ne sont pas très attentifs. Voici ces phénomènes. Quand le malade est arrivé à la dose la plus élevée qu'il puisse supporter, si l'on augmente encore, il vous dira : j'ai ressenti un peu d'engourdissement dans une main; un autre aura eu une crampe à une jambe; un troisième, la respiration gênée; un quatrième aura senti sa tête lourde, étourdie, etc. Mais pas de vomissements, pas de diarrhée chez aucun d'eux, pas de suppression d'urine, seulement parfois un peu de gastralgie; et ces phénomènes se seront montrés un quart d'heure, une demi-heure, une heure après la dernière dose administrée. (Il est remarquable que les phénomènes de gastralgie, de colique, de diarrhée se manifestent au début de l'administration de cette solution, c'est-à-dire à la dose de 4 à 8 gouttes, lorsque les malades ont l'estomac et les intestins assez délicats pour ne pouvoir pas supporter l'emploi de l'arsenic.) Bien que légers, ces symptômes ont une grande signification, car si l'on ne suspend pas tout de suite le médicament, le lendemain, quoiqu'on n'en ait donné que la même dose, on verra se manifester l'ensemble de tous les symptômes de l'empoisonnement par l'arsenic à haute dose, moins tous les phénomènes d'action directe de l'arsenic sur l'estomac et les intestins : ce sont les symptômes graves de l'absorption de ce poison. Il semble donc qu'il arrive un moment

[illegible] mêlée d'arsenic ; et alors l'addi- [illegible] extrêmement faible, produit l'effet [illegible] Qu'ainsi le malade ait négligé [illegible] pe légère, un peu d'engourdisse- [illegible] médecin, peu expérimenté, n'ait [illegible] cet égard, et le lendemain il sera [illegible] de dans l'état le plus grave : il est [illegible] fondément altérée ; la respiration [illegible] de ; le pouls petit, fréquent, se rele- [illegible] aussitôt ; l'urine est supprimée ; d'ail- [illegible] évacuations alvines.

[illegible] poser à ces accidents ? D'abord le mé- [illegible] veillance attentive de son malade, en pré- [illegible] Mais enfin s'il était assez malheureux pour [illegible] faudrait qu'il sût comment les combattre. La [illegible] sont présentés à notre observation, c'était dans [illegible] entre MM. Orfila et Rognetta au sujet de la [illegible] empoisonnement par l'arsenic. Le premier vou- [illegible] les malades ; le second, qu'on leur donnât des ex- [illegible] etc. Le malade que nous eûmes occasion d'ob- [illegible] figure altérée, le corps couvert d'une sueur froide ; [illegible] par moments, d'autres fois il devenait filiforme ; [illegible] supprimées. Dans cet état nous tirâmes une pa- [illegible] une potion cordiale fut ensuite administrée, et les [illegible] intoxication ne tardèrent pas à disparaître. Nous pen- [illegible] on devra, dans ces circonstances, se conduire d'après [illegible] offerts par le malade. S'il y a de l'excitation, pres- [illegible] petite saignée d'abord ; si la prostration, au contraire, [illegible] phénomène dominant, il faudrait débuter par les cordiaux. [illegible] ne sera hors de danger que lorsque l'émission des urines [illegible] rétablira ; cette émission recommence habituellement au bout [illegible] trois ou quatre heures, et alors le malade entre en convales- [illegible] A propos de cette suppression de l'urine, MM. Orfila et [illegible] gnetta n'étaient pas d'accord. M. Orfila prétendait qu'elle était [illegible] supprimée, M. Rognetta qu'elle continuait. Ils avaient raison [illegible] tous deux. La *sécrétion* de l'urine n'est pas suspendue, mais seu-

lement son *émission;* on peut en acquérir la preuve en sondant les malades.

Le traitement d'une maladie de peau par la liqueur de Fowler doit durer de deux mois, à deux mois et demi. La guérison se reconnaît à un phénomène que nous croyons avoir signalé le premier, au moins dans les affections squameuses: lorsque la médication arsenicale a été suffisamment continuée et convenablement administrée, la surface malade guérie se *colore en brun*, et la peau reprend toute sa souplesse. Cette tache *brune* est un fait capital; elle prouve que le traitement est complet et la guérison aussi parfaite que possible. Il résulte, en effet, de nos observations que si, par une cause quelconque, la maladie récidive, ce qui est malheureusement trop fréquent dans les affections cutanées squameuses chez les ouvriers, c'est plutôt à côté de la tache et non sur la tache elle-même que reparaît la maladie; c'est du moins ce qui arrive le plus souvent. Ces taches, que j'appelle *arsenicales*, ne disparaissent qu'après huit ou dix mois. Cet effet est analogue à celui que produit l'administration de nitrate d'argent, avec cette différence que l'on peut expliquer la coloration dans ce dernier cas par l'action de la lumière, tandis que dans l'espèce il n'y a pas d'explication possible. Toujours est-il que la tache brune arsenicale remplace toute l'étendue de la surface antérieurement malade, et que, sauf la couleur, la peau y reprend sa consistance, sa souplesse, son épaisseur, sa texture et son état primitif.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la liqueur de Fowler doit être suspendue dès qu'il survient un malaise quelconque, un dérangement soit du côté de l'estomac, de la poitrine, des membres, etc. Après trois, quatre, cinq jours de repos, on reprendra la solution à une dose moitié moindre que celle à laquelle on était déjà arrivé, en augmentant ultérieurement les doses de solution dans le rapport où on les avait commencées.

Sous l'influence de cette médication, il peut apparaître une *éruption secondaire* sur les taches arsenicales ou sur les parties de la peau où siége encore la maladie qui est en traitement. Elle consiste en quelques boutons rouges, isolés, papuleux, de la grosseur d'une lentille, qui se multiplient lentement. Ce phénomène, que nous

avons signalé le premier, est commun aussi à l'usage des pommades au goudron et aux alcalins. Si l'on continue alors l'emploi des arsenicaux ou de ces pommades, cette éruption fait des progrès. C'est donc une indication de cesser les uns et les autres. Si le médecin, trompé par une vaine apparence, croit au renouvellement ou à une recrudescence de la maladie qu'il traite, et qu'il veuille augmenter les doses d'arsenic ou de goudron, suivant qu'il emploie l'un ou l'autre, cette éruption intercurrente sera vivement exaspérée. Il devra cesser toute médication active, recourir aux émollients, et en prolonger l'emploi, car la guérison exige un certain laps de temps. On pourrait aussi prendre cette éruption pour des papules syphilitiques, mais il n'en est rien. Enfin nous devons ajouter qu'il n'est pas rare de voir succéder une éruption papuleuse syphilitique dans le cours du traitement des affections squameuses sous l'influence des bains de vapeur et des pommades, et que le diagnostic en devient plus difficile en présence du développement des larges papules dont nous avons signalé l'existence.

Faut-il administrer indistinctement les arsenicaux chez toutes les personnes atteintes de maladies squameuses? Non, sans doute, car ce traitement n'est pas sans inconvénients; il agit sur l'estomac et en général sur l'ensemble de l'économie d'une manière fâcheuse, et tout malade qui l'a suivi s'en va plus ou moins amaigri, le teint jaunâtre et terreux. Il en résulte que tous les malades ne sont pas aptes à supporter cette médication, et qu'il faut un individu fort, doué d'une bonne constitution, d'une bonne poitrine, d'un estomac qui digère bien. En l'absence de ces conditions, on verra survenir de l'anorexie, de la répugnance, du dégoût pour la plupart des aliments, et par suite un amaigrissement plus ou moins prononcé.

Une autre remarque à faire dans l'usage de cette médication, c'est que l'arsenic doit être dosé suivant la force du malade. Chez tel individu, 12 gouttes de solution de Fowler produiront autant d'effet que 16 chez un autre. Un homme délicat, faible, quoique jouissant d'une bonne santé, sera influencé par une dose inférieure d'arsenic, laquelle sera sans effet notable sur un sujet robuste, vigoureux. Nous avons cru remarquer que les femmes supportent au moins aussi bien l'arsenic que les hommes.

n, le régime des malades soumis à l'arsenic doit être réglé
in. Ils devront s'abstenir de toute espèce d'aliments acides,
oûts épicés, etc., et faire usage principalement de viandes
t de légumes. De plus, au début de la médication, on dimi-
a dose des aliments, du pain et de la viande surtout, afin de
r ensuite donner l'alimentation ordinaire lorsque le malade
ibitué à l'arsenic. L'eau ferrée aux repas est un auxiliaire
le.

s sont les effets immédiats et successifs de l'arsenic sur la ma-
ntanée? Supposons qu'ils s'agisse d'un psoriasis et qu'on le
xclusivement par les préparations arsenicales Un psoriasis
éralement constitué par des plaques disséminées, et sur ces
s sont des écailles recouvrant des surfaces rouges au niveau
les la peau est épaissie. Si l'arsenic seul guérit ce psoriasis,
ârrive souvent, ces écailles épidermiques tombent d'abord
ré remplacées par d'autres moins épaisses; la peau diminue
'épaisseur; la couleur rouge tend à devenir moins foncée;
il ne se forme plus de plaques, et la peau cesse d'être proé-
e; elle devient lisse et revêt sa coloration brun grisâtre. Cette
brûne arsenicale se montre quelquefois lorsque la peau
encore, aux points qui étaient malades, la même souplesse
r les parties saines; alors la guérison n'est pas assurée, il
diminuer encore jusqu'à ce qu'on ait obtenu cette souplesse de
i.

dernier mot sur l'emploi des préparations arsenicales. Si vous
lire à une affection squameuse, un psoriasis, par exemple,
date que d'un ou deux ans, vous pouvez espérer de le guérir
liqueur de Fowler. Mais si le psoriasis remonte à dix ou
ans, l'arsenic sera presque toujours impuissant à opérer la
n de l'affection d'une manière radicale; vous devez même
er à son usage, si le malade a été déjà traité par cet agent
ienteux, car sa constitution doit se ressentir plus ou moins
première médication, et ce ne serait pas sans danger qu'on
irait encore. Contentez-vous alors d'un traitement externe.

uelques autres médications employées dans les affections squa-
— L'une d'elles a pour base l'antimoine. Ce métal fournit

peu de composés pharmaceutiques, ou du moins les uns sont peu solubles, et, partant, peu actifs ; les autres sont caustiques et ne peuvent être administrés à l'intérieur. Le plus usité et le plus actif, c'est l'émétique ; mais on sait qu'il est difficile de l'administrer sans provoquer le vomissement. On le donne cependant dans les maladies de la peau de la manière suivante : tous les matins le malade prend 25 milligrammes de tartre stibié avec 2 grammes de crème de tartre entre deux confitures, en même temps qu'il boit un peu d'eau. Cette médication provoque souvent, les premiers jours, quelques nausées, mais la tolérance s'établit en général assez promptement en ce sens que les vomissements cessent ; cependant il est rare que le malade n'ait pas une ou deux garderobes par jour, ce qui prouve que le médicament est peu absorbé. On donne cette préparation aussi longtemps que l'arsenic, c'est-à-dire deux ou trois mois, et quelquefois elle guérit quand l'arsenic a été impuissant : c'est même seulement alors qu'il convient de l'employer, car la méthode antimoniale généralisée réussit peu. Nous l'avons souvent mise en usage ; les succès que nous en avons obtenus sont assez peu nombreux pour que nous ne la préconisions qu'à défaut de succès des préparations arsenicales. On ne peut l'administrer qu'à des sujets forts, bien constitués et chez lesquels il n'existe pas d'affection intestinale chronique ou même de susceptibilité des intestins.

Depuis huit à dix mois que je recherche les effets thérapeutiques de l'*hydrocotile asiatica* dans la lèpre et dans d'autres maladies, je ne l'ai appliqué qu'une seule fois au traitement du psoriasis. Cinq semaines seulement sont écoulées depuis son usage, et j'en obtiens chez ce malade une amélioration notable ; ira-t-elle jusqu'à la guérison, c'est ce que je serai à même de faire connaître à l'article Psoriasis. (Voyez cette maladie.)

Médications externes très usitées dans les affections squameuses. — Goudron. — Huile de cade. — Le goudron est un des moyens les plus propres à faire disparaître les affections squameuses ; aussi est-il très fréquemment employé. Il ne procure que des guérisons superficielles. Les malades ne sont que *blanchis*, ainsi qu'ils le disent, et la récidive est presque inévitable dans un délai assez court. Il faut autre chose qu'une médication topique pour obtenir une guérison

un peu durable. Il faut, par un traitement interne, imprimer à toute l'économie une modification profonde, afin de détruire, s'il est possible, la cause inconnue de ces éruptions cutanées. Cependant le médecin est heureux, dans un très grand nombre de cas, et lorsque l'état général du malade ne permet pas un traitement interne, d'avoir à sa disposition un agent aussi puissant que le goudron. Voici comment on l'administre. On commence par une pommade au 20e de son poids de goudron, puis au 10e; après un mois, six semaines, on la fait préparer au 5e. Chez quelques malades on arrive à se servir de parties égales de goudron et d'axonge, et même du goudron pur dans des cas de psoriasis très anciens.

Par l'action de ces pommades, largement étendues, l'épiderme se ramollit, les écailles tombent, la peau épaissie devient plus mince; puis, s'il s'agit d'un psoriasis nummulaire ou circiné, c'est le centre qui guérit le premier; s'il est diffus, c'est le contraire. L'usage de la pommade au goudron peut provoquer, ainsi que nous l'avons dit, les mêmes éruptions secondaires que l'arsenic; on doit alors y renoncer et employer les bains simples, la pommade blanche, c'est-à-dire la graisse pure, etc. Le traitement ordinaire par le goudron dure de six semaines à deux mois et demi. Si en même temps qu'on emploie le goudron à l'extérieur, on donne l'arsenic intérieurement, il faut moins de temps pour obtenir la guérison. Le traitement sera encore plus efficace si l'on y joint, trois fois par semaine, des bains de vapeur à une température simplement suffisante pour faire transpirer le malade. Mais avec l'association du traitement interne au traitement externe on a des *guérisons moins sûres*.

J'ai voulu savoir si le goudron pouvait guérir les affections squameuses par son administration à l'intérieur. Je me suis servi d'un sirop préparé par M. Dublanc qui, à l'aide d'une certaine manière d'opérer, obtient un sirop très chargé de goudron. Ma tentative a eu lieu chez une jeune fille qui était atteinte de psoriasis de date assez récente, et qui se trouvait par conséquent dans les conditions les plus favorables de guérison. Or je n'ai rien obtenu, et l'arsenic a fait justice de sa maladie. L'action du goudron est donc toute locale. Elle a pris par jour jusqu'à 80 centigr. de goudron.

L'huile de cade produit les mêmes effets que le goudron. Elle est

employée dans les mêmes conditions et à même dose ; cependant à l'égard de celle-ci nous avons remarqué qu'il fallait souvent débuter par des pommades moins fortes.

Nous avons reconnu, l'un des premiers, que cette huile guérissait aussi bien que le goudron. Quelques médecins, frappés des bons effets de ce médicament à l'extérieur, ont eu la pensée de l'administrer à l'intérieur sous forme pilulaire ; mais en même temps qu'ils le donnaient intérieurement, ils le prescrivaient aussi à l'extérieur, de sorte qu'ils se sont fait illusion. J'ai en vain cherché à obtenir la guérison des affections squameuses par l'administration *intérieure et seule* de cette huile ; j'ai dû renoncer à son emploi de cette manière et la regarder comme inutile.

Le goudron et l'huile de cade ne peuvent guérir qu'à la condition d'être employés très largement ; il faut que le malade conserve longtemps la même chemise et les mêmes draps, afin qu'il reste constamment dans une atmosphère de goudron ou d'huile.

Il n'est pas très rare de rencontrer des cas de psoriasis ou de lèpre vulgaire qui, loin de se guérir, sont au contraire exaspérés par le goudron et l'huile de cade ; alors les pommades alcalines, celle au précipité blanc à la dose de 4 grammes pour 30 d'axonge, produisent quelquefois les meil eurs résultats. La pommade au précipité blanc a néanmoins un inconvénient : c'est que si on l'emploie sur une large surface, elle est absorbée en quantité notable et produit une salivation d'autant plus abondante que la pommade reste longtemps sur la peau, car l'absorption continue, même après qu'on a cessé d'en faire usage, si l'on ne prend pas soin de faire laver la peau au savon noir aussitôt que les accidents se montrent. Chez ces malades il faut se hâter de donner des bains de Baréges, des bains alcalins ou savonneux.

Ajoutons que les pommades, quelles qu'elles soient, ne guérissent qu'à la condition de graisser largement, non-seulement les plaques malades, mais toute la peau. Le malade doit coucher longtemps avec la même chemise et les mêmes draps. Ceci est désagréable en hiver ; car, indépendamment de la mauvaise odeur qu'ils répandent, les chemises, les draps, sont toujours froids, la graisse étant un bon conducteur du calorique. En outre, les pommades ta-

ant le linge : les taches de goudron ne sont jamais enlevées à la sive. Enfin, un malade graissé de goudron ou d'huile de cade pand autour de lui une forte odeur de ces substances, et il lui rient difficile d'aller dans le monde pendant toute la durée son traitement ; ce qui fait souvent repousser l'emploi de ces ents.

Enfin, ces divers moyens externes ne peuvent être mis en usage s le concours de bains ; les bains de vapeur, quand le malade st les supporter, et, à défaut de ces bains, les bains alcalins.

Au surplus nous indiquerons avec soin l'ensemble de cette thé- peutique spéciale, quand nous ferons l'histoire de chacune de ces ladies.

Quand un malade a été guéri d'une affection cutanée de ce genre, mporte, pour le mettre à l'abri des récidives, qu'il se soumette à hygiène convenable. Les auteurs, moins pénétrés que nous t-être de l'importance des préceptes hygiéniques, ou peu con- ts dans leur efficacité, n'ont pas, à notre avis, assez insisté sur point. Nous sommes convaincu, pour notre compte, que, dans lpse aisée surtout, on peut, à l'aide d'un traitement prophylac- ie, éviter souvent le retour d'une maladie cutanée. Voici les pens que nous conseillons de mettre en usage contre les affec- s squameuses.

i c'est en hiver, le malade prendra un bain de vapeur par se- ine. S il n'a pas la facilité de prendre des bains de vapeur, il les placera par des bains savonneux ou des bains alcalins. De plus, ir en se couchant, et une fois par semaine, il se graissera la n avec du saindoux. Quand la saison le permettra, on devra s usage de quelques moyens hydrothérapiques. Ainsi, le matin, que le malade est éveillé, on le fait placer pieds nus dans un pat de quelques centimètres de profondeur seulement ; à côté ui, une large cuvette remplie d'eau à la température ordinaire la chambre et une forte éponge. Il promène cette éponge large- et mouillée sur son corps des pieds vers le ventre, des mains vers poitrine ; il mouille la poitrine et le ventre ; puis il fait couler de n le long du dos, en exprimant l'éponge derrière le cou. Tout n doit être fait dans l'espace de quelques secondes. Le malade

s'essuie rapidement avec une serviette rude, s'habille et fait une course pour provoquer la réaction.

C'est par ces moyens fort simples qu'on entretient les fonctions de la peau, et, en les continuant durant longtemps et en revenant souvent, il est rare qu'on voie survenir une récidive.

V. Médications composées ou mixtes.

Je désigne sous ce nom des médications dans lesquelles je fais entrer plusieurs éléments médicamenteux qui tous concourent à un but commun, tout en agissant isolément, en raison de leur nature propre. Les anciens faisaient grand cas de ces mélanges, mais ils en ont porté l'emploi jusqu'à l'abus ; et comme la chimie n'était pas encore à l'état de science, ils associaient des substances qui, par leur combinaison, changeaient de nature et devenaient le plus souvent inertes. Il est vrai de dire que les anciens, qui avaient une grande confiance dans les mixtures ou mélanges de médicaments tirés du règne végétal, n'ont eu le plus souvent d'inconvénients réels de ces associations que par le nombre des agents employés avec lesquels ils formulaient des apozèmes, des électuaires, etc.

L'école de Broussais, en posant les bases d'une médecine nouvelle, contribua puissamment à détruire l'art ancien de formuler. Cette école a eu son temps ; comme elle avait fait table rase, on a cru devoir réédifier la médecine et la faire reposer sur la statistique, en ne tenant aucun compte des observations recueillies dans les siècles passés. Bientôt aussi il a fallu refaire la thérapeutique, et l'on est ainsi arrivé à un excès opposé en expérimentant les agents médicamenteux les uns après les autres, et en repoussant leur administration simultanée. L'art de formuler est alors tombé dans l'oubli le plus complet. Depuis quelques années seulement les médecins reviennent à des formules un peu plus composées ; malgré les progrès de la chimie, ils retombent parfois encore aujourd'hui dans les fautes reprochées aux anciens, car il n'est pas rare de trouver dans nos formulaires bon nombre de substances qui sont alliées entre elles et qui se décomposent.

Quoi qu'il en soit, la tendance *du jour* est aux médications com-

osées, et je suis heureux d'avoir été des premiers à entrer dans ette voie. Mais ce ne sont pas les médicaments composés que j'emploie. Ainsi prenant pour point de départ ce fait que l'iode est un atisyphilitique comme le mercure, on s'empresse de prescrire le roto-iodure de mercure, comme représentant les deux éléments et omme devant agir en vertu de l'iode qu'il renferme et du mercure u'il contient, de même pour l'iodure de potassium et pour le ichlorure de mercure dont on fait une combinaison dans la pensée ue ce sel agira par ses deux éléments, etc., et l'on ne réfléchit pas ue ce sont là des combinaisons semblables à celles des acides et es bases dans lesquelles les éléments se neutralisent plus ou moins omplétement. Quant à nous, nous mêlons les substances ensemble, nous les formulons dans leur état primitif de manière à ce qu'elles ssent isolément quoique mêlées, différence énorme et qui n'a as de rapports avec ce que l'on fait aujourd'hui. Voici quelle est, à et égard, notre manière de voir. Une substance donnée combattra vec avantage une maladie, mais elle ne la guérira pas toujours. Une autre, d'une nature différente, employée contre la même ffection, amènera des résultats semblables. Toutes deux ont donc ne certaine valeur. Nous nous sommes demandé si les deux substances réunies ne pourraient pas avoir plus d'action que lors de leur administration isolée, et l'expérience a confirmé nos prévisions. Les premiers essais en ce genre ont été faits à l'égard des accidents syphilitiques secondaires et tertiaires; et, tandis que les praticiens donnaient d'abord le mercure, puis, en cas d'insuccès, l'iodure de potassium, j'administrais, il y a dix-huit ans environ, l'un et l'autre, et j'arrivais à ce résultat fort remarquable, qu'il me fallait des doses beaucoup plus faibles de ces deux agents réunis pour obtenir des guérisons plus promptes. C'est surtout à mon entrée à l'hôpital Saint-Louis, il y a dix-sept ans, que j'ai pu mettre ette idée en pratique sur une grande échelle. Pour les maladies syphilitiques j'ai associé les préparations mercurielles à l'iode, au fer, à l'arsenic, aux sudorifiques et à l'opium.

Bientôt j'ai étendu ces sortes d'associations à des affections plus rebelles encore, les maladies scrofuleuses; et tandis que l'on employait isolément l'iode, l'huile de foie de morue, les amers, les

antiscorbutiques, je suis arrivé à réunir ces substances en un traitement composé qui, depuis cinq ans, est suivi de succès si nombreux, qu'aujourd'hui je ne désespère d'aucun scrofuleux, surtout d'aucune affection scrofuleuse de la peau. Je vais poser ici les principes de ces médications composées dont, j'en suis sûr, les praticiens pourront tirer grand parti.

Dans les éruptions simples secondaires de la syphilis, je me borne à administrer les tisanes sudorifiques, l'iodure de potassium et le sublimé associé à l'opium. A cet effet, je fais préparer une solution de 10 grammes d'iodure de potassium pour 500 grammes d'eau, dont je fais mettre une cuillerée à bouche dans une tasse de tisane sudorifique prise le matin et le soir. Une heure après, je fais prendre au malade le sublimé à l'état pilulaire, associé à l'extrait de gaiac et à l'opium, chaque pilule contenant de 4 à 6 milligrammes de sublimé, suivant l'âge et la force du malade; jamais je ne dépasse cette dernière dose: d'où il suit que le malade prend par jour 5 décigrammes d'iodure de potassium et 8 à 12 milligrammes de sublimé. Il est rare que je sois obligé d'interrompre le traitement à cause d'accidents. Jamais de salivation. Si l'anorexie survient, c'est par la concentration de la tisane qui fatigue l'estomac, et non par les doses d'iodure ou de préparation mercurielle. Mais, dira-t-on, le sublimé de vos pilules va être transformé en iodhydrate de chlorure mercurique par l'iodure de potassium de la tisane; cela est vrai. Mais d'abord la décomposition va se faire dans l'estomac ou dans l'intestin au moment de l'absorption; le sel qui en résultera sera soluble et facilement absorbé; ensuite il n'y aura peut-être que la dixième partie de l'iodure de potassium qui servira à la combinaison, les neuf dixièmes restant agiront comme iodure de potassium. Voilà la différence énorme qui sépare nos formules de celles que je combats.

La même pensée a encore fait naître l'engouement si fâcheux et si généralement partagé pour le proto-iodure de mercure; c'est là une substance dont la préparation n'est pas stable, elle n'est pas identique dans les pharmacies: aussi combien de fois ne donne-t-elle pas lieu à des accidents. Il suffit, en effet, qu'elle soit mal lavée pour qu'elle contienne, ou du sublimé, ou de l'iodure de potas-

sium. D'ailleurs elle est insoluble, il est par conséquent impossible d'en mesurer l'absorption ; aussi est-on souvent obligé de donner ce sel à des doses énormes, 5, 10, 15, 20 centigrammes par jour. Mais telles sont la patience et la foi de quelques praticiens en ce médicament, que je l'ai vu administrer à des malades pendant un an de suite et sans interruption, malgré son inefficacité dans le cas particulier. Le même engouement a existé pour l'iodure de potassium dont on a fait abus en portant la dose de son administration à 2, 4, 6 et 10 grammes par jour. Aussi que de gastralgies difficilement curables n'a-t-on pas developpées à cette dose ! Quand un malade rend un médicament par les urines, c'est que l'économie en est saturée ; c'est que l'agent thérapeutique produit tout l'effet qu'il doit produire, sauf l'action locale qu'il peut exercer durant son contact avec l'estomac. Or un malade qui prend l'iodure de potassium a la dose de 5 décigrammes à 75 centigrammes rend tous les jours de l'iodure de potassium par les urines.

C'est d'après les mêmes idées que je formule encore un sirop dans lequel entrent pour 500 grammes, 10 grammes d'iodure de potassium, 15 à 18 centigrammes de sublimé, et 35 centigrammes d'extrait thébaïque. Le malade prend une cuillerée à bouche de ce sirop matin et soir, dans un verre de tisane sudorifique.

S'agit-il d'une forme syphilitique scrofuleuse, je donne l'huile de foie de morue préalablement à un verre de tisane additionnée d'une cuillerée à bouche de sirop mercuriel et ioduré. Le sujet est-il débilité, je fais prendre des pilules ferrugineuses dans le cours de la journée et je fais boire de l'eau ferrugineuse aux repas. Enfin, dans les accidents tertiaires de la syphilis où les os sont malades, je joins l'arsenic à ces préparations, en faisant composer un sirop dans lequel entre l'iodure de fer, l'iodure de potassium, le bichlorure de mercure et la solution de Fowler. (Voyez *Formulaire.*)

Ces médicaments composés se prêtent merveilleusement au traitement de la scrofule et des maladies de la peau à forme scrofuleuse et syphilitique à la fois. Ainsi, dans la scrofule, je ne donne jamais l'huile de foie de morue sans vin de gentiane et sans sirop d'iodure de fer, le tout battu ensemble, mélange après lequel je fais prendre une tasse de tisane d'houblon ou de décoction de

feuilles de noyer. Souvent aussi j'introduis dans la composition du sirop d'iodure de fer que je fais préparer extemporanément, c'est-à-dire en combinant directement le fer à l'iode (voy. *Formulaire*, PRÉPARATION), une certaine quantité d'iode libre et d'iodure de potassium : ainsi, 5 à 10 centigrammes d'iode pour 500 grammes de sirop et 6 à 8 grammes d'iodure de potassium pour la même dose. La base de mon traitement de la scrofule, c'est la réunion des tisanes amères, du vin de gentiane, de l'huile de foie de morue et de l'iodure de fer, une cuillerée à bouche, matin et soir, de chacun d'eux. J'augmente la dose de l'huile en laissant subsister celle du vin de gentiane et du sirop d'iodure de fer; je porte la dose de l'huile à 4 et 6 cuillerées à bouche par jour, en progressant d'une cuillerée tous les trois jours pour les engorgements ordinaires avec ou sans abcès. S'il s'agit d'une carie, j'y ajoute l'iodure de potassium et l'iode; s'il s'agit d'un lupus, j'augmente la dose d'huile jusqu'à 8 à 10 cuillerées par jour. J'ai renoncé à ces doses exagérées d'huile que j'employais autrefois, 12, 16 cuillerées par jour; elles n'amènent pas de résultats plus prompts, elles fatiguent l'estomac, elles causent des diarrhées qui obligent à suspendre l'emploi des médicaments.

Ces doses sont celles qui conviennent dans l'adolescence ou dans la jeunesse ; elles seraient trop fortes pour des enfants.

Souvent aussi je joins à ces médicaments l'usage d'une liqueur alcoolique à principes amers, telle que celle de M. Demaulon, pharmacien à Compiègne, que j'ai déjà préconisée et qui a pour base toutes substances végétales à principes amers, ou bien le sirop antiscorbutique. C'est au médecin à choisir entre le vin de gentiane, le sirop antiscorbutique et la liqueur alcoolique que je viens de citer.

Cette thérapeutique d'ensemble, dans laquelle je suis entré depuis un certain nombre d'années, me donne de tels succès qu'aujourd'hui je ne repousse aucun scrofuleux de mon service, et que j'aborde avec le plus grand succès un grand nombre de ces maladies que les chirurgiens ont qualifiées de *noli me tangere*, maladies que je guéris dans l'espace de quelques mois. Je pourrais, à cet égard, invoquer le témoignage de plusieurs de mes collègues des

hôpitaux dont les noms font autorité dans la science. J'avoue qu'il ne s'agit pas d'un emploi de quelques semaines ; ce n'est pas dans un laps de temps pareil qu'on peut modifier l'économie, et apporter des changements dans le tempérament et la constitution du malade. Il faut de la persévérance de la part de ce dernier et de la part du médecin.

Toute maladie de la peau assise sur un sujet d'un tempérament lymphatique très prononcé, et portant elle-même le cachet de la forme plus ou moins scrofuleuse, doit être traitée de la même manière, sauf à ne pas employer les antiscrofuleux à une dose aussi élevée.

Comme on le voit, c'est une idée spéciale qui m'a dirigé dans l'emploi d'une thérapeutique que je puis appeler nouvelle. Lorsque l'on a préconisé l'iode contre la scrofule, l'iodure de potassium contre la syphilis, on a donné plus tard la préférence à tous les composés mercuriels qui contenaient de l'iode, parce que l'on supposait que ces composés devaient avoir une action double en raison des éléments qui les constituaient ; mais on n'a pas fait attention que l'on était réduit à donner de faibles préparations de ces iodures ; que, par conséquent, l'iode de l'iodure de potassium devait jouer dans l'économie un rôle insignifiant.

Pour moi, je crois que si les anciens ont introduit dans la pharmacie des agglomérations de substances dont on ne peut plus apprécier les effets, s'ils sont allés jusqu'à l'excès, les médecins modernes sont entrés dans un excès contraire ; mais ces excès des anciens ne détruisent pas pour cela les propriétés de catégories de médicaments simples dont l'expérience a démontré l'efficacité : il faut donc y revenir. Dans nos médications mixtes je ne recherche pas des combinaisons nouvelles, des composés nouveaux jouissant de propriétés particulières, je les évite, au contraire ; je donne plusieurs substances à la fois dont l'efficacité isolée est déjà reconnue par tout le monde, et je les associe de manière qu'elles conservent leur nature sans subir aucune décomposition, afin d'agir comme si on les donnait seules.

Que l'on parcoure les travaux si conscencieux de Baudelocque, de Guersant père, sur les antiscrofuleux ; ceux même des syphilio-

graphes modernes sur le mercure et l'iodure de potassium, et l'on aura pour résultat statistique de l'iode, de l'hydrochlorate de baryte, de la décoction de feuilles de noyer, des antiscorbutiques : un tiers de malades guéris, un tiers de malades soulagés, et un tiers d'insuccès. On verra les médecins français, après avoir épuisé l'action du mercure, arriver à l'iodure de potassium, et les médecins anglais à l'arsenic. Qu'est-ce que tous ces résultats démontrent? C'est que chacun de ces médicaments a une efficacité réelle, mais limitée quand on les donne isolément. Pourquoi donc ne pas les grouper, les réunir, les doser de manière à ne pas nuire, afin d'obtenir un effet multiple, alors qu'il s'agit d'accidents secondaires et tertiaires ou de degrés divers de formes scrofuleuses qui se rattachent toujours à une date fort ancienne? Ne peut-on pas dire de la scrofule et des maladies cutanées qui en dérivent, qu'elles sont simples ou constitutionnelles, qu'elles sont secondaires ou tertiaires ?

Ces deux ordres de maladies se rapprochent tellement l'un de l'autre, que la syphilis se transforme certainement en scrofule. La syphilis héréditaire qui se développe vers l'age de huit à dix ans est toujours à forme scrofuleuse, et sous ce rapport nous n'hésitons pas à penser que la plupart des enfants scrofuleux descendent d'aïeuls ou de bisaïeuls syphilitiques. Les faits depuis la publication de la première édition de cet ouvrage sont tellement venus confirmer nos prévisions, que nous faisons aujourd'hui un chapitre à part des scrofules syphilitiques.

VI. Bains, eaux minérales, bains de mer, douches.

Nous croyons devoir consacrer un chapitre spécial à l'ensemble des bains, des eaux minérales et des bains de mer, comme les agents les plus puissants pour combattre les maladies de la peau ; et non-seulement nous le ferons sous ce rapport, mais encore parce qu'il a été fort peu écrit sur les bains de vapeur, les douches; que la généralité des médecins se borne à prescrire l'usage des eaux sans pouvoir donner à leurs malades aucune indication précise, laissant ainsi aux médecins de chaque établissement d'eau minérale la direction

entière du mode d'administration. Sans blâmer cette conduite d'une manière absolue, nous dirons que le médecin qui connaît son malade doit au moins fournir quelques indications spéciales, et c'est sous ce point de vue que nous nous arrêterons aux considérations suivantes.

1° *Bains aqueux.*

Un bain aqueux agit de trois manières, par le liquide qui le constitue, par la température de ce liquide, et par la durée du bain. Sous le premier rapport, l'eau est absorbée ainsi que les éléments qu'elle tient en dissolution. L'absorption est démontrée par ce fait, que quelques personnes urinent six, sept ou huit fois dans un bain d'une heure à une heure et demie, quoiqu'elles aient vidé la vessie avant d'y entrer. Toutefois ce phénomène est très variable suivant les sujets, parce qu'il est telle organisation de la peau dans laquelle l'absorption est très rapide, tandis qu'il est des peaux sèches qui n'absorbent que peu, comme elles ne transpirent presque jamais.

L'absorption des substances mises en dissolution dans l'eau est évidente dans les bains médicamenteux, comme dans ceux au sublimé corrosif à l'aide desquels on peut faire faire un traitement mercuriel très complet et guérir une syphilis constitutionnelle, tout aussi bien qu'en administrant le sublimé à l'intérieur. Les bains alcalins, ceux de Vichy par exemple, en fournissent encore une preuve très tranchée : de sorte que l'on peut établir en thèse générale, que toute eau composée, artificielle ou naturelle, comme les eaux minérales sulfureuses, alcalines, salines, ferrugineuses, etc., ne borne pas ses effets à l'action qu'elle exerce sur la peau comme sedatif, astringent, excitant ou tonique du tissu cutané, mais qu'elle étend son action à toute l'économie par le transport dans le sang des éléments médicamenteux qu'elle renferme.

On trouve dans les plantes une analogie d'absorption qui vient appuyer cette proposition. Prenez une plante, quelle qu'elle soit ; arrosez-la avec une solution saline ajoutée à l'eau dans des proportions telles qu'elle ne puisse pas nuire à la végétation, et vous retrouverez dans le végétal et dans tous ses produits, feuilles, fleurs et fruits, la substance avec laquelle vous l'avez arrosée. C'est ainsi

qu'on obtient du raisin salé, en arrosant la terre où végète la vigne avec de l'eau et du sel. Le sulfate de fer, si préconisé pour la végétation, agit sur les végétaux, que j'appellerai chlorotiques ou végétant mal, comme il agit sur l'homme. Les poisons solubles sont eux-mêmes absorbés par les végétaux.

Ainsi tout médecin qui compose un bain, qui prescrit une eau minérale, doit, avant tout, se pénétrer de ces idées et tenir compte de la composition de l'eau au point de vue de l'absorption.

Mais un bain aqueux n'agit pas seulement en raison de la composition de l'eau, il agit encore en raison de sa température, et celle-ci a une influence très puissante sur le sujet qui en fait usage. Entre un bain très chaud dans lequel on immerge un enfant menacé de congestion cérébrale, et le bain froid dans lequel se jette l'individu en pleine sueur dans le traitement hydrothérapique, il y a une distance immense et des effets tout différents.

Tout bain d'eau qui a une chaleur agréable pour celui qui y est immergé, c'est-à-dire à une température de 32 à 35 degrés (26 à 28 degrés Réaumur), est un bain émollient, antiphlogistique; plus chaud, il active la circulation; plus chaud encore, il donne une grande impulsion aux battements du cœur et amène une certaine congestion à la tête et aux poumons, de sorte que l'individu qui meurt dans un bain trop chaud succombe à une congestion pulmonaire et cérébrale.

Le bain plus froid que la température moyenne indiquée ci-dessus est un bain sédatif pour les sujets chez lesquels il existe une grande activité de la circulation; aussi ces personnes réchauffent leur bain par leur température propre, ainsi qu'elles le disent communément et avec beaucoup de sens.

Le bain plus froid encore, c'est-à-dire à une température de 20 à 25 degrés centigrades, devient tonique, excitant, à la condition qu'on y reste peu de temps; à une plus basse température il amène, comme le bain chaud, des congestions pulmonaires et cérébrales, mais par un autre mode d'action, c'est-à-dire en supprimant la circulation capillaire excentrique et en refoulant pour ainsi dire le sang au dedans.

Si ces bains froids sont employés pour un individu en pleine

. c'est que la sueur provoquée par les linges mouillés et l'eau a une action sédative, et que par l'immersion de quelques les dans l'eau froide on procure une réaction qui ranime les des malades. Le contact instantané de l'eau froide procure ce it ; le contact prolongé pourrait amener la mort en refoulant s poumons et le cerveau le sang porté à la périphérie.

empérature d'un bain ne peut être que très difficilement pres- ar un médecin quand il s'agit d'un bain tempéré, que j'ap- ain antiphlogistique : elle est toujours relative au sujet. Le it, suivant moi, réellement antiphlogistique quand sa tempé- est *agréable* à celui qui en fait usage.

lurée du bain, comme on a déjà pu le voir, a une grande in- e en thérapeutique ; cette influence est tout à fait relative. En bains ordinaires, il est des personnes pour lesquelles un bain ire prolongé pendant plus d'une demi-heure devient un bain ant. Dans ce cas, le bain d'une demi-heure de durée équi- . un bain d'une heure pour la généralité des individus. Les ines d'un tempérament bilieux ou bilioso-sanguin prennent mment des bains de deux et de trois heures sans en être le du monde affaiblies, tandis que des personnes lymphatiques portent pas une heure de bain sans en être affaiblies. A durée un bain chaud est beaucoup plus débilitant qu'un bain ré. Un bain froid de rivière, par exemple, de quinze à vingt es de durée, est un bain tonique, à la condition que l'in- i sait nager ; car il suffit d'un séjour de huit à dix minutes l'eau de rivière pour obtenir le même résultat dans le cas ire.

bains froids de rivière prolongés pendant deux et trois s, même avec natation, sont essentiellement débilitants, et, es personnes d'un tempérament lymphatico-sanguin, ils pré- ent aux rhumatismes, si même ils ne les procurent.

ites ces données subissent nécessairement des modifications l il s'agit de bains composés artificiels ou de bains de sources rales. La durée moyenne d'un bain minéral est de trois quarts ire à une heure, mais dans quelques cas on prolonge ce temps ison de la nature de l'eau et des habitudes de la localité, der-

nière circonstance qui est née de l'expérience acquise. En thèse générale, on supporte beaucoup plus longtemps un bain de *piscine* qu'un bain de baignoire, puisque dans les piscines de Louesche, par exemple, on y reste tous les jours durant trois, cinq et sept heures consécutives.

Les bains à eau courante permettent toujours un séjour plus long que les bains à eau dormante; les bains à eau courante ont une action toute spéciale sur la peau que n'ont pas les bains à eau dormante. Quelle est cette action? Nous ne saurions la préciser d'une manière positive. S'exerce-t-elle par le fait du frottement de l'eau sur la peau ou par la soustraction plus rapide de calorique, en multipliant les points de contact du liquide? C'est ce que nous ne saurions dire; mais toujours est-il que cette action est beaucoup plus énergique. Ainsi il n'y a pas de comparaison à établir entre un bain de siége ordinaire et un bain de siége hydrothérapique ou à irrigation circulaire. Il en est de même pour les bains en baignoire comparés à ceux en piscine ou en rivière. A Bagnères-de-Bigorre il existe une piscine dans laquelle l'eau se renouvelle presque à flots. Cette piscine est constamment occupée par les baigneurs, et si cette préférence est si marquée, c'est que cette sorte de bains combat avec beaucoup plus d'avantage les névralgies contre lesquelles on dirige son emploi. L'eau qui s'y écoule est d'ailleurs de même nature que celle du grand établissement.

En résumé, quand le médecin prescrit un bain à un malade, il faut, en raison de l'espèce de bain et en raison de l'état du malade, qu'il précise les conditions du bain. Nous aurons le soin de rappeler quelques-unes de ces conditions quand nous ferons l'histoire particulière de chacune des affections de la peau.

2° *Douches liquides.*

Elles sont de deux sortes: douches en jet, douches en arrosoir. La douche en jet est celle qui s'écoule d'un ajutage en jet unique; mais son volume peut varier depuis le diamètre le plus fin jusqu'au diamètre de 8 à 10 centimètres, et alors la douche prend le nom de *flot*, ainsi qu'on le dit en hydrothérapie. Il est évident qu'une masse

si considérable d'eau constitue plutôt un écoulement qu'une
iche : car une douche suppose une chute d'eau d'une hauteur
s ou moins grande, mais conservant dans tout son parcours la
me d'une petite colonne d'eau ; et le flot tantôt tombe en nappe
ne grande hauteur, tantôt il s'échappe sous forme d'écoulement
n réservoir peu élevé, sans quoi il serait impossible de supporter
percussion. En général, le jet d'une douche varie entre un
mètre de 2 à 3 millimètres et un diamètre de 1 centimètre
lemi.

es douches en arrosoir constituent une série de jets plus ou
ins fins qui s'échappent à la fois du même ajutage.

l existe, soit dans les établissements d'eaux minérales, soit dans
établissements créés à Paris, dans les hôpitaux ou dans la ville,
a peu de douches en jet ou en arrosoir qui remplissent les condi-
ls que l'on devrait y trouver, c'est-à-dire un jet non vrillé, non
isé, conservant toujours son même diamètre à une distance de
mètre et dont la circonférence représente par son poli la netteté
miroir. Cela tient à la difficulté de percer la douille du robinet,
i la forme que l'on donne au trou d'écoulement. Quand on voit
couler l'eau des tonneaux des porteurs d'eau de Paris, on est
erveillé de la pureté du jet d'écoulement, et si l'on entre dans
établissement de bains, on n'y trouve que des douilles mal faites
loin d'atteindre la perfection des ajutages de ces tonneaux. Ceci
nt paraître bien puéril ou au moins bien minutieux à l'égard de
dministration des douches, et cependant nous allons en faire
tir toute l'importance, afin d'engager les médecins inspecteurs
aux minérales à apporter des perfectionnements dans leurs in-
uments d'administration des eaux.

Une douche liquide a deux genres tout à fait différents d'action :
Elle exerce une influence donnée, par la nature de l'eau qu'elle
nale. 2 En dehors de cette circonstance son action est toute dif-
rente, suivant qu'il s'agit d'une douche en jet ou d'une douche
l'arrosoir.

Il faut avoir fait usage de ces agents thérapeutiques pour en bien
tir l'importance. La douche en jet produit sur la peau la sensa-
n du marteau qui la percuterait : sous ce rapport, elle est destinée

à éteindre la sensibilité : aussi convient-elle dans les névralgies et dans la surexcitation nerveuse de la peau, comme celle qui résulte d'une phlébite. — La douche en arrosoir stimule, au contraire, la peau, elle la pique, la larde ; quand elle est forte, c'est autant de coups d'épingle qui surexcitent la peau au point d'y amener de la douleur. Cette sorte de douche convient donc surtout dans les paralysies. Cette distinction, qui jusqu'alors n'a jamais été faite dans les effets des douches, est d'une grande importance, et l'on conçoit qu'il faille de bons instruments pour la produire : car si le jet crache, comme on le dit ; si les petits jets qui sortent de l'arrosoir s'entre-croisent, s'entre-détruisent, se rompent et se réunissent dans leur trajet, il n'y a plus rien de semblable, la douche est inutile. On se figure généralement que l'arrosoir doit avoir un grand diamètre pour donner beaucoup de jets, c'est une erreur ; avec une très petite surface, celle de 2 à 3 centimètres, on peut satisfaire à tous les besoins.

En supposant les ajutages bien faits, il faut qu'une douche ait une grande hauteur et que son réservoir ait une forme donnée. Une douche dont le réservoir est à 6 mètres de hauteur est une douche d'une puissance ordinaire : mais aussitôt que l'on dépasse cette distance, on acquiert tout de suite une grande force : 10 mètres constituent déjà une grande action. Ce qui importe surtout, c'est que le réservoir ait sa capacité en hauteur et non pas en largeur.

Au surplus, avec les douches les plus fortes on peut donner les douches les plus faibles ; il suffit pour cela d'ouvrir au quart ou à moitié le robinet de la douche : de sorte qu'il y a un grand avantage à établir un réservoir à une grande hauteur. Le médecin a si souvent occasion de prescrire l'usage de ces moyens, que nous avons cru devoir lui faire connaître ces détails. Il y a d'ailleurs plusieurs manières de les prescrire. Ou on les donne seules et sans bain, c'est-à-dire le malade étant nu et assis sur une chaise, ou étendu dans une baignoire dont on laisse écouler l'eau, et alors on doit faire habiller immédiatement le malade et lui faire faire une marche un peu rapide, s'il peut l'exécuter, afin de soutenir l'action excitante de la douche. Ou, au contraire, on a affaire à des sujets nerveux, exci-

tables, et l'on craint de développer chez eux une surexcitation trop vive; dans ce cas il faut les faire doucher, recevoir l'eau de la douche dans la baignoire, et faire couler aussitôt un bain simple dans lequel le malade séjourne une demi-heure pour diminuer la surexcitation causée par la douche. En effet, toute douche donne toujours lieu à un certain ébranlement du système nerveux, que le bain calme immédiatement.

Mais la douche peut être locale ou générale. Lorsqu'elle doit être locale, on a un puissant intérêt à garantir quelquefois les autres parties du corps du contact de l'eau, surtout en hiver. D'ailleurs il arrive souvent que, faisant doucher la figure avec une douche froide, on fait en même temps placer le malade dans un demi-bain très chaud pour appeler le sang aux extrémités. Dans ces sortes de cas, on garantit efficacement le malade à l'aide d'un petit manteau de taffetas gommé. Dans les établissements de bains il existe divers instruments propres à préserver certaines parties du corps de l'eau de la douche: des éventails de bois pour la figure, quand la douche est donnée sur les épaules, ou d'autres écrans analogues. Un moyen que nous préconisons souvent dans les cas de couperose où la douche est reçue en pleine figure, c'est un ajutage de caoutchouc qui s'adapte à la bouche et qui se termine par un tuyau un peu long et un peu large, à l'aide duquel le malade respire facilement. Cet ajutage se fixe par deux cordons derrière la tête en passant au-dessus des oreilles.

3° *Bains et douches de vapeur.*

Les médecins, en général, connaissent peu la puissance des bains et des douches de vapeur. Nés à l'hôpital Saint-Louis, installés sous la direction de Darcet, ces bains ont pris à Paris une grande extension, car il existe peut-être dans la ville une vingtaine d'établissements de ce genre. On peut mesurer l'efficacité de ces bains par ce qui s'est passé autrefois à l'hôpital Saint-Louis et par ce qui s'y passe encore aujourd'hui. Autrefois de nombreux équipages stationnaient à la porte de l'hôpital, y conduisant les personnes les plus riches de la ville, qui venaient chercher dans ces bains le sou-

lagement à leurs souffrances. Aujourd'hui sur plus de cent cinquante mille bains que l'on délivre seulement aux personnes du dehors, sur ce nombre cent mille peut-être sont des bains de vapeur; ajoutons que huit cents malades de l'hôpital prennent tous les jours leurs bains dans cet établissement où ils séjournent. Si à ce chiffre énorme on joint celui des bains de vapeur que l'on délivre à la Maison de santé, à l'hôpital de la Charité, à l'hôpital Beaujon, tant aux malades de ces hôpitaux qu'aux personnes du dehors, puis ceux que l'on prend dans les établissements publics de la ville : Tivoli, les Néothermes, bains Sainte-Anne, bains d'Alger, etc., etc., on arrive à un chiffre considérable relativement à la population. Ces bains sont aujourd'hui si répandus, qu'ils sont préférés par beaucoup de personnes aux bains d'eau. On sort en effet d'un bain russe dans un état de bien-être que ne procure pas un bain simple ; en hiver surtout, où il fait fonctionner la peau, amène la souplesse des membres, relâche les tissus engourdis et contractés par le froid. Eh bien, en présence de cette révolution qui s'opère dans les bains, la province reste stationnaire, et ceci est tellement la faute des médecins, que nous pourrions citer deux des principales villes de France, parmi les plus commerçantes, où l'on a créé des bains de vapeur et où il ne s'en prend qu'une proportion si faible que ce bain ne coûte pas moins de 6 francs, alors que, dans quelques établissements à Paris, il revient à 60 centimes. Qu'on me permette donc d'entrer ici dans quelques détails qui fassent comprendre toute leur importance, toute leur efficacité. Heureux si je puis conduire nos confrères des départements à préconiser leur emploi, à favoriser leur fondation, car j'aurai rendu d'immenses services à la population!

Et d'abord qu'est-ce qu'un bain de vapeur? Quelles sont ces variétés de bains de vapeur portatifs, en étuve, bains russes, bains ottomans? Un bain de vapeur a pour but de faire naître une sudation artificielle abondante. Cette sudation, quand elle est opérée par la chaleur sèche, constitue une fumigation en boîte que l'on peut rendre aromatique, sulfureuse, cinabrée ou simple. On fait les fumigations dans des boîtes cubiques dites *à la Darcet*, où le malade est assis, ayant la tête seule dehors qui passe par une ouverture pratiquée à cet effet, de sorte qu'il ait la respiration libre. Ici la suda-

n se fait par la peau stimulée au moyen du calorique de l'atmo-ère dans laquelle elle se trouve.

Dans certains établissements d'eaux minérales il existe quelque se d'analogue, au moyen de l'eau qui s'échappe de la terre à une pérature élevée de 50, 60 et 70 degrés. Ainsi, à Néris, à Plom-res, à Aix en Savoie et dans d'autres localités, on a construit au-r de la source, qui est enveloppée par des murs disposés comme x d'un puits, une série de cabinets dans lesquels se répand un air auffé par l'eau, air qui procure rapidement une sudation abon-nte. Ces étuves naturelles des eaux minérales prennent en général nom d'*enfer*. Mais ici les conditions sont bien meilleures ; et avec température beaucoup plus basse, on peut avoir une sudation s rapide, tout aussi abondante et moins fatigante que dans les tes. Toutefois les détails dans lesquels nous allons entrer serviront ire comprendre la supériorité des bains de vapeur en étuve sur bains précédents et sur ceux de vapeur dits portatifs. — Dans les tes à fumigation on n'obtient de sueur que par la chaleur que n porte à la peau : plus celle ci est excitée, plus le malade trans-e ; mais cette chaleur artificiellement répandue autour de la peau tive fortement la respiration, porte le sang aux poumons et a la e, amène des palpitations et de la céphalalgie Quand, au contraire, malade respire l'air échauffé qui doit le mettre en sueur, alors sudation pulmonaire facilite singulièrement la sudation cutanée. la circulation en est moins excitée. Cela est si vrai, qu'il suffit de ocer la figure au-dessus d'un vase contenant de l'eau chaude pour ettre tout le corps en sueur. Or, puisque la sudation pulmonaire traine très rapidement la sudation cutanée et sans incommodité ieune, il s'ensuit par conséquent que le concours d'action et sur peau et sur la membrane muqueuse pulmonaire, doit être beau-ép plus avantageux pour le malade et pour la production de la eur.

De même qu'il existe des bains de vapeur portatifs dont nous lons parler tout à l'heure, de même il y a de petits appareils à r chaud qui peuvent remplacer en partie les boîtes à fumigation. conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, à l'époque a choléra de 1849, s'est préoccupé de la pensée de fournir aux

classes malheureuses un moyen puissant, rapide et peu dispendieux, de procurer la réaction dans la période algide des cholériques. M. Cadet de Gassicourt a proposé un appareil fort simple qui a été adopté, et dont l'emploi est aujourd'hui répandu dans la plupart des hôpitaux de Paris, notamment à l'hôpital Saint-Louis, où l'on a souvent un intérêt puissant à faire naître une sudation abondante à la peau, soit dans des cas de répercussion des maladies cutanées, soit dans les rhumatismes, soit dans les accidents cholériformes. Cet appareil consiste dans un cône de tôle plus large que les grandes formes de pains de sucre, où se trouve à sa base une petite porte de poêle pour introduire une lampe à esprit-de-vin à trois mèches, cône qui est terminé à son sommet par un tuyau de poêle coudé et évasé en entonnoir à son extrémité; ce tuyau est disposé à s'allonger ou à se raccourcir à volonté, les bouts de tuyaux entrant à frottement les uns dans les autres. Pour se servir de cet appareil destiné aux malades qui ne peuvent pas être déplacés de leur lit, on met à terre sur le plancher la base du cône; on y adapte les tuyaux coudés dont on introduit l'extrémité dans le lit du malade; on tient les couvertures soulevées au-dessus du corps à l'aide de deux demi-cerceaux à fractures placés à distance le long et en travers du lit. Les choses étant en cet état, on introduit la lampe à esprit-de-vin sous le cône, on allume les trois mèches, et quand le malade est en sueur, si la chaleur est trop forte, on éteint une ou deux mèches à l'aide de petits couvercles faits exprès pour cet usage.

En six ou sept minutes la transpiration est ordinairement établie; on peut la faire naître dans l'espace de temps que l'on veut, et la modérer comme on le veut. On la facilite en faisant boire au malade de l'eau à une température qui n'est ni froide ni chaude.

Arrivons maintenant aux bains de vapeur. Ceux-ci sont dits *portatifs* ou *en étuve*. Les premiers ont pris dès l'abord une certaine extension, en ce sens qu'ils peuvent être donnés, ou dans le lit du malade, ou sur une chaise dans sa chambre. On peut même acheter à bas prix un de ces petits appareils. Ici, comme dans l'appareil Adam, c'est une sphère de cuivre terminée par un tube de 25 à 30 centimètres, sphère dans laquelle on met de l'eau que chauffe une lampe à esprit-de-vin, et dans cette eau on peut introduire des plantes aro-

iques. Là c'est le même système, mais avec des modifications orme. Ailleurs une petite marmite de tôle, de 2 à 3 litres de caté, placée sur un fourneau à charbon et entrant en ébullition ı une pression un peu plus forte que celle de l'atmosphère, de ière à fournir, par un tube très long, de la vapeur à volonté et s un point donné de l'appartement. Le réchaud a un tuyau d'é- t qui s'introduit dans la cheminée. Ce dernier appareil répand nt de vapeur qu'il en est besoin, mais tous les autres laissent rent le malade à court ou le chauffent trop. Il est plus dispen- ıx, car son prix s'élève à 80 ou 100 francs, les autres variant de ı 50.

'ous ces appareils ne sont que des *joujoux* de bains de vapeur; ı amènent la sudation par la température à laquelle ils élèvent eau, et par conséquent c'est une sudation difficile, plus ou moins gante, qui n'est pas comparable à celle du bain d'étuve.

e bain d'étuve exige un ensemble d'appareils propres, non pas rvir un seul bain, mais un certain nombre de bains dans la rnée. Et d'abord il faut un générateur de vapeur ou chaudière à asion, de manière à mettre l'eau à 120 degrés de température. ce générateur part un tube qui se rend dans une petite chambre linairement de bois blanc, qui peut cuber 10 à 12 mètres. Sur un ı côtés de cette pièce existe un lit de camp de bois ou de jonc, sur uel se couche le malade; c'est sous ce lit de camp et au voisi- ge des pieds que doit s'ouvrir le robinet de vapeur. Il ne doit ja- is être laissé à la disposition du baigneur; il doit être ouvert par garçon de bain qui ne quitte pas le malade. A la portée de la n du malade se trouve un thermomètre centigrade; il est bon 'il soit à alcool coloré en rouge sur émail blanc, de manière que degrés qu'il marque soient très apparents. On doit aussi mettre la portée de la main du baigneur une cuvette où l'eau ne sé- rne jamais; dans cette cuvette à tuyau d'écoulement, une grosse onge, et au-dessus un petit robinet d'eau froide. Cette éponge ui imbibée d'eau renouvelée est destinée à mouiller fréquem- ent le front et la figure du baigneur pour éviter la congestion à tête.

Dans un point de la salle opposé au lit de camp, et vers le pla-

fond, se trouve un arrosoir large, capable de fournir une pluie d'eau un peu étendue en surface. Dans cet arrosoir se rendent un tuyau d'eau chaude et un tuyau d'eau froide que l'on peut ouvrir isolément, au moyen de leviers coudés munis de poignées de bois, leviers qu descendent à la portée du baigneur ou du garçon de bain, de manière que l'on puisse donner à volonté une d uche d'eau chaude, une douche d'eau froide, ou une douche d'eau tempérée par le mélange de l'eau froide et de l'eau chaude. C'est moins une douche qu'une pluie d'eau; aussi suffit-il de deux réservoirs peu élevés, l'un à l'eau chaude, l'autre à l'eau froide.

L'ensemble de ce système porte le nom d'*étuve*. La porte de l'étuve doit s'ouvrir en dedans comme en dehors, sans serrure ni clôture aucune, de manière qu'en cas d'accident le baigneur puisse sortir en poussant la porte devant lui. Cette porte a d'ailleurs un large carreau poli qui permet au garçon de bain de voir ce qui se passe dans l'étuve alors qu'il en est momentanément dehors.

Tous ces appareils ont dû nécessairement éloigner beaucoup d'industriels de la pensée de créer de pareils bains, à cause des dépenses de premier établissement. Cette dépense est nulle ou presque nulle quand la création est bien entendue et quand on sait tirer parti de la vapeur. Il suffit, en effet, d'une très petite chaudière à vapeur pour chauffer une grande masse d'eau. Il faut un foyer peu considérable pour chauffer un petit générateur de vapeur: ainsi toute l'économie du système consiste à chauffer l'eau de l'établissement de bains, à l'aide de la vapeur produite par le générateur de vapeur, de sorte que le générateur ne soit pas établi seulement pour les bains de vapeur, mais que ceux-ci puissent cependant être donnés dans tous les instants sans nécessiter un chauffage particulier.

Enfin, auprès de l'étuve doit exister un cabinet avec lit de repos pour le malade, et un nombre de couvertures suffisant pour développer et entretenir la sueur. Dans les hôpitaux, au lieu d'avoir une étuve qui ne contienne qu'un seul malade, on a une étuve plus grande où l'on dispose des gradins demi-circulaires sur lesquels s'asseoient les malades; au fur et à mesure qu'un malade s'élève dans cette espèce d'amphithéâtre, il y trouve une température plus forte,

la vapeur la plus chaude tendant à gagner la partie supérieure de la salle.

Ceci posé, indiquons de quelle manière le bain de vapeur peut être pris. A cet égard, nous distinguerons les variétés désignées sous les noms de : *bains simples*, *bains russes*, *bains avec massage*, *vergeture*, *onctions*, dits *bains ottomans*.

Modes divers d'administration des bains de vapeur. — Le bain le plus simple consiste à étendre le malade nu sur le lit de camp, l'étuve, par l'émission préalable de la vapeur, étant chauffée à 35 degrés centigrades. Après quelques minutes, on élève peu à peu et graduellement la température en ouvrant le robinet de vapeur à moitié, de manière à monter successivement à 38, à 40 ou à 42 degrés. Cette température est suffisante pour les personnes d'un tempérament lymphatique ou lymphatico sanguin qui suent facilement. Une fois atteinte, on peut l'entretenir en ouvrant de temps en temps le robinet ou en le laissant ouvert au sixième ou au huitième de son diamètre. C'est aussi la température qui convient pour tous les malades atteints d'affections cutanées sécrétantes. En l'élevant au delà, on irrite la peau et les surfaces malades que l'on aggrave au lieu de les guérir.

Une personne qui sue plus difficilement a besoin d'une température plus forte; mais à cet égard je préfère n'obtenir la sueur qu'au troisième ou quatrième bain, sauf a maintenir une basse température. Quand il s'agit d'affections rhumatismales, où il ne faut pas seulement procurer de la sueur, mais où il convient de porter une certaine excitation à la peau, on peut faire monter l'étuve à 50 et à 53 degrés ; c'est même la routine de tous les bains de vapeur à Paris. Elle est très fâcheuse pour les maladies de la peau, et j'ai beaucoup de peine à obtenir un abaissement de température pour mes malades.

Au surplus, il en doit être de même d'un bain de vapeur comme d'un bain d'eau: il faut qu'il soit agréable au malade, et du moment qu'il amène des palpitations notables, du mal de tête, la sensation de battements dans la tête, c'est qu'il est trop chaud.

La durée du bain est généralement de vingt à vingt-cinq minutes.

Ce bain, pris de cette manière, est moins favorable que lorsqu'on le modifie comme il suit. Après les dix premières minutes, on fait placer le malade sous la pluie d'eau que l'on donne d'abord tempérée et que l'on rafraîchit peu à peu, le tout pendant une ou deux minutes ; puis le malade se replace sur son lit de camp. Une pareille douche lui est donnée dix minutes après ; enfin il reçoit sur les pieds une douche d'eau très chaude avant de quitter l'étuve.

Alors on le couvre d'un peignoir brûlant et d'un manteau de laine ; on lui enveloppe la tête et les oreilles avec une serviette brûlante. On le couche sur le lit de repos. On l'y étend, les bras allongés le long du corps ; on enveloppe les pieds et les cuisses d'une serviette très chaude, on emmaillotte le corps de plusieurs couvertures, et on l'abandonne à lui-même. Là il entre en pleine transpiration, et après vingt minutes écoulées on lui recommande d'écarter un peu les jambes et les bras du corps pour affaiblir la sudation. Il reste ainsi trois quarts d'heure dans le lit ; après quoi il s'habille, sort de l'établissement, et fait une course à *pas rapides* pour entretenir la moiteur, ou s'il ne peut agir, il est convenable de le faire rentrer chez lui en voiture.

Dans le bain russe, on chauffe brusquement le malade en faisant arriver de la vapeur jusqu'à 55 degrés de température ; après quelques minutes, on met le malade sous la douche *froide*. On recommence la sudation et la douche quatre ou cinq fois dans l'espace de vingt à vingt-cinq minutes. On prend un balai de feuilles et de iges fines de bouleau avec lequel on frappe toute la surface du corps pour stimuler la peau ; le malade n'est pas placé dans un lit ; en sortant de l'étuve, il s'essuie, s'habille et fait une promenade à pas rapides.

Dans le bain oriental, non-seulement on pratique ces opérations, mais on y joint le massage de tous les muscles après avoir enduit de savon toute la surface du corps, puis des lavages successifs de la peau, et enfin des frictions avec des essences.

Ce qui doit préoccuper le médecin dans l'emploi de ces bains, c'est l'activité qu'ils peuvent faire prendre momentanément à la circulation ; de là, chez certaines personnes, des battements plus ou moins violents à la tête, chez d'autres des palpitations, chez quel-

ques-unes une certaine oppression. Les deux premiers phénomènes sont presque toujours tempérés : 1° par des bains moins chauds ; 2° par l'usage répété de l'éponge froide appliquée sur la tête ou sur la région du cœur. Quant à l'oppression, elle n'est que temporaire, et il est d'observation que ces mêmes personnes, qui ne supportent que difficilement les bains de vapeur, supportent encore plus difficilement le poids de l'eau dans les baignoires. Toutefois, comme on peut diminuer la hauteur de l'eau dans celles-ci, ce que l'on ne peut pas faire à l'égard du bain de vapeur, il s'ensuit qu'il faut chez ces personnes user de beaucoup de modération à l'égard de ce dernier bain.

Je n'ai jamais vu d'accidents graves survenir dans un bain de vapeur, à moins qu'ils n'aient été le résultat d'imprudences ou de négligence.

Une circonstance importante à connaître, c'est qu'un bain de vapeur peut être pris après avoir mangé. Il y a plus, il vaut mieux ne pas y aller à jeun : prendre un potage, un bouillon avant d'y entrer. En un mot, ces bains ne troublent pas la digestion comme le font les bains d'eau.

Quant aux douches de vapeur, elles se donnent à l'aide d'un tuyau d'ajutage enté sur le tuyau de conduite. Elles sont toujours en jet. Il est d'usage de les prendre aussi chaudes que possible.

4° *Hygiène des bains.*

Je consacre quelques lignes à l'hygiène des bains dont je trouve peu de chose dans les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, et cependant j'ai vu tant d'accidents survenir par défaut de soins, qu'il me paraît utile de rassembler ici quelques conseils généraux à ce sujet.

Tout bain chaud et aqueux doit être pris à jeun ou au moins après un temps suffisant pour que la digestion stomacale soit accomplie.

Tout bain aqueux et froid exigeant une certaine réaction, il n'est pas convenable de le prendre à jeun, mais il y a danger à le prendre immédiatement après un repas. On compte un certain nombre de décès survenus lors des bains de rivière pris immédiatement après

un repas copieux; la mort arrive alors par une congestion pulmonaire et cérébrale. Le mieux, dans les bains de rivière, consiste à favoriser la réaction per une petite quantité de vin généreux prise pendant sa durée, si l'on est à jeun surtout.

Une fois en baignoire, on peut faire usage d'aliments légers sans aucun inconvénient. Il y a plus, dans les piscines où l'on séjourne plusieurs heures, il est convenable d'y manger pour éviter de se laisser débiliter par ces sortes de bains.

Les bains de mer sont peu favorables à jeun. Chez les enfants surtout, il faut avoir le soin de faire prendre un potage une heure avant le bain.

On peut entrer dans un bain de vapeur ou recevoir une douche peu de temps après avoir pris des aliments, et par cette expression nous n'entendons pas des aliments copieux ; de sorte que nous pouvons traduire d'une manière générale ces préceptes hygiéniques, en disant que tout bain qui exige de la réaction ne veut pas un estomac exclusivement à jeun.

Il est un certain nombre de bains qui exigent le repos immédiat pendant une ou deux heures ; d'autres demandent, au contraire, un certain exercice. Dans la première catégorie se placent tous les bains en baignoire, soit les bains simples, soit les bains d'eau minérale. Rien n'est plus favorable aux bains de ce genre que le repos amenant une certaine moiteur qui provient, ou de ce que le bain était émollient, ou de ce qu'il était excitant de la peau par sa nature saline ou sulfureuse. Tout bain qui, par sa nature, amène de la sudation, veut un séjour convenable au lit pour la favoriser et l'accroître.

Il est, en général, sans inconvénient de manger immédiatement après le bain, excepté pour ceux qui amènent une transpiration abondante ; l'estomac ne supporte alors que des aliments légers. Il faut cependant en excepter le bain russe proprement dit; mais celui-ci n'entraîne qu'une sudation momentanée, et les ablutions d'eau froide amènent une réaction que ne procurent pas les autres bains.

L'effet le plus général des eaux minérales, c'est de procurer tout d'abord un surcroît d'appétit : d'une part, parce que la peau fonc-

tionne mieux ; d'une autre part, parce que la personne a généralement quitté la ville pour le séjour à la campagne et au milieu des montagnes. Il est convenable de ne pas trop y satisfaire, sous peine d'amener un trouble de la digestion et un malaise général. Ceci est, en général, soumis non-seulement à l'eau dont on fait usage, mais encore au climat dans lequel l'eau se trouve.

Sous ce dernier rapport, rien de moins innocent que le climat de la mer, et cependant, aujourd'hui, chacun se rend aux bains de mer par une sorte d'entraînement qui est devenu une mode, une habitude. Il est peu de personnes qui n'éprouvent pas quelque incommodité de leur séjour à la mer.

Si d'abord un bain de mer est loin d'être aussi innocent qu'on le croit généralement, il ne convient qu'à certaines natures ; d'autres y sont influencées de la manière la plus fâcheuse. Qu'on nous permette donc quelques observations à ce sujet. — Les bains de mer ne sont réellement utiles qu'aux individus d'un tempérament plus ou moins lymphatique. S'ils conviennent à l'enfance, c'est que la prédominance lymphatique est l'apanage de cet âge. Mais dès qu'il s'agit d'un enfant nerveux, le bain de mer peut développer les indispositions les plus fâcheuses. Ces influences sont de deux sortes et dérivent de la nature du bain et de l'état moral de l'enfant. Il y a deux espèces de bains de mer. Ou la mer est calme, et alors l'enfant joue et *barbote* dans la mer, qu'on me passe cette expression ; il peut rester ainsi cinq ou six minutes, et même huit à dix, si la mer est très calme. Mais si l'on fait prendre à un enfant un bain à une mer tant soit peu agitée, de sorte qu'il faille un baigneur pour l'y conduire et l'y maintenir, alors le bain, qui ne doit avoir que trois minutes à trois minutes et demie de durée, n'est plus un bain innocent. A plus forte raison si, comme on le dit, on prend le bain à la *lame* ; alors deux minutes et demie suffisent, et beaucoup d'enfants ne peuvent même pas supporter ce bain sans qu'il en résulte une lassitude, une courbature plus ou moins marquée, et souvent un état fébrile avec symptômes congestionnels au cerveau et dérangement dans les fonctions intestinales. Il y a donc déjà, sous le rapport du bain, de grandes précautions à prendre. Mais il y a deux manières d'entrer dans la mer : ou on le fait en marchant peu à peu

jusqu'à ce qu'on ait de l'eau jusqu'à la poitrine; ou le baigneur saisit l'enfant sur ses bras, le plonge la tête la première en le redressant sur les pieds. Ces deux méthodes se pratiquent pour tout le monde, enfants ou adultes. Le premier mode a quelques inconvénients pour les personnes sujettes aux palpitations et aux étouffements, mais on les évite en prenant la précaution de jeter sur la tête de la personne qui prend le bain un seau d'eau avant de la faire entrer dans la mer. Le second mode prévient toute congestion accidentelle, mais il a sur tous les enfants une influence morale *fâcheuse* qu'il faut éviter, et cette influence, quoique moins fâcheuse d'ailleurs pour les grandes personnes, existe toujours pour elles. Il serait donc nécessaire que les deux modes fussent employés suivant les besoins dans tous les ports de mer, et que le médecin, interrogeant à cet égard le naturel des malades, prescrivît l'un ou l'autre, car l'un des deux n'a pas d'avantages sur l'autre.

En thèse générale, la durée d'un bain de mer médicamenteux, et quand il n'y a pas de natation, ne doit pas dépasser cinq à six minutes. Si la personne nage, ce n'est plus le bain de mer ordinaire, c'est un exercice dans une eau fortifiante, sans sensation du froid et du choc de la lame.

Après tout bain de mer il est bon de prendre un bain de pieds chaud, surtout les enfants, et recevoir, en sortant de la mer comme en y entrant, un seau d'eau sur la tête.

Un bain de mer doit être suivi de réaction; il faut donc s'essuyer très rapidement en se frictionnant, s'habiller très vite et faire une course à pas rapides.

Il existe un autre bain de mer qui n'est pas moins important que le bain de mer à l'eau. Beaucoup de médecins envoient à la mer des convalescents qui ne peuvent pas prendre de bains, mais qui viennent respirer l'air de la mer. Ces malades sont amenés dans des chaises à porteurs au bord de la mer et y séjournent deux, trois ou quatre heures sur les galets : c'est l'habitude des ports de mer. Nous regardons cette habitude comme une des plus fâcheuses. Un malade convalescent placé au bord de la mer reçoit, il est vrai, toutes les émanations de la mer ; mais il reçoit aussi toutes les influences d'humidité, de ventilation, d'insolation alternatives, qui, loin de re-

tre la santé, renouvellent souvent des affections rhumatismales
arues, amaigrissent le malade au lieu de le fortifier, troublent
ligestions, en un mot, ne représentent plus ces conditions atmos-
iques qui tendent au rétablissement de la santé.

ailleurs, qu'est-ce donc que l'atmosphère de la mer? Est-ce
lle borne son influence à sa surface? est-ce qu'elle ne se fait pas
r à plusieurs lieues de distance? Pourquoi donc exposer à des
litions fâcheuses d'humidité, de ventilation, des convalescents
nt besoin d'un air généralement pur et exempt autant que pos-
des variations qui exercent sur tous les hommes une influence
nicieuse? Ce qu'il faut pour ces malades, c'est de leur faire
rer l'air de la mer à l'abri du vent et en plein soleil. A cet effet,
yez-les dans un port en amphithéâtre, comme le Tréport, par
ple, sur une plage limitée, petite; faites-les asseoir le long des
ons, à l'abri de toute ventilation, et surtout à l'abri des vents
est qui sont si communs du côté de l'Océan. Aussi les ports du
de l'Océan sont ils bien préférables aux ports du nord.

existe aussi des bains de mer chauds dans un grand nombre de
s de mer; on les donne à l'eau pure ou mitigée d'eau ordinaire,
oitié, au quart, etc. : ces bains sont évidemment fortifiants. On
ve aussi dans ces établissements des douches qui exercent une
ence excitante sur la peau, et qui peuvent être favorables aux
tions rhumatismales. Les médecins ne sauraient trop en re-
mander l'emploi.

erminons en parlant un peu de l'influence de l'air de la mer
la santé des baigneurs. La personne qui, de l'intérieur des terres
pays, est transportée au bord de la mer, y trouve un air vif,
, d'une nature toute nouvelle pour elle. Cet air stimule, excite
d'abord, amène une soif continuelle, procure de l'appétit les
iers jours, cause de la constipation; puis, comme on est géné-
ment porté à aller admirer un spectacle grandiose et tout
veau, on est sans cesse sur les jetées, sur les galets, sur les fa-
s. On trouve avec abondance le poisson de mer, des coquil-
s, et l'on en use souvent avec excès. Cette pratique est des plus
stes; il en résulte un trouble des voies digestives plus ou
ns prononcé. Cette surexcitation d'appétit cesse très vite pour

faire place presque à de l'anorexie. La constipation est remplacée par des coliques avec évacuations abondantes, et quelquefois des vomissements, de sorte qu'il est peu de malades qui ne paient leur tribut à l'air de la mer.

Suivant nous, la personne qui se rend à la mer doit peu à peu s'y acclimater, s'observer surtout sous le rapport du régime alimentaire, éviter dans les huit ou dix premiers jours le poisson de mer, et rechercher au contraire le poisson d'eau douce, ne pas faire usage surtout de tout ce qui est coquillage, crabe, homard, langouste. Ce ne sera que graduellement qu'elle arrivera à leur emploi comme aliment ; les repas doivent être réglés, peu abondants, ayant pour base des viandes rôties et les légumes.

Ce qu'il faut ensuite, c'est de savoir se vêtir même dans la plus belle saison, le matin et surtout le soir ; les habitants des ports de mer ne quittent presque jamais le drap, et ils font souvent usage du manteau le soir. On ne saurait croire combien sont communs les accidents qui proviennent d'une hygiène mal entendue à cet égard.

Ce qu'il faut rechercher, c'est une promenade journalière dans l'intérieur des terres, de manière à sortir de ces champs arides qui bordent l'océan et à trouver dans l'influence des émanations des végétaux de la campagne un contre-poids à cet air sec et âpre de la mer.

VII. De la saison de l'année ou la curabilité des maladies de la peau est plus facile.

Une opinion généralement accréditée parmi les médecins, c'est qu'il faut traiter les maladies de la peau au printemps ; cette manière de voir est essentiellement fausse, elle est très préjudiciable aux malades: c'est ce que nous allons démontrer. Les affections de la peau se développent généralement à deux époques de l'année, au printemps et à l'automne. Celles du printemps, ayant un caractère plus aigu, se terminent par résolution beaucoup plus souvent que les maladies d'automne, qui suivent une marche plus insidieuse, affectent un caractère chronique, parce qu'elles survien-

dans une saison où les fonctions naturelles de la peau tendent
roître par le refroidissement de plus en plus marqué de l'at-
hère, ce qui contribue à perpétuer ces maladies plutôt que de
ourir à leur guérison, comme cela a lieu en été.

uit de là que si une maladie de peau se développe au prin-
s et qu'elle prenne la forme chronique, le médecin remet au
mps suivant pour appeler les avis d'hommes plus exercés dans
atique de ces affections. Que si la maladie se montre en au-
e, le médecin n'espère pas la guérir à cette époque de l'année ;
met au printemps à la traiter radicalement, et s'il échoue
voilà le malade renvoyé à l'année suivante. Il faut avoir
e nous des rapports journaliers avec les praticiens, pour ap-
r la justesse de ces observations, et c'est ainsi que le médecin
a tâche plus difficile.

r détruire cette manière de voir si fausse, il faut chercher à
comprendre que le malade est placé dans de bien meilleures
tions au point de vue thérapeutique en hiver qu'en été ; c'est
e nous allons essayer de prouver.

grande généralité des maladies de la peau provient de ce que
ne accomplit imparfaitement ses fonctions, de ce qu'elle ne
e pas, de ce que l'on ne fait pas assez généralement usage de
. La peau devient sèche, il s'y montre çà et là des démangeai-
le malade se livre à des frottements, à des grattages ; les
s sensations, les mêmes besoins se reproduisent à des inter-
s plus ou moins rapprochés, et bientôt un lichen, un eczéma se
rent, la cause prédisposante existant d'ailleurs chez l'individu
a en être affecté. Mais si le même sujet avait observé une hy-
de la peau bien entendue, il aurait peut-être pu éviter la ma-
ation de l'éruption. Cela est si vrai, que bon nombre de mala-
le la peau qui apparaissent en hiver se guérissent en été sous
l bénéfice d'une transpiration développée et entretenue par
ion. C'est ce que l'on remarque pour beaucoup de pso-
. Le malade en est atteint en automne et en hiver ; tout cesse
é.

conséquence a déduire de ce fait, qui ne peut être révoqué en
e, c'est que si en hiver, la peau étant malade, on la fait fonc-

tionner d'autant plus que la température est plus basse, et ce au moyen des bains sulfureux, des bains de vapeur, des bains russes, on produira un résultat d'autant plus puissant qu'à cette époque de l'année la peau ne sécrète pas.

Le résultat d'une grande sudation en été, c'est un excès de sensibilité de la peau. A cette époque de l'année, ce tissu est plus impressionnable, plus excitable ; le moindre résolutif peut devenir stimulant pour elle. En hiver, au contraire, la peau, ferme, moins irritable, supporte une application de moyens externes bien plus variés sans s'irriter, et par conséquent le médecin trouve à sa disposition plus d'agents externes en hiver, et il peut les employer d'une manière plus soutenue qu'en été ; de là de nombreuses ressources.

Ceci s'applique non-seulement à la partie malade, mais encore aux organes internes vers lesquels on a besoin de diriger une thérapeutique d'ensemble. En été, les fonctions digestives s'accomplissent moins bien qu'en hiver ; nous ne pouvons pas user d'autant d'aliments, nous les digérons plus difficilement. En fait de médicaments, toutes les tisanes sont lourdes pour l'estomac, beaucoup d'agents actifs ne peuvent pas être tolérés. En hiver, au contraire, l'appétit est plus complet, l'estomac supporte les spiritueux, les toniques, les amers, sans troubles fonctionnels ; cette condition du tube digestif est très favorable à l'administration de nos médicaments héroïques dans les traitements des maladies de la peau, les sulfureux, les amers, les arsenicaux, les antimoniaux.

Notez que nous pouvons exercer fréquemment des dérivations sur le canal intestinal en hiver, tandis qu'en été les purgations sont beaucoup plus difficilement supportées.

Ainsi, en résumé, d'une part, nous plaçons la peau dans des conditions bien plus favorables à la guérison ; d'une autre part, nous pouvons user, et à l'égard de la partie malade, et à l'égard de l'économie, de tous nos moyens thérapeutiques sans restriction aucune, ce que nous ne pouvons pas faire en été. La seule ressource que nous ayons dans cette saison et que nous n'avons pas en hiver, ce sont les eaux minérales. Loin de moi la pensée d'en nier l'efficacité, je suis le premier à en conseiller l'usage ; mais on verra dans le

cours de cet ouvrage que les eaux minérales sont prescrites d'une manière presque banale et qu'elles sont loin de rendre les services qu'on leur attribue. C'est pour le médecin une grande ressource par rapport à une maladie vis-à-vis de laquelle il a échoué, mais pour le malade c'est quelquefois une déception.

VIII. Classification des maladies de la peau.

Une classification n'a pas d'autre but que d'arranger, de grouper méthodiquement les maladies de manière à constituer un cadre dont l'esprit puisse saisir l'ensemble, afin d'en faire une étude méthodique. Les divers auteurs qui se sont occupés de classification des maladies de la peau ont cherché un point de départ, une idée, un fait qui pût en dominer l'arrangement. Ainsi les uns ont invoqué la causalité de ces maladies, les autres les formes morbides pathologiques, quelques-uns les produits de sécrétion, d'autres le siége anatomique, etc. Malheureusement les maladies en général se plient peu à toutes ces distinctions; il en résulte que pour la peau, comme pour les autres tissus de l'économie, il ne saurait exister une classification à l'abri de reproches. C'est assez dire que nous n'attachons pas d'autre importance à leur valeur relative, et que celle qui se prêtera le mieux à l'étude, en même temps qu'elle conduira à quelques conséquences pratiques, sera celle à laquelle nous donnerons toujours la préférence.

Les classifications sont de date récente. Jusqu'à Plenck, qui publia en 1776 son traité intitulé : *Doctrina de morbis cutaneis, qua hi in suas classes, genera et species rediguntur* (Vienne, *ibid.*, 1783, in-8°, Lovani, 1796), on avait décrit les affections cutanées sans ordre, sans méthode, ou, à l'instar de Lorry, on les avait envisagées surtout d'une manière générale.

Plenck eut le premier l'idée de rapprocher les maladies d'après les analogies qui existaient entre *leurs formes élémentaires morbides;* aussi est-ce à tort que l'on attribue à Willan la classification plus particulièrement accréditée aujourd'hui, sous le nom de *classification anatomique*, classification qui, pour le dire en passant, n'est pas *anatomique*, mais bien anatomo-pathologique, puisque ce ne sont

pas les éléments anatomiques connus qui forment la base des divisions de maladies, mais des éléments qui nous sont encore inconnus, ce qui donne lieu à des formes morbides d'anatomie pathologique, comme toutes les productions morbides variées que nous voyons surgir dans les maladies des divers organes. Plenck a eu le seul tort de multiplier ses classes de maladies en regardant comme des formes élémentaires ce qui n'était que des produits secondaires de la même affection, en sorte qu'il a reproduit dans deux classes différentes les mêmes maladies cutanées. Mais l'idée mère de la classification lui appartient tout entière, et il suffit de rapprocher ses divisions de celles de Willan qui publia sa classification en 1798, c'est-à-dire vingt-deux ans après la première et deux ans après la dernière édition de l'ouvrage de Plenck, pour voir qu'il y a identité parfaite.

Plenck admettait quatorze classes de maladies cutanées :

1° *Maculæ ;* 2° *pustulæ ;* 3° *vesiculæ ;* 4° *bullæ ;* 5° *papulæ ;* 6° *crustæ ;* 7° *squamæ ;* 8° *callositates ;* 9° *excrescentiæ cutaneæ ;* 10° *ulcerea cutanea ;* 11° *vulnera cutanea ;* 12° *insecta cutanea ;* 13° *morbi unguium.*

Willan (*Description and treatment of cutaneous diseases*, in-4°, London, 1798) range les maladies de la peau en huit classes : 1° exanthèmes ; 2° vésicules ; 3° bulles ; 4° pustules ; 5° papules ; 6° squames ; 7° tubercules ; 8° macules. Ces divisions se trouvent dans les classes de Plenck, à part celle des exanthèmes ; c'est donc la *même idée mère*, c'est la même classification, moins complète d'une part, mais plus exacte de l'autre.

Loin de moi la pensée de chercher à porter la moindre atteinte au mérite de l'auteur anglais ; je ne veux que rendre à Plenck ce qui lui appartient. L'idée mère d'une classification est une découverte trop importante pour qu'elle ne reste pas à toujours à son auteur. Il n'y a dans la classification de Willan qu'une perfection par suite d'observations et de recherches plus minutieuses ; il y a dans la classification de Plenck une idée, et une observation d'autant plus difficile, qu'elle avait été faite en premier.

Nous donnons ici un tableau des maladies cutanées que nous avons rangées d'après la classification de Willan, mais que nous avons augmenté et complété.

CLASSIFICATION DE WILLAN, MODIFIÉE.

MALADIES

Exanthémateuses.
- Erythème.
- Rougeole.
- Urticaire.

Vésiculeuses.
- Eczéma.
- Herpès.
- Gale.
- Impétigo.

Bullées.
- Pemphigus.

Pustuleuses.
- Impétigo.
- Acné.
- Erthyma.
- Sycosis pustuleux.
- Gale.

Papuleuses.
- Strophulus.
- Lichen.
- Prurigo.

Tuberculeuses.
- Lupus.
- Sycosis tuberculeux.
- Lèpre tuberculeuse.
- Framboesia.
- Molluscum.

Squameuses.
- Pityriasis.
- Psoriasis.
- Lèpre vulgaire.
- Ichthyose.
- Pellagre.

Hémateuses.
- Purpura.
- Hémorrhagie.
- Scorbut.

Chromatéuses.
- Pityriasis versicolor.
- Pityriasis nigra.
- Acromie.

Cancéreuses.
- Cancer.
- Kéloïde.

Végétantes.
- Favus.
- Herpès tonsurant.
- Porrigo decalvans.

Corps étrangers animés.
- Acarus.
- Pediculus.
- Pulex.

Corps étrangers inanimés.
- Productions cornées.

Maladies de la peau et du tissu cellulaire.
- Eléphantiasis des Grecs.
- Lèpre anesthésique.

Maladies des poils.
- Plique.
- Canitie.
- Alopécie.

Maladies des ongles.
- Hypertrophie.
- Atrophie.

En 1816 parut la classification d'Alibert (*Précis historique et pratique sur les maladies de la peau*, 2 vol. in-8). Une autre pensée avait dirigé cet admirable nosographe, c'était de grouper par catégories ou familles les maladies qui avaient entre elles quelque analogie : 1° *Teignes :* faveuse, granulée, furfuracée, amiantacée, muqueuse. 2° *Pliques :* multiforme, solitaire, en masse. 3° *Dartres :* furfuracée, squameuse, crustacée, rongeante, pustuleuse, phlycténoïde, érythé-

moïde. 4° *Ephélides:* lentiforme, hépatique, scorbutique. 5° *Cancroïde* ou kéloïde. 6° *Lèpres:* squameuse, crustacée, tuberculeuse. 7° *Pians:* ruboïde, fongoïde. 8° *Ichthyoses :* nacrée, cornée, pellagre. 9° *Syphilides:* pustuleuse, végétante, ulcérée. 10° *Scrofules:* vulgaire, endémique. 11° *Psorides:* pustuleuse, purulente, pustuleuse vésiculeuse, papuleuse, crustacée.

En effet, si l'on envisage les maladies de la peau sous leur point de vue le plus important (*ars sanandi*), on est conduit à accueillir cette *idée dominante*. La catégorie des teignes groupe entre elles les maladies du cuir chevelu, qui ne se montrent guère que dans l'enfance et dans la jeunesse, et qui exigent un traitement, une conduite médicale toute spéciale. La plupart de ces teignes sont, il est vrai, des affections cutanées tout à fait semblables à celles qui peuvent se montrer sur le corps de l'adulte, et en cela Alibert diffère de Willan, puisqu'il est obligé de les décrire deux fois; mais il est bien plus médical d'exposer dans un même tableau toutes les variétés de teignes ! A combien de considérations générales leur ensemble ne peut-il pas conduire! Nous en dirons autant des *syphilides*, des *scrofules*, des *kéloïdes*, où la cause première de l'affection, quelle qu'en soit la forme, doit toujours être présente au médecin durant tout le cours du traitement de la maladie. Ici variété de forme, mais analogie de cause, de nature et de traitement.

Malheureusement c'est là seulement tout ce qu'il y a de vrai dans la réalisation de la pensée d'Alibert. Chaque autre groupe de sa division ne comporte plus qu'une seule maladie avec ses variétés: tels sont les groupes *pliques*, *éphélides*, *lèpres*, *ichthyose*, *psorides*, et quant au groupe *dartres*, il a le défaut tout opposé. Sous une dénomination vulgaire, Alibert a rassemblé une foule de maladies dissemblables qui toutes peuvent reconnaître des causes différentes, se présenter sous des formes variées, se modifier en raison du tempérament et de la constitution du sujet, et exiger une médication appropriée à toutes ces circonstances.

Convenons donc cependant qu'Alibert a rendu un immense service en créant cette classification imparfaite, à l'époque où il l'a publiée, et, pour apprécier ce service à sa valeur, reportons-nous à

une époque où la classification de Plenck était inconnue en France, et où l'histoire des dartres était presque tout entière à faire.

C'est en vue de la même pensée qu'en 1832 (*Monographie des dermatoses*, in-8°), Alibert créa sa classification nouvelle : *son arbre des dermatoses*. Elle n'est, à proprement parler, qu'une extension de la première quant aux groupes principaux. Toutefois ces groupes sont mieux dessinés. Alibert les a multipliés en y comprenant plus de maladies, telles que les dermatoses *exanthémateuses* et *hétéromorphes*, et cependant il a fait disparaître une partie des groupes qui n'étaient que des genres, puisqu'ils ne comprenaient qu'une maladie et ses variétés. Voici au surplus ces divisions.

Dermatoses : 1° *eczémateuses*, 2° *exanthémateuses*, 3° *teigneuses*, 4° *dartreuses*, 5° *cancéreuses*, 6° *lépreuses*, 7° *véroleuses*, 8° *strumeuses*, 9° *scabieuses*, 10° *hémateuses*, 11° *dyschromateuses*, 12° *hétéromorphes*.

DERMATOSES.

1° *Eczémateuses*. — Érythème, érysipèle, pemphix (pemphigus), zoster, phlyzacia (ecthyma), cnidosis (urticaire), épinyctide (sorte de lichen de nuit), olophlyctide (herpès phlycténoïde), ophlyctide (aphthes fébriles), pyrophlyctide (pustule maligne), furoncle et charbon.

2° *Exanthémateuses*. — Variole, vaccine, clavelée (petite vérole des moutons), varicelle, nirle (exanthème papuleux lenticulaire de vingt-quatre à trente-six heures, succédant souvent à la rougeole), roséole, rougeole, scarlatine, miliaire.

3° *Teigneuses*. — Achor (teigne muqueuse), trichoma (plique polonaise), porrigine (pityriasis et eczéma chroniques, porrigo decalvans).

4° *Dartreuses*. — Herpès, varus (acné), mélitagre, esthiomène (lupus exedens).

5° *Cancéreuses*. — Carcinome, kéloïde (excroissance cancéreuse).

6° *Lépreuses*. — Leuce (lèpre des Hébreux), spiloplaxie (malemort des arabistes), radezyge (lèpre du Nord), éléphantiasis.

7° *Véroleuses*. — Syphilides, mycosis (pian et framboesia).

8° *Strumeuses*. — Scrofule, farcin.

9° *Scabieuses*. — Prurigo, gale.

10° *Hémateuses*. — Pétéchies, péliose (purpura).

11° *Dyschromateuses*. — Panne (taches de rousseur, pityriasis versicolor, nigra), achromie.

12° *Hétéromorphes*. — Verrues, dermatolysie (cutis lapsus), onygose (tournisole), naevo (naevus maternus), tylose (cors aux pieds), ichthyose.

s morbides. Presque toutes, en effet, sont précédées ou gnées de phénomènes généraux ; elles apparaissent à l'état es sont accompagnées de rougeur, de chaleur et d'une sen- ii va jusqu'à la douleur ; elles parcourent leurs périodes espace de temps assez court ; elles passent rarement à l'état e ; elles se terminent le plus souvent par résolution, et le it antiphlogistique leur est commun.

ces conditions se trouvent encore mieux dessinées dans des *exanthèmes*.

liverses sortes de teignes ont des formes différentes, si les hérapeutiques qu'elles réclament sont variés, il est quel- rochements à faire entre elles qui peuvent justifier leur dans le groupe des dermatoses teigneuses. Elles affectent oujours l'enfance et la jeunesse ; elles sont souvent liées à éral de la santé, et cette liaison est souvent si intime, que le l'enfant s'altère du moment que l'affection teigneuse di- intensité ou se supprime ; et tandis qu'on arrêtera impuné- même affection dartreuse siégeant partout ailleurs, mais à époque de la vie, on pourra compromettre les jours d'un procédant ainsi pour certaines variétés de teignes : de là eptes généraux de traitement qui sont communs à toutes ions.

êmes analogies existent pour les groupes des dermatoses es, *véroleuses*, *strumeuses*, *hémateuses*, *scabieuses*, *dischroma- léproeuses*. Restent donc deux groupes auxquels on ne peut quer ces principes, les dermatoses *dartreuses* et *hétéromor- is* la dernière dénomination indique déjà un assemblage de de formes et d'espèces différentes qui n'ont pu être clas- ous ne voyons réellement que le groupe des dartres qui alheureusement conservé.

bien que cette classification ne conduit pas au diagnostic elle de Willan, et c'est là surtout ce qui l'a fait repousser osologistes modernes ; mais au moins elle conduit à la thé- te. Que l'esprit de l'élève soit satisfait quand il a reconnu eus-crépitant ou un bruit de souffle au premier temps, ort bien ; qu'un professeur voie même avec plaisir un élève

établir un diagnostic, je suis le premier à en reconnaître les avantages, je dirai même la nécessité. Mais cela n'est pas tout en médecine, et tel médecin est quelquefois fort embarrassé d'appliquer un remède à un mal qu'il a parfaitement reconnu. Nous irons même plus loin, et nous dirons qu'après avoir porté un diagnostic assuré, nous en sommes souvent réduit à faire la médecine des symptômes, la médecine de l'état général du malade, et ce n'est certes souvent pas la plus mauvaise.

Concluons donc de tout ce qui précède, que si nous mettons la classification de Plenck, dite de Willan, en regard de celle d'Alibert, nous rendons justice à l'une et à l'autre, en disant que la première est utile pour apprendre à reconnaître les maladies, que la seconde est nécessaire pour apprendre à les traiter.

J'eusse pu, pénétrant plus avant dans la classification d'Alibert, lui adresser des reproches de détail sur chaque maladie en particulier ; mais j'ai tenu à juger l'ensemble de sa classification et à pénétrer dans la pensée qui l'avait dictée.

Depuis Alibert, MM. Cazenave et Schedel, Gibert et Rayer, se sont rattachés à la méthode de Willan que Biett avait propagée en France. M. Rayer ne l'a prise toutefois que d'une manière secondaire et en tant qu'elle s'appliquait aux maladies de la peau qu'elle peut embrasser, car ce savant écrivain a adopté un cadre beaucoup plus vaste. Il a divisé en quatre classes les maladies de la peau : 1° Celles qui sont propres à ce tissu ; 2° celles qui appartiennent à ses dépendances ; 3° l'étude des corps étrangers qui peuvent s'y développer ; 4° les maladies primitivement étrangères à la peau, mais qui lui impriment parfois des altérations toutes spéciales.

Dans la *première section* se trouvent les inflammations : — *A.* à une seule forme élémentaire : ce sont les affections exanthémateuses, bulleuses, vésiculeuses, pustuleuses, furonculeuses, gangréneuses, papuleuses, squameuses, tuberculeuses ; — *B.* à plusieurs formes élémentaires : les brûlures, les engelures et les syphilides.

Dans la *deuxième section* sont placées les sécrétions morbides qui comprennent les éphidroses, concrétions cutanées, tannes et tumeurs folliculeuses.

la *troisième section*, les congestions hémorrhagiques : cya-
urpur, vibices, pétéchies, dermatorrhagies.
la *quatrième section*, l'anémie de la peau.
la *cinquième section*, les névroses.
la *sixième section*, les vices de conformation : 1° du *derme*,
nant : hypertrophie, atrophie, nævus, kéloïde ; 2° du *pig-*
écoloration, nævi pigmentaires, éphélides, chloasma, lentigo,
rmie, ictère, teinte du nitrate d'argent ; 3° de l'*épiderme* :
se, appendice, cors.
euxième classe comprend les altérations des ongles et celles
ls.
oisième classe : les corps étrangers inanimés et les corps
rs animés.

émettrons notre opinion sur la classification de M. Rayer
même franchise que nous l'avons fait pour les classifications
ntes. Ce savant médecin nous saurait mauvais gré d'agir
ent.

classification est un grand cadre dont les divisions sont
et bien dessinées ; il a permis à son auteur d'embrasser
es affections qui peuvent atteindre la peau ; mais dans les
s désignées sous le nom d'*inflammations*, il en est qui ne
s inflammatoires : le favus, par exemple, rangé dans la caté-
es pustules, et qui n'est pas pustuleux. L'éléphantiasis des
st-il inflammatoire? En distinguant les inflammations en
une seule forme élémentaire et à plusieurs formes élémen-
M. Rayer n'a pu être exact.
let, la *gale* est tantôt vésiculeuse, tantôt vésiculeuse et pa-
, tantôt pustuleuse, et dans ces trois cas la forme étant dif-
elle devait être rangée dans plusieurs divisions. Le *sycosis*
e pustuleux ou tuberculeux. Le *lichen* n'est pas toujours à
e papules ; il est quelquefois papuleux et vésiculeux, comme
lichen eczémateux. Le *lupus* n'est pas toujours tuberculeux :
e *lupus exedens*. L'*ictère*, les *éphélides* ne sauraient être con-
comme des vices de conformation du pigment de la peau ; il
le même de l'*achromie* ou décoloration, qui n'est pas tou-
ngénitale. L'*ichthyose* est une maladie et non pas un vice de

conformation de l'épiderme; les *pityriasis versicolor* et *nigra* sauraient, dans la plupart des cas, être considérés comme affections squammeuses.

C'est qu'il est extrêmement difficile de créer une classification l'abri de tout reproche. M. Rayer nous semble d'ailleurs avoir établ la sienne plutôt pour une exposition méthodique de toutes les ma tières de son excellent ouvrage sur les affections cutanées, et nous devons dire que ce cadre est très généralement heureux.

J'arrive maintenant à une classification de date plus récente : c'est celle qu'a adoptée M. Baumès, de Lyon, dans sa nouvelle *Dermatologie* publiée en 1842.

Partant de ce principe que, quelle que soit la forme sous laquelle se présente une affection dartreuse, elle résulte de l'exercice irrégulier des forces de la vie, que l'on ne saurait rattacher qu'à une force ou cause première inconnue que l'on chercherait en vain, il appelle cette inconnue *fluxion*, sans y attacher ni le sens qu'on attribue ordinairement à ce mot, ni aucune signification quelconque. C'est l'x de la dartre sous quelque forme qu'elle se présente.

Mais, dit-il, ce qu'il importe au médecin de connaître pour opérer la guérison de la dartre, c'est d'arriver à déterminer quelle est la cause externe ou interne, quelle est la condition morbide qui a pu faire naître et qui entretient cette *fluxion*. Une fois connue, on l'attaque, on la détruit, *ce qui* (pour le dire en passant) *n'empêche pas d'agir sur la maladie locale qui s'est perpétuée à la peau pendant un certain temps et qui y a fait en quelque sorte élection de domicile.*

Ceci posé, M. Baumès établit des catégories :

1° *Fluxion par cause externe.*

2° *Fluxion réfléchie*, ou répétition en dehors d'un travail morbide qui existe déjà sur un organe interne.

3° *Fluxion déplacée*, ou transport à la peau d'une maladie d'un organe interne, ou fluxion critique.

4° *Fluxion excentrique*, succédant à une cause ou à une série de causes qui portent leur influence sur l'économie en général, et qui introduisent par les voies respiratoires et digestives des principes qui amènent une perturbation dans les fonctions régulières de tous nos organes.

5° *Fluxion par diathèse*, ou consécutive aux diathèses scrofuleuse, cancéreuse, syphilitique, scorbutique.

6° *Fluxion idiopathique*, ou développée dans le tissu de la peau sans cause connue et par suite d'un principe né de l'hérédité, et par cela même de la condition organique de la peau.

7° *Fluxion complexe*, ou résultant de la combinaison de plusieurs causes réunies.

Il applique maintenant ces divers modes de maladies cutanées à chaque maladie en particulier, et pour exposer ces maladies il adopte, à peu de chose près, la classification germanico-anglaise : ainsi il décrit successivement les éruptions *érythémateuses*, *vésiculeuses* ou *puro-vésiculeuses*, *papuleuses*, *tuberculeuses*, *squameuses*.

Puis viennent les *éruptions* se rattachant à la fois à plusieurs des cas précédents.

Puis les *macules*, les *excroissances*, les maladies des dépendances de la peau ; enfin les maladies cutanées par *fluxions diathésiques*.

On voit, en résumé, que M. Baumès a emprunté aux classifications de Willan, d'Alibert et de M. Rayer, ses principales divisions qui sont au nombre de douze, et qu'il a envisagé les maladies sous le point de vue médical pouvant conduire à des applications thérapeutiques plus positives. Ce qu'il a fait de plus spécial, c'est d'appeler l'attention des médecins sur la nécessité de s'attacher à la recherche de l'origine des affections dartreuses pour les mieux traiter ensuite. Malheureusement l'application n'a pas toujours des résultats aussi satisfaisants que pourrait le donner à penser une théorie aussi simple en apparence, et trop souvent le médecin prêche en vain les préceptes de M. Baumès. Ceci soit dit sans que nous inférions qu'il ne faut pas les adopter. Tout médecin éclairé recherche avec soin la cause du mal, et de tout temps il l'a fait et le fait journellement ; mais lorsque le médecin voudra appliquer au malade les divisions tracées par M. Baumès ; quand il recherchera surtout la cause première, la *fluxion*, l'*inconnue*, l'*x* de la maladie cutanée, le malade ou plutôt la cause première du mal lui fera défaut, et la classification lui deviendra inutile.

Mais la publication de la première édition de notre ouvrage,

notre honorable collègue M. Hardy a fait connaître dans ses leçons sur les maladies de la peau une classification nouvelle. Nous en donnons ici le tableau.

Classification des maladies de la peau par ordre de leur nature (1856), *par* M. HARDY.

CLASSES.	SECTIONS.	ESPÈCES.
1° Macules et difformités.	1° de l'appareil chromatogène.	1° Nævi pigmentaires. 2° Lentigo. 3° Ephélides. 4° Nigritie. 5° Vitiligo. 6° Albinisme.
	2° de l'appareil vasculaire.	7° Taches vineuses. 8° Nævi vasculaires. 9° Tumeurs fongueuses.
	3° de l'appareil folliculaire.	10° Acné punctata. 11° Acné varioliforme. 12° Acné miliaris. 13° Molluscum.
	4° de l'appareil papillaire	14° Verrues.
	5° de l'appareil épidermique.	15° Durillons. 16° Cors. 17° Ichthyose. 18° Productions cornées.
	6° du derme.	19° Kéloïde.
2° Inflammations simples constituant des maladies locales.		20° Erythème. 21° Strophulus. 22° Urticaire. 23° Herpès. 24° Ecthyma. 25° Prurigo. 26° Acné. 27° Pemphigus.
3° Maladies parasitaires.	1° Parasites végétaux.	28° Favus. 29° Herpès circiné. 30° Herpès tonsurant. 31° Sycosis. 32° Porrigo decalvans.
	2° Parasites animaux.	33° Phthiriase. 34° Gale.
4° Maladies symptomatiques d'une affection générale		35° Herpès labialis et nasalis. 36° Taches rosées. 37° Sudamina. 38° Purpura.

5° Fièvres éruptives.	. . . . .	39° Rougeole. 40° Scarlatine. 41° Variole. 42° Erysipèle. 43° Roséole. 44° Erythème papuleux. 45° Erythème noueux. 46° Erythème scarlatiniforme.
6° Dartres.	. . . . .	47° Eczéma. 48° Lichen. 49° Pityriasis. 50° Psoriasis.

7° Scrofulides.
8° Syphilides.
9° Cancroïdes.
10° Maladies exotiques et climatériques.

Nous ne pensons pas devoir soumettre à notre critique cette classification, sur laquelle, j'en suis convaincu, M. Hardy n'a pas encore dit son dernier mot. Il en restreindra probablement les classes. Il fera rentrer plus tard, dans le cadre d'affections qui sont un reflet d'un état général de l'économie, des maladies qu'il a peut-être trop localisées. Quelque récente qu'elle soit, nous nous empressons de la livrer à la publicité, et nous remercions notre collègue de nous y avoir autorisé.

Telles sont les principales classifications adoptées jusqu'à ce jour par les dermatologistes, en tant qu'elles offrent réellement les caractères qui peuvent leur faire donner le nom de classification. Si nous nous résumons à cet égard, nous verrons qu'elles ont été faites soit en vue du diagnostic, soit en vue de la thérapeutique des maladies de la peau. Elles ont toutes leur côté avantageux et utile. Aux personnes qui veulent apprendre à reconnaître une maladie de peau, je leur dirai : Attachez-vous à la classification germanico-anglaise de Plenck et de Willan, adoptée avec quelques légères modifications par MM. Baumès, Cazenave et Schedel, Gilbert et Rayer; à celles qui voudraient grouper entre elles les maladies cutanées dans le but d'applications thérapeutiques générales pour chaque groupe : Adoptez la dernière classification d'Alibert.

Toutes ces classifications pèchent par les deux conditions exigibles pour toute bonne classification : 1° l'idée mère à laquelle

viennent se rattacher toutes les divisions, genres, espèces et variétés; 2° l'impossibilité de rapporter à chacun de ces groupes bon nombre de maladies. Sous ce rapport, le reproche peut être généralement appliqué. Ainsi, tous les auteurs ont négligé les formes mixtes sous lesquelles peuvent se présenter les maladies de la peau.

Mais jusqu'alors notre tâche a été facile: c'était celle d'un critique. Que mettre à la place de toutes ces classifications? A cet égard, nous sommes obligé d'avouer notre impuissance à remplir ce programme; les efforts de ceux qui nous suivent, MM. Bazin et Hardy, ne sont pas plus heureux que ceux des médecins qui nous ont précédé, car dans son cours de séméiotique M. Bazin a comme nous critiqué, sans élever un nouvel édifice. Cependant il nous fallait un ordre d'exposition des maladies qui eût quelque apparence de logique. Nous nous sommes arrêté à l'idée de former des groupes morbides; pour les constituer, nos points de départ n'ont pas toujours été les mêmes. Voici les motifs qui nous ont dirigé dans ces agglomérations de maladies: 1° autant que possible, nous avons mis à côté les unes des autres les affections qui ont entre elles des analogies de causes et de thérapeutique; 2° dans d'autres circonstances nous avons dû faire intervenir la forme morbide; dans d'autres cas, le produit morbide ou l'accident morbide; 4° enfin l'origine climatérique. Nous sommes ainsi arrivé à constituer quatorze groupes de maladies qui forment le tableau ci-après.

GROUPE.
Érythème.
Urticaire.
Roséole.

GROUPE.
Eczéma.
Herpès.

GROUPE.
Pemphigus.
Ecthyma cachecticum.
Rupia.
Purpura.
Scorbut.

GROUPE.
Impétigo.
Ecthyma.
Sycosis.
Acné et couperose.

GROUPE.
Lichen.
Prurigo.
Strophulus.

GROUPE.
Pityriasis.
Psoriasis.
Lèpre vulgaire.
Ichthyose.

GROUPE.
Teigne.
Herpès tonsurant.
Porrigo decalvans.
Sycosis?
Herpès circiné?
Pityriasis versicolor.
Plique.

8e GROUPE.
Gale.
Maladies pédiculaires.
Acné punctata.

9e GROUPE.
Lupus.
Scrofulo-syphilides.

10e GROUPE.
Syphilides.

11e GROUPE.
Pellagre.
Lèpres.
Bouton d'Alep.
Pian.
Kéloïde.
Molluscum?
Plique.

12e GROUPE.
Productions anormales et accidentelles de la peau.

13e GROUPE.
Maladies des ongles.

14e GROUPE.
Des maladies qui affectent les cheveux, particulièrement chez l'enfant à la mamelle.
Maladies de quelques régions du corps.

Certes, ce n'est pas là de l'homogénéité; mais au moins existe-t-il, dans l'étude successive des maladies qui constituent chacun des groupes, des données qui dirigent le médecin vers la partie applicable au traitement des affections de la peau; ce que nous aurons soin de faire ressortir au commencement de chaque groupe. Nous ne mettons donc ici aucune prétention à une classification.

PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE
SPÉCIALES.

PREMIER GROUPE.

Affections exanthémateuses.

EXANTHÈMES (ἐξάνθημα, efflorescence ; ἐξανθέω, je fleuris).

Ce groupe de maladies est si nettement tranché, que Plenck, Willan et Bateman, tout en prenant pour base de leur classification l'élément anatomico-pathologique, ont cru devoir en faire une classe à part ; et cependant il y a dans cet ensemble de maladies les formes les plus variées d'état pathologique qui, envisagées au point de vue anatomo-pathologique seulement, permettraient de les ranger dans diverses catégories de vésicules, de pustules, de papules, etc. ; mais ces dermatologistes ont reculé devant cette grande considération, que les exanthèmes ont entre eux des caractères si communs, une analogie de cause, d'évolution, de terminaison et de thérapeutique telles, qu'ils n'ont pas osé les séparer et qu'ils ont été réduits à en faire une classe à part, détruisant forcément l'unité de vue et l'harmonie de leur classification. C'est qu'il n'en pouvait être autrement ; c'est qu'il ne faudrait pas être médecin pour se permettre de scinder tout cet ensemble d'affections dites *éruptives*, et de maladies cutanées symptomatiques de causes générales si nettement dessinées.

Or, si dans d'autres maladies de la peau, à formes variées d'ailleurs, on retrouve les mêmes considérations moins nettement tranchées, il est vrai, mais existant cependant, le lecteur nous pardon-

n-t-il pas de ne point nous être astreint servilement à la sification de Willan, et d'en avoir agi ainsi pour rapprocher des ctions plus ou moins identiques sous les rapports, ou de la ne, ou de la cause, ou de la thérapeutique, et à ce dernier point ue surtout.

t d'abord ce qui frappe le plus le praticien, c'est que toutes ces ctions exanthémateuses ont pour point de départ un état géné- de manière que l'éruption n'en soit qu'un reflet. Cet état éral, cette maladie d'ensemble, dérive de plusieurs causes dif- ntes; il ne saurait être rattaché à une cause, à un principe que. Ici c'est le virus variolique, là l'inconnue de la rougeole, la scarlatine; ailleurs c'est l'érythème, la roséole, l'urticaire, venant soit d'un état inflammatoire de l'économie, qui a été onséquence de la suppression des règles ou d'un écoulement guin périodique, ou dépendant d'une sorte de fluxion printa- re du sang, si je puis m'exprimer ainsi pour rendre ma pensée. ns d'autres affections, ce sera l'usage de certains médicaments, certains poissons, etc. Mais dans tous ces cas l'éruption n'est e le phénomène morbide, la maladie est dans toute l'économie.

En second lieu, la régularité de ces exanthèmes donne naissance à e sécrétion morbide qui a sa période d'accroissement, son époque suppuration et de dessiccation à jour fixe, comme si la nature débarrassait de tout ce qui gêne l'harmonie de ses fonctions par te sorte d'émonctoire.

En troisième lieu, ce qu'il y a de remarquable dans la produc- n de tous ces phénomènes cutanés, c'est la régularité de leur suc- sion pour ainsi dire à heure fixe, et tellement précise, que quand te évolution ne suit pas sa marche accoutumée, l'état général du lade en devient plus grave. Essayez-vous d'enrayer, de modifier, faire avorter ces affections éruptives, vous amenez une pertur- ion plus ou moins grave dans l'économie, vous faites naître une legmasie d'un des principaux organes avec trouble fonctionnel ns ou moins intense.

Enfin la thérapeutique de ces affections repose sur ces deux prin- es, qu'il faut savoir en favoriser le développement, et qu'il y ieu en général de livrer à elle-même l'affection cutanée.

Quoi qu'il en soit, il n'entre pas dans le cadre que nous nous sommes tracé de décrire tous les exanthèmes, la généralité de ces affections est largement étudiée dans les traités de pathologie; mais il en est trois qui nous concernent d'une manière toute spéciale: ce sont l'*érythème*, l'*urticaire* et la *roséole*. Si nous en traitons à l'exclusion des autres, c'est que ces maladies affectent des formes particulières peu connues de la généralité des médecins; c'est que l'histoire de l'une d'elles, en particulier, l'érythème, ne peut être faite que par un dermatologiste, à cause des aspects si multipliés sous lesquels il se présente et de ses connexions avec les autres affections cutanées.

Érythème (ἐρύθημα, rougeur); *erythema*, feux de dents, efflorescence, *dartre érythémoïde* d'Alibert.

ÉRYTHÈME SYMPTOMATIQUE.

Dépendant:

1° D'un état inflammatoire général.
- Fugace (*fugax*).
- Papuleux (*papulatum*).
- Tuberculeux (*tuberculosum*).
- Noueux (*nodosum*).
- Marginé (*marginatum*).
- Circiné (*circinatum*).
- Mamellé (*mamellatum*).
- Excentrique (*excentricum*).

2° D'un état anémique.
- Lisse (*leve*).
- Paratrime.

3° D'une cause syphilitique.
- Érythème syphilitique.

4° D'une cause générale mal connue.
- Engelures (*pernio*).
- Acrodynie.
- Pellagre.

ÉRYTHÈME IDIOPATHIQUE.

Coup de soleil (*erythema à solare*).
Par piqûre (*à punctura*).
Par brûlure.
Par succion.
Par contact d'un fluide irritant.
- Sueur altérée (*intertrigo*).
- Urine.
- Flueurs blanches.
- Matières fécales.

L'érythème est une affection qui, dans ses prodromes, son début, sa forme, sa marche et sa terminaison, présente des phénomènes si variés, qu'il peut offrir l'image de presque toutes les formes pathologiques des maladies cutanées, depuis celles qui affectent le plus superficiellement la peau jusqu'à celles qui l'attaquent le plus profondément; depuis la simple rougeur, la simple efflorescence à la surface de la peau jusqu'à l'inflammation profonde et violente, jusqu'à la gangrène. On y retrouve toutes les dispositions morbides

s la classification de Willan : rougeur, sécrétion vésiculeuse, état pulleux, tuberculeux, etc. Tantôt il est fugace, tantôt persistant. peut être précédé des symptômes qui forment le cortége des aladies les plus légères, comme aussi de ceux qui annoncent une aladie grave. Commençons par en donner les caractères, afin établir nettement les bases du diagnostic.

A l'état simple, l'érythème se présente toujours avec les seules pparences d'une rougeur plus ou moins vive et rose de la peau, ec ou sans surélévation des téguments, amenant un peu de chaeur, de démangeaison ou de cuisson, et sans sécrétion aucune. Cette ougeur a pour cachet trois caractères essentiels : *coloration rosée de partie malade :* rosée, j'insiste sur ce mot ; *disparition instantanée complète de la coloration* sous la moindre pression du doigt ; *apparion très rapide* de ce phénomène, de sorte qu'à l'aide de ces caracres il est impossible de confondre l'érythème avec aucune autre lection cutanée.

L'érythème peut être envisagé sous trois points de vue : 1° il est mptomatique ou idiopathique ; 2° il est aigu ou chronique ; 3° il t endémique, épidémique ou sporadique. De ces trois divisions mmunes à presque toutes les maladies, c'est la première qui nous ppe, parce qu'elle nous conduit directement à la thérapeutique. n effet, dans l'érythème symptomatique, ce n'est pas l'érythème i'il faut voir, c'est la cause, et c'est vers elle qu'il faut diriger le itement. Pour l'érythème idiopathique, la médication diffère mme les variétés d'érythème et de causes.

1° *Érythème symptomatique ou dépendant d'un état général.*

Dans cette division, nous trouvons une série d'espèces qui ont reçu s auteurs des noms différents :

Érythème amorphe ; — papuleux ; — tuberculeux ; — noueux ; - mamellé ; — marginé ; — circiné ; — excentrique ; — fugace. Ces rythèmes ont pour caractère la forme sous laquelle ils s'offrent à s yeux.

L'*érythème amorphe* n'a pas de forme particulière ou déterminée, insi que son nom l'indique.

L'*érythème papuleux* est caractérisé par l'apparition à la surface de la peau de petites élevures de forme et de volume analogues à la forme et au volume d'une lentille.

L'*érythème tuberculeux* se rapproche du précédent, et n'en diffère qu'en ce qu'il est plus volumineux. Dans ces deux variétés d'érythème papuleux et d'érythème tuberculeux les rougeurs sont très nettement circonscrites.

L'*érythème noueux* présente une rougeur qui n'est pas parfaitement limitée. A la surface de la peau paraissent des élevures du volume d'une noisette environ, et l'on sent dans l'épaisseur de ce tissu comme de petites nodosités, en passant le doigt sur la saillie érythémateuse, de sorte que l'affection paraît plutôt avoir son siége sous la peau qu'à la surface.

L'*érythème mamellé*, signalé par Alibert, est caractérisé par une rougeur de forme ovoïde, de la largeur de la main environ, avec élévation de la surface érythémateuse au-dessus du niveau de la peau, ce qui lui donne un aspect assez semblable à la saillie d'une mamelle.

L'*érythème marginé* est celui dont la circonférence est très nettement arrêtée et circonscrite ; caractère fort important et qui lui a fait donner son nom. Cet érythème est souvent précédé et accompagné d'un mouvement fébrile ; il apparaît surtout à la figure, au cou et au tronc plutôt que sur les membres.

L'*érythème circiné* ou à forme circulaire. Ce qui distingue cette variété, c'est que la partie centrale du cercle décrit par l'éruption est complétement dégagée ; dès lors il ne reste plus qu'un cercle érythémateux en dedans duquel la peau est saine : il n'y a de malade que la circonférence, comme dans la variété précédente. On pourrait le confondre avec l'herpès, mais il est exempt de vésicules. Ses plaques affectent souvent une étendue très considérable.

L'*érythème excentrique* est formé par une surface érythémateuse arrondie qui s'étend de plus en plus en largeur en laissant à son centre une portion de peau qui a l'apparence d'une cicatrice très superficielle ; son siége est généralement aux pommettes et au menton ; sa largeur est celle d'une pièce de 2 francs. Biett l'a décrit le premier.

Il est une variété d'érythème excentrique du bout du nez, à forme chronique comme le précédent, et dont les auteurs n'ont pas fait mention. Il survient fréquemment à la suite d'une maladie grave, une fièvre typhoïde, une variole ; il peut aussi se montrer en même temps à la pulpe des doigts, où il cause alors une sensation très pénible par la pression : c'est ce qui a lieu, par exemple, pour les jeunes personnes qui touchent du piano. On voit cet érythème se montrer par une légère surface très petite avec un gonflement à peine sensible de la peau, mais entourée d'un bourrelet appréciable au toucher. Cette surface érythémateuse s'élargit peu à peu au point d'acquérir l'étendue de 1 1/2 centimètre à 1 centimètre en surface, laissant à son centre une peau légèrement blanchâtre et de coloration inégale comme la surface d'une cicatrice très superficielle de brûlure, et entourée de cette rougeur en bourrelet plus saillant. On se demande si c'est là un érythème, une engelure ou un herpès? Ce qui peut exclure la pensée de cette dernière maladie, c'est l'absence de démangeaison ; il n'y a dans les points affectés qu'une sensation de douleur par une pression brusque, ou de chaleur par la réaction qui suit l'exposition à l'air vif ou froid, ou par l'exposition au feu. Ce n'est pas l'engelure, car dans l'engelure la surface est uniformément violacée et sans bourrelet. D'ailleurs aucune sécrétion, aucune apparence de vésicules ou de lames épidermiques sur le bourrelet, comme dans l'herpès.

La marche de cette dernière affection est essentiellement chronique ; elle dure des années, et résiste aux pommades ; les lotions résolutives, et surtout les cautérisations répétées avec une solution de nitrate d'argent au cinquième ou au dixième de son poids, en ont seuls justice. Les douches sulfureuses réussissent aussi quelquefois. Ajoutons qu'il est des cas où l'on a beaucoup de peine à débarrasser les malades. J'ai employé en vain le traitement antiscrofuleux le plus actif et le plus longtemps soutenu.

Enfin, l'*érythème fugace* paraît un jour pour disparaître le lendemain ; disparaît de nouveau, puis reparaît au bout de deux, trois ou quatre jours, sans époque fixe, à des intervalles plus ou moins éloignés.

Toutes ces formes sont aiguës ; elles ne sont jamais endémiques

ni épidémiques, toutes sont symptomatiques de diverses circonstances, soit d'un état morbide général de l'économie, caractérisé par une fatigue, une lassitude générale ; soit d'une longue marche, d'un état saburrhal des voies digestives, de l'usage longtemps prolongé de certains poissons, et notamment de poissons salés, des moules. Les moules contiennent, plus particulièrement vers le mois de septembre, une production dont on ignore la nature, que les uns regardent comme un insecte, les autres comme une mousse; leur ingestion provoque alors, au bout de vingt-quatre heures environ, l'apparition d'un érythème général, d'une durée plus ou moins longue, sous forme papuleuse ou érythémateuse simple. — Dans d'autres cas, la cause en est une pléthore sanguine, une menstruation irrégulière, chez les jeunes filles surtout. — Ceci posé, et ce fait une fois bien établi, que l'érythème est ici toujours symptomatique, nous devons spécifier quelques circonstances qui lui sont propres, soit comme causes, soit comme résultats. Nous appellerons surtout l'attention sur l'érythème noueux, l'érythème papuleux et l'érythème circiné.

L'érythème noueux se montre presque exclusivement aux jambes. Il est particulier aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Il apparaît au voisinage de la puberté; chez les jeunes filles, et quelquefois chez les femmes plus avancées en âge, il est souvent lié à l'aménorrhée. Chez les jeunes garçons, il dépend du développement rapide que l'on observe dans l'adolescence. Dans tous les cas il indique un état de pléthore à combattre, sauf, pour les jeunes filles, à provoquer la menstruation; aussi disparaît-il toujours sous l'influence d'une saignée générale; chez les femmes, une application de sangsues à la vulve suffit pour amener le même résultat.

L'érythème papuleux se montre principalement aux membres et surtout au voisinage de leurs extrémités; il est fréquent de le rencontrer chez les personnes atteintes de rhumatismes ou de rhumatismes goutteux, et il a cela de particulier que lorsque la coloration rouge et l'aspect papuleux ont disparu, il reste une tache d'aspect cuivré, semblable à une tache ecchymotique; de sorte que, comme ces taches sont nettement circonscrites, disséminées sur les membres et sur le tronc, on peut être conduit à se demander si ce

ne sont pas des taches syphilitiques. C'est un fait très grave qui doit fixer l'attention du médecin ; car on peut se trouver conduit à prescrire un traitement antivénérien à des personnes qui n'ont jamais eu de maladies vénériennes, ou qui n'ont eu qu'un simple écoulement blennorrhagique à une époque très reculée. Souvent même cette dernière circonstance est la cause déterminante de l'erreur. Il faut donc se défier de la persistance des taches alors qu'elles ont succédé à un état aigu très marqué. Ce qui embarrasse même sous ce dernier rapport, c'est que très souvent les syphilides se développent en vingt-quatre ou quarante-huit heures, et avec un état fébrile, comme l'érythème papuleux.

Il existe une grande différence entre l'érythème circiné et l'érythème excentrique. Dans le premier, la plaque est manifestement rouge, quoiqu'elle soit entourée d'un bourrelet ; dans le second, le centre se guérit au fur et à mesure que le bourrelet s'étend à la circonférence. L'érythème excentrique est fort remarquable. L'un des cas les plus intéressants que nous en ayons vu a été chez un magistrat de la Cour de cassation, auprès duquel nous fûmes appelé il y a quelques mois par notre confrère M. Devis. Ce magistrat était d'un âge déjà avancé. Il avait été pris de tous les prodromes généraux du développement d'un exanthème ; et en effet il survint bientôt une urticaire générale, qui fut suivie quelques jours après de purpura aux jambes. A la suite de ce purpura, il se montra un érythème excentrique qui se dessinait par l'apparition de petites plaques rosées qui, en quelques heures, prenaient un rapide accroissement, s'élargissaient en se dégageant à leur centre, tout en conservant un anneau érythémateux à teinte rosée et fugace. Ces anneaux occupaient le tronc et les membres supérieurs, plutôt en avant qu'en arrière. Quelques-uns d'entre eux avaient 10, 15, 20 centimètres de diamètre, en sorte que plusieurs se confondaient entre eux, de manière à représenter une circonférence largement sinuée ou formée de portions de cercles. Le malade n'éprouvait autre chose qu'une sensation de fourmillement ou de picotement. L'affection n'eut pas de suites.

Du reste, les érythèmes ont des caractères communs auxquels on doit faire une grande attention. Ils ont tous une invasion brus-

que ; ils se développent dans l'espace de vingt-quatre à trente-six heures à peu près. Ils sont précédés de malaise, de lassitude, de courbature, d'anorexie, etc. Quelquefois, et cela arrive surtout chez les ouvriers, les malades vous assurent ne s'être aperçus d'aucun de ces prodromes ; mais les gens du monde, qui s'écoutent plus et s'observent mieux, accuseront pour la plupart un ensemble de phénomènes généraux qui porte un trouble plus ou moins prononcé dans l'économie, durant la nuit qui aura précédé le moment de l'éruption. Les sensations que développent les érythèmes sont toutes différentes de celles que produisent les autres éruptions cutanées ; c'est ou un sentiment de fourmillement, ou de picotement, ou de cuisson, mais en général pas de démangeaison.

Quant à la marche et à la durée de cette affection, l'érythème fugace dure assez longtemps, en ce sens qu'il se reproduit. Il est symptomatique de fièvres graves, se développe consécutivement à des phlébites, à des affections typhoïdes. Il se montre à des intervalles variés et non déterminés , paraît et disparaît. Il ne se guérit qu'avec la cause qui l'a produit. En général, on considère cet érythème, dans les maladies pendant le cours desquelles il se développe, comme l'indice d'un état général grave ; sa durée ne saurait doncê tre déterminée.

Les érythèmes amorphe, tuberculeux, mamellé, ne durent guère que huit à dix jours ; l'érythème papuleux, un peu plus longtemps. L'érythème noueux peut persister pendant plusieurs semaines, et il n'est pas rare de le voir se montrer d'une manière successive, affectant les jambes et les cuisses de préférence aux membres supérieurs. Quant aux taches que laisse l'érythème papuleux, elles persistent un certain laps de temps après la disparition de l'état aigu de l'éruption, plusieurs septénaires.

Les érythèmes sont d'ailleurs essentiellement propres au printemps et à l'été ; on en observe aussi quelques cas en automne.

En général, le pronostic des érythèmes n'a rien de grave, excepté le cas où ils sont symptomatiques d'un état général grave de sa nature. Mais les érythèmes papuleux et noueux, étant ceux qui ont le plus de durée et qui exigent plus de soin, doivent appeler l'attention du médecin.

ous ces érythèmes se terminent d'ailleurs par résolution, si on bandonne à eux-mêmes et si l'on n'emploie pas dans leur traitement de médication irritante ou perturbatrice.

ais nous avons dit que l'érythème pouvait affecter toutes les es des maladies de la peau, et donner naissance à tous leurs uits de sécrétion de manière à arriver jusqu'à l'état gangré- : c'est ce qui s'observe dans les cas où la cause du mal est ex-, ainsi que le démontre l'observation ci-jointe :

ne femme, jouissant autrefois d'une certaine fortune, s'est mis our en tête de parcourir les pays lointains, l'Italie, la Grèce, pte même, puis l'Angleterre. Partie avec une bourse assez bien ie, elle a fini par tomber dans la misère ; obligée de voyager à , elle est revenue à Paris en mendiant, fatiguée par de longues ches. A peine de retour à Paris, elle fut prise d'un érythème à mbe, avec phlyctènes, suppuration, teinte violacée de la peau, nce à la gangrène. C'est que chez elle la fatigue, conséquence e marche forcée, avait été la cause du développement de l'éry-e, et que, malgré l'érythème, la marche avait été continuée. n'est pas rare de voir des malades qui se placent dans de sem-es conditions, soit par le même motif, soit par l'application de nes irritants, et alors, sur la surface érythémateuse, se déve-nt des vésicules qui sécrètent de la sérosité comme dans l'ec-, ou donnent de la suppuration et finissent par s'ulcérer dans surface plus ou moins étendue. Voici un exemple d'érythème tcité simulant un *pityriasis rubra.*

malade, couchée au n° 13 de la salle Saint-Thomas, est âgée de vingt-ans. Elle travaille dans les filatures de laine, elle est mariée, elle a eu e enfants dont un seul est vivant ; elle est d'une assez bonne constitution, ne d'un tempérament sanguin ; elle n'a jamais eu de maladies graves, et bien réglée. Depuis trois ans la malade ressentait des douleurs entre ux épaules, douleurs qui ont commencé après la seconde couche ; elle ses douleurs pendant trois ans sans suivre aucun traitement ni interne erne. Enfin, après sa quatrième couche, le 13 novembre 1850, ses ues étaient devenues si vives, qu'elle pouvait à peine marcher. Le vier 1851, elle se décida à consulter un médecin qui ordonna une pom-d'huile de laurier et de camphre ; elle s'en frotta le dos et le cou quatre e jeudi, et le vendredi matin, trouvant que cette médication la faisait

male. Voici une observation qui démontre toute la gravité de certains érythèmes symptomatiques.

Le 9 décembre 1852 est entrée à l'hôpital Saint-Louis, salle Saint-Thomas, n° 17, la nommée Soyer, âgée de vingt ans, cuisinière. Cette fille d'un tempérament lymphatique, est sujette à des indispositions fréquentes. Elle est réglée depuis l'âge de quinze ans, et n'a jamais éprouvé de trouble ni de retard dans l'apparition de ses menstrues. Quinze jours avant son entrée à l'hôpital, elle a eu ses règles, qui ont duré quatre jours; le dernier jour de l'écoulement menstruel, elle eut dans sa maison un service extraordinaire et très pénible, et le lendemain, 3 décembre, elle fut prise de douleurs dans les membres, de céphalalgie, d'inappétence, de fièvre. Une saignée fut faite, et un purgatif ordonné. Le lendemain, la fièvre augmenta, il y eut de la diarrhée, des vomissements et l'on vit apparaître sur la face une rougeur vive, qui, débutant par la joue gauche, s'étendit bientôt à la joue droite, au menton et un peu au front. Quelques plaques rouges apparurent aussi aux jambes et aux genoux. La face était le siége d'une chaleur considérable. Quatre jours après le début de la maladie, les symptômes d'une bronchite se manifestèrent, et au septième jour la malade se décida à entrer à l'hôpital.

A son arrivée elle était très abattue : on voyait sur chaque joue deux ou trois plaques érythémateuses plus grandes qu'une pièce de deux francs, d'un rouge clair, dont la rougeur disparaissait sous la pression du doigt. Chacune d'elles était entourée d'un cercle rouge foncé, plus élevé que le centre de la plaque, et dont la saillie était facilement sentie en promenant la main sur la joue. Dans l'intervalle de ces plaques, la peau avait une couleur rouge vif, et formait ainsi un fond uniforme, sur lequel le cercle rouge foncé se détachait parfaitement (*érythème circiné*). Les plaques et le fond sur lequel elles reposaient formaient par leur ensemble une surface oblongue d'un rouge vif, obliquement dirigée de la pommette vers l'angle de la mâchoire, tranchant fortement par sa coloration avec la peau du reste de la joue. Au menton existait une plaque plus petite, mais en tout semblable aux précédentes. Sur les jambes, au voisinage des genoux, de petites plaques érythémateuses formant des saillies arrondies représentant tout à fait de l'érythème noueux; elles disparurent dès le lendemain.

Il y avait quelques râles sibilants dans la poitrine : les crachats étaient muqueux, la peau chaude, le pouls assez calme, peu de douleurs de tête.

Pendant les trois premiers jours, l'état de la malade resta le même; il était assez satisfaisant. Mais, dans la nuit du troisième au quatrième (12 au 13 décembre), la fièvre s'alluma, il y eut des nausées, de la céphalalgie, un peu de diarrhée. Le lendemain matin, un bain d'air chaud fut ordonné. Le 14 décembre, un peu plus de calme, toutefois toujours des nausées. 1 gr. 50 centigr. d'ipéca. — Dans la journée, les vomissements furent assez abondants; toujours un peu de diarrhée; pas de fièvre. — 15, 16, 17 décembre, la fièvre

s'est un peu allumée, la diarrhée persiste, la vue est un peu trouble; toujours les symptômes du début du côté des voies respiratoires. Un verre d'eau de Sedlitz est ordonné chaque jour. — 18 décembre. L'abattement est plus marqué ; bourdonnements dans les oreilles et un peu de gargouillement dans la fosse iliaque droite. La langue, qui jusque-là s'était maintenue humide, est devenue sèche ; la peau est chaude et sèche. Bain d'air chaud. — 19, 20, 21 décembre, la malade est toujours très affaissée ; le dévoiement continue : quatre ou cinq selles liquides par jour ; la céphalalgie a disparu. Bains d'air chaud. — 22 décembre, la nuit a été assez bonne ; l'abattement est moindre; toujours du dévoiement. 1/4 lavement laudanisé. — 23, 24, 25 décembre, le dévoiement a diminué : deux selles par jour ; le matin, la malade est mieux ; mais le soir, vers trois heures, elle est reprise de fièvre, et est très abattue ; la fièvre cesse chaque soir vers neuf heures. On continue les lavements. — 26, 27 décembre, le mieux s'est maintenu le matin ; les selles sont de moins en moins nombreuses : une seule par jour. Le soir, à trois heures, la fièvre a été faible. 4 gr. de diascordium. — 28 décembre. Le matin, la peau est chaude, le pouls assez vif et plein ; le mal de tête a reparu ; la langue est sèche ; une seule selle hier. Même traitement.

Depuis cette époque, et sous l'influence du sulfate de quinine, l'accès de fièvre intermittente s'est dissipé, et peu à peu la malade est entrée en convalescence, la diarrhée ayant été arrêtée par les opiacés. Voilà donc un érythème symptomatique d'une affection générale à forme typhoïde, suivi d'une fièvre intermittente. Loin de guérir l'érythème, nous l'avons provoqué par des bains d'air chaud pour porter à la peau et faire naître une sudation générale, puis nous avons combattu les symptômes au fur et à mesure qu'ils se sont présentés.

2° *Érythèmes symptomatiques dépendants d'un état adynamique.*

Dans cette catégorie, je comprends deux espèces d'érythèmes : l'*érythème lisse* (*leve*) ; l'*érythème parutrime*. La première espèce, comme la seconde, coïncide toujours avec un état morbide général avec forme adynamique plus ou moins prononcée. Ainsi l'*erythema leve* se rencontre dans les anasarques avec distension extrême de la peau ; aussi s'observe-t-il presque toujours aux jambes et aux cuisses. On lui a donné le nom de *leve* parce que la peau étant distendue et brillante, même lorsque l'érythème n'existe pas, elle conserve le même brillant quand l'érythème est survenu. Cette espèce d'érythème est presque toujours d'une couleur plus sombre que les autres, n'amène aucune sensation et est persistant ; il dure un temps

plus ou moins long, en raison de l'état général du malade, et de l'état local de la partie œdématiée. Il n'est pas rare de le voir se couvrir de vésicules séreuses plus ou moins nombreuses, et même quelquefois de phlyctènes; parfois aussi ces phlyctènes se remplissent d'une sérosité sanieuse, et sous la sérosité se trouve une tache de nature gangréneuse plus ou moins marquée et plus ou moins étendue. Alors, si le médecin n'a pas enrayé la marche de l'érythème, on voit plus tard se détacher une eschare, et une ulcération plus ou moins difficile à guérir la remplace. Parfois aussi la tache gangréneuse fait des progrès et s'étend ainsi que s'aggrave l'état général du malade.

Cette sorte d'érythème réclame un traitement tout autre que les précédents. C'est par des astringents alcoolisés et camphrés, par la décoction de quinquina, la poudre de quinquina, que l'on remédie à cette affection. Mais comme la distension produite par l'œdème contribue pour beaucoup à son développement et surtout à ses progrès incessants, il ne faut pas hésiter, dans le cas où il se développe des vésicules séreuses, et à plus forte raison quand il se produit une phlyctène, à pratiquer quelques scarifications dans une partie déclive du membre; on donne issue à la sérosité, et, en même temps que la distension de la peau diminue, l'érythème disparaît.

L'*érythème paratrime*, ou par pression, se montre dans les cas où le poids du corps, ou bien la majeure partie du poids du corps, est supporté sur un point limité. Mais, comme chez un individu en bonne santé, qui se trouverait placé dans les mêmes conditions, il ne surviendrait pas pour cela d'érythème, il faut bien admettre que la pression n'est ici que la cause déterminante, et que l'état général en est la cause prédisposante, c'est-à-dire la cause de prédisposition et de durée. Aussi l'érythème paratrime se montre-t-il le plus fréquemment au siége dans le cours des fièvres typhoïdes, même chez les jeunes sujets; ou bien il se développe chez les vieillards plus ou moins débilités, qui, par cause de fracture, de luxation, sont obligés à garder une position permanente sur la même partie du corps.

Cet érythème peut suivre toutes les phases, depuis l'inflammation la plus légère de la peau jusqu'à la gangrène la plus avancée. Bornée dans quelques cas, et surtout dans les premiers temps, à une

simple rougeur, on voit peu à peu cette rougeur d'abord très limitée, et limitée au point où la pression est le plus forte, faire des progrès très lents en étendue, puis prendre une teinte d'un rouge plus foncé. Alors, si l'affection continue à faire des progrès, le premier point affecté présente une petite tache lenticulaire grisâtre qui s'excorie; à l'aspect grisâtre excorié succède une teinte brune, puis une teinte noire qu'accompagne l'odeur caractéristique de l'état gangréneux. Cette surface gangréneuse, d'abord très bornée, gagne peu à peu en surface, et alors de deux choses l'une : ou cet état fait des progrès, et l'on voit la gangrène envahir en étendue et en profondeur les parties affectées, au point de présenter des surfaces gangréneuses de 8 à 10 centimètres de superficie, en même temps que des os plus ou moins superficiellement placés se dénudent et se nécrosent; ou au contraire, et c'est le cas le plus favorable, l'état général s'étant amélioré, l'érythème a cédé aux moyens généraux mis en usage, à quelque époque de développement qu'il fût arrivé; de sorte qu'il a pu ne consister que dans un érythème simple, ou un érythème avec érosion, ou avec une tache gangréneuse, ou, au contraire, avec des eschares plus ou moins étendues.

Cet érythème entraîne toujours de sa nature un pronostic plus ou moins fâcheux, et sa description fait assez comprendre qu'il y a deux indications principales à remplir dans son traitement. En présence de l'état morbide local, la première chose à faire, c'est de diminuer ou d'annuler la pression des parties sur les objets qui servent de soutien. Malheureusement on ne peut pas toujours se rendre maître de cette cause. Ce qu'il faut au moins éviter, c'est le contact direct et surtout le frottement. Le diachylon étendu sur toile, l'emplâtre de Vigo, remplissent parfaitement cette indication, à la condition que ces emplâtres seront renouvelés tous les jours. Il faut entourer de coussins circulaires les surfaces malades, de manière qu'elles n'aient plus de pression à supporter. Ces mesures deviennent insuffisantes aussitôt qu'il y a phlyctène, érosion ou eschare gangréneuse. L'expérience apprend à cet égard, qu'il faut recourir à la médication tonique locale: la poudre de quinquina associée à la poudre de charbon, mêlées ensemble et répandues sur des plumasseaux de charpie que l'on arrose de suc de citron, constituent

ıeilleurs pansements, que l'on doit à Dupuytren ; des lotions le-vie camphrée, ou avec de l'eau additionnée de chlorure :; souvent même les applications de charpie trempée dans ıge Lorsque l'état gangréneux est arrêté, les surfaces concependant un aspect grisâtre demi-putride, on a reconnu ı pouvait toucher avec beaucoup d'avantage les surfaces avec le proto-nitrate acide de mercure, de préférence au cide de mercure du Codex. (Voy. *Formulaire*, CAUSTIQUES.) au traitement général, il est soumis à la maladie primi- is il réclame presque toujours des médications toniques; ıoutenir les forces du malade par quelque vin généreux onner des aliments substantiels aussitôt qu'il peut les sup-

3° *Érythème dépendant d'une cause syphilitique.*

rythème sera décrit dans l'histoire des syphilides.

4° *Érythème dépendant de causes mal connues.*

ı cette catégorie, j'avais placé dans la première édition de cet e trois espèces d'érythème : les *engelures*, ou *érythème pernio*, *ynie* et la *pellagre*. Afin d'être plus logique, j'ai cru devoir r l'histoire de la pellagre dans le groupe des maladies exo- car elle est originaire de la Lombardie. Peut-être sera- ırpris de trouver les engelures dans un ensemble de mala- al connues ; mais si l'on réfléchit que cette affection, tout en ıtrant généralement chez des enfants lymphatiques, se pré- ı divers âges de la vie chez ceux qui ne le sont pas, et persiste er'ains enfants avec une ténacité si grande et en dehors de conditions de tempérament, on ne peut pas se dissi- qu'il y a là quelque chose d'inexplicable et qui justifie notre ın.

thème pernio. — *Engelures* — Cette maladie est essentielle- propre à l'enfance, mais elle peut aussi se développer dans ıscence et même dans l'âge adulte, quoique beaucoup plus ent à cet âge. Certes, l'exposition au froid en est la cause dé-

terminante, mais il y a derrière cette cause une cause prédisposante qui nous est inconnue Et d'abord notons la condition de tempérament lymphatique plus essentiellement liée aux engelures que tout autre ; mais les engelures se montrent aussi chez des enfants d'un tempérament bilioso-sanguin, ou sanguin : il suffit qu'un enfant ait une santé délicate, qu'il végète, ainsi qu'on l'a dit, qu'il s'alimente mal, pour qu'il soit pris d'engelures aux mains ; et, chose remarquable, ce n'est pas durant les froids les plus rigoureux que l'engelure se manifeste, c'est en automne, lors de ces premiers froids, souvent fugaces, de courte durée, qu'il surgit un gonflement sur le dos des doigts, entre les articulations, ou sur les orteils. Ce gonflement occupe la peau et le tissu cellulaire. Il est accompagné de fourmillement, de démangeaison, qui invitent les enfants à se frotter plutôt qu'à se gratter ; mais ce frottement donne du volume à l'érythème et de l'accroissement au mal. Chose remarquable, cet érythème n'existe pas seulement à la peau, c'est la peau et le tissu cellulaire qui sont atteints à la fois, de sorte que le doigt dans sa moitié supérieure a doublé de volume. Il survient quelquefois une seule engelure, le plus souvent deux ou trois, et chez quelques enfants tous les doigts et tous les orteils en sont couverts. En tout cas, et dans cet état, c'est l'engelure au premier degré. Ainsi, à l'état d'érythème, la maladie peut exister d'une manière permanente, sans faire d'autres progrès qu'un peu plus ou un peu moins de gonflement ; et tant que les froids persistent, l'engelure persiste aussi. La saison de l'hiver est la condition de durée, et la limite est le printemps, et pour quelques enfants, la fin du printemps, époque à laquelle le retour des chaleurs amène seul la cessation du mal. Mais aux approches de l'automne, lors des premières gelées blanches, on voit apparaître et se renouveler l'affection à des degrés divers, pour persister ainsi avec ses périodes de décroissance et de reprise, non pas durant quelques années, mais jusqu'à l'âge de dix-huit, vingt, vingt-cinq ans, et quelquefois plus. Il est des personnes qui ont des engelures toute leur vie, si par état elles ont les mains constamment exposées aux intempéries de la saison : c'est ce que l'on voit chez les épiciers surtout, chez les débitants de toile et dans toute profession où les mains sont à l'air.

L'*érythème pernio* ne borne pas ses effets à la rougeur de la peau et au gonflement du tissu cellulaire. Il peut s'ulcérer et donner naissance à des plaies extrêmement douloureuses ; non pas que la douleur soit permanente ou continue, car qu'il n' y ait qu'érythème, qu'il y ait ulcération, c'est toujours la même sensation de démangeaison, de fourmillement ; mais la douleur devient extrêmement aiguë par la pression, et comme les engelures ulcérées existent sur la face dorsale des doigts et des orteils, il en résulte le contact accidentel et très fréquent de ces parties avec des corps durs qui éveillent des sensations très douloureuses. Notez que ces douleurs sont accrues par des pansements plus ou moins mal faits, avec des linges ou de la charpie toujours adhérents aux bords de l'ulcère, et dont le petit malade redoute le renouvellement. En cet état, l'érythème est accompagné d'un gonflement général des doigts qui s'oppose aux mouvements de flexion et qui place l'enfant dans l'impossibilité de se servir de ses mains et souvent aussi de marcher. J'ai vu un enfant qui, de quatre ans à sept ans, est resté pendant huit et neuf mois de chaque année dans l'impossibilité la plus absolue d'exécuter des mouvements, en proie d'ailleurs aux douleurs les plus vives, redoutant tous les contacts, tous les pansements. Les topiques généralement mis en usage n'ont rien fait pour lui ; ce n'est qu'une poudre que l'on emploie à l'état de pâte, vendue aujourd'hui à Paris, dans la pharmacie Savoie, et dont la composition n'est inconnue, qui l'a guéri et débarrassé de ses engelures ; non pas qu'elles ne se soient jamais montrées depuis, mais lorsqu'elles apparaissaient, il suffisait de deux ou trois jours de l'emploi de cette pâte pour les guérir. Je crois que depuis cette époque on a fait un usage presque journalier de cette pâte au collége Sainte-Barbe, et tandis qu'on avait habituellement à l'infirmerie quatre ou cinq enfants malades chaque hiver, actuellement aucun des pensionnaires ne va à l'infirmerie pour être traité d'engelures; il n'y a plus de suspension d'étude pour cette cause. C'est le hasard qui a porté ces faits à ma connaissance, je les ai reproduits tels qu'ils m'ont été donnés. Je n'ai employé cette pâte qu'une seule fois, elle m'a réussi ; mais la disparition des engelures chez cette jeune personne a apporté un certain trouble dans la santé (un état chlorotique d'une

certaine durée), qui s'est rétablie depuis. Il m'a paru utile, dans un intérêt général, de faire connaître ce résultat à côté des inconvénients d'une maladie qui ne porte pas atteinte à la santé, mais qui résiste souvent à la thérapeutique la plus rationnelle.

Les engelures n'affectent pas seulement les doigts et les orteils, et c'est ici que le dermatologiste doit être éclairé. Il n'est pas rare de voir l'engelure au bout du nez, chez des personnes qui n'ont pas les dehors d'un tempérament lymphatique très prononcé, c'est-à-dire des traits arrondis, une figure potelée, de gros os, etc., mais qui, avec des traits délicats, ont une *animalisation* (que l'on me passe cette expression synonyme de *végétation*), qui ont, dis-je, une *animalisation* lente, avec une circulation d'une lenteur remarquable, froid constant du bout du nez, des oreilles, des mains et des pieds, phénomènes qui, d'ailleurs, se montrent très souvent aux mains et aux pieds chez les enfants atteints d'engelures. Il semble que ce ralentissement circulatoire n'entretienne pas la calorification dans ces parties extrêmes, et alors il faudrait considérer l'engelure comme une *gelure*. L'*érythème pernio* du bout du nez suit absolument la marche des engelures des doigts : reparaissant chaque hiver, disparaissant l'été. Il est rare de le rencontrer alors dans le très jeune âge : c'est vers dix-huit à vingt ans que je l'ai toujours observé. Il se montre sous la forme d'une surface violacée arrondie, amenant un peu de gonflement de l'extrémité du nez, et dont la teinte violacée se perd insensiblement avec la couleur de la peau. Cette dernière circonstance distingue l'engelure du bout du nez d'une autre maladie qui n'a pas été plus décrite et que nous avons signalée sous le nom d'*érythème excentrique du bout du nez*. D'ailleurs, il n'y a presque aucune sensation dans l'une ni dans l'autre. L'érythème est en cercle plus ou moins saillant et à circonférence arrêtée, le centre étant plus ou moins blanchâtre ; l'engelure présente une surface uniformément rouge ou violacée. Ajoutons à ces caractères un abaissement de température de la peau souvent très sensible au toucher et qui ne se montre pas dans les deux autres affections.

Le traitement de l'*érythème pernio* doit, suivant nous, être général ou local ; la maladie est toujours le reflet d'une vie générale qui manque d'activité et dans laquelle le sang n'est pas suffisam-

t nutritif, semblable en cela à ce qui se passe dans la gelure ou la congélation. Celle-ci survient principalement chez les per-es qui, soumises comme les autres à l'action du froid, sont es plus qu elles d'aliments et de liqueurs alcooliques ou géné-s. C'est donc une médication fortifiante sous tous les rapports faut prescrire, en hygiene alimentaire et médicaments. Ainsi, iandes rôties noires, le vin généreux, le vin de quinquina, la ure de cantharide administrée par gouttes, matin et soir, en nençant par 2 gouttes, augmentant de 1 goutte chaque jour, nanière à arriver à 15, à 20 gouttes, dans une tisane amère. ercice gymnastique et l'exercice habituel, les frictions générales rps à l'eau froide tous les matins, comme je l'ai indiqué. (Voy. CATION ANTILYMPHATIQUE.)

ntent les moyens locaux qui sont variables en raison de l'état *rythème pernio* Existe-t-il sans ulcération, on a recommandé, raison, les frictions avec la neige ou la glace pilée, l'emploi du amenant toujours une réaction circulatoire favorable à la sur-malade ; les lotions à l'eau-de-vie camphrée, l'alcool que l'on sa combustion sur la partie malade ; des lotions d'eau saturnée, n additionnée de sublimé, solution au 1/1500e ou au 1000e de poids C'est même cette lotion que beaucoup de pharmaciens lent comme eau contre les engelures.

ne série de pommades résolutives que l'on emploie quand l'en-re est ou n est pas ulcérée : cérat opiacé, cérat saturné cérat bonne de chlorure de soude. Il en est une dont je me suis gé-lement bien trouvé, et que j'ai préconisée depuis longtemps ; en la formule :

Axonge.	30 grammes.
Creosote	8 gouttes.
Sous-acétate de plomb.	6 gouttes.
Laudanum de Sydenham.	10 gouttes.

us, la poudre dont j'ai parlé et dont j'ignore la composition.

nodyne. — Cette maladie n'a été réellement étudiée que lors-lle s'est montrée sous forme épidémique à Paris, en 1828. Elle lait certainement bien avant cette époque, car depuis ce temps

on en trouve des cas assez communs et isolés qui jusqu'alors n'avaient pas dû fixer l'attention.

On a rangé cette affection parmi les érythèmes, parce que l'érythème en est le phénomène apparent; mais il est évident que ce n'est là qu'un phénomène local, constant quant à son siége, mais qui est le reflet d'un état général plus ou moins grave qui nous est mal connu. Quoi qu'il en soit, voici ce que l'on a observé à cette époque. — Vers le mois de juin 1828 apparut à l'infirmerie Marie-Thérèse, rue d'Enfer, une maladie épidémique principalement caractérisée par des douleurs générales, un engourdissement dans tous les membres, suivi du développement d'érythème aux mains et aux pieds, qui, dans quelques cas, prenait un caractère gangréneux. De cet hospice l'épidémie s'étendit à tous les quartiers circonvoisins d'abord, puis à la totalité de Paris. Elle parut céder durant l'hiver suivant, pour reprendre avec une nouvelle vigueur au printemps et ne se terminer que durant l'hiver de 1829-1830.

Anorexie, nausées, quelquefois vomissements, coliques, diarrhée; injection et état larmoyant des yeux avec bouffissure de la face, tels étaient les phénomènes qui accompagnaient le début de l'affection. Dès le début aussi, et parfois un peu plus tard, se montrait à la paume des mains et à la plante des pieds, sous forme de taches d'un rouge plus ou moins vif, analogue, à des ecchymoses, une éruption érythémateuse qui s'étendait parfois aux jambes et aux avant-bras. Puis, du rouge la peau passait au brun pour prendre la coloration de la suie, en même temps que l'éruption devenait générale et s'étendait au tronc, au cou, à la face.

Alors se dessinaient au siége primitif de l'état érythémateux, c'est-à-dire aux pieds et aux mains, des élevures papuleuses ou boutons, rouges, coniques, avec pustules, phlyctènes, furoncles. Puis s'opérait un travail de desquamation favorisé par des sueurs locales abondantes ; de sorte que l'épiderme se détachait peu à peu et mettait le corps muqueux à nu. L'épiderme se reformait de nouveau et se détachait encore ainsi successivement et à plusieurs reprises sur le même point. Pareil phénomène se reproduisait sur diverses parties du corps, autour des articulations des pieds; l'épiderme s'épaississait, et il n'était pas rare de voir ce tissu envelopper le pied à la

nière d'un brodequin, et se détacher en totalité pour laisser le l dépouillé.

Tous ces phénomènes locaux étaient accompagnés d'engourdissements, de fourmillements, d'élancements plus forts la nuit que jour, et surtout sensibles et douloureux à la plante des pieds. était dans quelques cas le sentiment de chaleur qui existait aux ds, que les malades les tenaient souvent hors du lit; certains ne ivaient supporter la pression des draps et des couvertures, d'au- s étaient en proie à une sorte de paralysie avec contraction et nigrissement des membres. C'est ainsi que fut l'état général des ldes au début et lors de la gravité la plus grande de l'épidémie. s tard, et durant le cours de celle-ci, une foule de phénomènes riés se produisirent, avec prédominance de chacun d'eux suivant individus. Chez les uns, altération de la sensibilité en général, rexcitée ou amendée; chez les autres, lésions des voies diges- es. Dans une catégorie de malades occupant certaines localités, prison de Montaigu, par exemple, la peau prit la teinte brune la s dessinée, ce qui n'exista pas à la caserne de la Courtille, non s qu'à celle de Lourcine. Dans celle-ci il y avait prédominance contractions violentes chez les malades, tandis que les vomisse- nts, l'ophthalmie, l'œdème de la face, se faisaient observer à la rne de la Courtille.

La maladie durait d'ailleurs plusieurs mois; elle était sujette à idive; elle devenait rarement mortelle, à moins qu'elle n'affectât s vieillards, et alors les altérations que l'on observait à l'ouver- re du corps ont été rapportées par la généralité des médecins ôt à des complications qu'à la maladie elle-même.

Impossible de confondre cette affection avec aucune autre. lle de laquelle elle se rapprocherait le plus serait la pellagre. is la marche chronique de cette dernière maladie l'en dis- gue suffisamment pour que nous n'insistions pas sur les carac- res différentiels locaux. — Telle est l'acrodynie qui s'est montrée ette époque sous forme épidémique. Nous en avons emprunté le bleau à M. Rayer, qui nous paraît en avoir rendu les phénomènes s plus saillants et les plus vrais. Voyons actuellement quelle est acrodynie que le médecin sera à même d'observer tous les jours.

Il est rare qu'à l'hôpital Saint-Louis il ne se montre pas par année cinq ou six cas de cette affection dans notre service. Ces malades nous arrivent après trois, quatre ou cinq mois de la durée de cette affection, qui a débuté d'une manière lente, et qui en général a été précédée de symptômes gastralgiques ou entéralgiques. Alors les pieds et les mains sont affectés à la fois. Mais dans quelques cas la maladie paraît être de cause externe, et alors elle survient chez les individus, femmes ou hommes, qui ont une profession qui les expose à avoir souvent les mains en contact avec l'eau ou avec des liqueurs dans lesquelles se trouvent dissoutes des substances irritantes : ainsi, les blanchisseuses d'abord, puis les teinturiers, les chapeliers. Dans cette dernière catégorie de malades, les mains sont le siége de chaleur permanente avec fourmillements, picotements; l'épiderme semble épaissi. La sensation du toucher exalte la sensibilité : c'est la paume des mains et surtout la pulpe des doigts qui sont atteintes. Il suffit alors du repos, de l'usage de l'amidon, de la poudre de tan, de corps gras et de quelques pommades légèrement résolutives au goudron, pour amener la terminaison de la maladie. Dans ce traitement, il faut surtout éviter l'usage des bains et des agents liquides.

Si au contraire l'acrodynie est le reflet d'un état gastralgique ou entéralgique, elle se montre sur des sujets plus ou moins amaigris, qui se nourrissent mal ; et au lieu d'un amaigrissement, il existe une légère augmentation dans le volume des doigts, dont toute la face palmaire paraît pourvue d'embonpoint, en même temps que la peau est fine, rosée, souple, extrêmement sensible au toucher. Le malade y ressent d'ailleurs des picotements, des fourmillements que la chaleur augmente dans des proportions notables, et surtout la chaleur du lit : aussi souvent ces malades sont-ils privés de sommeil.

On n'y observe pas l'ensemble de ces phénomènes graves, généraux ou locaux, que l'on a vus durant l'épidémie de 1828 ; tout se borne à de mauvaises digestions et à un très léger érythème. Dans certains cas on serait tenté de rapporter cet état à une lésion de la moelle épinière, mais l'affection gastro-intestinale détourne rapidement de cette erreur. Cette liaison de l'acrodynie avec les gastro-

es fait assez sentir que la maladie des mains ne réclame par
e aucun traitement. Il y a plus, il est peut-être convenable
ire pour la guérir, afin qu'elle serve d'indice de l'amélio-
venue du côté de l'estomac et des intestins par suite d'un
t qui aura été prescrit à cet effet. Contrairement à l'acro-
opathique, les bains et les émollients aqueux peuvent ici
n usage.

Erythèmes idiopathiques.

ma *à solare* (coup de soleil). — Cet érythème, ordinaire-
; simple et sans danger, peut cependant acquérir dans
cas une grande gravité. Ce n'est qu'à ce point de vue que
arlons. Sa dénomination fait assez connaître son origine.
affecter que des parties à découvert, quelles qu'elles soient
: le dos des mains, le cuir chevelu et la figure sont celles qui
nt le plus souvent et le plus naturellement atteintes. De là
ne affinité de cause et de siége entre l'*érythema à solare* et la
voy. Pellagre). Mais le coup de soleil le plus grave est celui
evelu et de la face. A deux époques de la vie principalement,
velopper des accidents, en donnant lieu à des congestions
s avec fièvre, délire, et tout l'ensemble des symptômes de
is. C'est dans l'enfance et dans l'âge adulte que ces phéno-
montrent le plus ordinairement. Dans les pays intertro-
s coup de soleil y cause souvent la mort en peu de temps.
e tombe rapidement dans un état comateux profond, avec
dilatées, pouls à 120 pulsations, etc.; les applications
les purgatifs répétés, les bains, sont les moyens le plus
nent employés. Suivant M. Strong, les accidents peu-
montrer sous deux formes différentes : dans l'une, il
e prostration marquée, à début brusque; la peau est froide,
ent. Cet état est bientôt suivi d'une réaction vive, marquée
aleur de la peau, la plénitude du pouls; le malade tombe
oma et meurt, s'il n'est pas secouru. D'autres fois, le ma-
emble à un homme ivre ou à un sujet qui aurait reçu un
la tête. (*Americ. Journ. of med. Scienc.*)
espèce, l'érythème a par lui-même tous les caractères des

autres érythèmes ; il se développe très rapidement, amène une sensation de cuisson très vive, et quand il atteint la surface des membres ou une partie du corps qui n'a aucune sympathie directe avec un organe interne important, ses effets locaux, quoique plus marqués que dans les érythèmes symptomatiques, cèdent beaucoup plus rapidement, par cela même qu'ils sont de cause externe : un peu d'huile ou de graisse mêlée d'amidon, et souvent même absence de tout agent, et l'érythème disparaît.

D'où il résulte qu'au point de vue thérapeutique, c'est moins l'érythème que les accidents généraux qu'il a développés, qui doivent fixer l'attention du médecin, et il ne faut pas hésiter à les enrayer dans leur marche à l'aide d'émissions sanguines générales ou locales, de boissons rafraîchissantes et des moyens mis en usage en pareil cas.

Érythème par piqûre. — Tout érythème par piqûre n'a de gravité que par les trois circonstances suivantes : la densité du tissu dont l'inflammation amène l'étranglement ; le cas où le corps vulnérant laisse dans la plaie une partie de sa substance ; enfin, celui où le corps vulnérant est muni d'un venin. Dans toutes ces conditions les érythèmes peuvent varier depuis le plus simple degré jusqu'au phlegmon, la phlébite et la gangrène ; tous ces résultats constituent un ordre de faits que l'on décrit dans les traités de pathologie interne et externe, et qui ne sauraient trouver place ici.

Érythème par brûlure. — Même observation à l'égard de cette variété que nous passons sous silence.

Érythème par succion. — Cette espèce n'a réellement d'intérêt qu'à un seul point de vue, celui de l'allaitement qui amène non-seulement la rougeur et la turgescence de l'extrémité du sein, mais encore une altération spéciale que l'on désigne communément sous le nom de *gerçure*, dénomination parfaitement exacte d'ailleurs. C'est à la suite de ces sortes d'érythèmes et de gerçures que s'opère l'infection syphilitique de l'enfant à la nourrice.

Une opinion fort accréditée parmi les nourrices, c'est de continuer l'allaitement pour guérir les crevasses ; il est évident que l'on ne fait qu'aggraver le mal, et que la suspension de l'allaitement suffit le plus souvent pour amener la guérison de ces accidents : et

cela est si vrai, qu'en garantissant le sein de la succion à l'aide de bouts de sein, on arrive rapidement à ce résultat. La continuation de l'allaitement peut amener au contraire des abcès, de la fièvre, par les douleurs que la succion entraîne à sa suite.

Érythème par contact de fluides altérés. — Rien de plus commun que ces sortes d'érythèmes. L'urine, les matières fécales, les flueurs blanches, les écoulements mucoso-purulents chez les très jeunes enfants, le contact du pus altéré séjournant sur la peau saine, enfin la sueur elle-même : telles en sont les sources de développement.

Ces matières, telles qu'elles sont sécrétées, ne développeraient pas ce phénomène morbide, si elles ne s'altéraient pas, si elles ne se décomposaient pas ; et c'est là une condition dont il faut que le médecin se pénètre. Les fluides sécrétés par l'économie ne peuvent être irritants pour nos tissus ; mais chacun d'eux est plus ou moins putrescible au contact de l'air, et une fois modifiés dans leur nature, ils acquièrent des propriétés stimulantes. La sueur devient alcaline, d'acide qu'elle était ; il en est de même de l'urine ; la bile subit une modification opposée, et une fois placées dans ces conditions contraires à l'état naturel, elles constituent autant de stimulants pour la peau. C'est ce que l'on observe chez les sujets atteints de maladies des voies urinaires lorsqu'on est obligé de placer des sondes à demeure. C'est ce que l'on voit chez les très jeunes enfants qui sont à l'allaitement, et à l'égard desquels on ne prend pas assez de soins de propreté. Les petites filles de trois ou quatre ans, très lymphatiques de leur nature, sont souvent prises d'écoulement aux parties génitales, qui développe un état érythémateux des grandes lèvres et des cuisses. C'est dans de pareilles conditions qu'à certains âges de la vie et lors de certains états généraux morbides acquis, s'opère l'infection putride, qui par son origine se distingue ainsi de l'infection purulente.

La conséquence de ces données, c'est une thérapeutique tout antiseptique à mettre en usage : 1° soins extrêmes de propreté fréquemment renouvelés ; 2° lavage des surfaces malades avec de l'eau chlorurée ; 3° saupoudrer la peau de poudre de tan et la graisser de saindoux, de manière à éviter le contact des fluides sur ces parties, etc.

Intertrigo.—Mais il est une maladie érythémateuse provenant du contact de la sueur altérée, qui doit plus spécialement fixer notre attention, et qui a reçu la dénomination particulière d'*intertrigo*, dénomination qui en exprime parfaitement le siége.

C'est, en effet, au contact prolongé de surfaces cutanées qu'elle se développe, et elle ne peut se montrer que là ; de sorte qu'on ne la rencontre jamais que dans les parties suivantes du corps : 1° derrière les oreilles, dans le pli de jonction de l'oreille avec la tête ; 2° au pli des seins chez les femmes grasses ; 3° au pli des aisselles et quelquefois même au pli des bras ; 4° au pli du bas-ventre chez les personnes d'un grand embonpoint ; 5° au contact des bourses chez l'homme ; 6° au contact des grandes lèvres chez la femme ; 7° enfin, quelquefois, mais beaucoup plus rarement, au jarret.

Cette maladie est très commune, d'une guérison très difficile ; elle est très sujette à retour à cause des conditions mêmes dans lesquelles elle se développe, de sorte qu'il nous faut appeler l'attention du médecin d'une manière toute spéciale sur elle : la plupart des auteurs en ont fait une description fort légère et en ont mal décrit les variétés.

Elle est propre à deux âges opposés de la vie, l'enfance et la fin de l'âge adulte, c'est-à-dire cet âge de la vie que l'on nomme critique chez la femme, et qui, suivant moi, existe aussi chez l'homme, mais plus tard ; quarante à quarante-cinq ans pour la femme, quarante-cinq à cinquante-cinq ans pour l'homme. Je parle ici d'âge critique chez l'homme, et je puis paraître extraordinaire aux yeux de quelques personnes. On conçoit, en effet, un âge critique chez la femme, en ce sens qu'à cette époque de la vie il y a suppression d'un écoulement sanguin mensuel qui a existé pendant vingt-cinq à trente années, et qui se supprime plus ou moins brusquement à un âge donné de la vie.

Mais, dans la nature, les phases de développement et de décroissance de la vie ne sauraient être exclusives . elles existent pour les végétaux et pour les animaux ; elles sont uniformes pour chaque classe d'animaux, et dans une même nature d'animal il ne saurait exister pour la femelle un âge critique sans qu'il existe aussi pour le mâle. A l'époque de l'âge critique chez la femme, on voit surgir

un grand nombre de maladies qui compromettent la santé et quelquefois la vie.

Lorsque la femme a passé cet âge sans que les maladies ou accidents développés aient porté une certaine atteinte à la santé, il est rare que la vie ne se prolonge pas pendant un laps d'années plus ou moins long. Il en est de même pour l'homme ; c'est de quarante-cinq à cinquant-cinq ans qu'il est sujet à une foule d'incommodités qui exigent de sa part une hygiène mieux observée : les congestions pulmonaires ou cérébrales ; un état général plus ou moins inflammatoire, ou un état de pléthore qui demande des émissions sanguines. Il ne peut plus supporter le vin, le café, les alcooliques et l'alimentation substantielle comme auparavant. A l'égard de la peau, comme chez la femme, se montrent l'intertrigo, l'eczéma, le syycosis du cuir chevelu, etc. Si cet âge critique est moins marqué pour l'homme, c'est que chez lui il n'y a pas eu d'écoulement sanguin périodique. Je suis convaincu que plus on étendrait son observation dans ce sens, plus on trouverait des motifs de corroborer cette manière de voir, que j'ai déjà précédemment énoncée.

Quoi qu'il en soit, l'intertrigo se montre, avons-nous dit, à deux époques différentes de la vie, dans l'enfance ou à la fin de l'âge adulte. Chez l'enfant, ce n'est qu'aux aisselles qu'il a lieu, et alors il se produit là un érythème qui, le plus souvent, ne se borne pas à de la rougeur, mais qui suinte une sérosité muqueuse d'une certaine consistance qui peut aller jusqu'à la sécrétion purulente. Il y a plus : chez quelques jeunes filles où nous avons souvent observé cette maladie, la sécrétion devient non-seulement purulente, mais encore le pus qui se produit est en telle quantité, qu'il faut changer les linges quatre ou cinq fois par jour. Cette variété où le pus est blanc, muqueux, très liquide, nous l'avons désignée sous le nom d'*erythema purifluens*, tant la sécrétion est abondante et se renouvelle. Il suffit de mettre la surface à l'air pour la voir se couvrir en quelques instants de *muco pus*. Cependant la peau n'est pas le siége d'une érosion ; la surface est d'un rose vif, piquetée de rouge ; elle a peu de sensibilité, et il en suinte du pus, comme il suinte de la sérosité d'une surface eczémateuse.

On observe cette variété d'érythème chez les enfants essentielle-

ment lymphatiques, avec une peau blafarde, épaisse, et sur quelle nous aurons occasion de revenir quand nous traiterons l'acné.

Les intertrigos de l'âge adulte se comportent tout autrement. chez des personnes grasses, qui suent facilement, qui prennent de bains, et qui n'observent pas de soins de propreté, ces intertr se montrent, comme une légère rosée, dans toute l'étendue d de jonction des deux surfaces saillantes de la peau. J'insiste si siége d'origine, ce sera le point où le médecin aura plus de diffi à guérir l'érythème; aussi exigera-t-il des moyens spéciaux. rougeur linéaire appelle peu l'attention des malades; elle a une légère démangeaison que le frottement plutôt que le gra apaise. Mais peu à peu, et dans un temps donné, variable, mais jours avec une marche lente, l'érythème gagne en surface ju acquérir l'étendue du *contact habituel* des parties saillantes elles. Il résulte de ce fait que l'*intertrigo des oreilles* a plus ou m de surface, suivant que la personne par son mode de coiffure, prime plus ou moins les oreilles sur la tête; qu'il restera com ment très peu étendu chez les uns, beaucoup plus chez les au que cette circonstance que nous spécifions pour l'oreille doit s'éte à toutes les autres parties: si nous l'avons signalée, c'est que prend souvent un intertrigo pour un eczéma. Or nous verron contraire, que l'eczéma affecte des parties en saillie, tandis que tertrigo atteint des parties enfoncées.

Ayant ainsi envahi toutes les parties qui ont entre elles des p de contact, l'érythème ne fait plus de progrès en surface, m persiste d'abord sans suintement, et plus tard en fournissan sorte de transpiration capable de mouiller un linge qui y séjo durant huit à dix heures. A cette sécrétion, qui reste ainsi st naire pendant plusieurs semaines, succède une sécrétion un peu marquée, et parfois aussi se forment des squames ou lames ép miques qui font croire à l'existence d'un eczéma. Notez que mangeaison devient de plus en plus marquée, surtout quand la face malade a le contact de l'air. — Il arrive encore un momen à part la condition de siége, de localisation, il est difficile de d guer un *intertrigo* d'un *eczéma*. Il est des personnes qui garden

cette affection pendant des mois et des années, les unes par incurie, les autres pour cacher une maladie incommode, mais dont le siége est tel qu'elles répugnent à la montrer au médecin, et alors tous les jours en se couchant elles se livrent à des frottements qui rendent bientôt la surface eczémateuse. Si l'intertrigo siége au voisinage des parties génitales, il finit par éveiller, comme le *prurigo vulvæ*, une surexcitation des organes génitaux extrêmement pénible.

Ainsi, loin d'être un érythème ordinaire, l'intertrigo peut arriver à troubler l'existence d'un malade. J'ai vu des dames qui, depuis douze à quinze ans, avaient cette maladie, à la suite de laquelle était survenu un amaigrissement très notable par le trouble porté dans le moral et dans les fonctions digestives.

La maladie n'a pas, en général, d'autres résultats plus fâcheux. Nous allons esquisser les règles de son traitement.

La première condition à remplir, à quelque époque que soit arrivée la maladie, qu'elle soit de date récente ou ancienne, c'est l'isolement le plus complet des surfaces malades. Tout ce que nous venons de dire doit faire comprendre l'importance de ce moyen; c'est la cause que l'on combat alors, et la cause permanente. L'affection est-elle récente, il suffit ordinairement de ce moyen, associé à l'usage de la poudre d'amidon, de lycopode, de tan, de vieux bois, pour en obtenir la guérison, à la condition que la séparation des parties sera maintenue bien au delà du terme de celle-ci, pour éviter le retour du mal. C'est à l'aide de linges de toile bien appliqués que l'on arrive à ce résultat. Quant aux poudres, elles doivent être très fines et obtenues par des tamisations parfaites, et de plus il faut en employer dans une proportion très faible, de manière à ne pas faire des couches qui s'humectent et forment pâte; il faut saupoudrer très légèrement et très souvent avec une houppe à poudrer, sauf à répéter l'emploi de ce moyen. Mais, à chaque pansement, il est nécessaire de laver la surface malade à l'aide d'une eau au 25e ou au 20e de son poids de chlorure de soude. Cette liqueur agit et par sa nature astringente, et par la réaction chimique qu'elle exerce sur les fluides sécrétés.

Toutefois ces moyens, qui sont généralement utiles dans tous les

ne telle habitude de vitalité morbide, qu'il faut diriger le traitement dans ce sens pour obtenir une guérison.

L'*intertrigo purifluens* étant une maladie essentiellement liée au tempérament lymphatique et à une peau blafarde atonique, c'est r un régime intérieur antiscrofuleux dans lequel prédominent cependant les sulfureux, c'est par les bains sulfureux et les autres oyens locaux précédemment indiqués, qu'on arrête les progrès de te maladie. Mais il faut, en général, craindre de supprimer p vite cette sécrétion si abondante, et je préfère la laisser suivre i cours un peu plus longtemps, de manière qu'elle disparaisse nduellement sous l'influence d'un bon régime intérieur, plutôt e de tarir trop rapidement une source si considérable de suppuation. Il est même convenable, dans ces sortes de cas, d'appliquer exutoire au bras sain, pour opérer une dérivation, et de le maintir même après la guérison.

Que s'il s'agissait de prescrire une eau minérale contre un intrigo ayant siége dans plusieurs points du corps, je conseillerais eaux de Louesche qui réussissent parfaitement, excepté dans cas de prédominance lymphatique, où les eaux des Pyrénées, ix en Savoie, d'Aix-la-Chapelle et d'Enghien, devraient être préées.

TICAIRE, *urticaria*, d'*urtica*, ortie ; *cnidosis* de κνίδη, ortie (Alibert) ; *essera* (des Arabes) ; *febris urticata* (Vogel) ; *porcellenæ* (Lieutaud) ; *scarlatina urticata* (Sauvages) ; *purpura urticata* (Junker).

n ses aspects divers :
- *Simplex.*
- *Conferta.*
- *Tuberosa.*
- *Nodosa.*

n sa durée :
- *Evanida.*
- *Persians.*

Selon le moment de l'éruption :
- Diurne.
- Nocturne.
- Vague.

Selon sa marche :
- Aiguë.
- Chronique.

Selon sa cause :
- *Ab ingestis.*

Cette maladie exanthémateuse ne me paraît pas avoir suffisamment fixé l'attention des pathologistes sous le rapport de sa chroni-

cité et des conséquences qu'elle entraîne alors. On en a tracé le tableau le plus exact sous la forme aiguë, aussi nous y arrêterons-nous peu; mais le dermatologiste n'est réellement appelé à la traiter que lorsqu'elle est arrivée à l'état chronique : c'est donc surtout cette forme qu'il nous faut retracer, et à la thérapeutique de laquelle nous devons nous attacher plus particulièrement, ne fût-ce que pour signaler notre impuissance dans quelques cas. Alibert, d'ailleurs, ce peintre si habile à décrire et à saisir le point de vue pratique des dermatoses, avait, par des observations rapidement esquissées, fait pressentir toutes les difficultés qui se rattachent au traitement de l'urticaire.

L'urticaire est un exanthème qui se caractérise par des *élevures* à forme plus ou moins arrondie, mais irrégulières, disséminées çà et là à la surface de la peau, et caractérisées par trois phénomènes : la couleur érythémateuse rosée, disparaissant par la pression du doigt; la décoloration centrale de la rougeur érythémateuse ; la sensation de cuisson et de picotement, qui rappelle la douleur de la piqûre d'ortie.

Suivant qu'on envisage cet exanthème sous divers aspects, on peut établir des divisions différentes. Relativement à la forme qu'il affecte à la peau : on le dit *simplex*, quand il est étendu en plaques irrégulières, distinctes et discrètes ; *conferta*, quand les plaques nombreuses sont groupées les unes auprès des autres, de manière à être confluentes ; *tuberosa*, lorsque les élevures que présente l'urticaire sont tellement en relief qu'elles donnent l'image de tubercules; *nodosa*, lorsque l'érythème, au contraire, est peu saillant, mais que le tissu cellulaire sous-jacent à la peau est assez tuméfié pour représenter des nodosités. Ces quatre formes peuvent appartenir à l'urticaire qui est accompagnée de fièvre.

Eu égard à la durée de l'éruption, on appelle l'urticaire *evanida* ou *perstans ;* c'est qu'en effet elle peut ne durer que quelques heures, ou persister sans disparaître durant un ou deux septénaires et même plus.

Par rapport au moment où l'éruption apparaît, on l'appelle *diurne*, quand elle s'opère au lever du malade et lors de l'exposition au frais ; *nocturne*, lorsqu'elle se développe le soir, quelques instants

ucher de l'individu, et lorsque la chaleur s'établit dans
e, quand il n'y a rien de précis dans la manifestation de
et qu'elle se montre à divers moments de la journée, soit
ence du froid ou de la chaleur, soit sous celle d'une im-
orale quelconque.

lle est dite *aiguë*, lorsque cet exanthème parcourt ses pé-
s un ou deux septénaires; *chronique*, lorsqu'elle dure des
s années. Ces diverses divisions sont entièrement fondées
vation; mais la plus importante d'entre elles est celle
sur l'état aigu ou chronique de l'affection. En effet, la
l'éruption, le moment où elle apparaît, la saillie plus ou
sidérable de ses élevures, tout cela n'est que secondaire;
sous le nom d'aiguë, on comprend l'urticaire avec fièvre,
, sous celui de chronique, la santé générale se conserve
urfaite, il s'ensuit qu'il faut nous arrêter essentiellement à
fébrile et à l'urticaire non fébrile.

ire fébrile est généralement l'apanage de l'enfance; elle
vec tous les prodromes des éruptions exanthémateuses,
ils sont généralement peu intenses; ils ne consistent que
situde dans les membres, de la courbature, de l'anorexie,
e, parfois quelques nausées, de la fièvre. Après vingt-
rente-six heures, l'éruption, précédée d'une moiteur ou
ur générale, se déclare. C'est surtout sur les membres,
alement sur les membres inférieurs, qu'elle se montre,
e puisse envahir le tronc et la figure. Elle affecte alors des
iverses, quoique les variétés dites *tuberosa* et *subcutanea*
s spécialement applicables à l'urticaire chronique. Les
ont plus ou moins rosées, avec décoloration centrale assez
quelquefois elles sont même entourées d'un cercle rosé
la peau saine restant avec sa couleur assez naturelle entre
es; leur étendue est d'ailleurs très variable, depuis quel-
imètres jusqu'à plusieurs centimètres de diamètre. Inutile
n'elles sont accompagnées des sensations de fourmille-
e cuisson propres à cette éruption, qui peut être confluente
le.

urticaire *ab ingestis*, ou provenant d'aliments ou de médi-

caments propres à développer cette maladie, il n'est pas rare de voir des vomissements répétés, des spasmes, de la suffocation et des mouvements presque convulsifs des membres, précéder le développement de cette maladie, de sorte que cet ensemble de phénomènes simule assez bien un empoisonnement.

L'éruption développée, l'ensemble des prodromes qui l'avaient précédée disparaît peu à peu, moins l'état fébrile, qui persiste pendant quelques jours, mais à un faible degré; puis, vers le quatrième ou le cinquième jour, l'éruption elle-même diminue d'intensité, pour disparaître vers le neuvième ou douzième jour, en donnant lieu un peu plus tard à une légère exfoliation épidermique qui n'est pas constante. Mais il suffit souvent d'une sortie trop précoce du lit pour faire reparaître l'éruption, et c'est alors que si cette imprudence est répétée à plusieurs jours d'intervalle, on voit reparaître successivement la maladie et on la perpétue ainsi. Elle passe à l'état chronique. Aussi est-ce avec raison qu'Alibert cite l'exemple de quatre sœurs qui depuis leur enfance étaient atteintes de cette maladie. Il rapporte encore l'exemple d'un jeune homme de vingt-huit ans où elle avait pris naissance dès l'enfance, comme aussi celui d'une pauvre femme qui était affectée de cette maladie depuis dix ans. J'ai donné des soins à une dame qui la portait depuis dix-huit ans. Aussitôt qu'elle commençait à ressentir la chaleur du lit, l'éruption s'opérait, pour se dissiper après un quart d'heure. Lorsque l'éruption, par une circonstance tout accidentelle, ne s'effectuait pas, elle était prise de deux ou trois garderobes en diarrhée. Je ne pourrais suffire à citer les nombreux exemples du même genre. Tous, j'en ai la conviction, sont dus à des urticaires dont la période de développement a été enrayée par des circonstances diverses d'arrêt, et, je dois le dire, plus l'urticaire se montre à un âge avancé dans la vie, plus elle a une tendance à prendre la marche chronique. En général, les médecins négligent trop les précautions que réclame cette maladie. Si elle ne porte pas un préjudice notable à la santé générale, si les enfants ou les adultes qui en sont atteints n'éprouvent pas tous les malaises de l'état fébrile qui accompagne les autres maladies éruptives, l'urticaire n'exige pas moins qu'elles des soins assidus, surtout sous le rapport de la température dans laquelle le

malade doit être maintenu et du séjour au lit prolongé durant le septénaire qui a suivi la disparition naturelle de l'éruption.

A ce dernier point de vue, nous devons aussi appeler toute l'attention des médecins. La disparition brusque d'une éruption d'urticaire ou une évolution incomplète de cette éruption sous l'influence d'un refroidissement peuvent amener chez l'adulte surtout, et souvent aussi chez l'enfant, un ensemble de symptômes des plus graves. J'ai eu dans mes salles un homme de quarante ans qui, à la suite d'un travail exagéré, a vu se développer une urticaire sur les cuisses et sur les jambes. Il a porté peu d'attention à cette éruption, il a continué de travailler malgré le malaise qu'elle lui fait naître. L'éruption s'est supprimée, et alors il a été pris d'anorexie, de lassitude dans les membres et de malaise général. Il est entré à l'hôpital avec des taches bleuâtres disséminées sur les membres, phénomènes que laisse à sa suite l'urticaire tubéreuse brusquement supprimée. La figure était altérée, le pouls non fébrile, la langue épaisse et blanchâtre. Nous lui fîmes donner un bain d'air chaud dans le lit pour rappeler l'éruption ; un émétocathartique fut administré le deuxième jour, et trois bains d'air chaud furent successivement employés. L'éruption reparut, mais à un bien degré ; l'anorexie et le malaise continuèrent ; bientôt il se montra de la diarrhée ; plus tard, des vomissements bilieux répétés qui ne furent arrêtés que par des sinapismes appliqués sur la région épigastrique, et par la potion anti-émétique de Rivière ; la diarrhée persista. Enfin, il ne dut son rétablissement qu'à des frictions opérées sur les membres à l'aide de l'huile de *croton tiglium* dans les points où l'éruption s'était opérée, frictions qui firent reparaître l'urticaire d'une manière permanente, tout en développant à la peau un érythème vésiculeux artificiel.

Une fois passée à l'état chronique, l'urticaire a une ténacité, une persistance qui n'a plus aucun rapport avec l'état si éphémère en apparence de l'éruption. L'observation suivante en offre la démonstration la plus complète.

J'ai reçu à l'hôpital un malade atteint d'une urticaire diurne qui datait de trois ans. Après trois mois de traitement, la maladie, réfractaire aux moyens les plus énergiques, persistait encore sans avoir subi de modification sensible.

pensée. J'ai voulu seulement énoncer ce fait trop peu formulé par les auteurs, à savoir que l'urticaire chronique n'est que trop souvent la conséquence d'une urticaire aiguë soignée avec trop peu de précaution. D'ailleurs, le développement de l'urticaire est en partie soumis à la forme qu'elle affecte : ainsi, lorsque les élevures doivent présenter la forme *tubéreuse* ou *noueuse*, l'éruption n'est plus si instantanée, ni si confluente. Les nodosités ne se manifestent que successivement. Pendant quatre, huit ou douze jours, on en voit apparaître de nouvelles, chacune d'elles ayant une durée de 4 à 5 jours. Lorsqu'elles ont disparu, elles laissent aussi des traces de leur passage : ce sont des inégalités en saillie pour l'urticaire tubéreuse, et des inégalités avec dépression pour l'urticaire noueuse.

Quant aux causes de cette affection, elles sont variables comme l'éruption elle-même. Ainsi, pour l'urticaire fébrile, ce sont les causes de tous les exanthèmes. Mais pour l'urticaire accidentelle ou à marche chronique, voici ce que l'on observe à cet égard. Par rapport à l'urticaire accidentelle, il est certains coquillages, les moules, les crabes, les homards, mais surtout les moules, qui peuvent déterminer tout à coup l'invasion de l'urticaire ; on ignore, ainsi que nous l'avons dit pour l'érythème, à quel état anormal des moules il faut rattacher le début de cette affection. M. Gibert cite le cas d'une urticaire développée sous l'influence du baume de copahu qui, comme on le sait, donne plus souvent lieu à des érythèmes. Je viens d'en voir un exemple très complet et très général chez un élève en droit qui n'avait pris que soixante capsules de Mothes ; c'est en été.

Il est très commun de rencontrer l'urticaire chronique liée à des gastralgies ou à des entéralgies, et ces affections prendre ou perdre alternativement de l'accroissement, suivant que l'une ou l'autre prédomine. Cette circonstance est une grande ressource pour le médecin, car elle dirige plus nettement sa thérapeutique. Mais une des causes assez communes de l'urticaire dans l'âge adulte, ce sont les affections morales vives ; ainsi s'explique le fait, cité par Alibert, de cette dame qui ne pouvait entrer dans un salon sans être couverte de cette éruption de la tête aux pieds.

Traitement. — Les infusions aromatiques, le repos, de la diète,

une température douce et soutenue, surtout le soin de se mettre complétement à l'abri des transitions subites du chaud au froid, tels sont les moyens simples que réclame l'urticaire fébrile. Un éméto-cathartique devient quelquefois nécessaire quand elle est accompagnée de symptômes d'embarras gastrique. Nous ne saurions trop insister sur la nécessité de maintenir le malade dans les conditions d'une température uniforme durant un ou deux septénaires après la cessation de l'éruption, afin d'éviter la réapparition de l'affection. Les soins, à cet égard, doivent être d'autant plus complets et plus sévèrement observés, qu'il s'agit de personnes plus avancées en âge. En effet, contrairement aux autres exanthèmes, l'urticaire est une maladie qui se montre souvent à l'âge adulte.

J'ai donné des soins à une dame de trente-neuf ans, qui, durant une urticaire aiguë dont elle fut atteinte, ne voulut pas observer les précautions à laquelle je désirais l'astreindre.

C'était au printemps que la maladie s'était développée : elle reparut durant six semaines à plusieurs reprises, puis elle se manifesta successivement à des intervalles plus ou moins éloignés pendant la saison et l'hiver suivant. Je mis alors en usage plusieurs traitements actifs, mais sans succès. La malade garda son affection, avec les inconvénients qu'elle cause quand elle est chronique, durant un an encore ; à la moindre impression morale un peu vive, elle reparaissait. La maladie devint continue et plusieurs fois par jour l'éruption se produisait ; il suffisait que cette dame se déshabillât, pour qu'il se manifestât une série de plaques plus ou moins nombreuses. Enfin, au troisième printemps depuis l'éruption, j'envoyai cette dame à Louesche, où elle passa trente-cinq jours avec des poussées considérables qui firent justice de cette urticaire rebelle.

Le traitement de l'urticaire chronique varie comme la cause qui l'a fait naître et qui peut l'entretenir. Lorsqu'elle s'est développée sous l'influence de causes morales, on comprend qu'il y a peu de chose à faire. Si l'affection est liée à une gastralgie ou à une entéralgie, c'est à ces maladies qu'il faut surtout adresser la thérapeutique de l'affection cutanée. Lorsque l'urticaire est la conséquence d'une négligence dans les premiers soins et qu'elle existe depuis plusieurs années, il faut tenter diverses espèces de moyens. Je dis *tenter* l'emploi de diverses sortes de moyens, car il ne saurait y avoir rien de précis à cet égard : les bains salés, les bains de mer,

ceux de vapeur, les purgatifs répétés; et, à l'égard de ce dernier moyen, je puis citer le fait suivant qui en démontre l'inefficacité dans certains cas.

J'ai été consulté par une dame des colonies, qui habitait Paris depuis vingt ans, et qui, depuis dix-huit ans, était atteinte d'urticaire nocturne. Ainsi que je le disais plus haut, elle était couverte d'une éruption plus ou moins considérable un quart d'heure après s'être couchée, et lorsque l'éruption n'avait pas lieu, elle était prise de plusieurs garderobes en diarrhée; dans les deux cas, elle s'endormait une demi-heure ou une heure après, et elle dormait d'un sommeil calme toute la nuit. Aussi la santé générale n'était nullement altérée. J'employai alors toutes sortes de médications, voire même la solution de Fowler, qui ne fut pas supportée au delà de six gouttes, car elle amena une diarrhée intense à cette dose. Lasse d'invoquer les secours de la médecine, car elle avait frappé à toutes les portes des hommes les plus capables, la malade s'adressa à un herboriste qui lui fit prendre tous les matins une bouteille de tisane purgative. Je montrai cette tisane à un pharmacien, qui la reconnut pour être la *tisane royale du Codex*. Ce traitement, prolongé pendant six semaines, guérit, sinon radicalement, au moins de manière à ne voir reparaître l'éruption qu'à intervalles éloignés, et dans une proportion de développement très supportable.

Depuis lors j'ai souvent invoqué le secours de cette tisane en en proportionnant la dose aux intestins des malades. J'ai obtenu quelques succès, mais j'ai eu beaucoup plus d'insuccès. C'est cependant une médication que je conseille à défaut de meilleures.

M. Cazenave a cité le cas d'une urticaire chronique qui fut guérie par Biett à l'aide de la solution de Fowler, à la dose de 5 ou 6 gouttes, administrée pendant cinq jours. J'ai souvent employé cette solution jusqu'à 14 gouttes par jour et sans aucun résultat. J'avoue même qu'il me parait fort extraordinaire qu'une maladie d'une ténacité si grande eût été enlevée en cinq jours à une dose aussi faible.

Ce que je n'hésite pas à préconiser, parce que l'expérience m'en a démontré toute l'efficacité, ce sont les eaux de Louesche, qui ont une puissance d'action fort remarquable en raison du séjour que font les malades dans l'eau et des éruptions qu'elle fait naître à la peau. C'est dire, en résumé, qu'il reste à faire pour le traitement de cet exanthème, et nous appelons l'attention toute spéciale des médecins sur la thérapeutique qu'il peut réclamer.

Roséole, *roseola*.

Voilà une éruption cutanée sur laquelle il est peu d'auteurs qui aient une opinion bien arrêtée, et cependant on a fait à l'envi des variétés nombreuses de cette maladie. Willan, par exemple, en admet sept espèces qu'il désigne par les noms de *roseola æstiva*, *autumnalis*, *annulata*, *infantilis*, *variolosa*, *vaccina*, *miliaris*. M. Rayer, tout en avouant au début de la description de cette maladie qu'il est impossible de différencier plusieurs espèces de roséoles d'avec l'érythème, ajoute aux sept variétés précédentes la *roséole fébrile* et la *roséole rhumatismale* ou *goutteuse*.

Suivant moi, parmi ces dénominations de Willan, il est une variété de roséole qui n'est autre qu'une des espèces d'érythème, l'érythème circiné ou annulaire. La roséole miliaire ne serait-elle pas elle-même une variété de fièvre miliaire? Pourquoi cette distinction entre la roséole du printemps et celle d'automne? La différence reposerait-elle sur ce qu'en automne les taches sont plus foncées qu'au printemps et en été? Les roséoles varioleuse et vaccinale ne sont que des roséoles survenues à la suite ou dans le cours de la vaccine ou de la variole. Nous en dirons autant de celle qui se montre dans les rhumatismes et les gouttes: ce n'est pas moins une roséole comme dans les autres variétés; et quant à la roséole fébrile, c'est l'histoire de toutes les efflorescences légères de la peau dont le développement est ou n'est pas précédé ou accompagné de fièvre.

Toutes ces circonstances ne sauraient être assez importantes pour constituer des espèces de roséoles. Cette maladie est une; elle peut se présenter dans des conditions différentes. Ce qui importe, c'est de lui assigner des caractères tels qu'elle ne puisse pas être confondue avec une autre éruption cutanée; or, sous ce rapport, ce n'est pas parce qu'il y a absence d'angine qu'une éruption ne s'appellera pas rougeole. Il y a des rougeoles sans angines, exceptionnellement, il est vrai. Attachons-nous donc à bien spécifier les caractères de l'éruption roséoleuse, et à la distinguer de certaines variétés de rougeole et d'érythème.

ion roséoleuse occupe toujours une surface du corps plus *étendue;* elle débute généralement à la *poitrine* et au bien sur les *membres supérieurs*, et il est rare qu'elle se uelques plaques diffuses; celles-ci sont nombreuses, *con-* *très petite dimension* (*un centimètre*), laissant entre elles s assez uniformes de peau saine; les plaques ont d'ail- dimension *décroissante* de la poitrine aux extrémités; et uniformité de l'éruption, que la peau paraît zébrée ou nent maculée de *petites taches rosées* légèrement élevées du niveau de la peau, ce que l'on sent avec la pulpe du oration qui, comme toutes les efflorescences, disparaît à e pression. Voilà pour les phénomènes locaux, avec cette ance que, dans le cas de roséole syphilitique, la tache ro- levient sombre, violacée et persistante.

s tout érythème, la rougeur a une forme régulière bien e, et c'est d'après cette circonstance même que les va- ythèmes papuleux, tuberculeux, mamellés, etc., ont été ien de semblable dans la roséole.

s la rougeole, il y a quelque assimilation à faire entre l'as- laques et celui de la roséole sous le rapport de la couleur de saillie au-dessus du niveau de la peau, il faut dire que ugeole ces plaques sont généralement plus larges, qu'elles s'agrandir et à se confondre entre elles; enfin, qu'elles proéminentes. Si à ces caractères on joint la circonstance catarrhal et des prodromes fébriles, toujours beaucoup ases, on est conduit, dans le plus grand nombre des cas, nostic assez précis.

l'une part, nous repoussons toutes les distinctions établies n comme variétés, et nous disons que l'éruption roséo- une; qu'elle se montre soit au printemps, soit à l'automne, ans cette dernière saison elle paraît avoir un caractère u; qu'elle peut affecter la très jeune enfance; qu'elle est mmune à cet âge; qu'elle coïncide quelquefois avec le dé- ent de la vaccine et de la variole; qu'on l'observe dans la dans les rhumatismes aigus goutteux de longue date, et s tout à coup un certain accroissement; qu'on la trouve

aussi dans certains cas de fièvre typhoïde grave; mais que, qu' soit spontanée et seule, ou spontanée et coïncidant avec une a maladie, c'est toujours la même éruption.

Or, cette maladie est le plus souvent précédée de prodromes légers. Ils ne sont autres que ceux que l'on observe dans les e thèmes; ils consistent dans du malaise, de l'anorexie, de la lass dans les membres, et souvent un léger état fébrile à la suite du l'éruption se montre du jour au lendemain. Celle-ci a cela de ticulier qu'elle est très fugace, qu'elle disparaît un jour pour r raître le suivant, et que, dans tous les cas, elle ne dure pas plu deux ou trois jours, s'éteint et laisse après elle ou une légère rescence épidermique disséminée, ou même pas de desquam sensible.

C'est assez dire qu'elle exige une médecine d'observation genre de celle qui est appropriée aux autres exanthèmes sur ciels de la peau. Nous ne croyons donc pas devoir nous arrêter longtemps sur cette maladie. Nous aurons occasion d'y rev l'occasion des syphilides. (Voy. ce chapitre.)

DEUXIÈME GROUPE.

Affections vésiculeuses et bulleuses.

Eczéma (ἐκζέω, *effervesco*); *dartre squameuse humide* d'Alibert; *dartre vive* de Sauvages; *crusta lactea* de Plenck; *scabies miliaris; herpes miliaris.*

D'après la forme morbide :

Simple.
Composé. — Impétigineux.
Lichénoïde.
Herpétiforme.
Psoriasiforme.

D'après la conformation :

Amorphe.
Nummulaire ou en plaques arrondies et disséminées.
Feuillé.
Unisquamosum.

D'après la partie qu'il affecte :

Diffus ou général.
Localisé. — Tête.
Oreilles.
Racine du nez.
Mamelon.
Ombilic.
Vulve.
Bourses.
Jambes.

D'après sa marche :

Aigu. — *Simplex.*
Rubrum.
Chronique.

D'après la durée :

Fugax.
Persistant.

L'histoire de cette maladie est une des plus importantes, en raison de sa fréquence, de sa ténacité, de ses formes variées et de la thérapeutique qu'elle réclame. Sur 1800 malades qui sont atteints d'affections cutanées, il y en a 600 chez lesquels on constate l'existence d'un eczéma. (*Résultat de notre statistique.*)

Cette maladie est généralement définie par les auteurs une affection vésiculeuse de la peau caractérisée par une sécrétion plus ou moins abondante de sérosité, avec rougeur et démangeaison de la partie affectée. Il en résulte cette conséquence, c'est que le médecin qui aborde un malade recherche tout d'abord des *vésicules* comme caractère dominant et élément certain de diagnostic. Il n'en est rien. Si l'eczéma est une affection vésiculeuse en raison de son élément morbide, le développement des vésicules n'est que momentané et apparaît au début de l'affection pour disparaître en quelques heures.

Ce n'est donc que fort rare nent que le médecin peut les aperce
D'ailleurs ces vésicules sont tellement ténues, qu'elles ne peu
être vues qu'au reflet de la lumière du soleil. Nous préférons
définir l'eczéma une maladie superficielle de la peau, caract
par les quatre phénomènes suivants : 1° rougeur de la surfac
lade ; 2° démangeaison *permanente* plus ou moins intense ; 3° s
tion de sérosité limpide et citrine, tachant le linge *en gris et*
pesant à la manière des taches spermatiques ; 4° état *pon*
rouge de la peau, formé par les orifices enflammés des canau
par myriades, fournissent la sérosité : aussi chacun de ces
points exposés à l'air donne-t-il bientôt naissance à une série
tites gouttelettes séreuses extrêmement ténues. (Voy. pl. I, f

La réunion de ces quatre caractères a une telle importance
est impossible, quand on les a constatés, de confondre l'eczém
aucune maladie de la peau. Il nous faut donc insister sur c
d'eux. — La rougeur est variable en intensité, suivant l'état a
chronique de la surface malade ; mais cependant elle existe
dans la période décroissante de l'affection qui est caractéris
la formation de squames épidermiques ; c'est un des dernier
nomènes à disparaître. La démangeaison est incessante. Si e
commune à plusieurs maladies de la peau, il n'y en a pas
soit plus soutenue. Elle se montre d'ailleurs à tous les insta
suffit que le malade découvre la surface affectée, qu'il la fro
touche, quel que soit d'ailleurs le moment de la journée, pou
la ressente. Or, dans les autres dermatoses avec démange
c'est à certaines heures du jour que ce phénomène se ma
principalement. Ainsi, dans le lichen et la gale, c'est la nuit, à
que dans le jour le malade entre en sueur ou qu'il s'expose à l
leur. Dans l'eczéma, au contraire, la moindre circonstance
le besoin de gratter, de frotter, et dans quelques cas ce sym
est tellement marqué, que le malade ne peut pas vaincre cet
bitude qui contribue puissamment à la perpétuation de l'af
de la peau. — Quant à la sécrétion, continue, permanente
l'état aigu, elle va en diminuant dans la période stationnair
cesser presque complétement dans la période décroissante ;
au fur et à mesure qu'elle diminue, cette sérosité, d'abord

t limpide, de couleur citrine, alcaline de sa nature, ramenant le papier de tournesol rougi par un acide, tachant le linge et l'empesant à la manière des taches spermatiques, cette acquiert la propriété de se coaguler et de se transformer en s épidermiques, d'abord très petites, comme farineuses, *mais adhérentes;* puis en squames de plus en plus larges, sous e lamelles dont la circonférence la plus extérieure est libre la généralité de la surface est adhérente (voy. pl. I, fig. 2). n, l'état piqueté ou ponctué en rouge de la peau, qui n'a été par personne, doit appeler toute l'attention du médecin. ne surface eczémateuse aiguë d'un rouge plus ou moins vif, bserve pas une rougeur uniforme comme dans un érythème, ne rougeur vive criblée de *myriades* de petits points d'un plus foncé. Si l'on examine ces petits points à la loupe, on e ce sont des orifices de canaux desquels suinte constam- e la sérosité qui se rassemble bientôt sous forme de petites ettes à la surface de la peau. C'est qu'en effet les vésicules res de la maladie sont formées par une sécrétion séreuse qui e la lame épidermique située au-dessus de l'orifice vascu- puis l'épiderme se déchire pour donner issue à la sérosité e, et il ne reste plus que le pertuis vasculaire rouge et en- é, fournissant d'une manière plus ou moins permanente la on morbide et se dessinant par un point rouge sur le corps ux enflammé lui-même; de là l'état ponctué que nous signa- sur lequel nous insistons, parce que c'est le caractère dis- et différentiel de l'eczéma d'avec une maladie qui lui res- beaucoup et que les auteurs ont fort superficiellement décrite: e *pityriasis rubra*, dont nous traiterons. (Voy. PITYRIASIS.) gure 1 de la planche I, qui a été refaite avec beaucoup de par M. Léveillé, représente ces détails comme jamais aucune ne les a reproduits.) Dans un cas de diagnostic douteux, il le frictionner la surface malade avec une eau un peu chargée bonate de potasse, pour faire naître un état aigu accidentel ssine cet état ponctué d'une manière très marquée.

zéma est une maladie très superficielle de la peau, elle n'en pas très sensiblement le gonflement; aussi la surface eczéma-

teuse ne fait-elle jamais saillie au-dessus de son niveau ; l'affection semble se confondre avec la peau saine, à sa circonférence. Si dans une surface eczémateuse la peau est tuméfiée, le membre augmenté notablement de volume par la tuméfaction de la peau, c'est qu'on n'a pas affaire à un eczéma simple, mais à un eczéma composé, comme l'*eczéma impétigineux*, par exemple, ou l'*eczéma lichénoïde*, maladies qui affectent plus profondément le tissu de la peau, et qui amènent parfois le gonflement du tissu cellulaire.

Au point de vue des divisions scolastiques de cette affection, on peut la considérer sous divers rapports dont le tableau placé en tête de cette maladie donne l'indication.

Dans ces diverses divisions, il en est trois qui doivent fixer l'attention : 1° Celle qui établit une distinction entre l'eczéma simple et l'eczéma composé. Les auteurs n'en ont fait mention qu'accidentellement et secondairement, non-seulement pour cette affection, mais encore pour la généralité des maladies de la peau. Ils n'ont pas tenu compte des formes composées : or les formes simples de Willan ne se montrent guère qu'au printemps, elles sont rares ; les formes composées sont au contraire très nombreuses, et les seules peut-être que l'on voie en automne et en hiver ; elles sont tout aussi élémentaires que les formes simples. Pour nous, qui en avons fait l'objet d'une étude toute spéciale, nous ajoutons beaucoup plus d'importance à ces formes qu'à toutes ces divisions secondaires que Willan a établies dans les formes primitives qu'il a créées. Qu'un psoriasis soit *guttata*, *diffusa*, *gyrata*, cela importe peu, il réclame toujours le même traitement ; mais s'il est compliqué avec une autre forme morbide, il en ressort des indications thérapeutiques toutes particulières : car si la forme morbide qui le constitue psoriasis composé exige surtout l'emploi des sulfureux, par exemple, ce ne sera plus seulement alors au goudron et à l'arsenic qu'il faudra s'adresser, mais bien à l'association de plusieurs sortes d'agents médicamenteux.

Il est bon d'ailleurs que l'on sache que ces formes composées ne sont pas des complications morbides. La maladie naît dès l'abord avec les deux éléments de composition. Soit : pour l'eczéma impétigineux, la vésicule avec la pustule de l'impétigo ; la vésicule eczé-

mateuse et la papule de lichen, pour l'eczéma lichénoïde, etc. Mais, a-t-on dit depuis la première édition de cet ouvrage, et M. Cazenave notamment, c'est là une double maladie dans laquelle une des deux affections est prédominante, c'est un eczéma compliqué d'impétigo ou de lichen ! Non ; la vésicule eczémateuse existe, mais elle devient aussitôt purulente, comme dans la pustule d'impétigo. La papule du lichen eczémateux est dès l'abord sécrétante. Alibert, dont le talent d'observation n'a pas laissé d'imitateur qui l'approche, avait entrevu ces formes composées. C'est lui qui, le premier, a parlé d'eczéma impétigineux, et il décrit aussi ou fait entrevoir l'eczéma lichénoïde, quand il parle de l'herpès *squameux lichénoïde*. On verra par la suite, et à l'occasion de chaque maladie, se dérouler le tableau de ces formes composées que la majeure partie de nos collègues à l'hôpital Saint-Louis regardent d'ailleurs comme parfaitement fondés.

2° La conformation de l'eczéma ne présente pas moins d'intérêt sous le rapport pratique. Aussi les variétés d'eczéma nummulaire, fendillé et *unisquamosum* sont telles que la première est de toutes les formes eczémateuses la plus rebelle au traitement ; dans la seconde, au moment où l'on croit le malade guéri, surgit une éruption nouvelle avec son cachet tout particulier, de manière à faire le désespoir du malade et du médecin. Quant à la troisième variété, elle a cela de particulier, qu'elle se produit sans cesse dans les mêmes limites et sous la même forme.

3° La division de l'eczéma en aigu et en chronique est la plus importante pour la thérapeutique, puisque l'état local devient le guide des moyens qu'il y a lieu de mettre en usage.

Quant aux divisions adoptées par les auteurs, elles se réduisent à celles-ci. Willan en décrit trois variétés : 1° l'*eczema simplex*, 2° l'*eczema rubrum*, 3° l'*eczéma impétigineux*. Les auteurs qui l'ont suivi ont décrit un eczéma aigu, un eczéma chronique en plus des précédents.

Description générale. — Période aiguë. — L'eczéma est le plus souvent précédé dans son développement par une sensation de démangeaison dans la partie qui doit être affectée ; puis, après plusieurs jours, et souvent sans cause apparente ou connue, il sur-

déterminée. C'est l'eczéma le plus communément observé dans sa forme comme dans son étendue. Il peut affecter à comme plusieurs parties du corps, et il prend alors le nom général. Mais quelle que soit la multiplicité des points qu'il quelle que soit la dimension des plaques morbides qui le tuent, il ne *peut jamais* envahir la *totalité de la peau* de ma occuper toute sa surface sans laisser des espaces de peau sa *pityriasis rubra*, au contraire, peut atteindre uniformément surface du corps sans exception, aussi la dénomination de p général lui est-elle bien plus applicable. Toutefois l'eczéma pour ainsi dire, des lieux d'élection : ainsi, il résulte des que nous avons faits à cet égard que, sur 600 cas, les jam atteintes 446 fois, les avant-bras 155, les cuisses 152, les b la figure 114, le cuir chevelu 86, les parties génitales 68, le la poitrine 54, le ventre 50, le dos 45, etc.

L'*eczéma nummulaire* n'a été décrit nulle part. Nous l'av servé pour la première fois sur un employé de la poste il y et depuis cette époque, ayant été frappé de cette forme, nou eu l'occasion d'en voir plusieurs exemples par année. Ce q remarquable, c'est moins sa disposition *nummulaire* que à cité, et c'est la difficulté qu'on éprouve à le guérir qui engagé à en faire une espèce particulière.

L'eczéma nummulaire a pour cachet spécial de se dé lopper surtout à la surface des membres, et notamment des membres supérieurs, comme aussi à la surface du tronc ; il s'y montre par petites plaques qui prennent tout de suite l'étendue qu'elles devront avoir ; elles sont arrondies, de la largeur d'une pièce de 5 francs ou un peu plus ; elles n'ont aucun bourrelet, ce qui les distingue de l'herpès ; leur circonférence est amincie et se perd avec le reste de la peau, comme dans l'eczéma ordinaire ; elles sont d'ailleurs avec rougeur, état ponctué de la peau, démangeaison, sécrétion de sérosité. Elles exigent en général plusieurs mois pour leur guérison, et ne cèdent le plus souvent qu'à un ensemble de moyens plus ou moins énergiques.

Eczéma fendillé. — Cette espèce n'est pas plus décrite que la précédente, elle a cependant un cachet tout particulier ; elle est ou

initive ou secondaire. Elle se montre par une plaque morbide siant ordinairement en avant des jambes, mais pouvant aussi se rencontrer aux cuisses et aux avant-bras. Au lieu d'observer une surface uniformément malade, on y trouve l'épiderme cassé en long et fournissant dans ces cassures une sérosité plus ou moins abondante. Ces cassures se guérissent peu à peu dans l'espace de huit à dix jours; puis, sans cause connue, il se produit une poussée de cassures nouvelles qui se conduisent de la même manière, et ainsi de suite durant un espace de temps plus ou moins considérable. Cette circonstance d'éruption eczémateuse successive fait souvent croire à la guérison, qui n'est qu'un état voisin d'une poussée nouvelle. Le cachet de cette espèce, c'est cette succession même qui donne à cette affection plus de durée que de coutume, en dehors de ce que la forme morbide peut avoir de particulier. D'ailleurs, cette éruption ressemble beaucoup à la poussée produite par les eaux sulfureuses. Elle peut affecter la forme d'eczéma simple ou celle d'eczéma impétigineux; elle a de la tendance à la chronicité et à l'extension surtout, car elle *trace* sur les membres comme les racines dans la terre. Un des moyens qui m'ont paru le plus propres à arrêter les progrès de cette affection, c'est de saisir un de ses temps d'arrêt pour étendre tous les jours une légère couche d'huile de cade sur la partie malade, notamment chez les personnes âgées où cette maladie est commune. Il ne faut pas craindre de produire un peu d'excitation. On saupoudre la partie imbibée d'huile avec de l'amidon en poudre, et l'on emploie en général peu de pommades contre cette maladie.

Eczema unisquamosum. — Sous cette dénomination, on désigne une variété très rare d'eczéma, qui a été indiquée pour la première fois par M. Liévain, et qui a son siége à la racine du nez, entre les deux sourcils. Depuis quatorze ans je n'en ai observé qu'un seul cas, chez une maîtresse d'hôtel de la rue Croix-des-Petits-Champs. Elle avait cette affection depuis dix-huit mois. Dans cette espèce, une fois l'état aigu tombé, la sécrétion produite se transforme en une seule lamelle épidermique qui recouvre toute la surface du mal, tombe, et est remplacée par une nouvelle écaille au bout d'une huitaine de jours, et ainsi de suite. La maladie n'a guère qu'un

centimètre de superficie. C'est en modifiant la surface malade par des cautérisations légères que je suis parvenu à obtenir la guérison.

Eczema rubrum. — Variété mal décrite par les auteurs, et qui mérite de fixer l'attention du médecin. Je dis mal décrite, parce qu'ils ont rattaché cette épithète *rubrum* à la couleur d'un rouge vif de l'éruption eczémateuse ; mais à cette condition un *eczema simplex* aigu serait un *eczema rubrum*, et c'est ainsi que les dermatologistes modernes envisagent beaucoup d'eczémas : c'est une erreur. Il résulte des observations que nous avons faites à cet égard que la couleur rouge foncé n'est que le phénomène secondaire, mais toujours obligé, de l'eczéma ordinaire dans sa période aiguë, et non pas indispensable dans sa période de stase ou de décroissance. Ce qui caractérise l'*eczema rubrum* à nos yeux, c'est la manière dont naît l'éruption vésiculeuse jointe à la coloration intense qu'elle présente. Tandis que, dans l'*eczema simplex* même le plus aigu, l'éruption vésiculeuse s'opère à la surface de la peau, sans amener aucun gonflement du derme, de manière que toute la surface de l'eczéma soit sur un plan parfaitement égal et de niveau avec le reste de la peau ; dans l'*eczema rubrum*, c'est par plaques arrondies, ovoïdes, boursouflées, saillantes, agglomérées les unes à côté des autres, chacune d'elles de la largeur de 1 à 2 centimètres et en nombre indéterminé, de manière à former des groupes de bosselures très rouges et sécrétant en abondance de la sérosité. Ces groupes s'affaissent peu à peu, mais sans jamais disparaître complétement et en conservant toujours une certaine saillie même après la guérison ; puis, dans le voisinage des premiers, apparaît une nouvelle série de groupes, de sorte que toute la surface antérieure de la jambe, car c'est presque constamment sur cette partie que se développe l'*eczema rubrum*, finit par être bosselée. Or la maladie ne sécrète que là où apparaît une bosselure recouverte de vésicules et parfaitement dessinée d'ailleurs : et comme leur récidive a lieu sans ordre, on distingue très bien celles qui sont nouvelles de celles qui se sont anciennement développées.

Dans cette variété les démangeaisons sont plus vives, plus incessantes, la chaleur est forte, la rougeur des plus marquées, le frot-

douloureux, le grattage impossible, tandis qu'il est uoique un peu cuisant, dans l'*eczema simplex*. Enfin, variété l'état aigu persiste avec une grande intensité, aise ; les émollients ordinaires sont impuissants pour le et la durée de l'affection avec son acuité est souvent de ois mois. Aussi réclame-t-elle un traitement particulier erons connaître.

fugax. — Quelques auteurs modernes décrivent cette va- s caractérisent par l'apparition et la disparition succes- ntervalles plus ou moins éloignés. Pour moi, je ne con- e plus tenace qu'un *eczéma*, et je n'admets pas l'existence *a fugax*.

localisés. — Tous les auteurs ont en général attaché une portance à leur description spéciale. Ce sont en effet des l'égard desquels nous allons fournir quelques détails s présentant d'ailleurs ce caractère commun, qu'ils sont bornés à une surface très circonscrite ; qu'ils ont une s grande ; qu'ils sont très sujets à récidiver dans le même ils parcourent leurs périodes sans s'étendre, et qu'ils nsi exister toujours sur la même surface pendant dix, nze et vingt ans.

de la tête. — Cette maladie ne s'observe que dans l'en- ns les premières années de la vie, à moins qu'elle ne soit le l'extension de l'eczéma des oreilles (voy. *Eczéma des* 'est une de celles qui, par les mêmes motifs, sont dési- le nom de *gourme*. C'est l'*acor mucifluus* d'Alibert. Tantôt enfants fournit une crasse grasse qui se détache facile- ôt cette crasse est au contraire fort adhérente. Ce sont deux *acor sébacé* ou *acné sébacé*. Dans un troisième cas, la tête pus : c'est un *impétigo*. Dans un quatrième, elle donne du a sérosité : c'est un *eczéma impétigineux ;* enfin elle peut e sérosité plus ou moins visqueuse : c'est l'*eczéma* du cuir 'ette maladie, qui se montre dans les premiers mois de la lt ordinairement avec une certaine rapidité ; elle est pré- uelques démangeaisons, puis tout à coup les cheveux de raissent mouillés, la peau a pris une teinte rosée ; et, si

l'enfant a un an ou dix-huit mois d'existence, on le voit aussitôt, tête étant à nu, porter ses deux mains au cuir chevelu pour gratter outre mesure, à un tel point que la mère ne peut faire cesser ces grattages. Dans quelques cas, la sécrétion est extrêmement abondante; la chevelure, les bonnets, sont traversés; tous les cheveux sont agglutinés et collés entre eux, malgré les soins de propreté. La maladie persiste ainsi fort longtemps, et elle persiste d'autant plus que le rôle du médecin doit se borner à la mitiger, à la rendre moins incommode, mais qu'il ne doit pas chercher à la guérir, car il compromettrait la santé et quelquefois la vie de l'enfant. Elle ne réclame que des soins hygiéniques que nous ferons connaître, en indiquant dans la thérapeutique de l'eczéma les inconvénients qui peuvent entraîner dans quelques cas les moyens les plus simples.

Eczéma des oreilles. — Il est très commun chez la femme et très rare chez l'homme. Il se développe surtout à l'âge critique, ou de l'adolescence, s'étendant ou dans la conque de l'oreille ou sur l'hélix et envahissant peu à peu tout le pavillon, mais surtout en avant et fort peu en arrière. Or, l'*intertrigo* sécrétant des oreilles qui se montre à la même époque de la vie existe au contraire dans le pli d'union du pavillon de l'oreille avec la tête en arrière. Cet eczéma reste aussi stationnaire pendant des années, affectant quelquefois une seule oreille, mais le plus souvent les deux. Cependant il peut, par des causes accidentelles, s'étendre au front et à la totalité du cuir chevelu; il devient alors fort rebelle. Contrairement aux autres eczémas, il augmente le volume du pavillon de l'oreille, et par sa persistance et sa chronicité il tend à le doubler ou à le tripler dans l'état aigu.

Eczéma de la racine du nez. — C'est l'*eczéma unisquamosum* dont nous avons parlé. (Voy. p. 239).

Eczéma du mamelon. — Il affecte le mamelon de l'un ou des deux seins, et ne *s'étend jamais au delà.* Il se montre le plus souvent à la suite de l'allaitement, et il n'est pas rare qu'il reconnaisse la syphilis pour cause quoiqu'il puisse en être indépendant. Cette circonstance que l'allaitement ou l'accouchement peuvent en être la cause déterminante, fait assez pressentir qu'on remarque cette maladie principalement vers l'âge de trente ans. Cependant on peut aussi la retrouver plutôt, mais rarement dans un âge avancé. Quand elle

plutôt, c'est chez des jeunes filles de l'âge de quinze à . Elle est tellement rare chez l'homme, que M. Rayer dé- avoir jamais vue. J'en ai observé d'assez fréquents exemples nnes garçons de douze à seize ans. Rien de plus tenace que ction ainsi localisée.

du nombril. — C'est là essentiellement une maladie de et de l'adolescence, plus commune aux jeunes filles qu'aux rçons. Elle affecte le nombril seulement, et elle y existe oujours sous la forme chronique, ne gagnant presque ja- urface, et occupant le cul-de-sac de ces ombilics fort en- ns les chairs. Mille causes amènent sa chronicité; l'enfant e ne s'en aperçoivent que par hasard. Il n'y a qu'une dé- son qui tout d'abord n'est pas incommode, et que les dis- de l'enfance font oublier. La pudeur de la jeune fille la fait avouer sa maladie quand elle s'en aperçoit. Il faut qu'un nt assez fort vienne accidentellement faire réclamer les soins cin. Cet eczéma, comme l'eczéma du mamelon chez les jeunes ordinairement essentiellement lié au tempérament lym-

a de la vulve. — Il est propre à l'âge critique; il succède ois à l'intertrigo des aines ou au lichen. Dans son état aigu, une cuisson et un épaississement des grandes lèvres avec aisons qui sont incommodes pour la marche, et aussi par la ation qu'elles peuvent produire soit du côté du méat uri- it du côté du clitoris. Cet eczéma a d'ailleurs une grande , et il est très difficile à guérir, attendu sa situation, la cha- régne dans ces parties, et la difficulté des soins pour cer- mmes obèses.

a des bourses. — Voici une maladie qui fait quelquefois le r et du malade et du médecin. Née vers l'âge de trente à inq ans, et souvent plus tard, elle envahit peu à peu la le la peau qui constitue les bourses, et s'arrête à la limite jonction avec la peau des aines et celle de la verge. Mais ge la avec per évérance, disparaissant, reparaissant sous ce des excès, de la marche, de la fatigue, de la sueur. Re- tant qu'il est possible de l'être, elle exerce une influence

des plus fâcheuses sur le moral; elle conduit à l'isolement, aux idées noires et quelquefois au suicide. — Elle épaissit peu à peu la peau; suintant quelquefois à la manière d'une plaie; se desséchant dans d'autres cas pour produire des écailles épidermiques plus ou moins épaisses, que le moindre frottement rend parfois douloureuses; de sorte que la marche devient très fatiguante et le repos indispensable.

Eczéma des jambes. — Je localise cette espèce, non pas que je la place tout à fait sur le même rang que les eczémas locaux que je viens de décrire, mais à cause de la fréquence de cet eczéma dans ce point. Cette fréquence est telle que, dans mes relevés statistiques, je trouve l'eczéma des jambes 75 fois sur 100. Il est vrai de dire que certaines professions, les débardeurs de bateaux; certains états vasculaires, les varices; certaines maladies des jambes, les ulcères, y prédisposent. Aussi a-t-on fait une espèce à part de l'eczéma variqueux, qui exige un traitement spécial. C'est cependant pour nous encore une question de savoir si les varices prédisposent aux eczémas des jambes, ou si les eczémas des jambes ne prédisposeraient pas aux varices. Nous serions presque tenté d'admettre, d'après nos observations, la possibilité des deux faits: toujours est-il que l'on trouve presque autant de malades chez lesquels les varices ont précédé, que d'autres chez lesquels elles ont suivi l'eczéma. Cette forme morbide n'a réellement d'intérêt qu'au point de vue de la thérapeutique; nous aurons soin d'en parler. Notons cependant cette circonstance, que tandis que l'eczéma non variqueux a son siége le plus général en avant et en dehors des jambes, l'eczéma variqueux a plus particulièrement son siége en dedans; cette circonstance tendrait à faire admettre cette variété comme toute spéciale et comme étant consécutive aux varices.

L'eczéma peut apparaître en été et en hiver: en été, c'est sous forme aiguë; en hiver, sous forme chronique. A cet égard, l'influence de la saison est absolue: ainsi j'ai vu bien souvent des élèves entrer dans mon service à la fin de l'été, et se plaindre, après cinq ou six mois écoulés, de n'avoir pas pu observer un seul eczéma aigu. Ce n'est pas tout. Il est digne de remarque que l'eczéma aigu, né sous l'influence du printemps, tend à disparaître

ujours quand il est nettement guéri, tandis qu'il est fré-
e voir l'eczéma chronique, né en automne, se guérir avec
ᵉ pendant l'hiver et être sujet à récidiver l'automne suivant.
ie âge a son cortége propre de formes eczémateuses. Ainsi
uciflluus, ou dartre muqueuse d'Alibert, qui n'est que l'ec-
ppartient à l'enfance. Il n'est pas jusqu'aux sexes qui ne
bjet de la prédilection de certaines formes spéciales d'ec-
elui des oreilles et des mamelons semble fuir le sexe mas-
s'attacher de préférence à la femme. L'homme est à son
s spécialement condamné à l'eczéma des bourses, tandis que
, des parties génitales est assez rare chez la femme. Le pru-
la vulve et l'intertrigo semblent tenir lieu de cette affection.
ma, comme les autres maladies, parcourt-il ses phases de
pement, de marche, de terminaison, dans un temps donné?
ait très probablement, si dès le début il était traité anti-
iquement et dans toutes les conditions d'hygiène et de
cessaires, sans que le malade cédât aux démangeaisons qui
nt cette affection. Mais il n'en est jamais ainsi. Nous ne
donc, à l'instar de quelques auteurs, dire qu'il parcourt
des en six semaines ou deux mois. La chronicité, la durée
ieurs mois, de plusieurs années, et quelquefois de longues
est la condition moyenne de tous les malades atteints de
aladie.

rminaison naturelle est la résolution. Une maladie dont il
dique souvent chez les vieillards, et principalement en été,
purpura, qui exige alors une médication interne toute spé-
Voy. PURPURA.)

e certaine époque de la vie, l'eczéma devient un exutoire
ire qu'il faut savoir respecter, sa suppression pouvant en-
des accidents très graves et quelquefois la mort. A cet égard,
aurait se faire une idée de la portée si grave de la suppres-
une surface eczémateuse même peu étendue chez quelques
Voici ce que l'on observe alors. Que, par une exposition au
u retour d'un bain, ou par toute autre cause analogue, une
eczémateuse sécrétante cesse d'exister; et l'on voit appa-
'ensemble des accidents que nous avons exposés avec quel-

ques détails dans nos considérations générales sur les maladi
la peau (voy. p. 60). On se demande comment une maladie l
si légère a pu mettre ainsi les jours du malade en danger. De
nécessité de respecter des eczémas très anciens, chez les vieil
surtout, et chez les personnes asthmatiques ou ayant habitu
ment une respiration courte. Nous indiquerons plus bas le m
de rappeler d'une manière efficace l'état eczémateux là où il
tait. — Un état morbide *général accidentel* peut faire dispa
l'eczéma ainsi que toutes les autres affections de la peau, mai
convalescence l'eczéma reparaît avec quelque bénéfice po
malade, en ce sens que la maladie est moins intense. Toutef
médecin commettrait une erreur si, en présence de la fièvre
loppée, de l'eczéma disparu, il annonçait la guérison radica
l'affection cutanée, car il est d'observation que la convalescen
cet état général n'est réelle qu'à la condition que la maladie
peau se montre de nouveau.

Causes de l'eczéma. — On peut sinon hériter d'une affection
mateuse, au moins hériter de l'organisation qui favorise son
loppement. Rien n'est plus commun que de voir cette malad
perpétuer ainsi dans les familles. Cela tient peut-être aussi
sorte de préjugé très fâcheux qui est encore aujourd'hui assez
ralement accrédité par un grand nombre de médecins : c'es
faut respecter une affection dartreuse dans le jeune âge. M
préjugé, ainsi que je l'ai déjà dit, ne se borne pas là pour les j
filles. Par exemple, on ajoute : Attendez, lorsque la menstru
sera survenue, la dermatose disparaîtra. La menstruation a
et la maladie de la peau ne disparaît pas. Alors on se rejette
mariage, et à défaut du mariage sur la première grossess
mariage arrive, il donne tort au médecin ; la grossesse seule j
l'exactitude de ce pronostic si fâcheux, mais cette justification
que momentanée : la dartre a disparu, pour reparaître si l'a
ment n'a pas lieu, et pour se montrer de nouveau après l'allait
si la mère nourrit son enfant. Il en résulte que si l'enfant
essentiellement de l'organisation de la mère, celle-ci transm
par la grossesse et par l'allaitement, la disposition à une m
dont elle était atteinte, et s'il tient du père, elle peut la transm

laitement. C'est ce que nous avons établi dans nos consi-
ns générales sur l'hérédité.

l'eczéma peut dériver d'une foule de causes différentes, et,
e dire, c'est l'une des maladies pour lesquelles la cause pré-
nte, celle qui entretient et perpétue l'affection cutanée, nous
lus souvent inconnue.

médecine plus qu'en toute autre science, il faut être vrai, il
re consciencieux; c'est pour le médecin qui écrit le plus
ux de tous les devoirs. Eh bien! que l'on interroge les ma-
tteints d'eczéma sur la cause de leur maladie; que l'on
les organes intérieurs pour savoir s'ils sont souffrants, je
fait que sur 100 cas d'eczéma on ne trouve pas 10 cas dans
la cause réelle de l'affection sera dessinée de manière que
isse diriger vers elle un traitement. Il y a plus, l'eczéma
e presque toujours avec l'état de santé général le plus par-
le plus grand nombre des malades vous disent qu'ils ne se
mais mieux portés que depuis qu'ils ont cette maladie. Si,
on développement, quelques-uns avaient des digestions dif-
un dérangement intestinal se répétant de temps à autre, tout
disparu depuis l'apparition de l'eczéma.

n est pas de même de la cause déterminante, elle devient
e dans la généralité des cas. L'eczéma aura succédé à la
tion momentanée des règles, à une suppression hémor-
le, à l'âge critique chez la femme; mais vous aurez beau rap-
s hémorrhoïdes ou rétablir la menstruation dérangée, vous
rirez pas l'eczéma En un mot, vous acquerrez facilement la
nance de la cause déterminante, mais vous arriverez difficil-
à la cause prédisposante, à celle qui perpétue l'eczéma, à
u'il faut thérapeutiquement combattre; aussi les dermatolo-
nvoquent-ils alors des méthodes empiriques et des médica-
ui, dans la généralité des cas, comptent le plus de succès.

rai que pour mon compte je ne puis rattacher l'eczéma à
pérament toujours très déterminé, je puis le rapporter à une
minance de tempérament. La statistique à cet égard nous
tre une prédominance du tempérament lymphatique; car
2 eczémas, je trouve noté le tempérament lymphatique pour

175 cas; lymphatique et sanguin, 195 cas; lymphatique et nerveux, 53 cas : total, 423 cas de prédominance de tempérament lymphatique, lymphatico-sanguin, lymphatico-nerveux. Dans ces eczémas sont compris les eczémas impétigineux qui se rattachent franchement au tempérament lymphatique, ce qui augmente naturellement ces chiffres. Toujours est-il que cette liaison des eczémas avec une certaine prédominance lymphatique rend compte des bons résultats que l'on obtient des médications sulfureuses dans le traitement de cette maladie.

Mais de ce qu'en thèse générale on arrive difficilement à la cause de l'eczéma, il ne s'ensuit pas qu'on ne doive la chercher. C'est, au contraire, un motif pour mettre plus de soin dans l'investigation de tous les organes sous ce rapport. Que si, à l'aide de la statistique que nous avons dressée, nous examinons les liaisons qui peuvent exister entre l'âge, les professions, l'habitation, etc., et cette maladie, nous arrivons aux résultats suivants, inconnus jusqu'alors. Sur 581 cas : 162 eczémas développés de quinze à vingt-cinq ans, mais ce sont presque tous des eczémas impétigineux; 243 de vingt-cinq à quarante-cinq ans, et alors presque tous eczémas simples; 80 de quarante-cinq à cinquante-cinq; 66 de cinquante-cinq à soixante-cinq, et 30 de soixante-cinq et au delà. D'où il suit que l'eczéma impétigineux est essentiellement une maladie de la jeunesse; que c'est surtout entre vingt-cinq et quarante-cinq ans que se montrent les eczémas francs; qu'après cette période, il y a tout de suite une décroissance très grande, et enfin que leur manifestation est très rare au-delà de soixante-cinq ans. Sur 319 cas les cochers, charretiers et journaliers figurent pour le chiffre le plus élevé, 65, soit un quart; pour les maréchaux, ferblantiers et mécaniciens, 51, soit un sixième; les tailleurs, couturières, revendeuses, et les menuisiers, ébénistes, tonneliers, charrons, pour 41 ou 43, soit un huitième environ. Les autres professions donnent des chiffres de peu de signification. — Nous trouvons une habitation malsaine, humide, notée 126 fois sur 582 cas. On voit que cette circonstance joue un rôle insignifiant dans le développement de cette maladie. Nous avons peu de documents sur la transmission, le genre d'individus sur lequel porte cette statistique, étant fort mal renseigné

ur les antécédents de la famille. — L'eczéma se lie en général à ne bonne constitution, car sur 530 cas nous trouvons signalée une nstitution médiocre dans 66 cas seulement. — La gale est notée 95 fois sur 469 individus. C'est une proportion assez considérable; eut-on la regarder comme une prédisposition? Ce chiffre nous rait insuffisant pour nous prononcer à cet égard, mais une proortion de près de moitié est cependant un chiffre qui doit appeler attention, car il est loin de l'état ordinaire. Parmi les individus ui pour une maladie quelconque ont recours à l'hôpital, c'est-à-ire parmi les ouvriers, il n'y en a pas la moitié qui gagnent la gale.

La date de l'invasion de l'eczéma chez les malades traités à l'hôital donne une idée de la durée de cette maladie et de sa ténacité. e moins de 1 mois, 19; de 1 à 2 mois, 28; de 2 à 6 mois, 106; e 6 mois à 1 an, 51; de plus de 1 an, 292; de plus de 10 ans, 57; e l'enfance, 8 : total, 561 malades. Non pas que l'eczéma eût conmment existé, ces diverses époques ne comprenant que la date de i première invasion, mais on en voit de 15, 20 et 30 ans de durée. e que notre statistique offre de bien remarquable et ce qu'elle neigne d'une manière bien évidente, c'est que l'eczéma débute ou n été ou en hiver; on verra d'autres maladies qui ne se montrent u'au printemps ou à l'automne. Printemps, 60 cas; été, 127; utomne, 28; hiver, 169, sur un total de 384 : ce qui donne 296 cas our l'été et l'hiver, et 88 seulement pour le printemps et l'auumne. Enfin, par rapport aux formes composées de cette maladie, statistique nous donne les résultats ci-après : 205 eczémas impéiineux, 101 eczémas lichénoïdes, 14 eczémas psoriasiformes, et eczémas herpétiformes, sur un ensemble de 600 cas.

Diagnostic. — Les caractères tout particuliers que je me suis tiaché à spécifier au début de cet article me paraissent suffisants our distinguer cette affection de toute autre. L'herpès à vésicules ès ténues ne sécrète plus après quelques jours; d'ailleurs sa rme circinée le distingue toujours de l'eczéma à configuration nal arrêtée. Dans l'herpès phlycténoïde et le zona, les vésicules ront beaucoup plus grosses. Il est une maladie non vésiculeuse ui a souvent été la source d'erreurs : c'est le *pityriasis rubra.* ci rougeur de la peau, démangeaison, sécrétion séreuse. Mais le

pityriasis rubra est généralement d'un rouge plus foncé que l'eczéma; sa surface morbide est nettement tranchée d'avec la peau saine; elle n'est pas ponctuée de points rouges quand elle sécrète, et quand elle ne sécrète pas, elle se recouvre de lamelles épidermiques et écailles qui se détachent à chaque instant des surfaces malades. Le suintement qu'il fournit est plutôt une sueur qui empêche le linge, mais sans le tacher en gris noirâtre comme la sérosité de l'eczéma. Quant à l'eczéma impétigineux, il donne une sérosité purulente qui se transforme en croûtes adhérentes dont la nature est facile à reconnaître.

Pronostic. — L'eczéma ne constitue jamais un danger sérieux pour l'existence, mais il en a un plus grave au point de vue de son opiniâtre persévérance. Sa ténacité est telle qu'il n'est pas possible d'en prévoir la durée, et quand il disparaît, rien n'assure qu'il ne reviendra pas recommencer ses éternelles périodes. Toutefois ce fâcheux pronostic s'adresse surtout aux personnes qui, par position sociale ou par toute autre cause, ne peuvent consacrer un temps suffisant à une parfaite guérison ; loin d'offrir d'ailleurs une ténacité proportionnelle à son étendue, il semble au contraire que plus il est circonscrit et restreint, plus il résiste à nos médications.

Thérapeutique. — La thérapeutique de l'eczéma doit être locale et générale ; elle doit tenir compte, sous les deux rapports, de la période aiguë, stationnaire ou décroissante de l'eczéma, de sa forme chronique, de ses causes, des modifications à apporter suivant la forme morbide elle-même, suivant la partie affectée, l'âge du sujet, et enfin elle doit correspondre au point de vue général de la cause qui a pu le faire naître comme aussi se rattacher à ce que l'on peut appeler l'empirisme du traitement de l'eczéma. C'est sous tous ces rapports que je vais exposer les faits qui concernent ce paragraphe.

Toutes les fois que l'eczéma se présente sous une forme aiguë, l'état général doit tout d'abord préoccuper le médecin. Il est des cas où cet état aigu est tellement prononcé, qu'il y a lieu de pratiquer une émission sanguine, soit par la saignée, soit par les sangsues à l'anus ; mais il faut alors qu'il y ait un état de pléthore assez marqué. C'est surtout au printemps que l'on aura occasion d'em-

lte médication. A l'intérieur, les tisanes acidulées, rafrai-
; diminution notable des aliments, que l'on fait prendre
antiels. Ce régime général doit être suivi tant que dure la
gue. Localement, et lorsqu'une rougeur vive accompagne
qu'il existe un sentiment de chaleur et de cuisson, il est
qui, dans la saison chaude, me réussit à merveille pour
er l'état aigu : ce sont des irrigations d'eau d'abord tem-
is rendue fraîche, que l'on emploie une ou deux fois par
nt une heure à une heure et demie chaque fois. Voici com-
is pratiquer ces irrigations, et je suppose qu'il s'agit d'une
lade, siége le plus ordinaire de l'eczéma. On élève un seau
u à 60 centimètres au-dessus de la partie affectée ; à ce
joute un robinet ou une cannelle de bois ; je fait attacher
et une bande que je divise en deux lanières à sa partie
. Le membre est placé horizontalement sur une toile cirée
en gouttière, pour faire écouler l'eau dans une terrine
près du lit du malade. Les choses ainsi disposées, on écarte
anières de la bande de manière à étendre ses deux chefs,
aut, l'autre en bas de la jambe, on ouvre un peu le robinet,
de s'écoule sur toute la surface affectée. J'obtiens de ce
ue j'ai employé la première fois pour combattre l'*eczema*
les résultats fort remarquables. L'inflammation cède rapi-
et ramène en quelques jours l'eczéma aigu à sa période
ire. Mais il ne peut être employé qu'en été, sur des per-
bon état de santé et chez lesquelles on n'a pas à craindre
e d'une réfrigération. Au surplus, on peut modifier son
t dans la température de l'eau et dans la durée de l'écou-

aux applications locales permanentes, elles peuvent être
, mucilagineuses ou pulvérulentes. A cet égard, l'expé-
prend, sans qu'on puisse le reconnaître à l'avance, que
a à l'état aigu se trouvera fort mal des émollients aqueux ;
les corps pulvérulents calmeront parfaitement l'état aigu,
vai. C'est une première observation à faire. Il est constant
taplasme, fût-il placé dans les meilleures conditions, peut
ement augmenter et l'inflammation de l'eczéma et son

étendue, tandis que la poudre d'amidon va faire céder l'état inflammatoire avec une rapidité extrême. Tel eczéma ne pourra jamais supporter un corps gras, fût-ce le plus onctueux, et il se trouvera très bien des corps liquides émollients, résolutifs ou autres. J'ai signalé ce fait d'observation depuis plusieurs années : il a une utilité réelle au point de vue thérapeutique. Les compresses d'eau de sureau, d'eau de guimauve ; les cataplasmes, notamment ceux de farine de riz, de fécule de pomme de terre bien lavée, car les cataplasmes de farine de graine de lin sont presque toujours moins tolérés; la poudre d'amidon tamisée mise en couche légère (fleur d'amidon), enfin les bains généraux émollients (voy. *Formulaire*, BAINS) : telle est la médication générale et locale propre à combattre l'état aigu, et dont il ne faut pas se départir avant qu'il soit détruit. On peut y joindre l'usage de quelques laxatifs, et à ce sujet, je ne saurais trop préconiser une décoction de 2 à 8 grammes de séné prise tous les matins en deux verres de tisane de pensée sauvage, ainsi que l'administre notre collègue Hardy. Il est un agent local dont on a beaucoup exagéré les avantages dans ces derniers temps, je veux parler de la Glycérine ; j'ai fait connaître, page 85, ce que c'était que cet agent ; il est toujours altéré par un peu d'acide sulfurique libre et par des sels de chaux, de magnésie et de fer qui s'y trouvent dans un certain état de combinaison, et qui en constituent un médicament qui tient le milieu entre les émollients et les résolutifs, aussi peut-il être employé avec avantage lors de la décroissance de l'eczéma ; mais contrairement aux assertions émises par ceux qui en ont préconisé l'emploi, je n'ai jamais pu terminer la guérison d'un eczéma avec ce seul agent.

Période d'arrêt ou stationnaire. — Il y a lieu de continuer encore le traitement émollient pendant quelque temps et jusqu'à l'apparition des furfures adhérents; mais c'est à cette époque qu'il faut commencer le traitement général au point de vue de la cause prédisposante. Existe-il quelques liaison de l'état eczémateux avec le tempérament lymphatique? prescrire les sulfureux, les ferrugineux (voy. MÉDICATION SULFUREUSE) et les amers. L'eczéma est-il le reflet de quelque irritation gastro-intestinale? la combattre par des moyens appropriés. Y a-t-il suppression d'un exutoire habituel? le rétablir,

mais sous une forme qui ne ramène pas l'eczéma, et à cet égard un cautère est moins propre à développer cette maladie qu'un vésicatoire.

De toutes les médications générales dont l'expérience a consacré les bons effets, celles par l'iodure de soufre, et le soufre en nature, l'orme pyramidal et l'arsenic comptent le plus de succès. L'iodure de soufre a été préconisé pour la première fois par le docteur Escobar, médecin espagnol ; nous l'employons souvent et nous le donnons à la dose de 5 à 10 centigrammes par jour. Cette substance est très altérable à l'air, et ainsi décomposée elle est sans effet ; c'est une circonstance dont il faut tenir compte, car ce médicament est peu employé en médecine, et il est commun de le trouver chez les pharmaciens à l'état de décomposition. C'est aussi pour obvier à cet inconvénient que je le donne en pilules formulées de manière à en opérer la conservation ; je les fais encore envelopper pour plus de sûreté. (Voy. *Formulaire*, art. PILULES.) Je commence par une pilule matin et soir avec une tasse de tisane amère ; j'augmente d'une pilule tous les six jours, de manière à arriver à quatre pilules par jour. — La médication par l'orme pyramidal avait été totalement abandonnée depuis cinquante ans, et cependant ce médicament, vanté dans les siècles précédents comme étant propre à combattre les maladies cutanées, eut une grande vogue. J'ai voulu savoir s'il justifiait réellement sa réputation, et il y a huit ans, après des essais très probants à cet égard, j'ai donné la formule d'un sirop que j'emploie principalement lorsque avec l'eczéma il y a prédominance du tempérament lymphatique. Il y a dans l'orme une énorme quantité de tannin uni à une matière mucilagineuse abondante, celle-ci est inutile. M. Crosnier, pharmacien à Paris, suit pour les préparations de mon sirop un procédé qui en opère la séparation sans nuire en rien à la composition de la matière extractive de l'écorce d'orme. Voici en quoi il consiste : On fait macérer 500 grammes d'écorce dans un litre d'alcool, on laisse pendant quarante-huit heures en contact ; on décante l'alcool, puis on fait avec l'écorce et de l'eau une *décoction*. On distille l'alcool pour en obtenir la matière extractive qu'il a enlevée à l'écorce et on la réunit au décoctum que l'on amène à l'état sirupeux pour faire 1000 gram. de sirop. C'est probablement en raison du tannin que cette écorce

agit. (Voy. *Formulaire*, SIROP D'ORME.) Il résulte de recherches plus récente , faites par M. Dublanc fils, pharmacien, que 500 grammes d'écorce doivent donner 100 grammes d'extrait hydro-alcoolique; on peut donc prescrire un sirop contenant de 40 à 50 grammes d'extrait pour 500 grammes de sirop. Je fais prendre ce sirop par cuillerées à bouche, une le matin, une le soir; j'augmente tous les trois jours d'une cuillerée à bouche par jour, de manière à arriver jusqu'à six cuillerées, trois le matin, trois le soir, dans une tasse de tisane amère. Ce traitement doit être administré pendant six semaines à deux mois, je ne saurais trop en préconiser l'usage; il me donne journellement d'excellents résultats; l'estomac le tolère à merveille; j'en fais prendre depuis deux jusqu'à six cuillerées par jour, en procédant par doses progressives. Quant à la médication arsenicale, comme elle est plus spécialement applicable aux affections squameuses, nous renvoyons ses formules et son mode d'administration a l'histoire de ces affections. (Voy PSORIASIS.) Toutefois, nous devons dire que ce médicament est de tous le plus puissant pour combattre les eczémas fort anciens qui ont résisté à la plupart des medications ordinaires; aussi le praticien ne doit-il pas hésiter à le prescrire soit pour des eczémas locaux soit pour des eczémas généraux qui ont résisté aux agents ordinaires; mais, si c'est la une médication puissante, c'est aussi, il faut bien le reconnaître, une médication exceptionnelle et que l'on ne doit mettre en usage que lors que la santé générale le permet et que la maladie en reclame l'emploi.

Depuis un an, j'étudie l'action de l'*hydrocotyle asiatica* comme agent therapeutique, non-seulement dans la lèpre de l'Inde pour laquelle il a été préconisé, mais encore dans les autres maladies de la peau. J'ai essayé l'emploi de cette substance comme médication générale dans l'eczéma chronique général et dans celui des oreilles et du cuir chevelu, maladie si rebelle chez les femmes, et pour laquelle on est souvent obligé d'avoir recours à l'arsenic. L'administration de l'hydrocotyle a l'etat d'extrait alcoolique et de tisane m'a procuré quatre guérisons dans les quatre cas ou je l'ai employé, ainsi que j'en donne le resumé. Cette substance a une action toute spéciale sur l'économie en général comme on le verra à l'article

tions; déjà les essais thérapeutiques que j'avais fait m'avaient conduit à considérer l'extrait alcoolique comme renfermant le principe actif de la plante malgré ce qu'on avait écrit sur les vertus de la poudre et du sirop. M. Lefort, pharmacien, qui procéda à une nouvelle analyse de ce végétal, en a retiré une résine particulière et extrêmement abondante, résine essentiellement soluble dans l'alcool, ce qui pourrait bien justifier le choix que j'ai fait par tâtonnement de l'extrait alcoolique; au surplus, je pourrai, je l'espère, être plus explicite à l'article LÈPRE.

Quoiqu'il en soit, j'administre d'une part une tisane préparée par infusion avec 8 grammes de feuilles pour 1000 grammes d'eau, et je donne de plus l'extrait en pilules en commençant par 25 milligrammes, augmentant tous les trois jours de 5 centigrammes, de manière à arriver à 15 ou 20 centigrammes par jour et continuant à cette dose. Au début de mes essais, il y a un an, j'avais administré l'hydrocotyle à plus haute dose, commençant par 5 centigrammes; je n'ai pas tardé à voir surgir des accidents généraux, qui ont dû m'en faire suspendre l'emploi (voy. LÈPRE). M. Cazenave a tout récemment employé l'hydrocotile, mais j'ignore ce qu'il en a obtenu. Voici maintenant le résumé très succinct des trois maladies guéries par cet agent.

Traitements par l'hydrocotyle asiatica. — 1. La nommée L..., âgée de cinquante et un ans, a déjà été traitée trois fois à Saint-Louis de trois attaques d'eczéma qui avait envahi une grande partie du corps; c'était chaque fois après un accouchement. Aujourd'hui, 6 mars 1856, elle revient demander les secours de la médecine. La tête est couverte de croûtes jaunâtres et est le siége d'une sécrétion abondante qui se sèche et raidit les linges. Les oreilles, les tempes, une partie des joues, le milieu de la poitrine, les mamelons, le nombril, le pourtour des parties génitales sont le siége de plaques rouges, couvertes de croûtes peu épaisses, et qui exhalent de la sérosité. Quelques plaques peu larges et disséminées se rencontrent sur les bras et les jambes, mais se rapprochent là du psoriasis quant à l'aspect. La rougeur est intense partout, les démangeaisons sont très vives excepté aux membres. Prescription : chicorée; 1 pilules iodure de soufre; bain de vapeur; glycérine au tannin en applications sur les parties malades: 3 portions. — 25 mars. La maladie a augmenté d'intensité; la rougeur, la sécrétion, la démangeaison n'ont pas diminué et les plaques se sont élargies; on abandonne le traitement et on adopte le suivant : infusion d'hydrocotyle asiatica, 8 grammes par litre; 1 pilule d'hydrocotyle, et augmenter d'une pilule tous les cinq ou six jours jusqu'à 6 pilules,

chaque pilule contient 25 milligrammes d'extrait alcoolique ; bains simples. — 11 mai. La malade est presqu'entièrement guérie ; les membres, le tronc, les oreilles, la face sont à l'état normal, et la peau est entièrement nettoyée ; la démangeaison a disparu ; sur la tête seule existent encore quelques pellicules minces qui reposent sur un fond dont la teinte est naturelle. L..... demande sa sortie.

2. B... est d'un tempérament lymphatique, ses règles sont irrégulières. — Entrée le 10 avril 1856. Depuis deux ans, la tête est couverte de pellicules blanches ; il y a six mois, les oreilles devinrent malades et un eczéma franc ne tarda pas à envahir le cuir chevelu, les oreilles, les tempes et le front. Prescription : infusion d'hydrocotyle ; 2 pilules d'extrait alcoolique d'hydrocotyle, et augmenter jusqu'à 6 par jour ; bains de vapeur ; saindoux ; couper les cheveux ras. — 12 mai. Amélioration sensible, la rougeur a diminué ainsi que la sécrétion de sérosité. On ajoute au traitement, tous les jours, 45 grammes de sirop d'iodure de fer. — 1er juin. On a suspendu pendant quelques jours le traitement, et il est repris aujourd'hui. La malade avait éprouvé des douleurs dans le dos et l'estomac, elle accusait un sentiment de constriction sur le front, qui a complétement disparu, et un mal de gorge caractérisé par un chatouillement désagréable ; il y a de la constipation qui n'existait pas auparavant ; les bains simples sont remplacés par des bains alcalins. — 13 juin. La sécrétion de sérosité a cessé, les squames ne se reforment plus aux tempes ni aux oreilles, la tête seule présente encore quelques croûtes sans rougeur. Continuation du traitement à l'hydrocotyle ; on y ajoute de la pommade au sulfate de fer pour terminer et faire disparaître les dernières traces de la maladie. Enfin, le 25 juin, la malade sort complétement guérie.

3. B....., soixante-cinq ans, entre le 12 juin 1856, dans la salle Saint-Thomas, hôpital Saint-Louis. Depuis dix-huit mois, elle est tourmentée par un eczéma au bas ventre et à la vulve. Après avoir été guérie chez M. Gibert, elle voit sa maladie reparaître aux oreilles, au front, au cuir chevelu. Les règles ont cessé depuis dix-sept ans. Chagrins et misère. Le front, les tempes, les pommettes, le cou, les joues, les oreilles, le cuir chevelu, sont le siége d'une rougeur intense, et de démangeaisons accompagnées de chaleur. Il y a des squames minces, sans hypertrophie de la peau : la sécrétion séreuse, après avoir été abondante, n'existe plus qu'aux oreilles. Prescription : infusion d'hydrocotyle ; 1 pilule, et augmenter jusqu'à 6 d'extrait alcoolique à un 25 milligrammes par pilule : bains simples : 3 portions. — 14 août. B..... sort guérie : il n'y a plus ni démangeaisons, ni formation de squames ; les oreilles sont redevenues souples et il n'existe plus qu'une rougeur rosée sur quelques points, notamment au front, aux tempes et au cou. Aucun trouble, aucune sensation qu'on pourrait rattacher à l'action du médicament n'a été accusée par la malade. Les pilules d'extrait ont manqué pendant environ huit jours et cela a été la seule interruption de traitement.

4. L..... âgée de vingt-neuf ans, est d'un tempérament lymphatique ; ses paupières portent encore les traces d'une blépharite chronique intense, ses

règles sont normales. Il y a trois ans, le front, les oreilles et le cuir chevelu, se couvrirent de squames minces et suintèrent de la sérosité au printemps et à l'automne ; elle se traita par des bains de vapeur, de l'axonge et des tisanes amères. Puis survint un érysipèle à la suite duquel les cheveux tombèrent ; elle entra alors à Saint-Louis, salle Saint-Thomas. — 19 juin 1856. Le cuir chevelu et les oreilles sont rouges, recouverte de croutes d'eczéma impétigineux, la peau est un peu épaissie, elle laisse couler une sérosité purulente qui se concrète en croûte assez épaisse. La tête est presque complétement dénudée. Démangeaisons modérées ; le front est rouge ainsi que toute la face, il y a des symptômes de congestion quand la malade se baisse. Prescription : infusion d'hydrocotyle ; 1 à 6 pilules d'extrait alcoolique ; bains de vapeur ; 4 portions. Dès le 8 juillet, la démangeaison a complétement disparu ; vers cette époque les pilules, étant venues à manquer, sont suspendues pendant une dixaine de jours. — 14 août. Le front et la face ont repris leur coloration normale, les oreilles ne sécrètent plus ou presque plus, le cuir chevelu a encore des squames, mais minces et se détachant facilement, les cheveux repoussent : pommade au sulfate de fer depuis quatre jours.

5. L....., trente-six ans, tonnelier, est un homme de bonne constitution, d'un tempérament sanguin ; il a un eczéma revêtu de squames sèches, adhérentes ; la peau est encore épaisse, il y a de temps en temps des poussées caractérisées par une exhalation de sérosité. Les plaques existent sur les membres qui sont envahis en grande partie depuis quatre mois, le début remonte à cinq ans ; démangeaisons vives, rougeur, chaleur. — A son entrée, le 20 avril 1856, on lui donna tisane de chicorée, saindoux, bains simples. — Le 20 avril, on essaie le traitement par l'hydrocotyle, l'état le plus aigu ayant disparu : tisane d'hydrocotyle ; 1 pilule à 6 d'extrait alcoolique ; saindoux. — 12 mai. Les démangeaisons ont presqu'entièrement disparu, et la maladie semble marcher vers la guérison, mais cette marche est lente, il y a de la diarrhée, de l'inappétence. On cesse l'hydrocotyle. L..... reste souffrant jusqu'au 22 mai, époque à laquelle on revient aux amers et aux pommades résolutives qui terminent la guérison, après deux mois de traitement.

On voit par ces quatre observations, dans lesquelles l'hydrocotyle seul a agi, puisque son action n'a pu être aidée que de bains simples à peu près insignifiants, combien l'hydrocotyle a paru montrer d'efficacité. Ces succès se soutiendront-ils ? Je ne tiens pas compte de la cinquième observation dans laquelle la santé générale du sujet n'a pu permettre de continuer son emploi.

Période décroissante. — Dans cette période de l'eczéma, déjà la médication générale qui a été prescrite commence à agir, car ce n'est jamais qu'après quinze jours ou trois semaines qu'un médica-

ment interne reflète ses effets à l'extérieur ; il y a ici deux indications spéciales à remplir : emploi des résolutifs sur l'eczéma, dérivation par les purgatifs sur le canal intestinal. En hiver, où les purgatifs sont facilement supportés, je purge mes malades affectés d'eczéma deux fois la semaine ; mais chaque fois une purgation douce, deux à trois verres d'eau de Sedlitz à 30 grammes, suivant les sujets. Je préfère dans ce cas les purgatifs salins à tous les autres. L'huile de ricin débarrasse l'intestin sans stimuler la membrane muqueuse ; les purgatifs drastiques ont pour beaucoup de personnes l'inconvénient d'amener une constipation souvent opiniâtre après leur emploi. Tout cela est d'ailleurs soumis aux idiosyncrasies.

Quant aux résolutifs à mettre localement en usage, c'est ici le lieu de rappeler la remarque que nous avons faite à l'égard des eczémas qui ne peuvent supporter les corps gras. Dans la période aiguë on les remplace par l'amidon en poudre, mais dans la période décroissante il est très difficile de trouver des résolutifs pulvérulents. A cet égard nous ne connaissons que la poudre de tan et celle de vieux bois. Nous avons souvent fait des essais dans le but d'associer l'alun, l'oxyde de zinc à ces poudres, afin d'augmenter leur action, mais quelle que soit la dose qu'on y incorpore, quelque tamisé que soit l'alun, on ne peut pas empêcher qu'il se trouve à nu et directement en contact avec la surface eczémateuse, et là où se trouve la molécule d'alun ou d'oxyde de zinc, elle est irritante au lieu d'être résolutive, parce qu'elle n'est pas enveloppée, comme cela a lieu dans une pommade. Nous sommes descendu à 1/3000e d'alun dans de l'amidon, et nous sommes arrivé par ces mélanges ou à des résultats nuls quand ils étaient trop étendus, ou à des résultats fâcheux comme trop irritants. Toutefois j'ai observé depuis qu'en faisant opérer à travers un tamis de soie, quatre ou cinq fois le mélange, on arrive a des poudres applicables au traitement de cette maladie.

Dans ces sortes d'eczémas on peut remplacer des résolutifs pulvérulents par des résolutifs aqueux : l'eau vinaigrée, excellent sédatif et résolutif calmant les démangeaisons ; l'eau alunée, l'eau saturnée, la solution de sublimé (voy. *Formulaire*, Lotions, à l'alun, n° 2 ; au vinaigre, n° 1 ; au sous-acétate de plomb, n° 1 ; au bichlorure d'hydrargyre, n° 2). Les lotions à l'alun et au sous-acétate de plomb

sont moins actives que la lotion au sublimé. On peut d'ailleurs essayer l'emploi des unes et des autres pour juger de celle qui réussit le mieux. Le plus généralement nous nous servons d'une solution d'alun ou de sous-acétate de plomb au 300e et d'une solution de sublimé au 2500e. Ce qu'il faut surtout prescrire, c'est de faire laver les linges ou les renouveler ; par suite de l'évaporation de l'eau, ils se chargent de sels, et ils finissent par contenir une solution très concentrée au lieu d'une solution faible.

Lorsque l'eczéma ne reçoit aucune influence désagréable des corps gras, on peut alors varier les pommades, dans la composition desquelles on fait entrer deux sortes de substances propres à remplir deux indications différentes : 1° la résolution de l'eczéma ; 2° la cessation de la démangeaison. Sous le premier rapport, on incorpore à l'axonge l'oxyde de zinc ou la calamine, qui n'est autre chose que l'oxyde de zinc naturel, le tannin, le sous-nitrate de bismuth, le sous-acétate de plomb. Sous le second, on y ajoute comme moyen sédatif le camphre ou le chloroforme ; tous deux calment en effet la démangeaison d'une manière marquée, mais le second de ces agents plus encore que le premier. Il est vrai que l'effet du chloroforme est moins soutenu que celui du camphre. (Voy. *Formulaire*, POMMADES, à ces diverses substances.)

Depuis la publication de la première édition de cet ouvrage il est une substance dont j'ai préconisé l'emploi et que j'ai introduite principalement dans le traitement de l'eczéma, c'est le proto-sulfate de fer. (Voy. BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE, janv. 1855.) Frappé des résultats obtenus par les chirurgiens dans l'usage du persulfate ainsi que de ceux que l'on obtenait en médecine des préparations ferrugineuses, j'ai eu la pensée d'incorporer le proto-sulfate de fer à l'axonge pour en faire une pommade à la fois résolutive et modificatrice de la vitalité de la surface malade. Par une coïncidence singulière, M. Velpeau se livrait à des essais du même genre en chirurgie, en se servant, pour le pansement des plaies, de la dissolution de proto-sulfate de fer. Il a publié ses recherches un mois après, c'est-à-dire en février 1855 et dans le même journal, dans le *Bulletin de thérapeutique*. Quoi qu'il en soit, j'ajoute à 30 grammes d'axonge 5 décigrammes à 1 gramme de ce sel cristallisé et bien lavé, après l'avoir

fait dissoudre dans quelques gouttes d'eau. Les résultats qu'il produit sont tels que je n'ai pas cessé depuis de mettre le sulfate de fer en usage dans la généralité des cas, de préférence aux oxydes de zinc, à la calamine, etc.

Quelques praticiens, et j'avoue que dans certaines circonstances je suis de ce nombre, emploient l'huile de cade et le goudron en pommade. Mais ces pommades sont généralement trop actives quand il s'agit d'un eczéma qui parcourt simplement ses périodes ; elles deviennent utiles lorsqu'il s'agit d'eczémas anciens où la sensibilité de la peau permet le contact de moyens modificateurs résolutifs, mais assez excitants, quoiqu'ils soient employés à très faible dose. C'est surtout dans la variété d'eczéma psoriasiforme qu'elles réussissent. (Voyez à cet égard nos formules, POMMADES à ces deux substances, n° 1 pour chacune d'elles.)

Quand l'eczéma suit une marche décroissante progressive, on peut arriver à la guérison à l'aide de ces seuls moyens ; mais on la favorise singulièrement par l'emploi de l'huile de cade préconisée par M. Serre, d'Alais, et que nous avons le premier essayée sur une grande échelle. (*Bulletin de thérapeutique*, février 1849.) Il faut à cet égard observer trois conditions essentielles : 1° L'huile de cade doit être pure ; or, dans le commerce on délivre fréquemment de l'huile distillée de goudron ou du goudron au lieu d'huile de cade. Nous avons reconnu que, quoique produisant un bon effet, l'huile distillée avait moins d'efficacité que l'huile de cade. L'odeur peut tromper des personnes peu exercées, mais la couleur ne saurait induire en erreur. L'huile de cade, en apparence brune, est d'un reflet rouge vif par la lumière ; le goudron est noir d'un reflet brunâtre et d'un emploi très mauvais. A Paris même, sur vingt pharmaciens, il y en a quinze qui délivrent de l'huile distillée de goudron ou du goudron pour de l'huile de cade. 2° Elle ne doit être employée que tous les trois jours. 3° Il faut l'étendre sur la surface malade, mais essuyer aussitôt avec du coton sec, de manière qu'il reste appliquée la couche *la plus faible possible d'huile*. A cet égard, l'expérience nous a appris qu'en plus grande proportion l'huile de cade devenait excitante.

Mais ce moyen n'est bon que dans la période de résolution et pour terminer l'eczéma. Employé plus tôt, on joue quitte ou double,

on guérit ou l'on exaspère, et dans ce dernier cas on transforme un eczéma qui se serait terminé plus tard en quelques jours en un eczéma chronique rebelle, difficile à guérir ensuite. Il est bon de savoir que l'effet essentiel de cette huile c'est de supprimer la sécrétion morbide; de là le danger de son usage dans la période aiguë et dans tous les cas où l'on a à craindre quelque répercussion.

C'est ici le lieu de parler de quelques agents préconisés, il y a deux ans, comme propres à guérir très rapidement même l'eczéma aigu, et qui sont d'ailleurs tombés dans l'oubli. D'abord je n'aime pas tout moyen qui supprime brusquement une sécrétion cutanée, quelle qu'elle soit; cette pratique a l'inconvénient grave de compromettre dans certains cas la santé et la vie des malades. C'est une véritable, ou au moins ce peut être une véritable répercussion que l'on opère; ensuite ces moyens n'ont pas l'efficacité qu'on leur a donnée, et comme peu de médecins savent établir d'une manière précise le diagnostic d'une maladie de la peau, je crains bien qu'il n'ait été commis quelque erreur à cet égard. Quoi qu'il en soit, on a proposé le collodion dissous dans l'éther et la dextrine dissoute dans l'alcool, ces deux substances étant étendues par couches sur la surface eczémateuse deux ou trois fois par jour. Aussitôt étendu, l'alcool ou l'éther s'évapore, et la peau se trouve enduite d'une couche gommeuse très dure qui enferme la jambe du malade comme dans une botte, la serre et la comprime. Il n'y a rien d'exagéré dans cette narration. Voici une expérience que M. Demarquay a faite pour la première fois, et que tout le monde peut répéter. Que l'on applique autour d'un doigt ou autour du poignet sain une couche de collodion sous forme de bracelet, et qu'on la laisse sécher dans l'immobilité, la constriction deviendra bientôt tellement forte, que l'on sera obligé de dissoudre immédiatement le collodion pour éviter la douleur qui en résultera.

Or, voici ce qui arrive pour l'eczéma : l'enveloppe de collodion s'oppose à la sortie de la sérosité; la peau se tuméfie; le peu de sérosité sécrétée passe à l'état purulent, et forme sous le collodion une surface suppurante dans laquelle la peau est plus profondément affectée, de sorte que nous avons dû renoncer à ce moyen.

Tel est le traitement de l'eczéma dans ses conditions les plus sim-

ples, en y ajoutant l'usage que l'on peut faire de bains rendus légèrement résolutifs vers la fin du traitement. (Voy. *Formulaire*, BAINS ALUNES.) Mais, d'une part, nous avons signalé des formes spéciales plus rebelles; d'une autre part, l'eczéma se présente le plus souvent au médecin avec une marche chronique, parce que les malades tardent trop à réclamer des soins, et que d'ailleurs on a pu voir que l'eczéma débutait ainsi dans certaines saisons de l'année. Nous allons faire connaître cette thérapeutique spéciale sous forme de propositions.

Lorsque l'eczéma est général, en ce sens qu'il existe des plaques plus ou moins larges sur les diverses parties du corps, il réclame essentiellement une médication générale interne. Les bains généraux émollients, résolutifs, et surtout les bains de vapeurs à une douce température, doivent aussi jouer un grand rôle dans le traitement. Il est quelquefois utile de modifier la vitalité du tissu par des bains excitants, tels que les bains alcalins, les bains sulfureux. (Voy. *Formulaire*, BAINS.)

L'eczéma nummulaire, qui est toujours disséminé, réclame les mêmes moyens, et vers la fin du traitement il faut en général toucher deux ou trois fois, à quatre ou cinq jours d'intervalle, les surfaces malades avec la solution de nitrate d'argent n° 1. (Voy. *Formulaire*.) Nous appliquons ce dernier précepte à l'*eczema unisquamosum* et à tous les eczémas localisés, notamment celui du mamelon, du nombril et des bourses.

L'eczéma du cuir chevelu est essentiellement lié au très jeune âge. Il veut être respecté pendant fort longtemps ; il ne réclame que des soins de propreté, des lotions de sureau, de guimauve, de graine de lin ; il ne faut pas couper les cheveux ; ne mettre de cataplasmes que pendant un temps fort court et souvent même s'en abstenir. Nous avons vu nombre d'accidents, et des accidents cérébraux surtout, survenir par l'application intempestive de moyens de ce genre ; c'est assez dire que nous proscrivons toute pommade résolutive. Il y a plus, quand l'eczéma tend naturellement à décroître, il est convenable de purger l'enfant par des minoratifs très doux et de lui appliquer un vésicatoire au bras. Il faut dans cette maladie que le médecin soit sourd aux instances des parents et qu'il ne cède pas aux désirs d'une mère qui craint de voir la figure de son enfant envahie par la mala-

. C'est là un exutoire naturel dont il faut se borner à diminuer ntensité trop grande.

L'*eczema rubrum* veut essentiellement l'emploi des irrigations d'eau ide que nous avons conseillées ; mais avant de les mettre en usage, aut s'assurer que le malade les supportera sans inconvénients.

Dans les formes très rebelles, et notamment dans l'eczéma du melon, formes qui sont limitées à une surface peu étendue, e faut pas craindre de modifier entièrement la vitalité du tissu rbide. Il semble en effet que dans ces sortes de cas la maladie devenue un second état de nature. Les charlatans réussissent s ces circonstances beaucoup mieux que les médecins. D'abord ne va les trouver qu'après avoir épuisé les ressources de la decine, et ils n'emploient jamais que des moyens qui causent surexcitation de la partie malade, qui en changent la vitalité. c'est une pommade à l'oxyde rouge de mercure ; là une pomde qui a pour base le sulfate de cuivre, comme la pommade de ckel ; ailleurs ce sont des lotions et frictions alcalines. Un moyen genre nous a été proposé il y a trois ans comme étant employé c beaucoup de succès par M. Hébra, de Berlin, chargé dans e ville du service des maladies de la peau. Il consistait à friction- tous les matins la surface eczémateuse avec une solution alcaline quart de carbonate de potasse. Cette friction se faisait avec la main mpée dans cette solution. Le malade éprouvait de la cuisson, peau rougissait, sécrétait d'abord de la sérosité, puis fournissait pluie de sang. Nous avons comparé les résultats de ce traitent sur les mêmes malades atteints d'eczéma aux deux jambes avec mploi de l'huile de cade, et l'avantage est encore resté à l'huile. Il est un moyen que nous employons depuis sept ans (*Bulletin de rapeutique*, mars 1846), que nous avons appliqué aux eczémas riqueux plus spécialement, et qui nous réussit à merveille : ce t des bandages *dextrinés*. Nous ne mettons autre chose sur la face eczémateuse qu'une compresse trempée dans une solution seuse contenant 125 grammes de dextrine pour 1000 grammes au sans addition d'alcool. (Voy. *Formulaire*, LOTIONS.) On trempe e bande roulée de 4 à 5 centimètres de largeur dans cette liqueur, on l'applique méthodiquement comme un bandage roulé ordi-

naire; on l'arrose ensuite et on laisse sécher peu à peu. La partie malade doit être contenue et non pas serrée; une fois sec, on ne renouvelle ce bandage que quand il s'élargit et que les bandes tendent à se défaire, c'est-à-dire vers le quatrième ou le cinquième jour. Le malade peut prendre quelque exercice, il n'a pas besoin de bains, et la guérison est en général très prompte.

Un autre moyen que je mets en usage dans un cas assez analogue, c'est celui des ulcères eczémateux, c'est-à-dire de ces eczémas des jambes au centre desquels existe une ulcération. Je les fais panser avec des bandelettes de diachylon circulairement appliquées, comme dans le bandage anglais, depuis le bout du pied jusqu'au-dessus de la surface eczémateuse; ces bandelettes sont étroites et se superposent régulièrement.

Eczémas composés.

Nous en avons admis quatre espèces : *impétigineux*, *lichénoïde*, *herpétiforme*, *psoriasiforme*. Nous aurions dû peut-être renvoyer l'histoire de ces eczémas à celle de l'*impétigo*, du *lichen*, de l'*herpès* et du *psoriasis*, car il faut connaître ces quatre maladies pour voir les points de contact que la forme eczémateuse peut avoir avec elles. Mais l'eczéma impétigineux est tellement lié à l'eczéma quant à ses causes, sa forme, sa terminaison et sa thérapeutique, que nous faisons ici une exception à son égard.

Eczéma impétigineux. — Cette forme d'eczéma est aussi commune que l'eczéma simple, et tandis que celui-ci affecte de préférence l'adolescence, l'âge adulte, l'eczéma impétigineux se montre plus souvent dans l'enfance; c'est même, en fait de maladies de la peau, une des plus communes à cet âge.

Cette forme morbide *composée* débute avec ses caractères de forme complexe : elle apparaît comme l'eczéma, avec une rougeur ponctuée de points plus foncés et des vésicules peut-être un peu plus larges, qui sécrètent aussitôt de la *sérosité purulente;* mais celle-ci, au lieu de s'écouler limpide, en mouillant les linges qui recouvrent la surface malade, a une grande tendance à se concréter et à former des croûtes d'un *gris jaunâtre* qui ne sont pas franchement jaunes comme les croûtes d'*impétigo*. Contrairement à l'eczéma, il n'est

pagné d'autant de démangeaisons; et tandis que dans est des malades qui ne peuvent pas résister à cette sen- s l'eczéma impétigineux il en est peu qui s'en plaignent ière très notable. Ajoutons que l'eczéma n'affecte en une surface très limitée sur un point donné du corps, n'est pas rare de voir l'eczéma impétigineux beaucoup ı et plus disséminé. L'eczéma gagne peu en surface; *pétigineux* offre une tendance opposée, et l'on voit sou- ıfants qui en ont la presque totalité du corps recou- l'eczéma impétigineux affecte la peau plus profondé- *eczéma simplex*, aussi ce tissu est-il épaissi et surélevé . niveau de la peau saine. C'est qu'il se rapproche des ıstuleuses qui ont en général un point de départ plus nt situé.

adie est très commune en automne et en hiver. L'ec- plus souvent en été. Elle a une période aiguë générale- ; longue, et en arrivant à la période stationnaire elle roûtes plus ou moins épaisses. Enfin l'eczéma impétigi- ıs facile à guérir que l'eczéma simple.

u de maladies où le tempérament lymphatique puisse ıdiqué comme cause prédisposante et comme entrete- ffection. A cet égard, la statistique nous démontre cette ıce de tempérament : j'appelle toute l'attention des mé- ette circonstance. Ce doit être, suivant nous, la base du général qu'il y a lieu de mettre en usage.

ıaintenant quelques particularités de détail. Nous avons *éma impétigineux* était très fréquent dans le jeune âge, ıne des *croûtes de lait*. Il envahit la totalité ou une partie lu cuir chevelu ; dans cet état il reste souvent station- luisant des croûtes épaisses et sèches qui tombent de mps et finissent par amener la chute des cheveux. Avec and l'enfant prend du développement, ces croûtes tom- peu et ne sont pas sensiblement remplacées. Il en est de limitées qui restent là indolentes pendant trois, quatre, ans. Nous avons vu une croûte de ce genre que la mère rvée à sa petite fille jusqu'à l'âge de neuf ans, sur le côté

du front et à la naissance des cheveux ; le bulbe de ce avait été atrophiée et la place qu'ils occupaient est restée d Cette croûte était si ancienne qu'elle avait fait une dé considérable qui constituait une véritable difformité. Nous détacher à l'aide d'un cataplasme et la peau se trouva presqu

Mais quand l'eczéma impétigineux débute vers l'âge de sept ans à la tête, il n'est pas rare de le voir envahir la fig corps, les membres, de manière que ces enfants soient reco d'une croûte *séro-purulente* sécrétant plus ou moins, et qui les hideux d'aspect ; ils sont très souffrants, parce qu'ils ne peu exécuter de mouvements sans arracher une portion de ces cro alors c'est une affection fort douloureuse, et qui dans certain n'est pas sans dangers. La suppuration abondante qui se m affaiblit l'enfant ; la souffrance lui enlève l'appétit, et si l'on calme cet état par des soins bien entendus, on peut en voir fois un résultat fâcheux.

Cette affection a de la tendance à passer à l'état chronique ; ne suit d'ailleurs pas une marche absolument uniforme : n quand l'eczéma impétigineux est traité rationnellement, il a beau coup plus de tendance à guérir que l'eczéma. Cela tient à sa form morbide ; on verra, en effet, que l'impétigo, affection pustuleuse e purulente de laquelle l'eczéma impétigineux se rapproche, suit en général une marche régulière et se guérit facilement. Mais si l'eczéma impétigineux affecte la forme chronique *primitivement*, ou s'il est mal soigné au début, il se perpétue à la manière de l'eczéma ; il en est quelques-uns qui ont un fond tellement lymphatique, scrofuleux, qu'ils sont très difficiles à guérir.

Les moyens locaux sont en fait de thérapeutique à peu près les mêmes que ceux indiqués pour l'eczéma ; mais les résolutifs sont mieux tolérés. On peut aussi employer avec avantage les pommades à la fleur de soufre. (Voy. *Formulaire*, POMMADES.) Il en est de même à l'égard des bains sulfureux légers. Quant au traitement interne, c'est ici le cas de prescrire les amers, les antiscorbutiques, le soufre à l'intérieur, le fer, le sirop d'orme pyramidal (voy. *Formulaire* ces diverses préparations), et une alimentation substantielle. Les bains de vapeur conviennent peu dans le traitement de cette ma-

bée; il en est de même des préparations arsenicales, qui doivent en général être proscrites. La maladie cède d'ailleurs beaucoup plus facilement que l'eczéma simple.

Eaux minérales. — Nous n'avons pas fait mention d'eaux minérales quand nous avons traité de l'eczéma : c'est qu'à part les eaux de Louesche et celles de Bourbon-Lancy, nous en connaissons peu qui le guérissent. Il n'en est pas de même de l'eczéma impétigineux : toutes les eaux sulfureuses en procurent en général la guérison quand la maladie a une forme chronique. Celles des Pyrénées sont surtout recommandées par nous pour deux motifs : le premier est dans leur nature, le second est dans le climat qui modifie très heureusement la constitution. Ces eaux ne doivent être prises à l'intérieur qu'en bains et en boisson à l'intérieur, les douches exaspéreraient inutilement le mal ; il faut toujours commencer par des eaux coupées ou par des sources faibles. A défaut des eaux de Barèges, Cauterets, Bagnères-de-Luchon, nous conseillerons Enghien ou même Aix-la-Chapelle. Quant à Aix en Savoie, la manière dont on les y administre cause souvent plus de mal que bien. On n'y a affaire, en général, qu'à des rhumatisants, et l'on prend des bains beaucoup trop chauds et trop énergiques.

Herpès (ἕρπειν, ramper), *ignis sacer*, — *erysipelas pustulosum*, — *zona repens*, — *zona serpiginosus*, — feu de saint Antoine, — dartre phlycténoïde, — herpès phlycténoïde, — ringworm, anneau herpétique, — *herpes circinatus*, — olophlyctide miliaire, — *herpes iris*.

Herpès a vésicules extrêmement tenues.
- **Simple.**
  - Circiné.
  - Nummulaire.
  - Du bout du nez et de la pulpe des doigts.
  - Tonsurant.
  - Crétacé.
- **Composé.**
  - Eczémateux.
  - Lichénoïde.
  - Pemphigoïde.
  - Psoriasiforme.
  - Rupiforme.
  - Lupiforme.

Herpès a vésicules très apparentes.
- Zona.
- Phlycténoïde.
- Labial.
- Préputial.
- Iris.
- En traînée.

Cette dénomination *herpès*, de date extrêmement ancienne, était

autrefois tellement généralisée, qu'elle était synonyme d'un mot tout aussi général, le mot *dartre*. Alibert a le premier cherché à la restreindre ; Willan l'a limitée à des affections vésiculeuses de leur nature : *herpès* proprement dit, *herpès zona*, *herpès phlycténoïde*, *herpès iris*. Malgré cette distinction, il existe encore si peu d'analogie entre la maladie que l'on doit, suivant nous, désigner uniquement sous le nom d'*herpès*, d'après l'étymologie de ce mot, et les trois autres variétés, *zona*, *herpès phlycténoïde* et *herpès iris*, que je ne saurais trop m'élever contre cette réunion de ces quatre affections sous le même nom.

Pour moi, j'appelle *herpès* toute maladie vésiculeuse de sa nature qui s'étend en surface par sa circonférence, au moyen d'un cercle ou bourrelet morbide, soit que le centre se guérisse, soit qu'il continue à rester malade. Ainsi précisée, la dénomination d'*herpès* s'applique à des maladies qui ont entre elles des analogies de forme, de marche, de terminaison, de traitement. Mais dans les divisions de Willan et Bateman, qui appellent *herpès*, le *zona*, l'*herpès phlycténoïde* et les variétés d'herpès *circiné* et *nummulaire*, parce que toutes ces affections naissent avec des vésicules, il n'existe là aucune similitude. Sous tous les autres rapports, de cause, de marche, de traitement, aucune ressemblance. Je vais plus loin, et je dis que les vésicules d'herpès ne ressemblent en aucune façon aux vésicules de herpès phlycténoïde, du zona et de l'herpès iris ; qu'il n'y aurait pas de raison pour ne pas appeler herpès l'eczéma, qui est tout aussi et plus vésiculeux que lui. Je n'hésite donc pas à retrancher de ces trois affections le mot *herpès* et à les dénommer simplement par les mots : *zona*, *phlycténoïde*, *iris*.

C'est ainsi que je m'exprimais dans la première édition de ce ouvrage. Des découvertes récentes, faites par M. Baerensprung (*Annales des Charité Krankenhauses*, *sixième année*, 1855), sont venues donner une confirmation définitive à notre manière de voir. Il a reconnu que l'herpès circiné était accompagné de la production de cryptogames dont il a donné la description, et dont nous avons vérifié l'existence sur deux espèces, l'herpès circiné et l'herpès psoriasiforme. Il y a lieu de croire que ce cryptogame existe aussi dans l'herpès nummulaire, il devient donc un des caractères

essentiels de cette affection. Suivant lui, c'est le même cryptogame que l'on rencontre dans l'herpès tonsurant et dans les variétés herpès circiné, et c'est aussi ce que nous avons observé. Il est constant que rien de semblable ne s'observe pour les espèces ma, phlycténoïde, iris. Ainsi se trouve consacrée une distinction que nous avons établie avant que le microscope ait révélé une production morbide toute particulière à l'herpès. (Voyez les maladies parasitaires et la planche relative à la micrographie.)

Ces considérations me conduisent à séparer les herpès en deux groupes : *herpès à petites vésicules, herpès à grosses vésicules.*

Le tableau en tête de cette maladie reproduit mes divisions. Dans le premier groupe, *herpès à vésicules extrêmement ténues*, on trouve les formes simples et des formes composées. Dans les formes simples existent en tête l'*herpès circiné* ou excentrique des auteurs et herpès que j'appelle *nummulaire* ou *en disque* parce que le centre reste malade en même temps que la circonférence ; j'y ai ajouté les variétés non décrites : l'*herpès du bout du nez* et *de la pulpe des doigts*, l'*herpès crétacé*. J'y ai joint enfin l'*herpès tonsurant*, dont la forme et la marche tendent à le rapprocher des herpès ordinaires. Quoique ce soit une maladie essentiellement liée à la production d'un champignon, je la décris avec les autres espèces d'herpès, parce que si l'on peut faire une classe de maladies à parasites végétaux, cette division est surtout bonne pour l'étude, mais elle ne se prête pas, comme on le verra plus loin, à la pratique médicale, elle tend même à faire dévier le praticien des voies d'une saine pratique. Les formes composées, à part l'*herpès lichénoïde*, décrit par Alibert, sont toutes le résultat de mes observations personnelles.

Herpès à vésicules extrêmement ténues (Voy. pl. I. fig. 7 et 5).

Cette maladie a pour caractères essentiels de se présenter par petites plaques toujours très nettement arrondies ou légèrement ovoïdes, sur le cou, la poitrine, à la figure, ou enfin à la partie interne des membres. La peau est rouge, chagrinée, très légèrement humide, et le plus souvent sèche, mais alors recouverte de furfures. Lorsque ces plaques sont dans un état très aigu, qu'elles sont très

récentes, et qu'on les examine au soleil et avec le secours de la l
on y aperçoit une foule de vésicules excessivement ténues q
crètent un peu de sérosité. Ce sont les débris de ces vésicules
cette sérosité concrétée qui constituent les furfures que nous
signalés. Mais telle est la ténuité de ces vésicules, que je n'ai
voir que trois ou quatre fois.

Elle débute à la peau sous la forme d'une petite surface
ou rouge, à peine lenticulaire, elle prend en très peu de
beaucoup d'accroissement. Alors se dessine à sa circonférer
bourrelet ou épaississement de la peau qui fait une saillie se
au doigt, mais quelquefois insensible à la vue. C'est sur ce
relet que se développent d'une manière permanente les vé
nouvelles destinées à agrandir à sa circonférence la plaq
mitive, et que se développent plus tard les cryptogames, de
que deux phénomènes peuvent avoir lieu. Ou le bourrelet, pr
sant, élargit la plaque sans que le centre se guérisse ; il en r
une surface toujours uniformément malade : je nomme cette
herpès nummulaire, à cause de ses dimensions en surface et
forme. Ou, au contraire, au fur et à mesure que le bourrelet
la peau saine, le centre de la plaque se dégage et se guérit
alors l'*herpès circiné* ou *centrifuge*, qui a généralement des d
sions beaucoup plus considérables. Toutefois, je tiens a bie
ciser ce fait que le développement des cryptogames n'est que
daire, tandis que les micrographes tendent à le considérer
cause, et par conséquent comme étant primitif, d'où la
quence pour eux qu'il suffit de détruire le cryptogame pour
la maladie. C'est là une grave erreur. Si cela peut avoir
apparence dans quelques cas de contagion, ce n'est que l'exc
Quoique les faits qui démontrent l'existence d'un parasite
dans cette maladie soient de date récente, j'ai eu l'occasion d'
manifester les diverses phases principalement chez un m
auquel je donnais des soins pour un herpès psoriasiforme
ancienne, et qui était arrivé à une guérison presque parfa
l'usage de la solution de Fowler et celui de pommades à
de cade. Les choses en étaient à ce point qu'il ne restait p
larges plaques qui couvraient tout le corps que quelques pet

urrelet, lorsqu'il se manifesta de ces boutons ou éle-
es papuleuses, plates, *secondaires*, sur lesquels j'ai appelé
en traitant de l'emploi des préparations arsenicales et
les, plaques qui simulent la syphilide papuleuse. Ayant
t les pommades et la solution, il se montra dans toute
u dos ainsi que sur les membres, de ces plaques lenti-
restèrent stationnaires pendant un mois à six semaines,
es, sans furfures, et qui plus tard prirent toutes la
pès circiné à centre dégagé, en même temps que leur
ce se recouvrit de furfures que j'examinai au micros-
ns lesquelles je retrouvai des traces très évidentes de
rfaitement développé. Ainsi la rougeur, la tuméfaction
, sous la forme de papules sans squames, malgré l'ab-
ins et de pommades, a précédé dans ce cas les crypto-
me autre part, l'affection, qui datait de plus de douze
été presque complétement détruite par l'usage seul de la
: Fowler. J'insiste sur ce fait, afin de combattre cette
e là où existent des cryptogames il suffit d'un traitement

quera peut-être à l'appui de l'opinion opposée, ce fait,
la tonsurant de la tête peut faire naître un herpès circiné
du même enfant, fait qui est exact et que j'ai rencontré
ent. Je ne nie pas la possibilité de ce second mode de
nent, la contagion, mais je dis que le cas où le cryp-
t secondaire, est beaucoup plus général.
mé, les caractères diagnostics de l'herpès sont : de pré-
maladie sous la forme d'un disque, dégagé au centre ou
face chagrinée, épaissie, plus ou moins rosée ; sécrétant
tant pas de la sérosité d'une manière sensible, mais four-
furfures et amenant de la démangeaison. Sans bour-
d'herpès ; sans surface malade nettement arrondie, pas

urrions ajouter un troisième caractère, celui tiré de
du cryptogame, mais d'abord le parasite végétal est-il
Ensuite tout le monde n'a pas de microscope pour en
tistence ; enfin, et il faut bien le dire, c'est là un carac-

tère de *luxe* pour le praticien; les autres sont suffisamment tra chés pour qu'on reconnaisse la maladie à première vue.

L'herpès est une des affections de la peau essentiellement *symp matiques*, le plus souvent liée à une affection gastro-intestinale ou voies biliaires, et que l'on guérit quelquefois par le bénéfice d hygiène bien entendue. Elle se montre vers l'âge de vingt à v cinq ans, ou plus tard chez la femme, surtout à l'âge critique; il n'est pas rare de la voir chez les très jeunes enfants liée ou c dant avec l'herpès tonsurant, comme aussi développée par co par contagion.

Lorsque l'herpès se développe sur la figure, le cou ou toute partie du corps, et c'est là son siége ordinaire, il est rare qu'il montre pas plusieurs plaques, les unes au voisinage des autres. circonstance tendrait à prouver la propagation de l'herpès p cryptogame qu'il fait naître. Sans invoquer cet ordre de pre dont le phénomène pourrait être parfaitement expliqué par la générale qui a fait naître la maladie, nous devons faire rema que l'herpès tonsurant a toujours été regardé comme contag M. Cazenave a cité des exemples de nombreux enfants qui divers pensionnats ont été successivement atteints de cette mal Mais depuis que M. Baerensprung a découvert un cryptogame l'herpès circiné qui n'est pas accompagné d'herpès tonsurant, attention a été appelée sur le fait de la contagion. Or il s'est pré dernièrement à notre consultation de l'hôpital Saint-Louis une f qui avait plusieurs plaques d'herpès, les unes au cou, les autr l'avant-bras. Elle m'a dit qu'ayant retiré de nourrice ses de fants, l'un d'eux, qui était atteint de cette maladie, l'avait co niquée à l'autre, qu'elle l'avait gagnée d'eux et que son m avait aussi été atteint. L'herpès doit donc être considéré co une maladie contagieuse par le cryptogame dont il peut accompagné. Il affecte une forme aiguë ou une forme c nique; débutant par une surface très petite, il s'étend et s'él peu à peu, et alors quelques-unes des plaques peuvent se fondre entre elles. Ces plaques d'herpès sont accompagnées peu de dérangeai son; c'est principalement sur des peaux très f qu'on voit l'herpès survenir.

stique nous a fourni des documents qu'il est important
ire, et qui viennent confirmer en grande partie les faits
lus haut. Elle prouve d'abord que sur 1800 cas de mala-
peau, cette affection ne figure, quand elle est à forme
est-à-dire à l'état circiné ou nummulaire, que pour 1/45e;
0 cas d'herpès, 24 se montrent de quinze à trente-cinq
cette maladie est surtout l'attribut du tempérament lym-
u bilioso-sanguin ; que sur 40 herpès 12 ont une date de
irs, 3 de quinze jours à un mois, 7 de un mois à un an, et
n à six ans. Ce dernier résultat vient justifier le reproche
avons fait aux auteurs qui nous ont précédé, d'avoir peu
apte, en général, de la ténacité de cette maladie qui d'ail-
nt s'entretenir, lorsqu'elle n'est pas soignée, par le crypto-
nt elle se complique. Sur 40 cas, 16 s'observent au prin-
en été, 9 en automne et en hiver: c'est donc bien là une
des saisons chaudes. Enfin, nous la voyons surtout siéger
à la figure et à la poitrine.

Dans les deux variétés d'herpès il en est une, l'herpès à centre
ngé, que l'on observe très communément à la partie interne
ieure des cuisses, dans le voisinage des bourses: c'est une
herpès dans laquelle les vésicules sont plus apparentes et
rétantes, en même temps qu'elles amènent de la cuisson
leur, ce qui tient probablement à son siége. On la confond
avec l'intertrigo, car le contact des bourses avec les cuisses
pe également les deux affections. L'existence d'un bourrelet
e dans l'herpès, l'absence de ce bourrelet et une sécrétion
ndante dans l'intertrigo, distinguent parfaitement les deux
s.

Doutons que dans ce cas il y ait une production végétale. Si nous
vons pas la question, c'est qu'au moment où nous écrivons,
ouverte n'a que 2 à 3 mois de date. Ce qui me porte à émettre
nion, c'est que la maladie cède à des moyens fort simples.
à la marche que suivent les diverses variétés d'herpès, quel-
eurs tendent à les regarder comme devant, pour ainsi
abandonnés à elles-mêmes ; car, suivant eux, elles guéri-
rs le cinquième ou le sixième septénaire. Nous ne parta-

geons pas cette opinion. L'herpès est une maladie tenace dans la généralité des cas, facile à se reproduire; prenant siége et durée là où il existe, et exigeant souvent, pour sa complète guérison, une modification de vitalité morbide par la cautérisation superficielle de sa surface.

Herpès circiné du bout du nez et de la pulpe des doigts. — Je n'ai vu cette maladie qu'une seule fois chez une jeune personne de quatorze ans, qui, depuis deux ans, en était atteinte, et qui avait reçu les soins de médecins compétents en pareille maladie; mais ils n'avaient pu la guérir. Voici en quoi consistait cette affection: Au bout du nez et à la pulpe des doigts de la main gauche, on observait une très légère tuméfaction de la peau avec teinte blanchâtre au centre et à la circonférence; un bourrelet rosé, sensible au toucher, parfaitement circulaire. La peau était lisse, non chagrinée. Il se formait de temps en temps de légers furfures; la surface malade était, aux doigts, de la largeur d'un centime, et elle avait un peu plus d'étendue au bout du nez.

Depuis deux ans, époque de son développement, cette affection avait fait, comme on le voit, très peu de progrès. La malade y éprouvait assez souvent la sensation d'une démangeaison; mais ce qui la gênait le plus, c'était le contact des corps durs, et, comme elle se destinait à être pianiste, elle ne pouvait toucher du piano sans souffrir.

Essentiellement lymphatique et nerveuse, pâle, décolorée, assez indolente, mais cependant sujette à s'inquiéter de son état, nous mîmes cette jeune fille à l'usage d'un traitement fortifiant: l'huile de foie de morue, les amers, le soufre et le fer. Nous fîmes prendre des douches sulfureuses sur les surfaces malades, et enfin nous cautérisâmes plusieurs fois les plaques d'herpès au nitrate d'argent en solution, et nous parvînmes à vaincre cette variété d'herpès qui, placée au nez, aurait pu être prise pour l'engelure du bout du nez, mais dont la situation à la pulpe des doigts, réunie à la forme morbide, excluait ce diagnostic. (J'ai eu sous les yeux, à l'hôpital, un second exemple de cette maladie.)

Herpès tonsurant. — L'*herpès tonsurant* ne se rencontre généralement que là où il y a des cheveux et des poils. Il n'a été décrit

me pour le cuir chevelu, mais j'ai eu l'occasion d'observer un herpès de la barbe qui avait amené la chute complète des poils. Il est vrai qu'il offrait peut-être des caractères qui se rapprochaient plus d'un herpès circiné; j'en ai fait prendre le dessin, que je conserve.

L'*herpès tonsurant* est une maladie de l'enfance, ou mieux de la seconde enfance : c'est vers l'âge de huit à dix ans qu'on l'observe le plus souvent. Il se montre au milieu des cheveux par une ou plusieurs petites plaques arrondies, rougeâtres, amenant de la démangaison et recouvertes de furfures. Cette plaque est dépourvue de cheveux, ou plutôt tous les cheveux qui la recouvraient sont amaigris, atrophiés et *cassés* à 1 ou 2 millimètres de la surface malade; de sorte qu'en passant la pulpe du doigt sur cette partie, on sent parfaitement tous ces cheveux cassés, roides et faisant brosse. Mais une partie des cheveux de cette plaque est réellement tombée. La surface malade est tapissée d'une sorte de poussière grise, sale, adhérente, formant moitié duvet, moitié écailles. Au début de l'affection, la peau est parfois un peu tuméfiée et comme hérissée par les bulbes pileux qui semblent tuméfiés et malades, et ils le sont réellement; mais plus tard la surface malade s'affaisse au niveau de la peau saine, elle se recouvre de cette poussière grisâtre et sale qui est due à l'existence de nombreux parasites. Impossible d'arracher les cheveux, ils se cassent et le bulbe reste. On conçoit par cette description la dénomination que l'on a donnée à cette maladie : sa forme et son aspect constituent un état qui ressemble à une tonsure faite depuis quelque temps.

La manière dont s'opère la cassure des cheveux est d'ailleurs d'une explication très facile, quand on examine la disposition du cryptogame qui existe dans cette affection et le siége qu'il y occupe. (Voy. la planche de micrographie). D'une part, il s'enroule à la partie du poil pour l'envelopper et l'étrangler, pour ainsi dire, en figurant l'enroulement d'un cep de vigne; d'une autre part, il pénètre dans le canal du cheveu ; atrophie ce dernier, l'amaigrit, pour ainsi dire, en détruit la substance à quelque distance de son bulbe, et amène sa cassure, tantôt en perforant son enveloppe dans un point seulement de sa circonférence, tantôt en le refflant unifor

mément du dedans au dehors et écartant toutes ses fibres longitudinales. On trouvera tous les détails de ce cryptogame dans le groupe des maladies parasitaires.

Cette affection est contagieuse : il n'est pas rare de voir dans un collége douze, quinze et vingt enfants du même dortoir être successivement pris. C'est probablement au moyen des bonnets et des casquettes qu'elle se transmet. En effet, les travaux modernes des micrographes nous apprennent qu'elle est due à la production d'un cryptogame ; qu'elle s'engendre de telle sorte qu'il s'en échappe des granules ou *spores* excessivement ténues qui adhèrent aux bonnets et qui viennent ainsi propager la maladie. Elle est d'ailleurs très rebelle, et l'on pourrait jusqu'à un certain point la comparer sous ce rapport à la teigne. Il y a plus, suivant M. Bazin elle résiste plus que la teigne ; mais personne, je crois, ne partagera cette manière de voir. Elle va s'élargissant de plus en plus ; mais ordinairement, après avoir atteint la forme et la largeur d'une pièce de cinq francs au moins, elle reste stationnaire des mois entiers, pour se guérir quelquefois spontanément. Est-ce là un herpès en tout semblable à l'herpès circiné ; je ne saurais résoudre cette question d'une manière positive, je suis cependant porté à le croire pour les herpès qu'il peut produire ailleurs, sur le cou, par exemple, du même enfant, et là où il n'existe pas de cheveux ; en général, je n'y ai pas observé le bourrelet extérieur que M. Baerensprung retrace sur ses planches. J'ai vu dans le service des teigneux de notre collègue Bazin un assez grand nombre d'enfants atteints de cette maladie, et chez aucun d'eux il n'y avait de bourrelet. J'en ai observé et traité un grand nombre à divers états d'accroissement, sans que jamais j'aie été impressionné par l'existence de ce phénomène morbide.

Herpès crétacé. — Personne n'a parlé de cette variété, que j'ai observée trois fois, et toujours avec les mêmes caractères. Mon collègue M. Hardy a eu l'occasion d'en observer un ou deux cas depuis que j'en ai donné la description. Cette maladie ne se montre qu'à la figure, sur les joues et sur le nez. Les sujets sur lesquels je l'ai vue n'avaient pas dépassé l'âge de vingt-quatre ans. Elle avait débuté dans les trois cas avec une forme chronique, et s'était ainsi maintenue sous cet état pendant des mois et pen-

Lupus Eczématoïde.

dant des années. D'ailleurs nulle cause interne qui puisse justifier le développement de l'affection. Dans ces trois cas, l'herpès que j'appelle *crétacé* s'est montré par une petite tache arrondie très limitée, qui, au lieu de sécréter un liquide, se recouvre de petites écailles blanches, à reflet opaque, à forme presque pulvérente, adhérentes d'ailleurs toutes entre elles, de manière à former une couche assez semblable à de la craie, un peu teintée de jaune et de gris sale. Cet aspect crétacé, ressemblant à celui que donnent certains polypes de mer, a quelque chose de tout spécial. — La maladie suit une marche très lente, mais quand on l'examine de près, on voit que, tout en affectant une forme arrondie, elle est terminée à sa circonférence par un *liséré* rouge un peu saillant ; c'est par là qu'elle s'étend. J'ai vu un jeune garçon de seize ans qui portait cette affection à la joue depuis huit ans, maladie qui avait résisté à une foule de moyens. Chose remarquable, l'application répétée des cataplasmes fait très difficilement tomber ces surfaces crétacées ; il faut le concours de la graisse et des émollients. D'ailleurs, les démangeaisons sont tolérables et n'amènent pas de forts grattages.

Je dois dire que pour guérir ces malades j'ai employé des moyens assez actifs et assez nombreux : les douches de vapeur sur la surface malade, les pommades à l'huile de cade, au goudron, au carbonate de cuivre, les pommades alcalines, les cautérisations au nitrate d'argent, et dans un cas, une couche excessivement légère de caustique de Canquoin. Peut-être les douches sulfureuses ou alcalines modifieraient-elles avec avantage cette affection, que l'on aura rarement l'occasion de rencontrer, mais qui méritait une place particulière dans l'histoire de l'herpès, par sa forme, sa marche lente, sa production morbide toute spéciale, et la difficulté de sa guérison. En voici deux exemples.

Dumol... (Louis), corroyeur, âgé de vingt et un ans, est un grand jeune homme de force moyenne. Sa santé a toujours été bonne, et il ne se souvient pas d'avoir jamais eu ni engorgement ganglionnaire ni ophthalmie. Vers l'âge de cinq ou de six ans, il aurait eu seulement une affection croûteuse du cuir chevelu, qui aurait duré plusieurs mois ; du reste, pas d'alopécie.

Peu de temps après sa sortie de l'hôpital de Lyon, où il avait été traité d'une affection du gland, l'extrémité lobulaire du nez prit une couleur rouge livide

assez intense. Il en rapporte la cause à des excès de boisson. — Au bout de huit jours la rougeur disparut pour reparaître trois jours plus tard. Alors il se mit à faire des frictions avec la pommade camphrée, mais la rougeur ne tarda pas à prendre un caractère différent. Sur cette rougeur il se forma comme plusieurs petits sillons parallèles entre eux, et de ces sillons suintèrent de très petites gouttelettes d'un liquide qui, en se concrétant, donna naissance à une croûte blanc jaunâtre assez épaisse. Le grattage fit plusieurs fois tomber ces croûtes ou plutôt ces écailles, comme dit le malade lui-même, mais il restait de la rougeur et il se formait bientôt une sécrétion nouvelle analogue. — Sous l'influence de la pommade saturnine opiacée en frictions, et de la salsepareille prise en tisane, les croûtes disparurent ; il ne se fit plus de sécrétion, et la cautérisation, faite une fois avec le nitrate d'argent en pierre, une seconde fois avec cette même substance en solution, réduisit la rougeur à une légère teinte rosée. C'est alors que le malade est venu à Paris, où, pour fêter son arrivée, les camarades lui ont fait faire des excès de boisson. La rougeur ne tarda pas à reparaître, et il s'en développa une seconde dans la région mastoïdienne du côté gauche.

Entré dans le service de M. Gibert, qui diagnostiqua, dit-il, un lupus érythémateux, on lui donna de la tisane de chiendent nitrée, de la liqueur arsenicale et des bains de vapeur. En même temps, et pendant quinze jours, on appliquait sur les points malades un mélange d'huile de foie de morue et d'huile de cade. — Il se produisit de nouvelles croûtes épaisses saillantes, d'un jaune blanchâtre, et la rougeur s'étendit aux parties latérales du nez tout en gagnant la racine. — Alors suspension de l'huile, continuation des bains de vapeur, chute des croûtes, mais persistance de la rougeur. L'emploi de l'onguent citrin n'amenant pas de résultats meilleurs, le malade sortit de la salle Saint-Charles, et vint le 24 novembre dans le service de M. Devergie. Il était entré chez M. Gibert le 25 août.

A son entrée, sur une rougeur diffuse, on voyait à l'extrémité du nez des écailles assez épaisses d'une couleur jaune grisâtre, paraissant très dures, et ayant assez bien l'aspect crétacé. On ordonna : chicorée, bains de vapeur, cataplasmes la nuit. Le troisième jour, M. Devergie pratiqua la cautérisation avec une solution de nitrate d'argent au 1/5e. Plus tard, douches de vapeur et cautérisations successivement répétées cinq fois à quatre jours d'intervalle. Le malade sortit guéri au bout de cinq semaines.

Labassie, treize ans. — Il y a deux ans et demi que parurent sur la figure et derrière les oreilles des petits boutons blancs qui ont peu à peu disparu. Quelques-uns ont été percés avec des épingles, puis ils sont revenus, et d'autres situés sur la joue droite, sur le nez et sur la joue gauche, ont persisté. — On a fait bouillir de la suie avec laquelle on faisait des cataplasmes. Il y a un an, peu à peu les boutons se sont agrandis et ont commencé à se recouvrir d'une croûte blanche fendillée tout à fait analogue à un plâtrage. On a appliqué des sangsues derrière les oreilles, aux coudes, à l'anus et sans amener

bon résultat; la maladie a marché, au contraire, de plus en plus, et six mois, d'ailleurs, on ne faisait plus aucun traitement. — Toutes les ns sont intactes.

nut de la figure est recouvert comme d'un masque qui, laissant les irfaitement à découvert, cache la joue droite, le nez et la joue gauche. que est limité en haut par la partie de la joue qui répond à la base de , il l'est en bas par le sillon qui de l'aile du nez va rejoindre les com- s labiales. Ce masque est de couleur blanc sale, a l'aspect plâtreux; il lilé, de sorte qu'il semble formé de petites granulations. Ce masque a eur d'une ligne et demie, et il n'est le siége de démangeaisons que l'enfant a chaud. État général satisfaisant. (Tout le masque est bordé rele rosé légèrement inflammatoire.)

ura. — Des cataplasmes appliqués sur la joue gauche ont fait tomber tie du masque et permis de voir une surface rosée plus colorée que saine, légèrement ridée, sans apparence de tubercules ni de vésicules, ette et sans autre production que quelques squames. — 25. Sur la joue , cautérisation avec le nitrate d'argent au 1/10e. — 27. La coloration isparut en laissant à la peau un aspect tout à fait analogue à celui qui avant. Aspect ridé; de loin en loin quelques petites excavations super- , beaucoup plus apparentes à la partie du nez sur laquelle on a hier première fois appliqué des cataplasmes. — 1er avril. Seconde cauté- , à droite cette fois; après avoir employé successivement la cauté- à plusieurs reprises, puis la pommade de goudron. — 9 août. Le demande à sortir, bien que la figure ne fût pas encore complétement à son état naturel. Il ne restait d'ailleurs de l'altération primitive ache très limitée, d'une teinte rosée, un peu plus prononcée que celle eau normale, mais il existait encore autour de l'affection un liséré non , mais plus coloré et limitant parfaitement le mal. Le malade a dû con- hez lui les onctions avec la pommade de goudron. Il est à craindre lection ne reparaisse.

a j'ai à signaler une variété d'herpès dont je n'ose point faire pèce, parce que je n'en ai vu qu'un seul cas. Il s'agissait eune personne de vingt-trois ans, d'une belle santé et d'une rande beauté, qui depuis sept ans était atteinte d'une plaque s au-dessous et un peu en dedans de la clavicule droite. aladie avait résisté à tous les traitements employés par plu- de nos premiers praticiens de Paris. Je lui ai donné des soins t dix-huit mois, et je l'ai enfin débarrassée de ce qui pour était qu'une cause d'inconvénient de parure, car elle n'en it pas, et avec une poitrine superbe, elle se privait de tout

bal et de toute situation dans le monde qui pouvait exiger qu'elle se découvrît. Cette plaque arrondie avait la longueur de 2 centimètres; elle avait la forme arrondie de l'herpès, avec bourrelet, mais sans traces inflammatoires intenses. Ce qui la différenciait de l'herpès, c'était un développement, une hypertrophie de tous les follicules sébacés de la peau dans la surface de la plaque, à un tel point qu'on ne parvenait à les guérir qu'en les cautérisant. Mais comme il ne fallait pas produire de cicatrice, on ne pouvait s'adresser indistinctement à tous les caustiques. C'est assez dire que les pommades, les lotions de toutes sortes avaient été sans succès. Quand on cautérisait une partie de la circonférence du mal, il apparaissait des follicules sébacés en dehors, et il fallait recommencer. Enfin j'appliquai successivement trois vésicatoires, que je fis suppurer pendant huit à dix jours chacun, et je parvins à la guérison. On pourrait appeler cet herpès *herpès folliculeux*.

L'herpès peut être de nature syphilitique. (Voy. SYPHILIDES.)

Herpès à formes composées.

Herpès eczémateux (voy. pl. I, fig. 5). — Cette variété est souvent difficile à distinguer de l'*eczéma nummulaire*, que nous avons décrit, mais elle s'en distingue cependant par la présence d'un bourrelet à sa circonférence. En effet, si dans l'eczéma nummulaire la forme arrondie est tout aussi tranchée que dans l'eczéma, la circonférence de la plaque *est de niveau* avec la surface de la peau et semble se perdre avec elle par sa coloration; le contraire a lieu pour l'herpès eczémateux. Du reste, même démangeaison, car les éléments de cette forme sont tels que, pris isolément, ils amènent ce phénomène; sécrétion séreuse plus abondante que dans l'herpès, mais moins marquée que dans l'eczéma; aussi pas de furfures; peau ponctuée de rouge comme dans l'eczéma, mais moins chagrinée que dans l'herpès; pas de squames sensibles dans la dernière période de l'affection. Le traitement diffère peu, d'ailleurs, de celui de l'herpès, sauf l'emploi de quelques-uns des moyens locaux applicables au traitement de l'eczéma.

Je renvoie la description des variétés d'herpès *lichénoïde*, *pso-*

e, rupiforme et *lupiforme*, aux maladies désignées sous les *lichen, psoriasis, rupia* et *lupus*.

eutique des herpès à petites vésicules.—Ainsi que nous l'avons entir, la thérapeutique générale de l'herpès peut être basée . considérations principales : 1° la liaison si commune de avec une gastralgie ou avec le tempérament bilieux ; 2° ce e expérience nous a appris à l'égard de l'herpès, à savoir : lame le plus souvent l'usage de la médication sulfureuse et . Avant donc de s'occuper de l'affection locale, le médecin rroger avec le plus grand soin les organes abdominaux, et e une médication appropriée à leur état. Ici ce sera l'emploi lins, lorsque la gastralgie sera accompagnée d'aigreurs ; là xclusif du lait et des aliments accommodés au lait ; ailleurs nitrate de bismuth associé au charbon, et tous les moyens médecine sait approprier à ces états. Mais lorsque aucun in- ce genre n'existe, que les fonctions s'accomplissent d'une régulière, c'est aux sulfureux qu'il faut s'adresser. Usage sulfureux (voy. *Formulaire*, SIROP SULFUREUX), une cuil- ouche matin et soir dans une tasse de tisane de saponaire ricorée sauvage ; dans le cours de la journée, tablettes sou- ins sulfureux, pommades soufrées à l'extérieur. Ici nous ns la période aiguë de l'herpès dissipée ; car dans l'herpès, dans toutes les autres maladies de la peau, la période aiguë traitée par les émollients, et l'herpès, plus que toute autre , se trouve bien de l'emploi externe de l'amidon en poudre. ce que l'expérience a consacré. L'emploi de ces agents et isons qui de tout temps ont été opérées avec eux seuls t que le cryptogame de l'herpès est facilement arrêté dans lution et détruit. Et en effet, il faut bien le reconnaître, il foule d'agents qui modifient et désorganisent les cham- qui croissent sur l'homme. Si dans la teigne on éprouve résistance à la guérison, cela ne tient pas à la nature du ame, mais à ce qu'il s'introduit dans le réceptacle du cheveu, nètre jusqu'au bulbe, et que l'on ne peut y faire pénétrer les ropres à modifier sa végétation, à moins d'annuler le poil ettre à nu la cavité de son réceptacle. Dans les herpès, au

contraire, le cryptogame s'étend moins souvent au bulbe surtout à la surface du cheveu ou dans son intérieur qu'il r de sorte qu'il est facile de l'attaquer sans avulsion; à plu raison quand l'herpès se montre sur des parties où il n'y quelques poils follets.

Il arrive souvent que des plaques d'herpès ne se terminen on les guérit alors très rapidement en passant une ou deux f leur surface un pinceau imbibé de solution de nitrate d'arge (voy. *Formulaire*). Dans l'herpès circiné il est inutile de tou surface malade; il suffit de toucher le bourrelet par lequel la maladie. C'est un fait capital que cette influence du bourre les progrès et la ténacité de l'affection, et c'est pour cela qu avons tant insisté sur ce caractère de l'herpès. Par les c sations légères on le détruit; si l'on ne touche qu'une parti circonférence, on arrête le mal dans le point touché, le re circuit faisant des progrès ultérieurs. Nous allons voir qu certaines formes composées il faut arriver à des moyens plus enfin, si ces agents étaient insuffisants, l'onguent citrin, la made au turbith nitreux ou minéral en feraient justice. — d'eaux minérales dont il y a lieu de prescrire l'usage, sans contredit les eaux des Pyrénées, et c'est là surtout montreront toute leur efficacité. Mais il faut, dans ces cas, leur usage à l'eau en boisson et en bains, de préférence au ches.

L'herpès circiné des cuisses est une affection qui guérit s avec des soins de propreté : 1° isolement du contact des bour des suspensoirs; 2° lotions répétées, bains généraux émo amidon en poudre dans l'état aigu. Puis à la période décroi lavages à l'eau chlorurée au 1/25e, lotions d'eau salée, saturnée.

Quant à l'*herpès tonsurant*, le traitement pour celui de la t le suivant : usage de pommades légèrement résolutives au soit à l'oxyde de zinc, soit au tannin (voy. *Formulaire*); ultérieur de pommades au carbonate de cuivre à 5 décigram carbonate, matin et soir, et lotions savonneuses tous les pour enlever la pommade de la veille (voy. *Formulaire*, Lo

s un mois de traitement, commencer l'emploi de l'huile de tous les deux jours, et terminer le traitement par quelques risations avec le caustique n° 1 au nitrate d'argent (voy. *Formulaire*). Couper d'ailleurs les cheveux dans une surface assez ne au pourtour de la maladie, afin d'éviter que les pommades graissent et ne se rancissent.

ne suis très bien trouvé de l'huile de cade employée huit ou e jours après le début, et mise tous les jours en proportion un ins considérable que de coutume. Elle a modifié très heureu- t la surface malade en l'enflammant, et l'emploi subséquent mmades résolutives a suffi pour amener la guérison.

Bazin conseille l'épilation ; mais cette maladie laisse des ents de cheveux tellement courts et fins, que l'épilation ne rait utile qu'à la circonférence du mal et pour arrêter les s. Encore nous la regardons comme inutile, d'après les s que nous avons basées sur le siége du cryptogame, et surtout e de l'impossibilité où l'on est d'avulser le bulbe du poil. Ce beaucoup plus rationnel, c'est de pratiquer l'épilation autour l afin de borner et d'arrêter l'affection. M. Bazin prétend qu'il ucoup plus facile de guérir la teigne que de guérir l'herpès ant, nous sommes d'une opinion tout opposée à la sienne.

rpès tonsurant de la barbe fait des progrès très lents et exige lement actif. Les cataplasmes tous les soirs, l'usage tous les ours de douches de vapeur sur la partie malade. Modifier t d'un certain temps la surface malade avec la solution de e d'argent n° 3 (voy. *Formulaire*), et dans quelques cas appli- r le bourrelet le caustique de Canquoin, mais à l'état liquide association à la farine.

Herpès à grosses vésicules.

s ces variétés, la forme vésiculeuse est tellement apparente, 'est pas possible de la méconnaître un seul instant. On voit stinctement les vésicules, à cause de leur volume, de leurs tions souvent espacées les unes des autres. Ce groupe com- cinq variétés : le *zona*, l'*herpès phlycténoïde* (la phlycténoïde),

l'*herpes labialis* (la labiale), l'*herpes præputialis* (la préputiale), *traînée vésiculeuse*.

Zona (voy. pl. Ire). — Nous traiterons d'une manière somma de cette affection, qui est décrite dans tous les traités de pathologi Son nom lui vient de ce qu'elle forme non pas une ceinture, m une demi-ceinture autour du corps. Elle affecte l'âge adulte et vieillesse, pouvant d'ailleurs se montrer sur tous les points du tron du cou, de la tête, mais en prenant origine d'une ligne média pour gagner la ligne médiane opposée, tantôt à droite, tantôt gauche. A cet égard, diverses statistiques ont été dressées, et tel leur résultat, qu'elles laissent aujourd'hui le médecin dans le dou sur la prédominance d'un côté sur l'autre. Ainsi, sur 53 cas no par M. Rayer, 37 étaient à droite. Reil l'a presque toujours observ sur le côté gauche. C.-E. Mehlis, sur 25 cas, en a vu 16 à gauc et 9 à droite. Pour nous, nous croyons avoir vu le zona occu plus souvent le côté droit que le côté gauche. Les auteurs ont a varié d'opinion relativement au point de la hauteur du tronc est le plus souvent atteint : les uns ont dit, c'est l'abdomen ; les tres, c'est la poitrine. Ces derniers ont raison.

Quoi qu'il en soit, on peut trouver le zona sur le front, sur joues, le cou, la poitrine et les membres ; mais à l'égard des me bres il a toujours son point de départ sur le tronc pour les me bres inférieurs, et sur le cou et à la poitrine pour les membres su rieurs. Ce n'est jamais que par groupes de vésicules qu'il se dé loppe, et la disposition de ces groupes a une forme ovoïde as déterminée pour que chaque groupe naissant successivemen la suite l'un de l'autre, leur ensemble présente une dispositi *linéaire*. Celle-ci peut être *transversale*, *oblique*, ou même *vertica* mais la direction *verticale* ou *perpendiculaire* ne s'observe jam qu'aux membres, dont les groupes suivent de haut en bas la su face interne : de là est née la division des auteurs en *zona ho zontal*, *oblique* et *perpendiculaire*.

Tel est le cachet de cette affection, que sur une surface rou ovoïde de 4 à 5 centimètres de longueur sur 3 de largeur, on v une série de vésicules du volume d'un grain de chènevis, dissé nées inégalement, les unes réunies, deux, trois ou quatre entre ell

isolées ; toutes à parois transparentes, remplies d'une
rine ou blanchâtre, suivant l'époque du développement.
, quatre ou cinq groupes développés successivement et
réairement se font ainsi remarquer, et constituent la ma-
son ensemble.

n début elle est précédée de prodromes qui lui sont tout
'e sont, avec un état de malaise général, des douleurs
dans toute l'étendue de la partie qui devra être affectée.
de ces douleurs et le nombre de jours durant lesquels
ontrent donnent la mesure de l'intensité du zona ; de
le phénomène de la douleur, réuni à un état de malaise
itude générale, constitue les phénomènes précurseurs
lu zona. Ils sont en général de plus en plus marqués avec
emblent s'atténuer durant l'éruption et pendant le temps
t à parcourir ses périodes, pour reprendre une certaine
t persister longtemps après la cessation de la maladie
i elles ont été primitivement intenses. Ainsi, on les voit
à huit mois chez quelques vieillards, et je cite ici la vieil-
e que c'est chez le vieillard que l'on observe les zona les
s, ceux qui sont accompagnés de gangrène. Rien de plus
es douleurs dans quelques cas, et surtout quand elles
et accompagne le zona du front et des tempes. Elles se
t alors dans toute l'étendue de l'extérieur du crâne ; elles
t au sommeil, amènent des rêvasseries, du délire, et font
e fièvre cérébrale imminente. Bon nombre de médecins
ent, ne reconnaissent pas l'éruption qui les accompagne,
ent aller à des émissions sanguines disproportionnées aux
malades et peu en rapport avec la thérapeutique que ré-
e affection. Ces pertes de sang, en faisant prédominer le
rveux sur le système sanguin, rendent les douleurs in-
les, augmentent le délire et font naître quelquefois par
ité le penchant au suicide.

aintenant quel est l'ordre d'évolution des phénomènes
zona : Douleurs lancinantes précédant de plusieurs jours
; apparition d'une plaque rouge circonscrite sur un des
onc, en avant plutôt qu'en arrière et quelquefois au mi-

lieu du côté. Le lendemain, huit à dix vésicules remplies de s sité citrine qui sont disséminées sur cette plaque rouge. Le jour vant, nouvelle plaque rouge à 2 ou 3 centimètres plus loin; mais, même temps, les vésicules de la première plaque ont augmenté volume; quelques-unes se rapprochent et se touchent: deux, tr ou quatre se confondent entre elles pour ne plus former qu'une bu irrégulière très aplatie. La sérosité a pris une teinte opaline. Le tr sième jour, nouvelle rougeur; sur la plaque érythémateuse de veille, des vésicules citrines; état opalin et presque purulent des v sicules de la plaque primitive. Il se montre ainsi, dans l'espace quatre à cinq jours, trois, quatre ou cinq groupes de vésicules suivent successivement les mêmes phases. Mais lorsque plusie d'entre elles se sont réunies, que la sérosité est devenue purule ou lactescente, il se produit sous la sérosité purulente une fau membrane qui affecte profondément la peau. Cette fausse membr peut même devenir gangréneuse, et dans cet état l'eschare s'éla peu à peu, au point de détruire une assez large surface de la p et de donner lieu à des ulcérations qui sont très vastes, très dou reuses et très difficiles à guérir. Disons tout de suite que c'est l cas exceptionnel; que dans la généralité des zonas une partie vésicules développées se dessèche par la résorption de la sérosit que d'autres se réunissent pour produire une fausse membra plus étendue; que celle-ci se détache peu à peu par une sécréti purulente éliminatrice; qu'une ulcération la remplace, ulcérati que l'on guérit par des pansements simples. Souvent même, et a le concours d'un traitement convenable, il n'y a pas de suppuratio la fausse membrane se dessèche, elle tombe et laisse une cicatr toujours indélébile.

Le zona peut affecter, comme nous l'avons dit, trois directi spéciales: oblique, transversale, perpendiculaire. La plus comm est la direction oblique; on peut dire que la direction transver est l'exception. Il naît aussi bien de la ligne médiane antérie pour se porter en arrière, que de la ligne médiane postérieure po se porter en avant. — Le zona qui avoisine les ouvertures nat relles peut s'y étendre et envahir la membrane muqueuse qui l tapisse. Ainsi M. Rayer cite le cas d'un vieillard chez lequel un zo

ce a pu gagner la surface interne de la joue et les gencives.
layer, qui a étudié avec beaucoup de soin le zona, a signalé
ier les fausses membranes qu'on observe dans ses vésicules
ou réunies en une bulle. En enlevant avec soin l'épiderme,
re une pseudo-membrane grisâtre, adhérente, épaisse, atta-
ne partie de l'épaisseur de la peau, et si on l'enlève, on
a le derme ulcéré. C'est ce qui explique par l'extension de
me morbide les cicatrices profondes qui se montrent à la
zona, et dont les malades conservent l'empreinte toute leur
une dépression à peu près égale à celle qui existait peu de
près la guérison.

itement du zona est bien simple : Galien l'a le premier fait
e. Cette éruption repousse toutes les applications liquides.
ue soit son étendue, il faut se borner à faire garder le repos
de, le mettre au régime sans le priver d'aliments; faire
rer d'amidon trois ou quatre fois par jour les surfaces ma-
e pas appliquer de cataplasmes, pas de compresses imbi-
solutions aqueuses : car tout ce qui est émollient, liquide,
e les douleurs de l'éruption, favorise l'état gangréneux chez
ards. Les douleurs comme prodromes cèdent avec l'érup-
is comme elles reprennent quelquefois avec plus d'intensité
terminaison du zona, qu'elles durent aussi pendant un
ps long, il faut, aussitôt après la fin de l'éruption, s'atta-
les faire disparaître. Je ne connais rien de plus propre à
ce résultat que la pommade à l'extrait de belladone et
(voy. *Formulaire*) ; on l'applique sur une grande surface,
ou trois fois dans les vingt-quatre heures.

ut les cas graves de zona avec gangrène. Ils sont souvent la
nce du traitement émollient employé. Ils réclament l'usage
ues pulvérulents, poudre de quinquina, poudre de tan ; des
l'eau-de-vie camphrée, de chlorure de soude ; des panse-
ec la charpie imbibée de vin dans lequel on a fait bouillir
de Provins, concurremment avec l'emploi de pommades
s lorsque les douleurs lancinantes sont vives.

énoïde (herpès). — On a donné cette mauvaise dénomina-
e maladie qui n'a ni les caractères *circinés* de l'herpès, ni

aucune des apparences des phlyctènes. Elle consiste dans une érup de vésicules toutes isolées et espacées les unes des autres sur point plus ou moins étendu de la face palmaire des membres, quelquefois cependant sur le dos de la main et à la face latérale doigts, sans ordre, sans méthode, sans conformation que l'on pui qualifier. Ces vésicules ont le volume d'un grain de chènevis, peu plus, un peu moins; elles sont plus ou moins confluentes, pl ou moins discrètes, mais en général leur ensemble occupe une su face qui ne dépasse guère 10 centimètres en longueur. Elles so remplies d'une sérosité citrine; elles sont arrondies ou oblongu elles ressemblent aux vésicules primitives du zona; elles n'ont de tendance à se confondre entre elles; elles ne donnent pas lie de fausses membranes. C'est donc là une éruption toute superfici de la peau.

Mais, malgré ces caractères qui tendent à faire considérer c éruption comme de peu d'importance, et quoique, comme le zo elles ne soient pas en général précédées de douleurs lancina vives, elles ont parfois pour prodrome de la fièvre; elles amè de la douleur, et il n'est pas rare de les voir accompagnées d phlébite de l'une des veines superficielles du membre. C'est ce se fait surtout remarquer lorsque la phlycténoïde a son siége main, et surtout le long des doigts. Mais ces phlébites mom nées, tout en annonçant l'influence de l'éruption sur la santé gé rale, sont ordinairement arrêtées par des émollients *loco dolenti*.

L'éruption de la phlycténoïde est ordinairement complète en jours, mais la maladie ne cède qu'en huit ou dix jours. Calmée l'amidon en poudre quand les douleurs sont peu vives, ou par cataplasmes de fécule jour et nuit quand la chaleur et l'inflam tion sont intenses, l'éruption persiste avec la sérosité citrine d'ab puis cette sérosité devient lactescente. Elle se résorbe en partie plus souvent les vésicules s'ouvrent, la sécrétion s'écoule; il résulte à la place de chaque vésicule une érosion de la forme e l'étendue de la vésicule, qui sécrète une sérosité légèrement lac cente et qui cède ensuite dans la période de résolution. Alors doigt ou la partie malade qui s'était tuméfiée revient à son volu primitif après avoir perdu la totalité de l'épiderme qui la reco

ni. C'est certainement aux doigts et à la main que l'herpès phlyc-
ide est plus intense, car lorsqu'il est disséminé sur la longueur
la partie supérieure d'un membre, il a ordinairement beaucoup
s d'acuité. C'est une très mauvaise méthode que celle qui con-
à ouvrir les vésicules avec une épingle : on donne accès à l'air,
qui augmente les douleurs sans aucun bénéfice pour le malade.
si ne faut-il employer les médications aqueuses que lorsqu'il y
nécessité, puisqu'elles amènent le même résultat.

Labiale (*herpes labialis*). 1re *variété*. — Cette maladie n'est autre
e l'*hydroa fébrile* de Frank. C'est une éruption vésiculeuse ana-
que à celle de la phlycténoïde, avec ces différences que les vési-
es sont ordinairement plus petites ; qu'elles sont disséminées çà
là sur les lèvres, et particulièrement aux angles de la bouche,
icules qui se montrent toujours à la suite d'un accès de fièvre
ager de la nuit.

Cette éruption est assez incommode, elle est même douloureuse
nd on écorche, qu'on excorie les vésicules. Elle cède ordinaire-
nt dans l'espace de quatre ou cinq jours, et sans aucun traite-
nt qu'un corps gras onctueux étendu sur les parties affectées.
est vrai de dire qu'elle peut prendre chez les enfants et chez les
sonnes assez âgées une certaine extension ; qu'alors cette maladie
e à l'état de suppuration séro-purulente et sanieuse, mais alors
le coïncide avec un état général morbide dont la labiale n'est que
accident. C'est ce que j'ai souvent observé ; j'en ai eu deux exemples
ppents sous les yeux, l'un chez une jeune fille de douze ans,
tre chez une femme de quarante-cinq ans, qui, après un état
ralgique de mauvais caractère, a vu se développer cette ma-
die ; deux mois se sont écoulés sans amélioration dans la santé
nérale ; un pemphigus s'est déclaré sur les membres, et la labiale
t étendue peu à peu, pour prendre l'aspect que j'ai signalé plus
t. Ces détails indiquent assez quelle direction on doit donner au
itement.

2e *variété*. — Il est une forme d'*herpes labialis* qui n'a pas été
crite et qui mérite de fixer d'autant plus l'attention, qu'elle est
nement rebelle, et qu'elle résiste aux traitements les plus
ionnels. Cette maladie affecte moins le point de jonction de la

lèvre avec la peau, ainsi que cela s'observe dans l'*herpes labialis* ordinaire, que la surface interne des lèvres. Elle apparaît toujours sous une forme chronique, et se relie, soit à un état plus ou moins scorbutique des gencives ou de la bouche, soit à une stomatite chronique, soit à un mauvais état du tube digestif. Nous devons ajouter qu'on peut la rencontrer chez des sujets en état de santé, mais qui se nourrissent peu ou mal. Elle n'est pas rare; elle affecte tous les âges, et je suis surpris qu'on ait passé cette affection sous silence.

Elle débute, en général, dans un point très circonscrit de la surface de l'une des lèvres, et par une petite vésicule à peine sensible à peine surélevée au-dessus du niveau de la lèvre, vésicule qui est remplie d'un liquide particulier transparent: mais l'épiderme est plus épais que dans la vésicule d'*herpes labialis;* le soulèvement épidermique est d'ailleurs aplati, et sa circonférence semble se confondre insensiblement avec le reste de la surface labiale. Le deuxième et le troisième jour, elle s'élargit; le liquide sous-épidermique s'y accumule, soulève l'épiderme, et alors on voit que la vésicule a un aspect un peu lactescent. — Il arrive un moment où, sous l'influence de l'accumulation du liquide, de la pression et du frottement par le passage des aliments, la vésicule se crève; elle laisse alors écouler un liquide transparent, visqueux, filant à la manière de l'albumine ou d'une eau chargée de gomme arabique. Cet écoulement devient alors continu, et l'on voit qu'en parlant, exécutant des mouvements avec les lèvres, il se montre constamment des filets de cette liqueur qui relient les deux lèvres. Notez que c'est ordinairement plus près du centre des lèvres que vers les angles de la bouche que se montre cette affection. Enfin l'épiderme de la vésicule qui s'est ouvert, mais qui n'a pas été détruit, finit par former croûte, en partie adhérente, en partie détachée, d'un aspect d'un blanc grisâtre et fort désagréable. Le moindre cataplasme, la moindre application d'une compresse d'eau mucilagineuse, suffit pour la faire tomber, et alors on constate une érosion extrêmement superficielle de la lèvre qui, laissée à l'air quelques instants, donne une gouttelette de ce liquide visqueux dont j'ai parlé. D'ail[illegible] cette maladie progresse de plus en plus, et dans l'espace de [illegible]

s, elle a envahi la majeure partie de la lèvre qui, par les lont elle est tapissée, prend un aspect dégoûtant. L'affec- là, lentement progressive pendant des mois et des années; ois elle se propage à la lèvre supérieure. — J'ai essayé pour ttre une foule de moyens. La première fois que je l'ai traitée ez un jeune homme de vingt-huit ans, d'une docilité qui se soumettait avec la plus grande abnégation à toutes ations, tant générales que locales. Ce qui m'a le mieux sont les cataplasmes de fécule pendant la nuit; c'est de la peau par des applications astringentes à l'alun; toucher uatre ou cinq jours les surfaces malades avec une solu- trate d'argent au dixième; les médications internes ferru- ou sulfureuses, l'usage des eaux, ont peu fait localement, méliorant la santé générale. Chez une malade j'ai fait tenir leux mois une lamelle de peau de baudruche attachée s oreilles, fendue au voisinage de la bouche et recouvrant des lèvres pour s'y accoler parfaitement. Tant que la peau uche a été appliquée, qu'elle a évité le contact et les ts des aliments, il n'y a plus eu de sécrétion, plus de la malade se croyait guérie; mais deux ou trois jours peine écoulés quand on en cessait l'emploi, que le suin- t les croûtes reparaissaient comme par le passé. Une gutta-percha ne produisait pas le même résultat, parce rface, ne s'agglutinant pas, ne collait pas à celle de la s la baudruche faisait merveille tant qu'elle restait appli- semble qu'elle remplaçait l'épiderme. J'ai guéri par les ue j'indique quelques-uns des cas que j'ai observés, mais é plusieurs fois.

ale (*herpes præputialis*). — Voici une maladie fort légère, t cependant fixer toute l'attention du médecin au point de iagnostic et du traitement. Cette affection se montre très hez des personnes qui ont été atteintes d'accidents primi- condaires de la syphilis, et par conséquent chez des ma- sont encore sous la préoccupation de la vérole. Or, cet nt et la persistance du mal peuvent bien souvent être pour hose dans le diagnostic que le médecin porte de cette ma-

ladie, de sorte que malade et médecin, qui ne connaissent pas l'*herpes præputialis*, sont tous deux conduits à l'erreur du diagnostic, et, ce qu'il y a de plus fâcheux, ce dernier est amené à l'erreur thérapeutique.

Que l'on se figure une éruption de vésicules extrêmement ténues, mais cependant encore très appréciables à l'œil, agglomérées toutes entre elles de manière à représenter la surface d'une pièce de 50 centimes ou même moins ; cette éruption se faisant avec une démangeaison assez vive, un sentiment de cuisson, de picotement et de chaleur, le tout sans gonflement très sensible de la peau ; ce groupe de vésicules produisant de la sérosité qui se concrète en croûte. Cette sérosité concrétée, réunie aux lamelles épidermiques qui servent d'enveloppe à la sérosité, donne une surface rugueuse d'une sensibilité extrême, ne pouvant pas supporter le moindre frottement : de sorte que le contact du pantalon, de la chemise, cause des douleurs aiguës aux malades. L'éruption met sept à huit jours à se guérir ; mais durant cette période de temps, ou quelquefois huit jours, quinze jours, trois semaines après, une nouvelle éruption d'herpès se développe, et ainsi de suite pendant des mois entiers.

C'est alors que se soulève la question de cause syphilitique. On se demande si le traitement mercuriel a été suffisant, et bon nombre de personnes se traitent à nouveau, soit spontanément, soit avec le concours de leur médecin. C'est que ces éruptions ne sont garanties de récidive qu'à la condition que, durant six semaines à deux mois, le malade tiendra sa verge enveloppée d'un petit linge qui évite ainsi tout frottement susceptible de réveiller la sensibilité que laisse la préputiale à sa suite et après sa guérison.

Quant aux moyens thérapeutiques, ils sont fort simples : la poudre d'amidon, de tan, de vieux bois ; des lavages à l'eau chlorurée ou salée, quelques bains ; parfois une cautérisation superficielle de la surface malade avec la solution de nitrate d'argent n° 1 (voy. *Formulaire*), et surtout éviter tout contact de la surface malade avec les vêtements en tenant la verge constamment enveloppée d'un linge.

Herpès iris. — Cette affection est à peu près du même genre que l'herpès circiné, mais elle en diffère par l'apparence très marqué-

des vésicules, le siége, le développement, la cause et la durée. On a donné ce nom à une série de vésicules entourées de cercles excentriques diversement colorés, formant plaque morbide sur le dos des doigts principalement, ou le long du bord interne des pieds. Ainsi le centre de la plaque est le siége d'une, de trois ou quatre vésicules blanchâtres entourées d'un cercle bleuâtre, et autour de celui-ci un cercle blanchâtre, puis un troisième d'un rouge plus foncé, puis une nouvelle série de cercles analogues ; de sorte que l'ensemble de ces deux séries de cercles, qui représentent une surface de 1 à 2 centimètres de diamètre, offre assez bien l'aspect d'une petite cocarde dont la disposition nuancée a fait donner à cet herpès la dénomination qu'il porte. La circonférence est toujours terminée par un bourrelet rosé assez saillant pour être senti en promenant le doigt sur la surface malade. Ce cercle tend à se fondre avec la couleur de la peau. La maladie se montre par une ou plusieurs plaques ordinairement placées sur les doigts, à la hauteur de la première phalange, mais elle peut se développer ailleurs ; elle parcourt ses périodes à la manière des érythèmes, dans l'espace de deux septénaires. Elle se montre surtout chez les enfants et dans l'adolescence, mais on la voit quelquefois à un âge plus avancé.

L'herpès iris est souvent le reflet d'une gastralgie ; il est aussi très fréquemment précédé d'un état fébrile assez marqué, avec anorexie et indices d'embarras gastrique. Il apparaît sur le dos des doigts, précédé de démangeaisons, accompagné de chaleur et quelquefois d'un peu de cuisson ; il met trente-six à quarante-huit heures à se développer complétement ; il reste stationnaire pendant trois ou quatre jours, et il finit par disparaître. Mais il est assez commun de voir une ou deux plaques succéder à la première, et ainsi de suite quatre ou cinq plaques successives ; souvent il se complique d'érythème.

Ne pas hésiter à donner un vomitif si l'embarras gastrique est dessiné. Diriger en tous cas le traitement interne selon l'état des voies digestives ; se borner à saupoudrer d'amidon les surfaces malades et à faire prendre quelques bains simples, tel est le traitement que réclame cette affection, peu commune d'ailleurs.

s herpès à grosses vésicules. A une distance de quatre à se montre une nouvelle traînée, et ainsi successivement space de cinq à six semaines ; mais l'éruption de ces fait à des distances d'autant plus longues que la date de st plus ancienne. Quant à la croûte formée, elle se des-détache peu à peu des bords et s'en va par débris. D'ail-nté générale est assez bonne, sauf lors des premières qui sont souvent précédées de fièvre. — De cet ensemble e l'on peut voir à la surface d'un avant-bras trois, quatre es traînées d'herpès à divers degrés. Cette forme d'herpès milieu entre les herpès à grosses vésicules et les herpès icules ; les prodromes fébriles, la douleur locale et par-nte, la forme, tendent à le rapprocher des herpès à cules.

rait pas croire que cette affection d'herpès perpendicu-rainées soit un effet du hasard ; nous savons combien cause déterminante externe peut facilement développer d'herpès. Ainsi une de nos malades qui était atteinte ciné s'étant éraillé perpendiculairement la peau de la une épingle, il se manifesta une éruption vésiculeuse lu genre de celle que nous venons de décrire : même même disposition, même aspect ; mais c'était là un fait nt la cause nous fut connue et que nous ne saurions vec la maladie que nous venons de faire connaître.

s nous nous sommes borné, pour cette maladie, à un mollient simple, l'amidon en poudre, les bains, et les ts à l'intérieur. Ce traitement nous a suffi dans les ue nous avons eu l'occasion de traiter.

que nous venons de tracer de tous les herpès justifie s rapports les deux divisions que nous avons adoptées. formité de causes, de forme morbide, de marche, de de traitement entre ces deux groupes de formes. Dans vésicules presque inappréciables, tendance très marquée té, reflet de gastralgie ou d'entéralgie, ou enfin du tem-ilioso-lymphatique ; avantages notables des sulfureux et à l'extérieur après la période aiguë ; nécessité de

modifier souvent le mode de vitalité des tissus malades par agents médicamenteux propres aussi à détruire les cryptog qui peuvent se développer à leur surface.

Au contraire, dans les herpès *zona*, *phlycténoïde*, *labialis*, *pr tialis*, ou herpès à grosses vésicules, prodromes, état inflamma général toujours assez prononcé, marche régulière de chaque a tion; terminaison franche par résolution. Mêmes symptômes loc mêmes douleurs, soit comme prodromes, soit comme coïncid soit comme conséquences; le système nerveux est là mis en je la même manière. Enfin, même traitement antiphlogistique gén et à l'extérieur même ordre de moyens antiphlogistiques, c'e dire émollients, à l'état pulvérulent et corps gras opiacés.

Herpès syphilitique. — Voyez. SYPHILIDES.

TROISIÈME GROUPE.

Affections symptomatiques d'altérations du sang.

Nous réunissons dans ce quatrième groupe des maladies qui p vent présenter entre elles des analogies de causes, de forme m bide et de traitement. Quoi de plus voisin, en effet, que l'*ecth cachecticum* et le *rupia?* Existe-t-il des maladies qui offrent e elles plus d'affinités que le *purpura* et le *scorbut?* Le *pemphigu* naît-il pas à la suite de toutes les causes que peuvent faire na aussi ces quatre maladies? Nous pourrions même y joindre l'é *petigo scabida*, si ce n'était une forme composée. Et si nous envi geons ces cinq affections dans leur ensemble, nous verrons que d toutes il y a un état spécial du sang qui doit tout d'abord att l'attention du médecin; cet état, on l'exprime facilement à la pen par cette locution vulgaire, mais bien caractéristique, en disant q y a *appauvrissement du sang*.

Ces cinq maladies se développent dans les mêmes circonstance c'est le chagrin prolongé, la misère, ou les excès soit de débauch soit de travail, sans une alimentation correspondant à la déper tion des forces; et dans toutes ces conditions se retrouve en défi tive un défaut de renouvellement du sang par les matériaux de la

n. Le chagrin, comme la fatigue, affaiblit les forces diges-
uoique le sujet puisse faire usage d'une bonne alimentation,
mac ne peut fonctionner suffisamment, et l'assimilation n'est
rapport avec la déperdition des forces. Cette cause existe
ière dans les conditions de misère où la personne peut se
. Aussi, pour peu que le chagrin, la misère, la fatigue, vien-
gir sur une personne âgée, l'épuisement des forces est ra-
le développement des maladies qui nous occupent le suit
. Le scorbut, qui est si commun chez les marins, ne se
chez eux que lorsqu'ils sont privés depuis un certain temps
ts substantiels, alors qu'ils sont réduits à l'usage de salaisons
scuits, et encore dans une proportion souvent insuffisante.
ura, il est vrai, se lie fréquemment à des états gastral-
ou à des affections chroniques du tube digestif, mais
re l'altération même des voies digestives s'oppose à la
n.

donc peu de maladies cutanées où l'indication thérapeu-
oit mieux dessinée et qui justifie plus le rapprochement
s en faisons, indépendamment de la forme morbide elle-
Que nous sert, en effet, de savoir que le rupia a pour élément
icule ou une bulle ; que l'*ecthyma cachecticum* est une affec-
tuleuse à forme spéciale ; que dans le *scorbut*, comme dans
ra, on rencontre des taches qui sont produites par du sang
s parois vasculaires pour amener soit l'apparence érythé-
, soit celle ecchymotique ? Ce qui est important, c'est de
re la cause réelle de ces affections ; or cette cause est de
nature pour ces cinq maladies, puisque ces maladies ré-
; la même thérapeutique à quelques nuances près ; il faut
our les praticiens, les grouper entre elles afin d'en tracer les
res et de pouvoir mieux nuancer les indications thérapeu-
qu'elles réclament. Ainsi se trouvent justifiées, je crois,
ditions dans lesquelles nous nous sommes placé, qui
t sous plus d'un rapport l'ordre d'exposition des ma-
d'après les éléments anatomico-pathologiques qui les
nent.

re de la peau, si ce n'est dans quelques cas de pem-
aigu où l'on voit se dessiner un léger cercle érythémateux
la bulle. Cependant ouvrez cette petite ampoule, laissez
per la sérosité, et dans le pemphigus le plus chronique
erez la peau rouge, enflammée : aussi cette rougeur est-
ntense dans le pemphigus aigu. Elle sécrète d'ailleurs
ment ; elle est d'une sensibilité extrême, alors que,
de sa sérosité et de son épiderme, la peau ne dévelop-
e sensation de douleur ! Circonstance, au reste, bien
au point de vue thérapeutique, et sur laquelle nous
s.

ngue deux *pemphigus* au point de vue de la marche: *aigu*
ue; et deux autres espèces sous le rapport de sa con-
litaire ou *confluent*. On admet une troisième variété, c'est
gus soutenu ou successif, *diutinus*. Il est vrai de dire que
nier rapport le pemphigus chronique est presque tou-
essif. Décrivons ces diverses variétés.

migus solitaire est une maladie de l'âge avancé de la vie.
rincipalement les jambes ; il naît au milieu de la hauteur
'elles, sur le tibia, par une bulle, et quelquefois par deux
volume d'un gros haricot, auxquelles se joint comme
plus souvent une troisième petite bulle. La maladie est
d'une sensation de chaleur et de démangeaison, souvent
geur que le malade ne voit pas, et sur cette rougeur une
a cache entièrement. Alors il se produit une sensation de
illeurs fort peu douloureuse pour le malade. Si la per-
lace dans des conditions de repos, la seconde et la troi-
le apparaissent dans les vingt-quatre heures et restent
lentes. Le surlendemain, toute sensation a disparu, les
t dans un état de tension très marqué. Elles restent ainsi
es pendant trois jours ; après quoi la résorption de la sé-
opère peu à peu, pour se terminer à la fin du septénaire
s jours plus tard. Cette affection est assez rare. Biett en a
is exemples, M. Gibert n'en a jamais vu ; j'ai eu l'occa-
aiter trois cas.

s aigu général. — C'est ordinairement au voisinage du

printemps que se montre le *pemphigus aigu ;* il suit alors une autre marche. Il est précédé de lassitude générale, de courbat de frisson, de fièvre avec soif, insomnie, anxiété, chaleur, agitati puis apparaissent vers le deuxième ou le troisième jour, au cou sur le haut de la poitrine, deux, trois ou quatre taches dissé nées çà et là, sur lesquelles se développent des bulles plus moins volumineuses, arrondies ou ovalaires, rénitentes, proé nentes, tantôt distantes, tantôt rapprochées, ardentes, picota ou lancinantes, entourées d'un limbe d'un rouge érythé teux. Ces bulles se multiplient et s'étendent de jour en jou gagnant la surface antérieure du corps, la surface postérieu les membres, de manière à envahir presque toute la pea huit ou quinze jours. Seulement, au fur et à mesure que de velles bulles se montrent, les premières se dessèchent. Ce y a de plus remarquable dans ce pemphigus aigu, c'est le lume des bulles, qui acquiert quelquefois une grande étendue en voit du volume d'un œuf de poule ou de dinde, et quelqu même de plus larges. Les malades sont dans l'état de malai plus grand ; outre que la fièvre avec soif accompagne cette érup ils sont dans le lit dans un état de gêne des plus marqués, par l possibilité d'exécuter des mouvements sans douleur. Notez que affection se montre ainsi chez des jeunes gens à l'époque de l où le système nerveux est le plus développé ; puis, peu à pe fièvre se calme, l'éruption cède et s'arrête. Il n'est pas indis sable qu'elle affecte toute la surface du corps ; on la voit quel fois s'atténuer au tiers ou à moitié de sa marche, et faire alor progrès rapides vers la guérison. Les bulles peuvent d'ailleurs disposées par groupes ou naître tout à fait isolées. Chacune d' contient un liquide transparent, visqueux, qui ressemble à de bumine. Au bout de deux ou trois jours de leur développen ou elles se rompent, laissant écouler leur liquide qui devien moins en moins visqueux les jours suivants, en même temps l'épiderme de la bulle s'accole aux corps muqueux, et alors l'i tion se guérit peu à peu dans ce point ; ou le liquide est comp ment résorbé, ce qui est la condition la plus favorable ; ou l'épiderme est arraché, et alors il s'établit un suintement qui

er pendant plusieurs septénaires. La durée moyenne de
: bulle est de sept jours, et celle du pemphigus aigu général
s ou quatre semaines. Le pemphigus envahit quelquefois la
, où il développe des bulles semblables à celles de la peau.
n pemphigus aigu est encore une maladie grave. Il a surtout
ctère lorsqu'il affecte les enfants dans les premiers mois ou
mières années de la vie. Il peut se lier à une inflammation du
ntestinal, ce qui ajoute à son importance. C'est le cas sur-
i, par une cause quelconque, l'éruption s'arrête brusque-
t se supprime à l'égard de toutes les bulles déjà sorties ; alors
la sérosité être rapidement résorbée, la peau recouverte de
s épidermiques à moitié déchirées, le corps muqueux et le
d'un rouge pâle ; puis une diarrhée abondante, de nature
: et glaireuse, a remplacé l'éruption. Il semble que toute la
asie cutanée se soit portée sur la membrane muqueuse in-
le. Alibert prétend même avoir observé dans le gros intestin,
erture du corps, des bulles pemphigoïdes semblables à celles
eau. Quelques dermatologistes ont nié ce fait, qui n'est pas
ible, aujourd'hui que l'on a reconnu que l'épiderme se pro-
t jusqu'à la valvule iléo-cæcale, comme il se prolonge de
che à l'orifice cardiaque. — Il résulte de cet état inflam-
e tout spécial, et suppléant à une éruption cutanée sécré-
des dangers pour la vie, si l'on ne parvient à arrêter les
s de cette sécrétion intestinale, qui devient très abon-
et qui amène des évacuations séreuses presque perma-
car cette sécrétion est d'une gravité beaucoup plus grande
le de la peau. Aussi presque tous les nouveau-nés atteints
phigus succombent-ils à cette maladie déjà très dange-
our eux ; et c'est presque toujours par le transport de
n de la peau à la membrane muqueuse intestinale que la
rvient.

mphigus de cause externe suit au contraire une autre
; il se limite à une étendue peu considérable. Ainsi, il n'est
de voir les personnes qui, par profession, ont les mains et
t-bras en contact avec des liqueurs irritantes, telles que les
rs, être atteintes de pemphigus. La maladie s'étend, en gé-

néral, au delà des parties exposées à l'action excitante, mais el limite à une surface peu considérable.

Quant au *pemphigus chronique*, il affecte les personnes âgées p cipalement, et celles qui ont été débilitées par les chagrins, par excès avec les femmes, ou par un état des voies digestives qu permet pas une alimentation suffisante. Ou ce pemphigus est *cret*, ou il est soutenu, *diutinus*. Dans le premier cas, il se mont çà et là, et à distance éloignée, une ou deux bulles dans un p donné de la surface du corps, et plus particulièrement aux jam et aux avant-bras. Ces bulles, développées d'une manière discr à de longs intervalles, mettent dix à douze jours à arriver à l desquamation. C'est moins alors la maladie elle-même que l'é général qu'il faut surveiller, car le pemphigus, quelque discret q soit, est toujours une affection qui reflète un état fâcheux de l'é nomie.

Le pemphigus à forme chronique est le plus souvent limité à membre ou à une partie d'un membre. Souvent aussi il succè un eczéma fendillé des jambes, ou à une blessure accidentelle, p contuse par exemple, qui a été accompagnée de phlegmasie ; il p siste alors avec une grande ténacité, et se renouvelle par des bu précédées de démangeaisons et de fourmillements, alors que le lade croit toucher au terme de la guérison. J'ai donné des soi une personne d'une grande fortune chez laquelle l'affection a persisté pendant dix-huit mois aux jambes, malgré les soins e avis de divers praticiens appelés auprès du malade.

Enfin, nous arrivons au *pemphigus diutinus*, le plus grave de t Il affecte le vieillard ou l'enfant à la mamelle. Il survient cause apparente connue, parce qu'en général il est le reflet état cachectique plus ou moins marqué. A part de la lassitude g rale, de la courbature des membres, d'un certain sentiment de blesse et d'un peu d'anorexie, il n'a guère d'autres prodromes ; il apparaît une, deux ou trois bulles sur un point donné du co et plutôt vers les régions inférieures que vers les supérieures lendemain, une ou deux bulles nouvelles, puis deux jours a quelques autres bulles ; et ainsi successivement, la maladie gag de proche en proche, de haut en bas, de bas en haut, finit par

: corps dans sa totalité dans l'espace d'un mois à six se-
Que deviennent les premières bulles? Les unes se dessè-
ms donner écoulement à la sérosité qu'elles contenaient;
rosité est résorbée, et l'épiderme vient s'appliquer sur la sur-
: a sécrété. Dans un autre point, cet épiderme s'ouvre, se
en lamelles larges, moitié flottantes, moitié adhérentes, lais-
nu le corps muqueux presque aussi sensible que dans le
gus aigu; mais dans cette maladie il y a toujours vingt,
cinquante, cent bulles à divers degrés soit d'évolution, soit
ption, soit de rupture, soit de dessiccation, de sorte que
surface du corps est en définitive malade. Dans ces condi-
s'exhale de la surface du corps une odeur fade, nauséa-
: toute spéciale au *pemphigus*. Le sujet qui est atteint de
ladie est dans un état d'endolorissement général, d'impres-
ité très grande au froid, ne pouvant faire un mouvement
lit sans souffrir, ayant la peau rouge, plus ou moins tumé-
gure, les mains et les pieds participant de cet état. Au mi-
s souffrances, il conserve cependant de l'appétit; les fonc-
stinales s'opèrent régulièrement; et tant que le malade se
ainsi, il faut espérer. En effet, il n'est pas très rare de voir
a la maladie s'arrêter et marcher vers la guérison. Quel-
orsque toute la surface de la peau a été envahie, que les
s parties atteintes semblent guéries, il se fait une récidive
arties mêmes, et cela deux, trois ou quatre fois pendant le
l'éruption. C'est assez dire que cette affection ne borne pas
à quelques septénaires; elle persiste deux, trois, six mois,
eux ans et plus.

: qui doit surtout fixer l'attention du médecin, c'est le vo-
s bulles: petites au début, et de la largeur d'un gros pois
haricot, elles prennent bientôt de l'accroissement pour
ensuite une large surface; puis au fur et à mesure que
n pemphigoïde perd de son intensité, le volume des bulles
; mais il est constant que le pemphigus à grosses bulles au
ra en général plus d'intensité que celui qui débute par des
lus ténues.

nt ces mois entiers pendant lesquels existe le pemphigus,

quoi de plus douloureux pour le médecin qu'un état morbide devant lequel il reste spectateur impuissant, et où tout son rôle consiste le plus souvent à surveiller l'alimentation du malade, à soutenir ses forces épuisées par une sécrétion séreuse si abondante qui amène l'amaigrissement le plus grand et le plus complet. Ces malades sont véritablement réduits à l'état de squelette; et alors la peau ne sécrète plus que des lamelles d'épiderme que quelques praticiens peuvent prendre pour celles que j'ai décrites dans le *pityriasis rubra*. C'est là une erreur. Dans le pityriasis général il n'y a aucune odeur; quel que soit l'état du pemphigus, l'odeur nauséabonde est toujours sensible. D'ailleurs le pityriasis rubra n'amène jamais l'état d'amaigrissement que nous signalons. La peau est rouge, luisante et tuméfiée, tandis qu'elle est brune et terreuse dans le pemphigus. Cette surveillance de l'entretien des fonctions de l'estomac et des intestins doit être continuelle; car si la diarrhée se montre, elle peut avoir lieu de deux manières, discrète ou excessive. Dans le premier cas, il faut l'arrêter et tout faire pour rétablir les garderobes normales. Dans le second, c'est à une sécrétion séreuse intestinale que le médecin doit parer, et à des garderobes tellement répétées qu'en peu de jours le malade est conduit au tombeau. Il semble que la sécrétion de la peau se soit transportée sur la membrane muqueuse. Telle est, il faut le dire, la triste fin et la fin la plus commune du *pemphigus diutinus* chez les vieillards. — Voici un exemple de ce pemphigus.

Louise, vingt-six ans, écrivain public, est entrée le 15 mars 1844. Habitation humide, misère pendant longtemps; tempérament nerveux lymphatique, constitution faible; jamais de maladie grave, mais santé toujours languissante; ne fut jamais réglée; est mal développée, petite, grêle, sans force; jamais de scrofules, jamais de maladie de peau. Antécédents: Pendant quatre ou cinq jours avant le début de l'éruption, fièvre, malaise, inappétence, constipation. Puis, et huit ou dix jours avant son entrée, éruption sous les aisselles et sur le côté du thorax de grosses bulles confluentes empiétant les unes sur les autres, s'étendant rapidement. Dès lors, son médecin (M. Gillette), voyant la gravité de l'affection, nous l'adressa à l'hôpital. Misère, faiblesse native. — Invasion: les côtés de la poitrine, puis bientôt toute la partie antérieure thoracique, le cou et le creux épigastrique. Bulles de la grosseur d'un haricot à celle d'une grosse noisette, souvent irrégulières et réunies les unes aux autres. Épiderme brusquement soulevé par de la sérosité citrine,

pand sur la surface rouge et dénudée. — Marche : bientôt les les bras, le haut des cuisses se couvrent de bulles, larges conflu- l se développent rapidement sur un fond érythémateux et où siége e fourmillement pendant les deux jours qui précèdent. Les bulles, iron vingt-quatre heures d'existence, se crèvent et laissent suinter ité abondante ; la peau reste au-dessous rouge.—Amidon en poudre ur les parties suintantes pendant toute la durée du traitement ; diarrhée : opium en lavements, acétate de plomb, diascordium.

s. La maladie n'a pas cessé d'augmenter, le tronc est complétement e bulles qui se crèvent et fournissent une sérosité abondante. s'étend sur les membres, mais avec plus de lenteur qu'elle n'en premiers jours. Le pouls est fréquent, l'appétit assez bon ; cette e souffre, mais ne se sent pas malade. — 13 avril. Le thorax com- e sécher ; en quelques points il est couvert d'une croûte unique qui ucoup moins de sérosité depuis quelques jours ; mais sur les lombes dénudation du derme assez étendue, qui cause de vives douleurs malade change de position. L'éruption, qui marche assez lentement, e jamais ; néanmoins les cuisses sont presque entièrement couvertes crevées et suintantes. Les jambes sont maintenant le siége principal tion et chaque matin on trouve de nouvelles bulles qui se sont déve- epuis la veille. Les bras, les avant-bras, le cou sont également pris. éral ne semble pas plus mauvais. On continue l'usage de l'amidon. il. Le visage, qui était resté sain, a été pris avec une grande inten- paupières, œdémateuses, excoriées, recouvrent les yeux, et nous la malade inquiète pour la première fois, car elle craint de perdre es extrémités sont également le siége de bulles nombreuses et il s'en e encore sur les avant-bras et sur le visage. La poitrine offre quel- its secs où les croûtes commencent à se détacher, mais sur le reste il y a d'énormes croûtes, adhérentes, divisées en petits segments, de le desquels suinte une sérosité un peu trouble et concrescible. La st affaiblie, fort maigre ; elle a demandé à se lever un peu, mais a été se recoucher. Elle a eu un peu de diarrhée peudant deux jours, arrêtée au moyen d'un quart de lavement contenant six gouttes de m. — 3 mai. L'éruption est complète et il n'y a pas un pouce carré qui n'ait été envahi, y compris la paume des mains. Sur le visage les ommencent à se durcir, les jambes sont encore à vif et sont le siége re cuisson. Il n'y a plus de suintement sur la poitrine et sur les épaules ; es tombent en quelques points. Diarrhée depuis hier, pas d'appétit. ai. La diarrhée est très vive, on a continué le tambaïan qui pendant r jours l'avait arrêtée, mais 4 grammes n'ont pu produire aucun effet ; ier, quelques vomissements. — 20 mai. Affaiblissement considérable. ents sont mal supportés, la diarrhée continue malgré les remèdes ; sé le tambaïan ; l'opium en lavements ainsi que l'acétate de plomb

n'ont pas d'effet ; diascordium, 2 grammes. — 30 mai. A la visite rien de table ; vomissement hier ; affaiblissement croissant ; diarrhée à vingt selles liquides en vingt-quatre heures. Mort à trois heures. — *Autopsie.* — croûtes sont en certains points enchâssées sur le derme, qui, du reste, semble avoir éprouvé aucune altération. L'intestin, examiné avec soin, m le siége d'aucune ulcération analogue à ce qui existe à la peau : il n'offre méme pas de rougeur exagérée et n'a rien qui le distingue des intestins les plus sai L'estomac est petit, contient un peu de bouillie blanchâtre, la muqueuse n'e pas ramollie ; l'utérus est petit, mais bien conformé ; les ovaires n'offrent rie de notable dans leur disposition. (*Observation recueillie par M. le docteu Faget, ancien interne.*)

Il est une forme de pemphigus qui n'a pas été décrite et dont l'ob servation ci-jointe donne une idée parfaite.

Pemphigus diutinus hémorrhagique. — Mademoiselle ***, âgée de qu rante-cinq ans, a toujours joui de la santé la plus parfaite ; pas de glan ni de sécrétion purulente à la tête pendant l'enfance. — Réglée à quato ans, la menstruation a toujours été régulière ; aucune maladie grave pend sa vie ; elle est, d'ailleurs, plutôt lymphatique que sanguine, quoique d'u bonne constitution.

Il y a trois ans, quelques jours après une colère assez vive qui avait am une certaine perturbation dans l'état général de la santé, perturbation tou fois momentanée, elle vit paraître aux jambes des élevures rosées, dur avec douleurs lancinantes, arrondies, et dans le genre de celles que l'on désig sous le nom d'urticaire tubéreuse. Mais au sommet de chaque tumeur élevure se montrent immédiatement des vésicules remplies de sérosité sa guinolente et de sang d'un violet foncé tout à fait semblable aux hémorri gies scorbutiques sous-épidermiques.

En quelques jours, la plaque violacée se dessine de plus en plus pour form de véritables bulles dont quelques-unes eurent plus tard jusqu'à 5 à 6 cen mètres de diamètre.

Ces bulles suivent des phases diverses : tantôt elles se dessèchent, se tran forment en une croûte sanguine noire, qui se détache peu à peu en laissa sous elle une cicatrice superficielle ; tantôt elles s'écorchent par les frot ments, et alors elles laissent à nu une véritable ulcération très profonde r couverte d'une pseudo-membrane noirâtre d'aspect gangréneux. Cette ulcé tion est d'une sensibilité extrême ; si on l'abandonne à elle-même, elle creuse à l'instar du rupia. Si on la fait tomber par des émollients, l'ulcérati cutanée est d'un beau rouge, bien bourgeonnée, et elle se guérit à mervei dans l'espace de douze à quinze jours.

Cette demoiselle voit redoubler son affection aux approches et au déc de chaque époque menstruelle ; elle habite d'ailleurs une ville saine, Cl

r-Oise. — Sa santé n'a jamais été du tout altérée; plus elle a meurs, plus elle a d'appétit. Elle est avertie de l'étendue que de-ir les tumeurs par l'intensité des douleurs qui en précèdent le déve-t.

a fait subir divers traitements, les amers et les dépuratifs sous toutes s, la solution de Fowler; elle ne peut pas supporter les bains, quoi-fait usage de bains émollients et sulfureux; la sueur augmente les

prescrit: amidon en poudre sur les tumeurs; saignée à l'approche ; jus de citron à sucer depuis un demi-citron dans la journée jus-citrons par jour; pilules de Vallet. Je n'ai jamais vu cette malade .

mphigus peut affecter les nouveau-nés à l'instar des A cet égard il existe aujourd'hui deux opinions bien tran-mi les médecins, à savoir, que le pemphigus peut être ou pas être syphilitique chez les enfants nouveau-nés. La sera plus amplement discutée à l'article SYPHILIDE, mais ésent nous nous rangeons à l'opinion qui le considère tant toujours syphilitique. M. le docteur Robert Barnes, r d'accouchements et chirurgien accoucheur du dispen-'ouest, a publié dans le n° 74, t. VI, du journal l'*Union mé-nq* faits de pemphigus développés chez des enfants de douze jours où le pemphigus n'était pas certainement sy-, et il oppose ces faits à l'opinion que nous soutenons. Mais sont pas des exemples de pemphigus de nouveau-nés; es pemphigus qui se sont développés à une époque plus ou pprochée de la naissance et dont le siége diffère comme le de son apparition. Dans le pemphigus des nouveau-nés apporte des bulles de pemphigus en *naissant* et elles siégent palmaire des mains et à la face plantaire des pieds, tandis tous les cas cités par M. Barnes les bulles se sont mon-les parties du corps où elles se produisent chez l'adulte, ire aux aisselles, sur la poitrine, le cou et les membres.

nt de vue du *diagnostic*, rien de plus facile d'après la des-que nous venons de faire que de distinguer le pemphigus nte autre maladie à l'état aigu. Quelle est celle avec laquelle ait le confondre? Cependant les erreurs en ce genre ne sont

pas rares pour le *pemphigus diutinus*, *et nous avons souvent vu p* *cette maladie* pour un *pityriasis rubra*, un *psoriasis aigu* et mê *eczéma chronique*. Il est en effet une période de cette affectior n'y a plus de bulles, où la peau ne sécrète plus, où elle est ment rouge, recouverte de lames épidermiques en partie déta épaissie et un peu humide. C'est le passage de l'état décroissan maladie à l'état de guérison, et ce passage a souvent une assez l durée, de sorte que les malades voyant une amélioration leur état sans obtenir une guérison définitive, viennent ré le secours de nouveaux médecins.

Il y a dans cet état de la peau quelque chose d'insolite qui tout d'abord : le malade exhale pendant toute la durée de so tion une *odeur nauséabonde* toute particulière et telle qu'il suffi lever les couvertures pour en être frappé. Au surplus, en causer le malade, il est rare qu'il ne vous parle pas d'ampou ont primitivement existé, ce qui tout de suite lève toute es doute à cet égard. D'ailleurs, ce ne sont pas des écailles épi ques épaisses comme dans le psoriasis ; ces écailles ne se dét pas abondamment comme dans le *pityriasis rubra;* il n'y a pluie de sérosité ni de démangeaison comme dans l'eczéma, il suffit d'une simple question pour éclaircir tous les doutes il montré des ampoules successives ? C'est que dans les mala la peau la difficulté de diagnostic n'existe pas pour la malad sante, où vésicules, bulles, papules, squames, etc., sont évi mais bien pour la maladie traitée ou datant depuis un certa de temps.

Sous le rapport du pronostic, on peut, avec Willan, dist le pemphigus en *benignus* et *diutinus* sans attacher au premie noms la signification que lui a donnée cet auteur, et dire : L phigus solitaire est une maladie de peu d'importance; le pem peut exister à éruption discrète sur une partie plus ou moins é du corps chez l'adulte comme aussi chez l'enfant, et alors il non plus de gravité. Le pemphigus aigu plus ou moins gén termine ordinairement d'une manière heureuse ; le pemphig *tinus* et chronique est toujours plus ou moins grave.

Pemphigus composé. — Le pemphigus peut se présenter

ire sous une forme composée, c'est celle d'herpès pemphi-
nsi que l'observation suivante en est un exemple.

pemphigoïde. — Le 25 février 1852, est entrée dans notre service
: âgée de cinquante ans, couturière.—La cessation de la menstrua-
nue il y a cinq ans, s'est opérée sans accidents ; comme antécé-
ents, un érysipèle à la tête survenu il y a trois ans ; un eczéma à
oite à peu près à la même époque. Elle est sujette depuis douze
ux de sang anal qui n'a amené aucun trouble dans la santé ; il a
octobre 1852. — Trois semaines après sa disparition, invasion de
pour laquelle elle entre à l'hôpital. Cette invasion a eu lieu de la
vante : La malade fut prise de démangeaison à la partie interne de la
e, suivie de grattages. Une rougeur inflammatoire *circonscrite* ap-
ôt, et sur sa surface de petites bulles de la grosseur d'une forte tête
ui, en vingt-quatre ou trente-six heures, prirent un volume va-
ds celui d'une petite lentille jusqu'à celui d'une noisette ; ces bulles
ent tous les jours au fur et à mesure que la rougeur s'élargissait
cles inflammatoires. Bientôt diverses parties du corps furent enva-
même manière, la jambe droite au voisinage de la malléole interne,
uche, la hanche droite, le dos, la région hypogastrique, les envi-
ortles génitales, la surface interne du bras gauche. A son entrée à
ffection, qui datait de quatre mois, se présente sous la forme de
nes de 10 à 15 centimètres de diamètre, rouges, mais plus colo-
irconférence qu'au centre, limitées à l'extérieur par une rougeur
une rosée, saillante, formant un ou deux bourrelets de 5 à 15 milli-
largeur ; le milieu du bourrelet excentrique un peu pâle, un peu
t sur ces bourrelets des bulles de divers volumes qui en suivent la
lont quelques-unes égalent la grosseur d'une petite noix. Tout le
es plaques est plus ou moins dégagé ou il ne présente que des dé-
les anciennes desséchées sous forme de squames ou croûtes d'épi-
blen des surfaces vives où le corps muqueux est à nu et où il y a
nent plus ou moins marqué. — La malade éprouve de la déman-
ns toutes ces plaques, mais surtout à leur circonférence. — Peu
arrivée, et sans aucune administration de médicaments à l'intérieur,
prise de diarrhée qui a été combattue par le diascordium et par les
laudanisés. On s'est ensuite borné à administrer plus tard des fer-
à donner une bonne alimentation et à saupoudrer d'amidon les sur-
des sans faire prendre aucun bain. Or, dans l'espace de quinze
Sioration a été telle qu'il ne survenait plus ni croûtes ni bulles, et
que totalité des surfaces suintantes était cicatrisée.—Depuis quatre
e femme était soumise à un traitement qui avait eu pour base les
aqueux, et la maladie avait toujours été croissant.

Si je m'étais borné à rappeler cette observation dans la pre édition de cet ouvrage, c'est que j'avais eu peu d'occasions server cette forme nouvelle qui m'avait frappé depuis peu de t mais depuis cette époque j'ai vu la maladie sous toutes ses p c'est-à-dire à l'état naissant comme à l'état le plus étendu, et suis attaché à l'observer dans sa marche et ses périodes comm les moyens les plus appropriés à son traitement. J'ai donné soins, en consultation avec mon honorable confrère M. Larch directeur de l'usine de M. François Delessert pour cette mal Ce monsieur s'était violemment heurté au-devant du tibia, et, trois semaines de là, il avait vu se développer une affection mateuse, qui bientôt s'était changée en une maladie bulleuse, le phigus. C'est alors que je fus mandé, et je reconnus qu'à plu centimètres autour des plaies résultant d'un choc violent, il e une série de portions de cercles sur lesquelles on voyait des bu divers volumes; au centre ces cercles semblaient se guérir pou remplacés à la circonférence par une rougeur assez vive sur la se montraient de nouvelles bulles, de sorte qu'incessamm maladie gagnait en surface, laissant au centre des rougeurs recouvraient de larges croûtes et qui suintaient çà et là. D'a le liquide des croûtes était séreux d'abord, lactescent ens presque purulent. Cet état bien constaté, je n'hésitai pas à riser toutes ces rougeurs de la circonférence avec une solut nitrate d'argent au 10e, et je vis avec plaisir que cet essai dans plusieurs points, réussissait. Je bornai ainsi le mal, et quai ensuite le centre de la même manière. La glycérine, les cations avec le vin et la poudre de quinquina, un régime fo et ferrugineux à l'intérieur complétèrent la guérison, que l'usage d'un bas élastique.

Mais j'ai vu le pemphigus herpétiforme envahir souvent corps. Des malades ont même succombé d'épuisement à ce ladie comme succombent ceux qui sont atteints de pemph ne faudrait donc pas heurter ou enrayer le pemphigus c début par la solution de nitrate d'argent.

Je renvoie le pemphigus des nouveau-nés à l'histoire des lides.

itement. — Il est essentiellement expectant. Mais en présence état fébrile, il n'y a pas lieu à une émission sanguine, car il ne es perdre de vue que le malade peut être appelé à subir une ion séreuse plus ou moins considérable qui amènera une dé- tion très grande de forces. Dans le *pemphigus aigu*, les rafraî- nts à l'intérieur, le séjour au lit, et de l'amidon en poudre sur illes : rien autre chose. Cette poudre d'amidon, c'est le seul et ible remède à toutes les formes de *pemphigus*. En effet, en thèse ale, toute sécrétion séreuse et bulleuse de la peau repousse nollients liquides ; les bains surtout doivent être exclus du trai- nt, si ce n'est toutefois à la dernière période de la maladie, n'il ne se forme plus de bulles depuis un certain temps : on alors *tenter l'emploi* de bains résolutifs légèrement additionnés sous-acétate de plomb ou de sublimé à faible dose. On con- ette forme dubitative : déjà les malades ne peuvent exécuter le légers mouvements très douloureux dans leur lit ; les condi- de transport dans le bain et de sortie, l'impossibilité d'essuyer lade, sont par conséquent fort nuisibles ; mais il y a plus, toute rompue donne accès à l'air dans son intérieur, et nous avons ie ce contact de la peau avec l'air était très douloureux ; enfin, st là un des motifs les plus puissants : en hiver, l'impossibilité yer le malade fait qu'il a toujours froid en sortant du bain, ce ut être cause d'une répercussion des plus graves.

ut aux corps gras à l'extérieur, je ferai remarquer que de- quelque temps la glycérine m'a rendu de notables services, e l'emploie dans bon nombre de cas : une couche très légère e avec un pinceau matin et soir ; de l'amidon à dose très fe : ne faire que saupoudrer légèrement toutes les bulles et dénudée avec une houppe à poudrer.

ndant, et comme en toute chose il y a restriction, il arrive ent où dans la période décroissante du pemphigus l'amidon le sérosité fait naître des croûtes très épaisses, dont la pres- douloureuse et dont les mouvements des malades dans le ent l'arrachement. C'est alors qu'il faut, contraint et forcé, n bain au malade, afin de les faire tomber. Ils vous diront it alors dans un état de bien-être très prononcé, et vous

solliciteront de le renouveler. Il ne faut le faire qu'avec une gr réserve. Il n'en est plus de même lorsque toute sécrétion a com tement cédé et qu'il ne reste plus qu'un état écailleux de la p avec production d'épiderme qui se détache peu à peu dans le lit peut alors administrer des bains de sublimé à 4 grammes sauf augmenter peu à peu la dose, ou mettre en usage une pomma l'huile de cade ou au goudron, mais au 40e ou au 50e de son p

Un bon régime alimentaire, composé principalement de via rôties, l'usage intérieur des ferrugineux, de quelques amers, vent faire la base du traitement interne.

Reste à porter remède au flux diarrhéique qui succède sou au *pemphigus*, ou à la diarrhée qui l'accompagne alors qu'il e depuis longtemps. Les lavements laudanisés et amidonnés, le cordium, le ratanhia et surtout les lavements que nous avons seillés depuis longtemps pour combattre la diarrhée des phthisiq ayant pour base le sous-carbonate de plomb provenant de la déc position instantanée de l'acétate de plomb par le carbonate de s (voy. *Formulaire*, LAVEMENTS), tels sont les moyens que l'on mettre en usage. Ici on a difficilement la ressource de dériv sur la peau par l'huile de *croton tiglium* ou les sinapismes ; la p a été si longtemps malade, que l'on redoute l'emploi de ces moy C'est surtout à l'aide d'une hygiène de tous les instants qu'il s'attacher à prévoir cet accident ; car il est si terrible dans cette m ladie, que lorsqu'il se montre on a peine à y parer.

ECTHYMA CACHECTICUM, *luridum ; ecthyma rupiforme.*

Cette maladie n'est qu'une variété d'ecthyma, et il était nat qu'elle trouvât sa place dans l'histoire de l'ecthyma en géné C'est ce que nous avions fait dans la première édition de cet ouvrage. Mais sa nature, ses causes, sa marche, ses produits m bides et son développement, la rapprochent tellement des qu autres maladies qui composent le groupe dont nous nous occ pons aujourd'hui, que nous n'avons pas hésité à rompre avec passé et à en tracer l'histoire à côté d'elles.

On verra plus loin (voy. MALADIES PUSTULEUSES) que l'ecthy

était une maladie franchement inflammatoire avec un développement rapide, et avec des phénomènes généraux assez développés parfois pour nécessiter une saignée générale ; l'évolution de l'affection de la peau étant prompte et l'éruption se terminant dans un espace de temps assez limité. Ici l'*ecthyma cachecticum* est souvent successif, ses pustules sont plus ou moins disséminées.

Dans cette maladie, les pustules d'ecthyma sont plus larges ; elles sont entourées d'un engorgement inflammatoire d'un rouge livide de mauvais aspect, en même temps que la vésicule de la pustule, qui est unique, se remplit d'un mélange de pus, de sanie, de matière ichoreuse du genre de celle de la matière du rupia, au lieu de n'offrir que du pus : aussi se produit-il assez rapidement une croûte brunâtre, plate, sèche, devenant même noire dans quelques cas. Une humeur sanieuse et purulente s'écoule de dessous cette croûte, et si on la fait tomber, on trouve qu'elle recouvre un ulcère de mauvais aspect, à teinte grisâtre. D'ailleurs la maladie apparaît par des pustules isolées, larges, d'un mauvais aspect ; une seconde succède bientôt à la première, puis une troisième, une quatrième ; mais toujours plus ou moins espacées les unes des autres, occupant plutôt les membres inférieurs que les membres supérieurs. Elles parcourent leurs périodes dans un espace de temps très long, plusieurs semaines ; elles donnent parfois écoulement à une sanie sanguinolente. Elles se dessèchent et se guérissent lorsque l'état général est meilleur : aussi tout ce que nous dirons plus loin des phénomènes généraux du rupia peut-il être appliqué à l'ecthyma. Comme on le voit, cette variété mérite à juste titre le nom d'*ecthyma rupiforme* ou *cachecticum*. Elle survient d'ailleurs chez des sujets affaiblis, épuisés par le travail et par le défaut d'une nourriture suffisante, ou à la suite de chagrins qui amènent en définitive un affaiblissement notable des forces physiques et morales.

On le distingue du rupia par l'isolement de ses pustules et par la présence même de celles-ci, le rupia étant une affection vésiculeuse ou bulleuse sans engorgement inflammatoire très nettement dessiné et presque toujours à forme confluente formant des plaques ou croûtes plus ou moins épaisses. Le traitement est le même que celui du rupia. Nous aurions pu, avec plus de raison peut-être,

faire de cette espèce d'ecthyma une variété de rupia plus qu'une maladie, et il y a lieu de croire que plus tard nous en aurons là ; nous décrivons donc cette affection à part plutôt pour satisfaire au passé et pour ne pas heurter tout à fait de front les idées reçues.

RUPIA de ῥύπος, ordures, vilenies ; ou ῥυπάω, salir, souiller.

Simplex.	*Compositum.*
Proeminens.	*Herpès rupiforme.*
Non proeminens.	*Impétigo rupiforme.*
Escharotica.	*Ecthyma rupiforme ou cachectique.*

Willan n'a pas décrit particulièrement cette maladie qu'il a confondue avec l'*ecthyma*. Bateman en a esquissé les principaux traits. Depuis, tous les auteurs en ont fait avec raison une maladie à part. Biett en a fait une affection *bulleuse ;* Bateman une éruption *phlyténoïde*, et les auteurs qui les ont suivis ont successivement varié d'opinion à cet égard ; mais la plupart ont rangé le *rupia* parmi les bulles, à l'instar de Biett. Sans attacher une grande importance à cette forme primitive du mal, je crois que cette maladie doit être mise au nombre des éruptions cutanées à forme vésiculeuse. En effet, lorsqu'on l'observe à sa naissance, on voit apparaître trois, quatre ou cinq vésicules confluentes, du volume d'une très petite lentille, se touchant par leur circonférence, *et se confondant bientôt entre elles pour ne plus former qu'une phlyctène*, ce qui a donné lieu à l'erreur. Ces vésicules se remplissent en quelques heures d'un liquide séro-sanieux d'abord, qui devient très rapidement purulent, en sorte que ce n'est ni de la sérosité, ni du pus, ni de la sanie, c'est un mélange de ces trois produits de sécrétion qui donne à la vésicule un aspect tout particulier, aspect qui a le reflet d'une production de mauvaise nature. Dans l'espace de trente-six à quarante-huit heures, ces produits de sécrétion se sont concrétés sous la forme d'une croûte, et c'est ici que commence à se dessiner quelle sera la forme du rupia. Est-il *simplex*, comme le disent à tort les auteurs puisqu'il n'est pas plus *simplex* dans un cas que dans l'autre ; et mieux est-il, comme nous l'appelons, *non proeminens*, alors une

croûte d'un brun noirâtre, aplatie, occupant l'étendue des vésicules, se forme peu à peu, adhère à la surface sans offrir de sécrétion apparente. Mais par la suite il peut s'échapper de jour en jour, par un des points de la circonférence de cette croûte, une humeur sanieuse qui salit le linge à pansement; ou bien, s'il n'y a aucune sécrétion sensible, on voit la croûte faire des progrès en surface, s'élargir tout en conservant sa forme et son peu d'épaisseur. Ce que l'on observe le plus souvent dans cette variété de rupia, c'est l'écoulement de sang, après une marche relativement un peu trop forte, ou après l'arrachement d'une partie de la circonférence de la croûte, et alors dans quelques cas l'abondance du sang est telle qu'elle constitue une petite hémorrhagie. Je dis hémorrhagie, parce que le sang qui s'écoule est tellement séreux, tellement fluide, qu'il faut quelquefois une compression méthodique pour l'arrêter. Il en résulte toujours un grand affaiblissement, surtout dans les conditions où se trouve l'individu affecté.

Mais, sous cette croûte noirâtre de mauvais aspect qui a remplacé les vésicules, existe d'abord une érosion de la peau, puis une ulcération. Celle-ci, lorsqu'on la met à nu par l'application de cataplasmes, de cérat, d'un corps gras, a l'aspect sanieux des ulcères de mauvais caractère. Elle devient douloureuse à la pression, douloureuse au contact de l'air, en sorte que les pansements en sont très pénibles pour les malades.

Tel sont les caractères du rupia *non proeminens*. Ceux du *rupia proeminens* diffèrent notablement. Le début de la maladie est le même; mais la croûte qui se forme, au lieu d'être noire et aplatie, est grisâtre ou d'un gris noirâtre et légèrement bombé. Cette croûte adhère et bientôt, dans l'espace de vingt-quatre a quarante-huit heures, on la voit s'élargir par un cercle teinté de gris brunâtre formant une ligne distincte et saillante à la fois, comme si une deuxième croûte lamelleuse et plus large s'était produite sous la première pour la soulever ou lui donner plus d'épaisseur en même temps que plus de largeur; dans l'espace de quinze jours ou trois semaines, il se forme ainsi une série de cercles comme *posés* les uns sous les autres et de plus en plus larges, au point de figurer exactement l'aspect et la forme que donne une écaille d'huître. La croûte pri-

mitive constitue la partie la plus saillante de cette croûte proéminente ; du reste, même ulcération dans cette variété.

Nous avons donné là les caractères de deux formes bien tranchées, mais nous serions incomplet si nous n'ajoutions que dans un bon nombre de circonstances il se produit des nuances qui sont loin d'être aussi tranchées.

Si ces deux variétés se distinguent entre elles par la forme et l'aspect des croûtes, elles se distinguent encore par le siége et la généralité de la maladie, ainsi que par les individus qu'elles affectent. Le rupia *non proeminens* se montre le plus ordinairement aux extrémités inférieures, par plaques croûteuses ou groupes de vésicules isolées, disséminées et espacées les unes des autres de manière à se distancer très sensiblement. — Le *rupia proeminens* présente un développement de croûtes assez ramassées ou rapprochées les unes des autres. Il atteint souvent les membres supérieurs, le tronc, soit en avant, soit en arrière, et, quand il est syphilitique, c'est plutôt sous cette forme qu'il se développe que sous celle de *rupia non proeminens*, en même temps qu'il se manifeste à la figure au voisinage des ouvertures naturelles, et surtout en dessinant un groupe de croûtes disposées en demi-cercles. Ces croûtes affectent alors quelquefois la largeur des valves des petites huîtres. (Voy. SYPHILIDES.)

Le *rupia non proeminens* peut se montrer à tout âge, chez les sujets jeunes comme chez les personnes âgées. Le *rupia proeminens* affecte surtout les personnes avancées en âge. Le tempérament, la constitution, n'ont d'ailleurs aucune influence sur le développement de cette maladie, quoique quelques auteurs aient fait jouer au tempérament lymphatique un rôle dans sa production.

Quant au *rupia escharotica*, c'est une variété que l'on observe souvent chez les enfants à la mamelle, et chez eux c'est la forme ulcéreuse qui se montre. Il semble qu'à cet âge la sécrétion morbide ne soit pas assez plastique pour donner lieu à des croûtes ; aussi en résulte-t-il des ulcères sanieux plus ou moins nombreux qui fournissent une humeur de mauvaise nature dont l'odeur vient ajouter une gravité de plus à une maladie déjà si grave.

La statistique nous montre cette affection dans une proportion assez considérable par rapport aux autres maladies de la peau ; 54 fois

sur 1800 cas, soit 3 pour 100. Sur ces 54 cas on en compte 18 de 15 à 25 ans, 10 de 25 à 35, 14 de 35 à 45, 4 de 45 à 55, et 5 au-dessus de cet âge. On voit donc qu'elle se développe à toutes les époques de la vie et qu'elle n'est pas l'attribut de la vieillesse ; mais, par rapport à la constitution des sujets, nous trouvons notée une mauvaise constitution 20 fois sur 48, et si l'on en avait tenu plus de compte il est probable que ce chiffre serait beaucoup plus élevé. Cette maladie est essentiellement à forme chronique, car sur 34 cas on en trouve 3 datant de moins d'un mois, 20 datant d'un mois à un an, 11 de plus d'un an. C'est en été ou en hiver qu'elle se montre principalement, car sur 39 cas, 25 se sont développés également dans ces deux saisons, et 14 seulement au printemps et à l'automne. Quant aux parties atteintes, les jambes sont cotées par le chiffre 37, les cuisses par le chiffre 20 ; la face, la poitrine, les avant-bras, par le chiffre 13 ; le cuir chevelu, les mains et le dos, par le chiffre 7 ; le ventre, le cou et les pieds, par le chiffre 3 : et, chose remarquable, les parties génitales n'ont pas été atteintes une seule fois. La complication syphilitique est notée 18 fois sur 54 cas.

Cette maladie, ainsi qu'on a pu le voir par les données statistiques précédentes, a toujours une marche très lente, en rapport d'ailleurs avec son développement. L'affection est souvent fâcheuse, en ce sens que la cause qui développe le rupia, étant générale, fait naître ou entretient la maladie en raison de sa permanence ; mais quoiqu'elle ne sécrète pas en abondance, elle tend à amener la déperdition des forces chez un sujet qui sous ce rapport était déjà épuisé avant le développement de l'éruption cutanée. Aussi voit-on ces individus languir plus ou moins affaiblis pendant des mois, des années, se nourrissant mal, sujets à l'anorexie, à la diarrhée, phénomènes qui viennent contribuer à l'épuisement général, et, il faut le dire, qui conduisent souvent les malades au tombeau. C'est en effet la maladie qui, avec le *pemphigus*, amène le plus souvent la mort. Celle-ci est d'autant plus prompte que les soins sont moins bien entendus, soit localement, soit généralement. Localement, quand par des pansements réitérés, des bains, on met à nu tous ces ulcères cutanés, qui deviennent douloureux à l'air, qui sécrètent avec d'autant plus d'abondance qu'on les panse plus souvent. Cette sécrétion et cet état

si douloureux, ajoutés à une maladie aussi grave, ne peuvent qu'exercer une influence fâcheuse sur le mode de terminaison de l'affection. C'est qu'en effet, si l'on détache les croûtes, les ulcérations vont toujours en s'élargissant et en sécrétant de plus en plus de la sanie, ou si le traitement général est mal institué, les croûtes prennent de plus en plus d'étendue. Dans l'hypothèse d'une guérison, au contraire, les croûtes deviennent stationnaires; elles sont de moins en moins humides, elles se dessèchent ; elles se détachent peu à peu par leur circonférence; elles finissent par tomber et laissent une cicatrice presque aussi large qu'était la croûte, cicatrice d'une teinte violacée, froncée, ondulée, inégale, et qui est tellement indélébile, qu'à tout âge de la vie il est possible de la reconnaître à sa forme arrondie ou au moins ovoïde, à l'inégalité de sa surface, à sa dépression, à l'absence de plicature comme dans les cicatrices de la brûlure.

Diagnostic, causes, traitement. — Après les détails dans lesquels nous sommes entré sur les caractères du rupia, il est impossible de confondre cette maladie avec aucune autre; tout au plus pourrait-on la rapprocher de l'*ecthyma cachecticum*. Mais dans cette dernière affection les pustules nettement arrondies, suivies de croûtes sanieuses, sont tellement petites par rapport à celles du rupia, que toute erreur nous paraît impossible. Il est évident qu'il ne s'agit ici que du *rupia non proeminens ;* quant au *rupia proeminens*, il ne ressemble à aucune maladie.

Le pronostic du rupia sous la forme même la plus discrète est toujours fâcheux, sinon grave; il reflète une constitution altérée. A plus forte raison lorsqu'il est étendu, multiple, disséminé, et qu'il atteint le vieillard ou l'enfant. Dans les deux cas, l'âge vient ajouter son influence aux causes prédisposantes du rupia et imprimer à cette maladie un cachet souvent mortel. Quoi de plus grave, en effet, que le rupia des enfants à la mamelle? La nature syphilitique de la maladie n'exclut pas sa gravité, car le rupia ne se montre chez le sujet atteint de syphilis que parce que la constitution est affaiblie. La forme des syphilides est une conséquence des conditions dans lesquelles se trouve l'individu sous le rapport du tempérament, de la constitution, de la structure de la peau et de l'état général. Celui qui est lymphatique n'aura jamais que des syphi-

ides sécrétantes; la personne disposée aux affections squameuses ne pourra être atteinte que de syphilides squameuses; celle qui est d'un tempérament nerveux sera affectée de syphilides papuleuses, etc.

Les *causes* de cette maladie sont de celles qui atténuent la richesse du sang, qui en diminuent la fibrine et le fer, en portant essentiellement atteinte à la nutrition, ainsi que nous le disions dans l'exposé des motifs de notre quatrième groupe. Misère, chagrins prolongés, mauvaise alimentation, travail au delà des forces, voilà ce qui amène le rupia, et ce d'autant plus facilement que le sujet est plus naturellement débilité. Ce que nous ignorons entièrement, c'est la raison pour laquelle il se montre ici un *rupia non proeminens*, là un *rupia proeminens*.

Traitement. — C'est à tort, suivant nous, que les dermatologistes recommandent de faire tomber les croûtes de rupia, de panser tous les jours les ulcères sous-jacents avec des corps gras, de la charpie humectée de vin aromatique, de décoction et de vin de quinquina, etc., etc. Nous pensons à cet égard d'une manière tout opposée, et nous insistons fortement sur ce précepte, qu'il faut autant que possible conserver la croûte du rupia sur l'ulcère, quelle que soit d'ailleurs la forme de cette croûte. C'est un moyen d'éviter à un malade déjà affaibli des pansements douloureux qui contribuent puissamment à aggraver son état.

Nous nous bornons à saupoudrer d'amidon les surfaces malades; nous ne prescrivons aucun bain, parce que ces bains affaiblissent sans bénéfice aucun, et parce que les ulcères mis à nu éprouvent du contact de l'air des effets fâcheux.

Là n'est pas le véritable traitement du rupia; c'est par la médication interne que la guérison des ulcérations doit avoir lieu, car tout traitement externe, fût-il le plus efficace, ne fera que guérir momentanément une ulcération qui sera bientôt suivie d'une nouvelle éruption. Notre méthode a d'ailleurs l'avantage de juger des effets de la médication interne mise en usage et de diriger le médecin dans son emploi. Quant on agit ainsi, on voit peu à peu la suppuration se tarir, les croûtes se dessécher, quelques points de leur circonférence se détacher pour tomber plus tard en totalité et laisser

une surface complétement cicatrisée. Voici au surplus en quoi consiste le traitement. Les ferrugineux sous toutes les formes, les amers, les toniques, le vin et une alimentation substantielle contenant beaucoup de matière nutritive sous un petit volume. La nourriture doit être proportionnée aux forces digestives du malade. De bon bouillon, des viandes rôties, l'eau ferrée aux repas, le sirop d'iodure de fer, etc., etc. Mais ce qu'il faut surtout surveiller, c'est la diarrhée, à laquelle le médecin doit parer immédiatement afin d'éviter l'épuisement du malade. Et quant aux hémorrhagies qui surviennent si souvent dans le *rupia non proeminens*, on doit les prévenir ou les arrêter par le repos, un bandage compressif sur le membre, et au besoin une compression douce exercée sur la plaque de rupia. C'est d'après les mêmes indications générales qu'il faut parer au *rupia infantile* des enfants à la mamelle.

Formes composées du rupia. — Impétigo rupiforme ou scabida. — Cette variété est assez commune chez les sujets lymphatico-sanguins, à l'époque du printemps et à la suite d'excès de travail et de fatigue. Elle a pour caractères des pustules ordinairement un peu plus volumineuses que celles de l'impétigo, tout aussi confluentes, mais qui, au lieu de sécréter un pus franc, se remplissent d'un mélange de sérosité et de sanie. Il en résulte une croûte d'un jaune grisâtre et brunâtre, épaisse, parfois sanguinolente, qui recouvre toute la partie affectée, en même temps que la surface croûteuse est environnée de pustules d'impétigo disséminées. Cette éruption est donc évidemment mixte. — Elle a deux siéges principaux, les jambes et la figure. Quand elle siége à la figure, on la confond souvent avec le *lupus exedens;* elle débute ordinairement au nez et elle envahit rapidement les joues et le menton. Ce qui surtout fortifie dans ce diagnostic, c'est la ténacité de cette affection : on a pu voir que l'impétigo aigu était de courte durée, qu'il se guérissait facilement ; d'une autre part le rupia est dans des conditions tout opposées ; la forme mixte de l'impétigo rupiforme participe de l'une et l'autre maladie. Comme l'impétigo, il apparaît avec rapidité dans une assez grande surface, mais jamais d'une manière diffuse ; comme le rupia, il ne cède que par un traitement interne approprié. Sous ce rapport même, et lorsque le *rupia* existe à la figure, il est souvent

is difficilement curable que le lupus. Au moins les agents pro-es à guérir le lupus ont beaucoup moins d'action sur lui. J'ai eu ns mes salles deux malades chez lesquels cette affection a été ssi dessinée que possible. Chez l'un, jeune homme de vingt-cinq s, ébéniste, l'impétigo rupiforme s'est développé à la partie an-rieure et interne de la jambe gauche, dont il a envahi presque ute la surface, dans la moitié antérieure de sa circonférence. C'est la suite d'excès de travail que l'éruption s'est montrée. Pour lui-là il a suffi de repos, de pansements simples à l'amidon, e bains, de l'usage interne des ferrugineux et des sulfureux lorsque 'état aigu a été tombé, pour amener la guérison. L'autre malade tait un jeune homme de seize ans, qui depuis six mois se trouvait à l'hôpital ; sa maladie datait de quatorze mois. Elle occupait, à son entrée dans notre service, les trois quarts de la figure, où elle avait envahi le nez, la presque totalité des joues, le pourtour de la bouche et le menton. Toutes ces parties étaient épaisses, recouvertes de croûtes purulentes et sanieuses, et sécrétaient en abondance un liquide de cette double nature. Le tempérament lymphatique de ce jeune homme nous détermina à prescrire le traitement que nous employons contre le *lupus exedens*, l'huile de foie de morue, le sirop d'iodure de fer, le vin de gentiane, etc. En effet, il en résulta pen-dant les trois premiers mois une amélioration très notable; mais, puisque la maladie fut réduite au quart de la surface qu'elle occu-pait, nous avons dû lutter sans cesse contre ces portions rebelles, au moyen de l'iode caustique, des solutions de nitrate d'argent, de l'huile de cade, et enfin du caustique de Canquoin, qui seul a pu compléter la guérison de cette cruelle affection. C'est qu'il faut savoir que sous ces croûtes purulentes et sanieuses la peau n'est pas lse ou légèrement excoriée; elle est ulcérée, bourgeonnée, comme tuberculeuse, lorsque cet impétigo rupiforme dure depuis long-temps. Les détails dans lesquels nous venons d'entrer suffisent pour indiquer la marche que le praticien doit suivre dans cette forme compliquée de rupia; nous n'y insisterons pas plus longtemps.

Herpès rupiforme. — Cette variété n'a pas non plus été décrite. Je l'ai vue plusieurs fois, mais toujours sous la forme de *rupia proe-minens*. Le cas le plus remarquable que j'aie observé en ce genre était

celui d'un jeune homme de dix-sept ans qui depuis cinq mois pré-
tait cette affection. Elle occupait presque toute l'étendue de la cuis
et de la jambe droite, où elle avait pris naissance par quatre poi
différents : à la partie interne de la cuisse, en dehors du genou,
la partie interne de la jambe et sur le cou-de-pied. C'était en dedans
de la jambe que la maladie s'était montrée par des vésicules
bulles devenues croûteuses en peu de temps, et qui, par un dévelo
pement successif à la circonférence, s'étaient élargies, tout en se dé
gageant au centre de la partie malade et y laissant alors comme
une surface de peau chagrinée plutôt que cicatrisée, mais non ma
lade. L'affection, en s'élargissant de plus en plus dans chaque
plaque, avait fini par former autant de cercles composés d'une suc
cession linéaire de croûtes de *rupia proéminens* très dessinées,
affectant le volume d'un segment de noix, ayant d'ailleurs l'aspect
du rupia. Ces divers points n'avaient pas été atteints au même mo
ment, de sorte que la plaque d'herpès de la jambe avait envahi
presque toute la surface de cette partie en la contournant; celle de
la cuisse avait gagné la moitié de sa hauteur et les deux tiers de
circonférence ; celle du genou était plus petite que celle de la cuisse
et celle du pied plus petite que celle du genou. Tout le membre
était donc affecté. Cette maladie était tellement remarquable, que
nous la fîmes reproduire par le dessin. Les cercles étaient d'ailleurs
entiers, sans intersection. Ce n'était donc pas là de ces syphilides
ou rupias syphilitiques à formes elliptiques, comme on les rencontre
si fréquemment, et qui, tout en guérissant, laissent des traces
cicatrices profondes ; c'était bien l'herpès circiné, mais dont le bour
relet était formé par des plaques de rupia. Nous avons guéri ce ma
lade dans l'espace de quatre mois, à l'aide d'un traitement très com
posé, le plus complexe de ceux qui sont relatés dans l'exposition de
nos médications mixtes (voy. cette médication). Nous nous sommes
demandé si, en présence d'un tel état, il n'y avait pas là une maladie
héréditaire de forme à la fois scrofuleuse et syphilitique. Ce malade
était orphelin et il n'était pas possible d'avoir aucun renseignement
sur sa famille. Aujourd'hui nous n'hésitons pas, en présence des nou
veaux faits que nous avons observés, à le considérer comme étant
cette nature. (Voy. l'histoire de la scrofule syphilitique héréditaire

PURPURA.

lorme :
Febrilis.
e. — *Sine febre.*
apparences morbides :
simplex.

Purpura ecchymotique.
Purpura hémorrhagique.
Suivant sa forme composée :
Purpura urticans.

» dans les auteurs une grande divergence d'opinions sur
e d'envisager les variétés de purpura dans leur ensemble.
plus grand nombre a-t-il décrit plutôt les espèces que la
de l'affection. Cette circonstance tient peut-être à ce qu'il
l'envisager le même phénomène sous deux points de vue
opposés. Ainsi, ce qui caractérise le purpura, c'est la trans-
lu sang à travers les vaisseaux capillaires, produisant d'ail-
peau deux caractères particuliers : une simple coloration
disparaissant pas par la pression du doigt ; ou cette colo-
ns l'épanchement et l'infiltration du sang dans le tissu de
dans le tissu cellulaire sous-cutané : de là l'ecchymose.
membranes muqueuses ce double phénomène peut se
st de plus un troisième, la transsudation du sang à la sur-
membrane d'où il s'échappe comme d'une éponge ; de là
rhagies.
effets se présentent à nos yeux dans deux conditions tout
la forme active et la forme passive. Dans la première, in-
le saignées et d'antiphlogistiques ; dans la seconde, em-
ploire de toniques et d'un régime animal propre à donner
lus de force et de plasticité. Le sang lui-même justifie ces
» traitement, puisque dans le premier cas il est plastique
eux, et que dans le second il est fluide et peu coagulable.
causes tout opposées donnent lieu au même phénomène
squ'il est constant que le purpura chronique est généraleı
des antécédents de misère, de mauvaise alimentation, de
de chagrins plus ou moins prolongés.
lonc une maladie caractérisée par la transsudation vascu-
sang produite par deux ordres de causes tout à fait diffé-
ni exige par conséquent deux traitements opposés. Or il

répugne à l'esprit de l'expliquer dans les deux cas de la mê manière ; car, si dans le purpura aigu le sang est plastique, infla matoire, comment s'échappe-t-il des vaisseaux capillaires? Ce r sultat se conçoit au contraire à merveille dans l'hypothèse d' sang pauvre, rendu fluide et non coagulable par les mauvaises co ditions de nutrition dans lesquelles l'individu s'est trouvé.

L'explication à part, ne devient-il pas rationnel d'admettre, d'ap les faits observés, un purpura actif et un purpura passif, ainsi qu' admet des hémorrhagies actives et passives? Aucun phénomène m bide ne se rapproche plus en effet des hémorrhagies que le pu pura, et nous ne voyons pas de motif pour ne pas adopter à c égard les idées qui nous dirigent dans la pathologie des hémorr gies. Elles vont donc nous servir de guide dans la description q nous allons faire du purpura.

Dans ces deux conditions de *purpura* viennent naturellement ranger les trois variétés de purpura, *simplex*, *urticans*, *hæmorr gica*, que la forme en soit aiguë ou chronique, qu'elle ait lieu av ou sans fièvre. Donnons les caractères de chacune d'elles, sans tenir compte des différences qui sont propres à leur invasion, la marche, leurs apparences particulières, leur terminaison et leur tra tement. Mais établissons tout d'abord les caractères essentiels d tout *purpura*.

Le purpura se présente sous forme de taches plus ou moins ar rondies, d'aspect érythémateux, variables en dimension depuis la largeur d'une lentille jusqu'à plusieurs centimètres de diamètre d'un rouge en général assez obscur, sauf le cas d'état aigu, m n'ayant jamais cette teinte rosée efflorescente de l'érythème. Ce couleur est d'ailleurs uniforme et a pour *cachet tout spécial* de n pas disparaître par la pression du doigt. Or, dans toute rougeur in flammatoire, le sang, affluant dans le système capillaire de la pea amène la coloration de ce tissu ; mais par la moindre pression qui fait refluer le sang dans les alentours du point comprimé, pa qu'il peut être déplacé par la pression. Dans le purpura, au co traire, non-seulement le sang a injecté les vaisseaux capillaires, m encore il a transsudé à travers leurs parois, et il s'est épanché da la membrane celluleuse de ses vaisseaux d'où il ne peut pas être d

placé par compression. De là une distinction très facile entre le purpura aigu ou chronique, d'avec toute autre coloration rouge de la peau. Ce caractère est constant, à l'abri de toute erreur ; il suffit donc pour établir le diagnostic de la maladie. Ceci posé, passons en revue chaque espèce de purpura.

Purpura simplex. — Il faut désigner sous cette épithète une variété de cette maladie, dans laquelle il n'existe à la peau autre chose que des taches variables en largeur, tantôt sous forme de simples pétéchies pouvant affecter toutes les parties du corps, tantôt sous celles de plaques plus ou moins larges. Elle se montre dans l'état aigu, principalement chez l'enfant, et alors elle est accompagnée d'un état fébrile plus ou moins marqué, précédé d'ailleurs dans son développement d'un sentiment profond de lassitude, d'abattement, de frissons plus ou moins marqués, de céphalalgie, d'oppression, quelquefois de nausées, d'envies de vomir et de vomissements. Ces prodromes ont deux à trois jours de durée, quelquefois plus ; parfois aussi le purpura est précédé de taches érythémateuses qui changent de caractère lorsque celui-ci fait invasion.

Le *purpura simplex* non fébrile se rattache ordinairement à d'autres causes que celles qui sont capables de développer l'ensemble des phénomènes précédents. Ainsi à la suite de chagrins, de fatigues, de misère, ou en présence de gastralgies ou d'entéralgies, de gastro-entérites chroniques qui ne permettent pas une alimentation suffisante, on voit se développer à la peau, après un sentiment de faiblesse, d'abattement, de lassitude générale qui remonte à plusieurs jours, des taches de purpura. Leur siége est ordinairement aux extrémités inférieures, en dedans des jambes et des cuisses. Mais la maladie peut être plus étendue et occuper toute la surface du corps. Les taches sont généralement plus larges que dans le purpura aigu ; l'invasion de l'affection est lente, mais son développement est successif, continu, soutenu ; c'est ce qui a lieu surtout dans les cas où elle est liée à une maladie gastro-intestinale ; l'éruption se fait plutôt pendant la nuit que pendant le jour : le malade s'éveille avec deux, trois ou quatre taches de plus que la veille.

Une fois l'éruption opérée, les symptômes généraux n'ont pas cessé pour cela, le sentiment de fatigue, de lassitude, est permanent ;

il règne en l'absence de la fièvre une prostration marquée, une t dance au repos, un défaut d'énergie et de résistance à l'accom sement des actes journaliers de la vie sociale. En même temps l pétit diminue ; la digestion est difficile, lente, pénible ; la figure étiolée ; en un mot, tout l'ensemble se ressent quelquefois de q ques taches de purpura disséminées çà et là et dont le peu d'étend ne paraît pas justifier un état général aussi grave, un moins imp tant pour le malade. C'est qu'en effet c'est là le propre de tout morbide de la peau, qui n'est qu'un reflet d'un état morbide géné de l'économie.

Purpura simplex ecchymotique. — C'est plutôt sous la fo chronique que cette deuxième variété débute que sous la fo aiguë, quoiqu'elle puisse affecter les deux ; mais dans l'une et l'autre le purpura est plus grave. Le sang ne se borne pas à s'i trer dans le tissu cellulaire propre aux vaisseaux capillaires s'épanche dans les mailles du tissu cellulaire de la peau, et m dans le tissu cellulaire sous-cutané, pour en remplir les vacuol constituer alors de véritables ecchymoses. Aussi se présente-t-il m des taches à l'égard desquelles le malade se pose la question de voir s'il ne s'est pas donné quelque coup, s'il ne s'est pas accid tellement heurté, et frappé contre quelque corps dur. Ces con sions sont en général plus discrètes que les taches de purpura, m dans quelques cas graves elles ont une multiplicité vraim effrayante. Les unes sont de niveau avec la peau, les autres s légèrement saillantes.

Purpura urticans. — Cette variété est essentiellement inflam toire ; elle affecte l'enfance et la jeunesse surtout. Elle se montre des taches rougeâtres, ovalaires ou circulaires, plus ou moins p minentes, auxquelles vient se joindre un sentiment de chaleur, cuisson, de picotement, comme dans l'urticaire. Leur coloration est plus rosée que dans le purpura, leur étendue généralement m considérable ; élevées au-dessus du niveau de la peau à leur dé elles s'affaissent dans les premiers jours, pour se transformer devenant plus foncées, en taches de purpura. Est-ce bien là une riété franche de *purpura?* Ne serait-ce pas plutôt cette urtic qui précède le développement du purpura aigu? Il est vrai

dans cette dernière sorte d'affection, l'urticaire est générale, très étendue, envahissant à la fois la presque totalité de la surface du corps dans l'espace de vingt-quatre à quarante-huit heures pour être remplacée ensuite par le purpura aigu ; tandis que dans le *purpura urticans*, l'éruption peut être discrète et quelquefois successive.

Purpura hæmorrhagica (*morbus maculosus* de Werlhof). — C'est là la variété la plus grave. Le purpura est précédé de l'ensemble de tous les symptômes généraux qui constituent les prodromes des fièvres éruptives de grande intensité, apparaissant d'ailleurs dans les meilleures conditions de santé et chez des sujets qui sont doués d'une forte constitution. A la peau, taches de purpura général, ecchymoses qui, chez les enfants, peuvent constituer de véritables *thrombus*. Telle est la susceptibilité du tissu cutané, qu'une pression tant soit peu forte suffit pour amener l'état ecchymotique. La moindre piqûre, la moindre excoriation suffit pour donner lieu à un écoulement de sang notable.

Toutefois ces divers phénomènes ne constituent pas la gravité de la maladie, ce sont les hémorrhagies qui l'accompagnent. Celles-ci peuvent avoir lieu partout où existent des membranes muqueuses : hémorrhagie nasale (*épistaxis*) chez les enfants ; hémoptysie ou hémorrhagie pulmonaire chez les adultes ; métrorrhagie chez la femme. Ces hémorrhagies peuvent affecter partiellement tous les points des membranes muqueuses : ainsi elles ont lieu par la bouche seulement, par le pharynx, dans l'estomac, par les intestins, par les voies urinaires, par l'utérus. Et dans tous ces cas ces hémorrhagies sont abondantes, très difficiles à arrêter, et elles amènent parfois immédiatement la mort. C'est ainsi que l'on a vu des enfants périr durant une épistaxis ou une hémorrhagie de la bouche ; à plus forte raison, à la suite d'hémorrhagie pulmonaire. Chose remarquable, il s'opère dans l'épaisseur de la membrane muqueuse des taches semblables à celles de la peau ; il se fait des soulèvements d'*épithélium* par le sang, qui figurent des bulles sanguines correspondant aux ecchymoses de la peau.

Mais ce n'est pas une seule hémorrhagie qui se montre ; et comme alors le sang, qui au début du mal était fortement coagulable, de-

vient de plus en plus fluide, il est difficile, il est souvent impossible d'en arrêter l'écoulement ; la faiblesse augmente alors dans la proportion de la perte de sang, et la mort survient. Cette affection n'est d'ailleurs pas seulement sporadique, elle est souvent épidémique ou endémique.

La marche que suivent ces variétés de la même maladie doit être étudiée, et dans les phases que parcourent les phénomènes qui leur sont propres, et dans les phases de la maladie elle-même. Or nous avons signalé quatre phénomènes tranchés : la tache purpurine, l'ecchymose, la tache d'urticaire purpurine et l'hémorrhagie. Particularisons les faits qui se rattachent à chacun d'eux.

Tache. — Si elle s'est opérée avec une marche aiguë, elle se fonce de plus en plus dans l'espace de trois à quatre jours pour prendre la teinte violacée de la tache du *purpura* chronique, qui, dès l'abord, a cette teinte. Cette coloration reste stationnaire pendant la première huitaine, puis elle prend une marche décroissante qui ne consiste pas en une décoloration, mais dans la disparition de la teinte rouge violacé pour prendre la teinte brune ; ce n'est que plus tard, vers le quinzième jour, que commence à se montrer une diminution dans l'intensité de la couleur, effet qui ne s'opère que graduellement et au bout de trois semaines ou un mois ; enfin la décoloration complète s'opère en passant par une teinte jaunâtre et verdâtre qui rappelle un peu les taches ecchymotiques. Le laps de temps pendant lequel s'opèrent ces phénomènes ne saurait être précisé : il suffit quelquefois de quinze jours dans le purpura discret, et dans d'autres cas d'un mois ou six semaines. En thèse générale, la résolution est beaucoup plus prompte lorsque le purpura est aigu que lorsqu'il est chronique.

Ecchymose. — La marche de celle-ci ne diffère presque en rien de la marche ordinaire des ecchymoses. Même passage successif de l'état d'épanchement à l'état de résorption, sauf la question de temps, qui dans le purpura est beaucoup plus considérable que dans celui d'ecchymose par cause externe. Il est donc inutile d'y insister.

Nous avons peu de chose à ajouter à ce que nous avons dit du *purpura urticans* comme phénomène local, puisque l'état d'urticaire n'est qu'un phénomène passager

Hémorrhagies.— Ici c'est surtout la nature du sang écoulé qui doit appeler toute l'attention du médecin. Tout sang fluide, peu plastique dès le début, doit faire craindre une récidive de l'hémorrhagie ; une récidive conduit à la crainte d'une autre récidive, d'une troisième, et dès lors la gravité de l'affection augmente en proportion de ces écoulements de sang qui affaiblissent l'individu déjà en proie à une maladie de nature anémique.

La fin si souvent fatale du purpura a permis de constater les résultats anatomico-pathologiques de cette affection: ici les taches purpurines n'ont atteint que la superficie de la peau; là, toute l'épaisseur de ce tissu ; plus loin, la peau et le tissu cellulaire sous-cutané. Les vaisseaux capillaires ne paraissent pas plus dilatés que de coutume, on peut par le lavage détruire en partie la coloration. On retrouve des taches ou des ecchymoses sur les membranes muqueuses de la bouche, de l'estomac, des intestins, le long de la trachée et des bronches; des ecchymoses dans le tissu pulmonaire, sous les plèvres, dans le mésentère, entre les membranes du cerveau. Dans le cas de mort par hémorrhagie, il y a vacuité des cavités du cœur et des vaisseaux sans altération notable de ces derniers.

Quant au sang lui-même, l'analyse faite par Aaskow chez des malades atteints de purpura n'a dénoté aucun changement de composition ; Johnston, au contraire, a noté l'état fluide permanent du sang écoulé d'une saignée. Duncan a comparé le sang sortant de la veine d'un malade à un mélange de sang artériel et d'eau ; la coagulation en fut très lente, le caillot était mou et ressemblait à de la gelée de groseille. M. Rayer a reconnu que dans le *purpura hæmorrhagica sine febre* le sang avait les apparences du sang ordinaire, mais qu'il devenait plus séreux après plusieurs hémorrhagies successives, Il est évident qu'il faut établir à cet égard des distinctions très tranchées entre le *purpura* aigu et le *purpura* chronique. Dans le premier cas, tous les phénomènes sont franchement inflammatoires, et il n'est pas étonnant que le sang soit plus ou moins riche ; dans le second, le sang est asthénisé, si l'on peut se servir de cette expression, et il doit offrir les caractères d'un sang pauvre.

Traitement. — Tout purpura aigu doit être traité par les antiphlo-

gistiques, et au besoin même par la saignée au début. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'avec ces apparences inflammatoires il y a dans cette forme morbide quelque chose qui nous échappe et qui se rattache plus ou moins à l'anémie. On a cependant vu quelquefois les hémorrhagies du purpura arrêtées par une émission sanguine. C'est un moyen que l'on peut préconiser dans la forme franchement aiguë et lorsque la force du sujet le permet; à l'intérieur, les boissons acidules et rafraîchissantes. Il n'en est pas de même du purpura chronique ; l'expérience a appris à cet égard que l'usage du citron sucé pur, en commençant par un demi-citron par jour, puis un citron ou un citron et demi, amènent des résultats fort remarquables, même chez les vieillards ; et à Bicêtre, par exemple, on met constamment en usage ce mode de traitement que j'ai employé lorsque j'y étais médecin et que j'emploie tous les jours à l'hôpital. Toutefois ce moyen est tout à fait empirique ; il paraît encore une action toute spéciale sur le sang, et il répugne au premier abord d'insister sur un sédatif, sur un débilitant en présence d'une maladie qui réclame des fortifiants. C'est cependant ce même moyen qui compte le plus de succès dans le scorbut des vieillards, ainsi que nous le dirons plus loin.

Administré seul, il serait insuffisant ; il faut y joindre les préparations ferrugineuses, un régime animalisé de viandes rôties et du vin dans une proportion modérée ; rejeter d'ailleurs les antiscorbutiques proprement dits ; s'en tenir aux tisanes amères ; pas de bains ; conditions de repos. Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est le régime et l'état de l'estomac et des intestins. Que faire ensuite contre ces hémorrhagies qui accompagnent le purpura? La saignée n'est indiquée que dans le cas de plénitude du pouls. La décoction et l'extrait de ratanhia, la décoction de quinquina acidulée, sont les seules ressources en rapport avec l'état morbide. Storck, Borsieri et d'autres praticiens ont employé dans ce cas avec avantage les purgatifs cathartiques, d'autres les purgatifs mercuriels ; M. Bayer s'adresse de préférence aux drastiques.

Quant aux applications locales, elles ne sont réellement utiles que dans le cas d'ecchymoses, car les taches de purpura se dissipent seules. D'ailleurs leur disparition spontanée, ou au moins sans agents

lesaux, donne la mesure de l'efficacité du traitement interne dont elle n'est alors qu'un reflet. Cependant on a conseillé l'application d'eau alcoolisée et celle d'oxycrat froid ; la glace dans une vessie sur le ventre dans les hémorrhagies intestinales, ou sur le front dans les épistaxis, etc. ; en un mot, les moyens ordinairement mis en usage pour arrêter les hémorrhagies. C'est par la compression que l'on peut arrêter les exsudations sanguines abondantes qui s'opèrent par les vésicatoires, les cautères ou les plaies.

Nous n'avons pas traité d'une manière spéciale du *purpura senilis* de Willan et Bateman. Nous le considérons comme n'étant autre que le *purpura* des vieillards, et il n'y a aucun motif d'en faire une espèce à part.

Scorbut.

Il est difficile de ne pas rapprocher le scorbut du purpura. Si ce n'est pas là une maladie de la peau, il se relie aux affections cutanées par les taches qui lui sont propres et qui ont une ressemblance avec celles du purpura. Nous ne voulons pas tracer l'histoire détaillée de cette affection, mais en reproduire les principaux traits de manière à mieux faire ressortir les caractères de la maladie que nous venons de décrire. Cette esquisse aura d'ailleurs l'avantage de rapprocher deux affections qui se touchent de très près sous les rapports de forme, de causes et de traitement.

Le scorbut se montre à la peau sous des apparences de taches, ayant tout d'abord l'aspect violacé d'une contusion légère, au point que le malade se demande s'il s'est frappé contre un corps dur ; ce n'est pas la rougeur violacée du purpura, c'est la coloration de l'ecchymose. La surface de ces taches n'est pas diffuse, *amorphe*, comme dans le purpura ; chaque plaque de scorbut a au contraire une forme *déterminée* et assez *nettement circonscrite*, forme généralement *arrondie*. La teinte brunâtre est presque toujours isolée, peu confluente, *successive*, sans limite d'évolution, c'est-à-dire que les plaques apparaissent à distance de un, deux, trois jours, tant que persiste l'état général interne qui précède et accompagne leur développement.

Chaque plaque n'a d'ailleurs au début qu'une teinte légèrement ombrée, puis elle se dessine successivement le deuxième et le troisième jour pour acquérir la couleur violette de la contusion. Plus tard la tache passe réellement par toutes les nuances décroissantes de la surface contuse, mais d'une manière plus lente encore. Ainsi, comme on le voit, rien de comparable soit avec le purpura aigu, soit avec le purpura chronique sous le rapport de l'état local.

Quant à l'état général, les prodromes offrent ici plus d'analogie, parce que les deux affections viennent du même genre de causes : privations, misère, chagrins, habitation malsaine et humide. Sous ce rapport, quelques pathologistes ont disséqué pour ainsi dire l'influence de ces causes, et ils ont dit, par exemple : Ce n'est pas la mauvaise alimentation, l'usage des viandes salées, qui développent le scorbut, car les Indiens, chez lesquels cette maladie est très commune, se nourrissent exclusivement d'aliments végétaux ; ce n'est pas la privation d'une nourriture animale, car la flotte de l'amiral Anson, qui fut si cruellement maltraitée par cette maladie, était abondamment pourvue de vivres frais de toute espèce, tandis que la maladie a constamment épargné des expéditions navales moins bien approvisionnées, parce qu'elles étaient dans de meilleures conditions par rapport à l'air, etc. Évidemment on peut faire à cet égard toutes les suppositions possibles ; mais en médecine, s'il faut rechercher surtout les causes des maladies, il faut aussi savoir faire la part de chacune d'elles, et ne pas vouloir qu'une seule et même cause d'une nature donnée puisse toujours produire les mêmes effets et rendre compte du développement d'une maladie. Dans l'espèce, il est évident que l'une des causes que nous avons citées est capable à elle seule de développer le scorbut, si elle agit avec une intensité suffisante et de manière à rendre de nul effet les conditions hygiéniques qui peuvent en modifier les influences fâcheuses. Ainsi, pour prendre les deux faits que nous venons de citer tout à l'heure : si la flotte de l'amiral Anson a été si maltraitée malgré les vivres dont elle était pourvue, c'est que sous le rapport des conditions d'humidité et d'état malsain de l'air elle se trouvait dans la situation la plus fâcheuse ; si, par contre, telle autre flotte, quoique ne se nour-

ıe de viandes salées et manquant de vivres frais, n'a pas te de scorbut, c'est qu'elle se trouvait dans les meilleures s sous le rapport de l'air et du climat. Il ne s'ensuit pas ı qu'une mauvaise alimentation ne puisse pas développer t; car si au lieu d'être placé sous un excellent climat, telle lotte se fût trouvée dans des conditions de salubrité ordi- us ce rapport, le scorbut se fût manifesté. A Paris et dans ces de la vieillesse, on voit souvent naître le scorbut; c'est ement durant les fortes chaleurs d'été qu'il se montre, alors résulte une diminution d'appétit et une influence d'affai- nt de tout l'organisme. Cependant la nourriture, le loge- s conditions de salubrité, l'air, restent les mêmes; mais ation, la digestion, ne se font plus comme en hiver et le se manifeste.

rbut a ses prodromes ou ses phénomènes généraux d'inva- rqués par la perte de l'animation de la figure, à laquelle une teinte pâle et terne; des mouvements lents, paresseux, le reculant devant tout exercice qu'entraîne la moindre les digestions se ralentissent, l'appétit diminue; les gen- gonflent et deviennent sensibles; le pouls s'affaiblit: c'est à ent que se montrent les taches; plus tard l'affaiblissement te, le teint est plombé et livide, les gencives douloureuses, s commencent à s'ébranler, la température de la peau , celle-ci devient sèche, *ansérine*; les taches se multiplient nment de plus en plus larges en même temps que les taches ntes ont passé par la période de résolution et d'absorption, celles des contusions; beaucoup, il est vrai, demeurent ı état indolent; quelques-unes, plus récentes et plus pro- sont accompagnées d'ecchymoses du tissu cellulaire et des . Comme dans le purpura il s'opère des pertes de sang en on variable; d'abord par les gencives, qui saignent au attouchement, ensuite par les selles surtout; alors la figure bouffie, les jambes œdémateuses; une odeur fétide s'exhale uche, le pouls s'affaiblit de plus en plus, la respiration de- née, les battements du cœur sont précipités, et les malades en conservant en général l'intégrité de leurs facultés intel-

lectuelles, à moins qu'une fièvre lente à forme typhoïde ne se déclare et ne les conduise au tombeau.

On trouve à l'ouverture du corps des désordres à peu près semblables à ceux du *purpura hæmorrhagica*.

Quant au traitement, il est de deux sortes, hygiénique et médical. L'un et l'autre ont une égale importance, et telle est même l'influence du premier, qu'il peut quelquefois à lui seul arrêter les progrès de l'affection et la faire marcher vers une guérison très prochaine. C'est ainsi que dans les hôpitaux, dans les vaisseaux, des épidémies de scorbut ont été arrêtées en déplaçant les malades et en les mettant dans des conditions d'aération toutes différentes et toutes nouvelles. Ainsi l'observation des règles de l'hygiène dans toute leur rigueur est la première condition d'une bonne institution thérapeutique.

Il existe de temps immémorial des médicaments qui ont été spécialement appliqués au traitement du scorbut et qu'à cause de cela on a nommés médicaments antiscorbutiques. Aujourd'hui ces médicaments sont loin d'être préconisés comme autrefois, au moins pour le scorbut de terre, qui, comme le purpura, réclame surtout l'emploi des acides unis aux ferrugineux et à une bonne alimentation. C'est ce que Rochoux et d'autres médecins ont observé à Bicêtre, où tous les étés le scorbut est plus ou moins fréquent. Nous bornons là les aperçus généraux de cette maladie, qui rentre surtout dans le domaine de la pathologie en général.

QUATRIÈME GROUPE.

Affections tuberculeuses.

Ici nous avons réuni des affections pustuleuses qui, pour la majeure partie, envisagées au point de vue de la cause et du traitement, ont entre elles les points de contact les plus directs. L'impétigo, l'ecthyma et l'acné sont des affections de l'enfance et de la jeunesse; toutes trois sont liées à des conditions de constitution et de tempérament plus ou moins lymphatique, exigeant à peu près le même

ement. Le sycosis fait, il est vrai, exception sous ce rapport, s il m'était difficile de séparer cette maladie pustuleuse des au-. Si j'attache ici de l'importance à la forme c'est pour ne pas ifier entièrement le diagnostic à la thérapeutique, puisqu'un gnostic précis conduit en général à des indications thérapeutiques cises.

A l'égard des maladies à forme pustuleuse, nous avons établi de-s longtemps une grande différence par rapport à la disposition ciale des pustules, et voici en quoi nous la faisons consister: s toute pustule il y a deux faits principaux, l'engorgement et la icule purulente; or, on observe deux catégories de pustules. Dans unes, il y a une telle prédominance de la vésicule purulente, 'elle forme les neuf dixièmes de la pustule; par contre, dans les tres affections pustuleuses, c'est le contraire, c'est-à-dire que les uf dixièmes de la pustule sont formés par l'engorgement. C'est ce s l'on remarque dans l'acné et le sycosis par opposition à l'impé-o et à l'ecthyma. Cette distinction est très importante, parce 'elle met immédiatement le médecin sur la voie, en lui faisant nnaître l'affection à laquelle il a affaire. Commençons par les deux nes de maladie pustuleuse avec prédominance de la vésicule rulente.

IMPÉTIGO, *dartre crustacée flavescente* d'Alibert, *mélitagre*, *impétigo* de Willan.

mpiex.	Chronique.
Aigu.	*Figurata.*
Figurata ou *conferta.*	*Sparsa.*
Sparsa.	*Rodens.*
Larvalis.	*Composita.*
Granulata.	Impétigo eczémateux.
Erysipelatodes.	— ecthymatiforme.
Pilaris.	— sycosiforme.
Purifluens.	— rupiforme ou *scabida.*

L'origine du mot *impetigo* est tout à fait inconnue. Cette dénomination a été donnée par divers auteurs anciens à des affections qui étaient pas analogues. On l'a fait dériver de *ab impetu*, probablement à cause de la rapidité de l'éruption. Willan l'a restreint à la

dénomination d'une maladie à pustules *psydraciées* (mot qui est produit par l'expression ψυδράκια, qui signifie petites pustules, ou vient de ψύδραξ, qui a la même signification). Comme on le v définir l'impétigo une éruption de pustules psydraciées, ainsi que fait Willan, c'est se borner à dire que c'est une maladie pustuleu à éruption de petites pustules. (Voy. pl. II.)

Tel est, en effet, le cachet de l'affection qui se montre tout à co par l'éruption à la peau d'un nombre plus ou moins considéra de pustules de la grosseur d'un grain de millet ou tout au plus chènevis, en général confluentes, quoiqu'elles puissent aussi disséminées ; mais c'est alors par groupes de trois, quatre, six, pustules agglomérées, chaque groupe étant plus ou moins esp l'un de l'autre ; ou bien il y a des milliers de petites pustules font tout à coup éruption dans un état complet d'agglomération manière à se confondre par leur circonférence, et à former par ensemble une plaque plus ou moins régulièrement arrondie. D la division naturelle d'*impetigo sparsa*, et d'*impetigo figurata* mieux *conferta*.

L'éruption pustuleuse est d'ailleurs caractérisée par ce fait, dans la pustule, c'est la vésicule purulente qui en forme le carac essentiel. Cette pustule est plus ou moins acuminée, remplie pus jaune-serin, à peine élaboré, qui, par son abondance, am promptement la rupture de la vésicule, et qui se concrète aus son contact à l'air, de manière à donner naissance à une cr transparente d'un jaune serin ou jaune soufré brillant, d'un as cristallin, ressemblant plus ou moins à du miel concret : de l nom de *mélitagre*. L'impétigo franc n'est pas sensiblement acc pagné de démangeaisons ; ce caractère, que les auteurs ont do comme appartenant à l'impétigo, est seulement applicable à l zéma impétigineux. — On a donc ainsi une surface d'une éten quelconque recouverte d'un croûte jaune plus ou moins épa suivant l'abondance de la sécrétion, et qui se reproduira touj sous le même aspect purulent lorsque par des circonstances q conques la croûte sera tombée. Dans les cas douteux il suffira d'abandonner la partie malade à elle-même pour laisser se refor les croûtes caractéristiques.

ption est pyrétique ou apyrétique ; elle succède le plus
ent à un état de malaise plus ou moins marqué, avec ano-
ude dans les membres ; elle est annoncée sur les points
ı elle doit se manifester par de la rougeur, avec sensa-
eur ; puis dans l'espace de vingt-quatre heures surgit
n de petites pustules, dont le nombre et l'étendue sont
'éruption pustuleuse a ordinairement acquis, en deux
rs et souvent en moins de temps, toute l'étendue qu'elle
: par la suite. C'est même là une différence tranchée
étigo et l'eczéma impétigineux : celui-ci tend à s'ac-
ne manière successive, et l'on n'est jamais assuré de
ù s'arrêtera le développement de la maladie. L'im-
ontraire, semblable à une fièvre éruptive, accomplit
n dans un temps donné très limité, puis il s'arrête
t.

une série de faits basés sur la statistique, que nous avons
qui comporte quelques documents importants. Sur
les atteints d'affections cutanées, l'impétigo s'est montré
t un peu plus d'un neuvième. Sur ces 241 malades,
moins de 25 ans ; 64, de 25 à 35 ; 42, de 35 à 45 ; 21, de
6 au delà de 55 ans. C'est donc là une maladie de l'ado-
si nous avions pu chiffrer cette affection avant l'âge de
ıs aurions été conduit à dire que c'est une maladie de
de la jeunesse. On la voit liée au tempérament lympha-
ois sur 212 malades, soit 3 malades sur 4 ; ainsi se trouve
ıe manière évidente ce rapprochement que nous avons
ıladies aux tempéraments, qui deviennent alors causes
ıtes. De même, nous trouvons dans nos relevés que sur
es il en est 40 qui avaient eu dans l'enfance des gan-
ırgés au cou. C'est en été ou en hiver que se développe
lie ; car, sur 159 cas, 105 ont eu leur invasion dans l'une
le ces deux saisons. Dans nos relevés de parties du corps
ous trouvons 168 fois l'impétigo siégeant à la face ; puis
décroissant : 34 fois au cuir chevelu, 28 fois aux avant-
jambes, 23 fois aux mains, 20 fois aux bras et aux cuisses,
pieds ; à la poitrine, au ventre, au dos, aux parties géni-

tales, 5 à 6 fois pour chacune d'elles; 2 fois seulement l'affec est générale.

La maladie, développée soit à l'état discret, soit à l'état confluent prend une marche stationnaire dans l'espace de six à huit jo La sécrétion diminue peu à peu; elle finit par se tarir, et les d nières croûtes de muco-pus concret se dessèchent; elles res adhérentes pendant une quinzaine de jours, pour se détacher portions, laisser une surface rosée et assez lisse, au moins sans c trices, recouverte seulement de quelques débris crustacés qu détachent successivement pour faire place à une peau saine. T est généralement la marche d'un impétigo aigu qui n'a pas été t menté par des pommades irritantes, qui a été soigné à l'aide moyens antiphlogistiques simples à l'extérieur, aidés de tis rafraîchissantes à l'intérieur et d'un régime alimentaire con nable.

Mais il n'en est pas ainsi d'un impétigo sur lequel on appli des agents plus ou moins résolutifs dès le début, c'est-à-dire i tants pour une surface enflammée, et dans lequel on contin nourrir le malade comme s'il n'y avait aucun dérangement d la santé générale. A plus forte raison, si le médecin, voyant d cette éruption à forme sécrétante le reflet d'un état lymphati général, prescrit les amers, les antiscorbutiques, les ferrugin dans la période aiguë de l'impétigo. Alors la sécrétion augme la maladie fait peu à peu des progrès, et ce n'est qu'avec le te qu'elle passe à la période décroissante. C'est ainsi que nous av pu retrouver chez certains enfants des croûtes conservées de quatre, cinq ou six ans, fortement adhérentes, ayant peu à p augmenté de volume et déprimé le tissu de la peau au point d faire naître un enfoncement que le temps seul a pu faire disparaît avec la croissance et le développement des parties molles.

Mais l'impétigo peut revêtir les formes chroniques dès le déb et c'est alors qu'il est lié à quelques altérations des voies digestiv coïncidant avec la constitution de l'enfant. C'est aussi le plus s vent dans ce cas qu'on peut le regarder comme héréditaire, en sens que la mère avait cette affection quand elle a porté nourri son enfant; ou que le père et la mère ont eu, comme le

es impétigos chroniques durant les premières années de

présente naturellement la question de savoir si l'impétigo maladie contagieuse. Les auteurs ont répondu à cet égard gative. Or je n'hésite pas à déclarer que l'impétigo est con- ar contact de bouche à bouche, et notamment d'enfant ou d'enfant à adulte. J'ai par-devers moi les faits les plus ues à cet égard. Et quant nous voyons tous les jours des pposer à ce que leurs enfants embrassent d'autres enfants omme elles le disent, quelques galons sur la figure, nous e l'expérience et l'observation suivie des faits viennent t sanctionner cette manière de voir. J'ai vu un domes- rente-six ans être atteint d'un impétigo très notable des ur avoir embrassé un enfant de trois ans de la maison où et qu'il aimait beaucoup. Ce domestique était en parfait anté et rien n'indiquait qu'il dût survenir chez lui une le ce genre. J'ai donné des soins à une dame de vingt- ui était affectée d'un impétigo de toute la figure ; elle nise à la lèvre supérieure de son mari et à la bouche te fille âgée de six ans. A plus forte raison, cette transmis- lle facile d'enfant à enfant, ainsi que j'en ai remarqué de x cas. Voici un exemple de contagion d'enfant à enfant. Pige.., mère de trois enfants, habite un endroit sain au étage. Sa sœur occupe le premier. L'aînée des deux e sa sœur fut prise d'un impétigo à la lèvre. Au bout de jours, le second enfant fut affecté de la même maladie. après et par suite des rapports des enfants malades avec madame Pige.., une de ses filles, Carida, âgée de quatre racta cette maladie au menton. Bientôt l'impétigo fit des t s'étendit sur toute la figure jusqu'au cuir chevelu. Au e jour de cette éruption, Pauline, âgée de six ans et sœur r enfant malade, fut prise à son tour. C'est au front qu'eut but de la maladie. Carida et Pauline étaient malades depuis s, lorsque la troisième sœur, âgée de deux ans, fut atteinte. à deux familles logeant dans la même maison, dont les vaient journellement des contacts et où l'impétigo, déve-

[illegible] chez un des cinq enfants, a succes[illegible] autres. Dans la statistique que j'ai dress[illegible] notée seize fois. On voit donc qu'elle [illegible] auteurs définissent à tort l'impétigo une [illegible] fréquente.

[illegible] soit, l'impétigo chronique *sparsa* consti[illegible] que l'on observe si souvent dans la tête des [illegible] ou six ans.

[illegible] maintenant à préciser les formes diverses d'*impét*[illegible] on appelle *figurata* ou *conferta*, toute éruption de p[illegible] en une ou plusieurs plaques plus ou moins *ré*[illegible] *ronnées* et de plusieurs centimètres de largeur, tant[illegible] une partie du corps, tantôt à plusieurs. Là to[illegible] et ouvertes ne forment plus qu'une [illegible] à circonférence assez arrêtée; mais il [illegible] disséminées au pourtour de cette plaqu[illegible] pustules isolées d'impétigo qui rappellent la form[illegible]. On nomme *sparsa* l'impétigo dans lequel i[illegible] moins nombreux de quelques pustule[illegible] sur une surface d'une étendue variable [illegible] impétigo est *larvalis* (de *larva*, masque), q[illegible] de la surface de la figure, de manière à [illegible] masque. Cette dernière forme est souvent chroniq[illegible] années. Willan et Bateman, et après eux M[illegible] ont décrit un *impetigo larvalis* qui n'est au[illegible] impétigineux, qui, comme nous l'avons dit, peut [illegible] affecter toute la surface du corps des enfants. (V[illegible] *impétigineux*, page 264.)

[illegible] *impetigo granulata* se distingue des autres variétés par l[illegible] secrétion qui, plus dense, moins muqueuse, moins gl[illegible] dessèche et s'écaille de façon à donner naissance à des [illegible]tions purulentes concrètes. Cette variété est surtout observé[illegible] chevelu, et alors les concrétions granuleuses, en se déta[illegible] la surface morbide, s'espacent sur la longueur des cheve[illegible] adhérant assez fortement. Dans ce cas, on confond sou[illegible] variété d'impétigo avec la *teigne granuleuse* (*favus granu*[illegible]

précédents lèvent tout doute à cet égard, en ce sens qu'une teigne ne sécrète jamais à moins d'une complication tout accidentelle et fort rare. Dans l'*impetigo granulata*, il y a toujours eu une période de suppuration liquide, qui ne saurait être oubliée des parents ; puis dans la teigne, cette odeur de souris si prononcée, odeur toute spéciale ; enfin, en enlevant avec soin le produit de la teigne, on met à nu un épiderme lisse et non érodé. Dans l'*impetigo granulata*, même à l'état chronique, il est rare de ne pas trouver le corps muqueux plus ou moins érodé.

Impetigo erysipelatodes. — On a fait une variété d'impétigo d'un mode particulier de développement de cette maladie, dans lequel un état inflammatoire érysipélateux précède et accompagne l'éruption. Il est rare en effet de trouver des traces d'inflammation bien notables au delà de la plaque impétigineuse. Dans cette espèce, au contraire, la peau est plus ou moins rouge, plus ou moins tuméfiée et fort au delà de la surface sécrétante. L'état inflammatoire persiste durant quelques jours après l'éruption pustuleuse surtout ; elle s'accompagne aussi parfois de l'engorgement des ganglions voisins, de sorte que, si l'éruption paraît à la face, les glandes sous-maxillaires et parotidiennes ou les ganglions lymphatiques du cou sont plus ou moins affectés. C'est donc là un impétigo plus fort, plus inflammatoire, et qui, sous ce rapport, réclame un traitement antiphlogistique plus énergique.

Impetigo pilaris. — Voici une variété qui n'a pas été décrite. Elle est fort remarquable. Elle se montre d'abord par des pustules qui, contrairement à celles de l'impétigo ordinaire, sont généralement coniques, nettement isolées, et tout aussi petites d'ailleurs que les pustules dites psydraciées de l'impétigo. Chacune d'elles est traversée à son centre par un poil, de sorte que cette maladie ne se montre que là où le système pileux est prononcé. C'est aux bras qu'on l'observe le plus souvent. On la voit aussi sur la peau du tronc. Elle est principalement propre à l'homme. Je ne l'ai pas observée à la tête. Les pustules viennent plus lentement ; mettent plus de temps à parcourir leurs diverses périodes. On décrit un *lichen pilaris* à forme papuleuse sans suppuration : il y a comme maladie correspondante un *impetigo pilaris* et un

psoriasis pilaris. D'ailleurs la marche de la maladie est à peu
la même; elle n'est pas plus rebelle, mais elle est plus sout
plus successive que dans l'impétigo simple.

Impetigo purifluens. — C'est encore une autre variété que
observée et qui n'a pas non plus été décrite. Elle est fort re
quable. Elle a d'abord pour siége une peau organisée d'une ma
toute particulière. C'est une peau blafarde, opaline, épaisse,
leuse. Sur un point du corps, à la figure, au voisinage des ore
à la partie interne des bras, plus ou moins près des aisselles,
montre une éruption pustuleuse dont les vésicules purulentes
crèvent toutes pour donner écoulement à un pus tellement
queux, que l'on pourrait dire que c'est un muco-pus d'un
jaunâtre pâle; l'épiderme qui formait l'enveloppe de chaque pu
se détache entièrement, et il ne reste plus qu'une surface sécré
légèrement pourvue d'aspérités d'un rouge vif, et qui fournit
pus en telle abondance, que le malade est obligé à cinq ou six
sements dans les vingt-quatre heures. On dirait ces surfaces de
térieur d'abcès froids fournissant du pus par exhalation. Mais
maladie ne perd pas entièrement le cachet de sa forme élém
taire; tout son pourtour, fort nettement dessiné d'ailleurs, est
semé d'un liséré ou petite traînée d'une croûte jaune-serin,
rappelle la croûte d'impétigo. Cette sécrétion purulente se proloi
des mois entiers: on peut la supprimer, mais on court le ris
d'apporter une perturbation dans la santé générale. Voici
observation qui a été recueillie par M. le docteur Marais, autre
interne dans mon service, et qui donne une idée exacte de ce
maladie. Cette observation a été insérée dans le numéro du 24 ju
1845 de la *Gazette des hôpitaux*.

Maurand (Charles), entré le 27 novembre 1844, salle Saint-Jean, n° 4
âgé de quinze ans et demi, menuisier. Tempérament lymphatique, consti
tion grêle, peau fine, blafarde, tout à fait décolorée. A l'âge de quatre ans
a eu un engorgement des ganglions sous-maxillaires non suppurant. Varic
à neuf ans.

Quinze jours avant son entrée à l'hôpital se développent derrière les ore
de petites pustules accompagnées d'une démangeaison vive, et dont la ru
ture produite par les ongles du malade fut suivie d'un écoulement purul
très considérable; la progression de la maladie fut si rapide, qu'en moins d

huit jours elle avait envahi toute la surface des oreilles, le cou, le derrière de la tête, le front et le menton.

Tel était l'état du malade à son entrée à l'hôpital, que toutes les surfaces indiquées plus haut représentaient l'aspect d'une membrane muqueuse rouge, piquetée, d'où suintait le pus presque à vue d'œil ; à la circonférence seule se dessinait un cercle de petites vésicules purulentes au moyen desquelles s'opérait les progrès du mal. Deux mois après, l'affection se montrait aux parties génitales sous la même forme et avec une telle intensité, qu'en moins de huit jours, les bourses, les parties internes des cuisses, le pubis, le quart inférieur de l'abdomen furent envahis. La maladie prenait en même temps de l'accroissement du côté du siége primitif ; elle occupait la face tout entière.

Forme. — De sa forme pustuleuse primive que nous avons indiquée, la maladie était passée, par une transition rapide, à celle d'une large surface mondie, excoriée, d'un rouge vif, accompagnée d'épaississement de la peau, au point de doubler le pavillon des oreilles ; le pourtour de ces plaques était limité, circonscrit par un cercle de pustules, petites, aplaties, se rompant facilement, et accroissant par leur reproduction circulaire successive l'étendue de la surface malade. Cette surface transsudait du pus en telle abondance, que les linges en étaient constamment baignés, et que dans l'intervalle des pansements, répétés quatre fois dans les vingt-quatre heures, la conque des oreilles en était remplie et les pièces d'appareil complétement mouillées.

Dès son entrée à l'hôpital, le malade fut soumis à un traitement ayant pour base les émollients locaux, les bains de Baréges et les préparations ferrugineuses à l'intérieur. Mais on retirait des cataplasmes remplis de pus ; et M. Devergie craignant que le contact prolongé de la matière purulente ne vînt à augmenter cette sécrétion, il les fit cesser pour les remplacer par la poudre d'amidon et des lotions d'eau de sureau que l'on rendit à la longue légèrement saturnée.

La maladie avait notablement perdu de son intensité, et la guérison paraissait devoir être prochaine, lorsque les parties génitales, les cuisses et le bas-ventre devinrent le siége d'un nouveau développement impétigineux. Il était vraiment curieux de voir la maladie faire des progrès pour ainsi dire de moment en moment, et de voir cette surface excoriée, lisse, d'un rouge plus ou moins vif, terni seulement par une légère nappe de pus blanchâtre, ou mieux blafard, comme si la matière muqueuse prédominait de beaucoup su les globules purulents.

M. Devergie crut devoir laisser sécréter cette surface, d'autant que cette sécrétion était liée à une organisation de la peau dont il signale souvent l'existence, peau en vertu de laquelle tout ce qui est dartre sécrétante fournit une abondance considérable de produit morbide. Il peint cette organisation particulière à l'aide des caractères suivants : Peau blafarde, à teinte opaline, semi-transparente, pour ainsi dire, quoique épaisse. Cet état de la peau est d'ailleurs lié à la constitution lymphatique : non pas qu'il existe nécessairement

chez ces sujets des engorgements scrofuleux ; mais ces individus sont pâles, mous dans leurs mouvements comme dans leur parler, indolents dans leur marche comme dans leur déterminations, apathiques et insensibles à toutes les émotions.

Quelques pommades résolutives furent essayées ; elles avaient pour base l'oxyde de zinc, puis le calomel à faible dose. On tenta aussi l'emploi de lotions de sublimé au 1500e du poids de cette substance. On exaspérait toujours la maladie. L'amidon seul et l'eau de sureau produisaient les meilleurs résultats.

Enfin M. Devergie crut remarquer un état stationnaire ; il saisit ce moment pour modifier l'état morbide à l'aide de cautérisations avec la solution de nitrate d'argent au 10e. Toutefois il ne toucha d'abord qu'une petite partie de la surface malade ; et ce, dans le double but de ne pas supprimer brusquement une sécrétion purulente aussi abondante et de ne pas exciter trop vivement la partie malade au cas où ce moyen dût produire des effets fâcheux. Le lendemain, la portion touchée était dans un état d'amélioration très marquée ; et en répétant cette opération chaque jour sur des surfaces non touchées, on arriva à guérir très rapidement toute la surface affectée, tant est puissant l'emploi des modificateurs habilement maniés, c'est-à-dire avec réserve et appliqués en temps opportun.

On regardait le malade comme guéri, lorsqu'il se manifesta un érysipèle de la face et du cuir chevelu, qui le retint encore un mois à l'hôpital : il céda à un régime antiphlogistique sévère.

Impetigo rodens. — Voici une forme d'impétigo chronique fort mal décrite, je pourrais même dire inconnue à Willan et à Bateman, dont les auteurs français ont fort incomplétement traité ou dont ils n'ont pas traité du tout, et sur laquelle j'ai depuis huit ou dix ans porté mon attention toute spéciale, appelée qu'elle avait été d'ailleurs par une malade qui en était atteinte depuis neuf ans, et qui avait reçu les soins de tous les dermatologistes de Paris, sans avoir obtenu de guérison.

Disons tout d'abord, d'après nos observations, que l'*impetigo rodens* se présente sous trois formes différentes : forme diffuse, forme ramassée mais excentrique, forme ulcéreuse. Dans ces trois variétés, c'est par un très petit point malade que l'affection débute. Dans la première il se fait dans divers points de la peau du visage, mais successivement et à distance, une petite sécrétion d'un jaune grisâtre, avec une légère démangeaison, sécrétion qui représente une croûte de la grosseur d'une tête d'épingle. Le malade n'y fait

pas attention, il y porte involontairement la main, et en trois ou quatre jours il fait tomber la croûte. A la place se trouve une petite surface déprimée, comme s'il y avait une petite perte de substance, sans qu'il paraisse y exister de plaie. Mais en examinant bien attentivement, on voit dans le fond de la dépression un point rouge qui saigne dans quelques cas, si le malade tourmente la surface affectée. Cette petite dépression se remplit peu à peu en quelques jours, et au bout de huit à dix jours elle est comblée par une croûte d'un gris jaunâtre tout à fait semblable à la première. Il suffit d'un peu d'axonge, de suif, de pommade de concombre, ou d'un corps humide appliqué pendant une ou deux heures, pour la faire tomber, et alors, quand ces précautions ont été prises, la dépression préexistante paraît moins profonde, et elle ne semble pas s'être élargie. Il s'écoule des mois et quelquefois des années avant que cette surface ait atteint la largeur d'une très petite lentille. Dans certains cas, la maladie semble s'être totalement arrêtée, et l'on ne voit plus alors qu'une très petite dépression cicatrisée, qu'on peut rapprocher de la marque que laisse une petite pustule de variole. C'est la variété que je désigne sous le nom d'*impetigo rodens diffusa*. Elle se montre ordinairement sur les joues, et notamment au voisinage des pommettes. Les points affectés sont espacés les uns des autres.

Dans une seconde espèce, beaucoup plus commune que la précédente, c'est à l'angle interne des paupières et sur les côtés du nez, mais surtout au voisinage de l'œil, que l'on voit survenir cette maladie. Elle a alors son cachet tout spécial en ce sens que débutant comme dans le cas précédent, par un petit point croûteux d'un gris jaunâtre, la croûte tombe et la partie malade semble se guérir : en effet, il se forme une cicatrice centrale ; mais autour de ce point apparaît une petite croûte circulaire, circinée, qui tombe à son tour pour augmenter les dimensions de la cicatrice première, autour de laquelle se forme de nouveau une petite croûte à cercle plus ou moins complet. Je dis à cercle plus ou moins complet, car il est rare qu'à la troisième ou quatrième évolution successive ce cercle ne se rompe pas sur un point plus ou moins étendu de sa circonférence, pour ne plus laisser que trois quarts ou un demi-cercle de croûtes. Dans l'espace de six, huit ou dix ans, la surface malade,

constituée dans sa presque totalité par une cicatrice blanche, légèrement froncée ou lisse, et terminée par une portion de couronne croûteuse, occupe une surface d'un centimètre à un centimètre et demi d'étendue, gagnant de l'angle interne de l'œil le dos et les côtés du nez, de manière à s'allonger sur le même côté et à ne pas dépasser en général la ligne médiane. En fait de sensation, de temps en temps une légère démangeaison, encore est-elle peu appréciable; sensation d'un fourmillement d'insecte. Un corps gras fait immédiatement tomber les croûtes, et il faut y regarder de près pour reconnaître une surface malade.

Singulière forme morbide, à marche lente, mais continue, qui résiste à toute médication interne ou externe, excepté à une cautérisation toute spéciale, ainsi que nous le dirons tout à l'heure.

Dans une troisième variété tout aussi inconnue que la première, les choses se passent différemment. Le cachet de cette troisième espèce, c'est la forme ulcéreuse; le siége est aussi un peu différent, quoique voisin du précédent. C'est sur l'aile du nez, ou à l'angle externe de l'œil, ou à l'angle interne et en gagnant vers le sourcil, qu'elle se montre. Elle débute de la même manière, et sa marche est presque aussi lente. Mais là où elle se manifeste, la sécrétion est plus abondante, la croûte plus élevée, plus humide, plus purulente et quelque peu sanieuse. Elle laisse moins de cicatrices derrière elle en s'étendant, et il existe sous chaque croûte une ulcération qui, tantôt gagne seulement en profondeur, et tantôt gagne à la fois en profondeur et en surface, de sorte qu'il en résulte une destruction de parties molles ayant déjà peu d'épaisseur. C'est ainsi que nous avons vu l'angle interne des paupières de l'un des yeux détruit, les points lacrymaux ulcérés et désorganisés, l'œil mis à nu dans une certaine surface en dedans. Chose remarquable, chez un de nos malades, l'affection s'était développée sur les deux angles internes des yeux à la fois, ce que nous n'avions jamais vu à l'égard de l'*impetigo rodens*, qui n'affecte ordinairement qu'un seul côté.

Quoi qu'il en soit, il résulte une forme particulière d'aspect et d'état morbide pour une maladie, qui est d'autant plus grave qu'elle tend d'une manière incessante à la destruction des parties molles. Il est vrai de dire que, comme dans les deux précédentes variétés

que nous venons de décrire, la marche ulcéreuse est très lente. Nous avons vu les deux angles internes des paupières détruits, ou l'angle externe, ou l'aile du nez et le dos du nez rongés et ulcérés en surfaces linéaires et courbes; ou même l'aile du nez dans un état voisin de la perforation et de la communication avec les fosses nasales, principalement dans le point où la peau et les chairs sont le plus amincies, c'est-à-dire dans ce triangle qui sépare le bord libre de l'aile du nez, le dos du nez et la jonction du nez avec la joue.

Ces diverses formes de maladies sont tout à fait distinctes de ces variétés de *noli me tangere* dont je parlerai plus loin. Leurs ravages à marche si discrète, si lente; leur aspect de plaies ou de productions morbides, de sécrétion de bonne nature, les en différencient essentiellement. Leur ténacité semblerait seule pouvoir les en rapprocher; mais il n'y a aucune comparaison à faire entre les trois espèces d'*impetigo rodens* et quelques cas de *noli me tangere* que nous avons été assez heureux pour guérir. — L'aspect plus ou moins circiné de la maladie à forme ulcéreuse ou non ulcéreuse, le siége au voisinage des ouvertures naturelles, pourraient peut-être faire naître la pensée d'une cause syphilitique. Il n'en est rien : d'abord, nous avons vu cette affection chez bon nombre de malades qui n'ont jamais été atteints de vérole sous quelque forme que ce soit ; ensuite, c'est une maladie de l'âge adulte et de l'âge plus qu'adulte, c'est-à-dire du retour d'âge. Chose fort remarquable encore, elle nous a paru moins fréquente chez la femme que chez l'homme.

Traitement de l'impétigo et de ses variétés.—Ce n'est pas parce que l'impétigo est *figurata*, *sparsa*, *larvalis*, etc., qu'il en peut résulter quelques modifications dans le traitement; des considérations d'un autre ordre doivent appeler l'attention des médecins : et d'abord l'état plus ou moins aigu de l'affection, la présence ou l'absence de prodromes inflammatoires; les conditions dans lesquelles l'impétigo est survenu : arrêt ou absence d'époque menstruelle, excès de travail, fatigue de tout autre nature ; puis les circonstances de causes éloignées, d'antécédents lymphatiques, etc.

En thèse générale, tout impétigo à forme aiguë, quelle qu'en soit la cause, déterminante ou prédisposante, réclame le traitement

antiphlogistique, général et local aidé de quelques laxatifs durant le temps nécessaire pour arrêter les progrès de l'affection et la faire entrer dans une période décroissante. C'est pour ne pas observer ce précepte que la grande généralité des impétigos passent à l'état chronique. Je ne veux pas dire qu'au point de vue de la cause première ils ne réclament pas une médication tout autre, mais en employant cette médication dès le début, on perpétue l'état aigu qui ne peut plus se terminer alors par la résolution. En adoptant, au contraire, la marche que nous indiquons, on guérit rapidement l'affection, sauf à administrer un traitement général au moment de sa période décroissante. Ainsi usage de tisane rafraîchissante au début, amidon en poudre et cataplasme de fécule sur les surfaces malades ; diminution notable des aliments, pas de vin, jusqu'à la période d'arrêt, jusqu'à la cessation de la suppuration, soit huit à quinze jours.

Ce temps expiré, il y a lieu de commencer un traitement général antilymphatique (voy. MÉDICATION ANTILYMPHATIQUE), l'huile de foie de morue, les vins amers ou antiscorbutiques, les ferrugineux, les sulfureux d'après un choix et dans une *proportion* relative au tempérament, à la constitution, à l'état général et aux antédents du malade. Quant aux moyens locaux, il suffit ordinairement de l'usage d'une pommade *légèrement résolutive* au tannin et à la fleur de soufre pour obtenir la guérison ; plus quelques bains sulfureux très modérés et à faible dose.

Il n'en est pas de même pour le cas où l'impétigo a débuté avec une forme chronique, ou lorsqu'il se présente au médecin après avoir pris cette marche, la période aiguë ayant cessé depuis longtemps. Dès l'abord, il y a lieu d'instituer la médication générale. Quant à l'état local, il ne faut pas se hâter de le guérir par des applications externes ; mieux vaut attendre que la médication interne commence la guérison, si même elle ne l'achève, ce qui arrive quelquefois ; mais il est bon qu'il soit survenu une modification générale dans l'économie avant d'opérer celle des parties malades. C'est dans cet impétigo chronique que les sulfureux font merveille : c'est là que les eaux des Pyrénées sont surtout efficaces. Mais dans ces formes chroniques très anciennes, on est souvent obligé de modifier les surfaces malades par l'usage des douches sulfureuses ou sulfo-

nière période de son traitement. Quant à l'*impetigo purifluens*, il faut le laisser marcher en se bornant à modérer l'écoulement du pus par l'amidon et la poudre de tan; administrant à l'intérieur un traitement essentiellement antilymphatique et faisant usage de bains sulfureux pour stimuler toute la surface cutanée. Mais aussitôt que la suppuration commence à se faire, il faut saisir le moment de modifier la surface malade en la touchant tous les trois jours avec la solution de nitrate d'argent au dixième, employant d'ailleurs l'eau chlorurée au vingt-cinquième pour eau de lavage, surtout dans la période d'écoulement, et plus tard faisant des lotions alunées ou au bichlorure d'hydrargyre (voy. *Formulaire*, LOTIONS), etc. Il est rare que le traitement de cette affection ne s'étende pas à deux mois: cela dépend du traitement au début et de la chronicité de l'affection.

Reste la thérapeutique toute spéciale de l'*impetigo rodens*. Nous allons la faire connaître. L'*impetigo rodens* non ulcéreux, quelle qu'en soit la forme, est toujours curable à l'aide d'applications du caustique de Canquoin tombé en *deliquium* au contact de l'air, et associé à de la farine de bonne qualité. On détache les croûtes au préalable à l'aide d'un petit cataplasme; on étend le caustique en pâte molle sur les parties croûteuses, et non pas sur la partie centrale que cette affection a pu laisser en s'élargissant. Si la surface malade est très étendue, on n'en cautérise qu'une partie. La couche de caustique doit être très mince et à l'état presque liquide. Ainsi appliquée, elle se dessèche bientôt; elle développe une inflammation assez intense, mais qui ne réclame jamais aucun soin particulier et qui tombe dans l'espace de deux à trois jours. On voit alors une croûte ou eschare sèche qui se détache peu à peu dans un intervalle de temps de quinze jours environ et qui laisse une cicatrice à peine appréciable. Cependant, lorsque le sujet est très lymphatique, il se manifeste sous la couche de caustique une sécrétion assez abondante d'une matière séro-purulente concrète qui ressemble tout à fait à la croûte d'impétigo; alors l'eschare se détache beaucoup plus vite, mais on guérit la petite plaie qui en résulte à l'aide de pansements avec le cérat créosoté. (Voy. *Formulaire*, CÉRAT CRÉOSOTÉ.)

Le traitement de l'impétigo ulcéreux est tout autre; il exige une

des médications mixtes les plus compliquées dont j'aie parlé (voy. médication mixte). Je fais prendre aux malades matin et soir de l'huile de foie de morue brune, une cuillerée à bouche, sans dépasser la dose de quatre cuillerées, deux le matin, deux le soir, dose à laquelle j'arrive progressivement en augmentant d'une cuillerée tous les quatre jours; immédiatement après l'huile et dans une tasse de tisane des quatre bois sudorifiques très légère (20 grammes des quatre bois pour un litre d'eau à faire bouillir pendant dix minutes), ou, s'il y a prédominance du tempérament lymphatique, dans de la tisane de houblon, une cuillerée à bouche d'un sirop ainsi composé:

Limaille de fer.	4 décigrammes.
Iode.	17 décigrammes.
Eau.	4 grammes.

Triturez à froid dans un mortier, en ajoutant l'eau goutte à goutte. Dissolvez dans la plus petite quantité d'eau possible :

Iodure de potassium.	10 grammes.

Ajoutez à cette dernière dissolution :

Bichlorure de mercure.	12 à 15 centigrammes.

que vous aurez divisé et dissous par quelques gouttes d'alcool. Mêlez à l'iodure de fer, et incorporez le tout à

Sirop de sucre.	500 grammes.

Ajoutez : Solution de Fowler.	15 décigrammes.

Ce traitement est prolongé sans inconvénient pendant plusieurs mois. Je donne aux repas, suivant l'état de l'estomac, de l'eau ferrugineuse rougie de vin ou de l'eau alcaline; les viandes et légumes forment la base de l'alimentation, à l'exclusion des ragoûts et des mets vinaigrés.

Après deux mois, lorsque la partie malade a subi, de la part de ce traitement, une modification heureuse, que la sécrétion a changé de nature, que la plaie a pris un meilleur caractère, qu'elle s'est en grande partie cicatrisée, que ses lèvres ont perdu de leur engorgement; alors je modifie les surfaces malades par le caustique de Canquoin appliqué par petites portions sur les surfaces malades, et je termine ainsi la guérison dans un espace de temps plus ou moins

court, sans abandonner le traitement interne, sauf à le rendre peu à peu moins actif, par la diminution des doses de substances médicamenteuses.

Noli me tangere. — Ce traitement est aussi applicable à ces ulcérations indolentes des côtés et du dos du nez, à bords amincis, à surface saignante, sans induration sensible des bords, qui détruisent peu à peu les parties au point de mettre à découvert les fosses nasales, et que l'on désigne communément sous le nom de *noli me tangere*. Il réussit merveilleusement dans ces sortes de cas. J'en ai encore deux exemples en ce moment sous les yeux à l'hôpital. Depuis six ans que je l'emploie j'ai obtenu des guérisons fort remarquables dans des cas d'ancienne date où les chirurgiens n'avaient rien voulu tenter à cet égard. Ce ne sont pas des ulcérations ayant des caractères syphilitiques ou scrofuleux, et cependant l'ensemble de ces moyens que j'ai indiqués me donne de remarquables succès. (Voy. SCROFULES SYPHILITIQUES HÉRÉDITAIRES.)

Formes composées d'impétigo.

Impétigo eczémateux. — J'ai décrit cette variété immédiatement après avoir fait l'histoire de l'eczéma, auquel elle se rattache par trop de points de contact. (Voy. ECZÉMA IMPÉTIGINEUX.)

Impétigo ecthymatiforme. — Voici une éruption intermédiaire entre l'impétigo et l'ecthyma, mais qui s'en distingue par le volume et la confluence des pustules. Dans l'ecthyma, toutes les pustules ont en général le volume d'une lentille. Dans l'impétigo, les pustules sont tellement petites, qu'on les a caractérisées par l'expression de *psydraciées*. Ici c'est un état intermédiaire pour le volume. D'ailleurs on voit les pustules avec un point noir central comme dans l'ecthyma, mais moins prononcé, et les pustules sont moins ombiliquées ; elles sont d'ailleurs beaucoup plus confluentes que dans l'ecthyma, moins espacées, mais elles ne se confondent pas entre elles comme dans l'impétigo. Elles ne donnent pas non plus lieu à des croûtes de mélitagre. C'est du pus qu'elles renferment et un pus plus épais, qui ne se concrète que difficilement et qui n'a pas cette couleur jaune-serin de la croûte de mélitagre. Il est très diffi-

ɔir dans ces pustules de fausses membranes comme dans
ı, et elles ne laissent pas de cicatrices aussi profondes et
rquées que cette affection. La maladie a une marche plus
: l'impétigo ; elle est plus tenace ; elle est sujette à déve-
ɜ nouvelles pustules à intervalles plus ou moins éloignés.
ɔlus une *poussée* de pustules dont le développement s'arrête
a période d'évolution a produit son effet, ici c'est une évo-
resque continue, presque successive ; on trouve surtout
ladie le long des membres ; elle réclame d'ailleurs le même
ıt, mais elle se rattache moins que l'impétigo à forme simple
érament lymphatique. Voici une observation qui a été
par le docteur Bergeron, autrefois mon interne, aujour-
ın collègue des hôpitaux, et qui donne une idée exacte de
e de cette maladie.

ɔ *ecthymatiforme.* — Ladislas (Jean), trente et un ans, fondeur,
, tempérament lymphatique. Il y a deux ans, le malade entra à
our un *eczéma lichénoïde* qui occupait la face externe des bras ; il
i au bout de quinze jours, mais un mois après la maladie récidiva.
: rentra à l'hôpital et sortit de nouveau guéri ; depuis ce temps il a
e toujours *quelques boutons*, mais il réprimait leur trop grand déve-
t par des cataplasmes de mie de pain et des bains fréquents. Au
ovembre 1842 la maladie récidiva une troisième fois avec les mêmes
, et ce n'est que douze jours avant l'entrée du malade qu'une forme
'est montrée au bras gauche par une série de petites pustules larges
l-millimètre à 2 millimètres, blanches, ombiliquées, entourées d'une
ɔée peu large ; elles sont formées par le soulèvement de l'épiderme
t. Confluentes et agglomérées dans certains points, elles sont bien
dans d'autres ; leur forme est tantôt circulaire, tantôt ellipsoïde.
ɔpent la face externe et postérieure du bras, au niveau du coude,
ɔace de 10 centimètres de hauteur sur 8 de largeur environ ; elles
ɔées de façon qu'on puisse même les diviser en deux séries de gran-
le occupant, l'une la face externe, l'autre la face postérieure du
la série de la face externe se partageant entre la partie inférieure
t la partie supérieure de l'avant-bras ; l'autre commençant au-des-
coude et descendant plus bas que la première sur l'avant-bras. —
bre. On applique des compresses de sureau, et le lendemain toutes
les sont percées et ont laissé derrière elles de nombreuses ulcéra-
grandeur variable suivant l'étendue et le nombre des pustules aux-
lles ont succédé. Les ulcérations sont indolores, excepté au contact

de l'air ; elles sont peu profondes et régulièrement concaves. — 26 décembre. Les ulcérations les plus petites sont déjà formées et laissent derrière elles de petits points rouges, les plus grandes sont diminuées ; en un mot, il y a progrès sensible vers la cicatrisation. — Le 3 janvier, il ne reste à la place des ulcérations que des points d'un rouge violacé correspondants à de petits noyaux engorgés. Sortie le 12 janvier.

Impétigo sycosiforme. — Quoique nous n'ayons pas encore traité du sycosis, il nous est impossible de ne pas rapprocher cette affection de l'histoire de l'impétigo, car on la désigne généralement sous la dénomination simple d'*impétigo*. Cette affection siége le plus ordinairement au milieu de la lèvre supérieure, immédiatement au-dessous de la cloison du nez, et elle y apparaît en une ou plusieurs petites pustules dont la sécrétion se transforme bientôt en une croûte d'un gris jaunâtre sale, plus ou moins ramassée, saillante, qui tombe au bout de quelques jours pour faire place à une croûte nouvelle, se reproduisant tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, et ainsi de suite durant des mois et des années. Chose remarquable, l'affection ne fait que des progrès extrêmement lents en surface, mais elle persiste avec une grande ténacité. Emploie-t-on des moyens propres à la guérir, elle s'atténue au point de toucher à son terme; puis par le moindre écart de régime, par la moindre circonstance accidentelle, il survient tout à coup une nouvelle *poussée* de pustules qui ramène l'affection sinon au degré où elle était à son début, au moins à un état qui retarde encore de longtemps la guérison. Or, si l'on rapproche cette forme morbide d'impétigo de la marche que nous avons tracée de l'impétigo ordinaire, on verra quelle différence tranchée existe entre ces deux maladies. L'impétigo ordinaire se guérit généralement en peu de temps et par des moyens simples, à moins qu'il ne soit très ancien ; celui-ci, au début même, exige des soins tout particuliers. Mais ce n'est pas seulement une différence de marche qui établit la distinction entre cette forme composée et la forme simple : l'élément morbide est tout différent. Tandis que dans l'impétigo la pustule est plutôt une vésicule purulente qu'une pustule, c'est-à-dire une pustule superficielle; dans l'*impétigo sycosiforme*, la pustule, quoique presque aussi petite, est plus profonde et l'engorgement inflammatoire con-

titue la moitié ou les trois quarts de la pustule, qui est alors à forme acuminée: ces pustules sont séparées les unes des autres et très distinctes, au lieu d'être agglomérées. Ainsi l'élément pustuleux est lui-même très différent.

Mais il existe deux variétés de cette forme morbide par rapport au point de départ de l'affection, et dont le praticien doit bien tenir compte. Dans l'une, la maladie a été précédée de longue date de sécrétion muco-purulente de l'une ou des deux fosses nasales, se traduisant par la formation de croûtes qui tombent, se détachent peu à peu, ou que le malade arrache ; accompagnées souvent de petites pustules sous le bord des narines, pustules douloureuses. Puis, par une cause déterminante quelconque, la maladie des fosses nasales semble s'étendre rapidement à la lèvre supérieure et envahir une surface plus ou moins grande, au point dans certains cas de gagner la lèvre inférieure et le menton. Cette forme est essentiellement lymphatique, scrofuleuse; elle se rencontre surtout dans la jeunesse. — Dans l'autre variété, le malade attribue presque toujours à l'emploi d'un rasoir sale le développement de la maladie, ce rasoir ayant causé une petite coupure qui ne s'est pas guérie et à la suite de laquelle sont survenus quelques petits boutons. Mais ce qui est vrai, c'est que le bouton ou la pustule précèdent souvent la coupure ; c'est que le malade se frotte, arrache, tourmente cette éruption et la transforme ainsi en une maladie de longue durée.

Si les diverses circonstances que nous venons de retracer distinguent l'impétigo sycosiforme de l'impétigo ordinaire, elles le différencient à plus forte raison du sycosis, qui a toujours son point de départ et son siége au menton, et qui s'y montre soit par de gros tubercules plus ou moins suppurants, soit par de grosses pustules, dans lesquelles l'engorgement forme la presque totalité de la pustule, le premier seul étant purulent. Et pour renouer ces différences entre les trois maladies, nous dirons que l'impétigo ordinaire est une affection pustuleuse qui ne s'étend jamais au delà de la superficie du derme ; que dans l'impétigo sycosiforme une partie du derme est attaquée ; et que dans le sycosis toute l'épaisseur de la peau et le tissu cellulaire sous-jacent sont malades.

Reste à donner quelques préceptes particuliers pour combattre-

cette maladie. Lorsqu'elle a pour point de départ les fosses nasales, c'est-à-dire la forme scrofuleuse, c'est la médication antilymphatique qui doit faire la base du traitement : les injections d'eau chlorurée dans les narines, les pommades légèrement sulfureuses. Quand elle siége primitivement et constamment à la lèvre, je ne connais pas de médication interne qui puisse la combattre avec efficacité. L'iodure de soufre à l'intérieur réussit quelquefois ainsi que les arsenicaux. Dans ces sortes de cas voici le traitement auquel je m'arrête : Un cataplasme de fécule de pomme de terre tous les soirs ; dans le jour de l'amidon, pendant les premiers jours, et puis l'usage de pommade au précipité blanc. Tous les deux jours une douche de vapeur aqueuse sur la surface malade. Une douzaine de douches est ordinairement suffisante. Puis modification de la surface malade avec la solution de nitrate d'argent au dixième ou même au cinquième, appliquée tous les cinq jours. Les cataplasmes doivent être employés avec une grande persévérance et durant tout le traitement. Dans quelques cas on se sert avec avantage de la pommade au cinabre, de l'onguent citrin (voy. *Formulaire*). Mais il faut surtout une observation sévère de l'hygiène pendant le cours du traitement.

M. Bazin considère cette forme d'impétigo comme une mentagre dans laquelle existerait le même cryptogame. Aussi conseille-t-il l'usage de l'épilation répétée des poils pour obtenir la guérison. J'ai tenu à connaître la valeur de ce moyen d'une application d'ailleurs très douloureuse, et voici ce que j'ai observé : Il m'est d'abord arrivé plusieurs fois d'avoir en traitement, et ce comparativement, des malades que je faisais épiler et d'autres chez lesquels je m'abstenais de toute épilation. Ces derniers guérissaient quelquefois plus vite. Cependant je dois ajouter que l'épilation m'a paru *favoriser* en général la guérison. Mais j'ajouterai que dans un certain nombre de cas l'épilation répetée huit à dix fois, et aidée des agens externes que M. Bazin met en usage, ne m'a pas amené de guérison. En voici un exemple, je pourrais en citer plusieurs autres.

Impétigo sycosiforme.—Vauthier (Auguste), trente-six ans, entre le 5 juillet 1855. La lèvre supérieure, dans toute son étendue, présente des croûtes gris jaunâtre épaisses, avec un peu de bouffissure de la lèvre ; la barbe est très adhérente et résiste aux tractions. Le malade est d'un tempérament san-

ier terrassier; il a vu apparaître les premières pustules il y a cinq
ription : cataplasmes de fécule; trois portions. — 7 juillet. Huile
- 9. Épilation d'une moitié de la lèvre, le deuxième jour l'autre
11. Poussée de petites pustules grosses à peine comme de petites
ugle sur la partie moyenne de la lèvre. — 12. Lotions de sublimé.
térisation au nitrate d'argent, solution au 10°. — 18. Épilation. —
sation; il était apparu la veille quelques pustules. — 25. Épilation,
ade au sulfate de cuivre. Le malade reste plus de vingt jours sans
r de nouvelles pustules; il sort le 25 septembre dans un état satis-
4 novembre. Le malade, qui est employé dans l'hôpital, me dit
stules sont revenues, que M. Bazin l'a fait épiler deux fois et lui
ner de la pommade de sulfate de fer.

oie l'histoire de l'*impétigo rupiforme* ou *scabida* et celle de
lupiforme aux articles RUPIA et LUPUS, auxquels ils se rat-
irectement.

YMA (ἔκθυμα, ατος, *id quod erumpit per cutem, pustula*).
Phlyzacia d'Alibert.

forme la plus commune :
re.
ge :
ile.
marche :

ique.
tinum ou successif.

Suivant sa cause :
Idiopathique.
Symptomatique.
Suivant sa forme composée :
Impétigo ecthymatiforme.
Ecthyma rupiforme, cachecticum ou *luridum*.

e Willan et Bateman aient fait faire à la science un pro-
ttachant l'épithète d'*ecthyma* à un mode tout spécial de pus-
ique M. Rayer ait plus particulièrement étudié et mieux
on ne l'avait fait avant lui la pustule d'ecthyma, il faut
règne encore dans les auteurs une certaine incertitude
lescriptions des variétés qui en ont été faites. Que l'on par-
r exemple, ce que dit Willan des caractères distinctifs de
luridum et de l'*ecthyma cachecticum*, on verra qu'il y a entre
formes une parfaite analogie, quoiqu'elles soient exposées
nt; aussi M. Gibert se borne-t-il, après avoir décrit l'*ecthy-*
um, à dire que l'*ecthyma cachecticum* s'en rapproche sous
rapports.

Attachons-nous d'abord à bien spécifier les caractères de affection pustuleuse par une description exacte de la pustu nous verrons ensuite dans quelles conditions cette maladie pe développer. L'ecthyma est une affection pustuleuse qui peut af toutes les parties du corps, mais qui, peu fréquente à la figu montre principalement sur les membres et au cou, beaucou rarement à la poitrine et au dos, par des pustules de la large moins d'une lentille, espacées les unes des autres, très rar confluentes; lorsque deux pustules se touchent, elles peuve confondre par une partie de leur circonférence, mais tout e courant, isolément chacune, les phases qui sont propres à ce tules. La pustule d'ecthyma, quoique large, est telle que le dixièmes de la pustule sont formés par la vésicule purulen centre de laquelle est un point noir déprimé qui donne à cett tule l'aspect rubéolique des pustules de la variole. Elle débu une élevure inflammatoire limitée qui, dans les vingt-quatre h se recouvre d'une vésicule large, remplie d'une sérosité arg du même aspect que celle de la vaccine ; puis dans les vingt-q heures suivantes, cette sécrétion prend une apparence franch purulente, en même temps que se dessine, au centre de la pu un point ombré qui devient noir et se déprime. Si l'on ouvre cette pustule, il s'en écoule du pus en petite quantité ; et en co avec soin l'épiderme qui lui servait d'enveloppe et qui adhè le point noir central presque autant qu'à la circonférence, o une fausse membrane assez épaisse qui recouvre le derme. O la détacher, et alors on aperçoit une ulcération du tissu de la déprimée dans le centre; cette dépression se conservant même la guérison de l'ecthyma et s'apercevant très bien après la rison, au centre de la cicatrice. Que si nous reprenons la p où nous l'avons laissée, c'est-à-dire après trois jours d'évolut lorsqu'elle est franchement purulente, nous verrons que peu la vésicule se rompt, le liquide qu'elle contient s'en s'éc l'épiderme s'applique sur la fausse membrane pour donner nai à une croûte grisâtre qui, en se desséchant, rétrécit le diamè la pustule et adhère fortement à la surface de la peau. Mais peu et vers le septième ou le huitième jour cette croûte se d

parait impossible de confondre l'ecthyma avec aucune affec-
ustuleuse, si ce n'est l'impétigo ecthymatiforme que nous
décrit et qui n'en est qu'un diminutif, mais qui s'en distingue
petitesse des pustules et leur confluence. Il est vrai de dire
s pustules de l'ecthyma se rapprochent beaucoup de celles
variole, mais les deux éruptions, comme confluence et comme
omes, sont tellement différentes, qu'on ne saurait les mécon-
.

ethyma que l'on a appelé *vulgare* ou *ordinaire* est une maladie
nement inflammatoire, se rapprochant des exanthèmes sous ce
rt. Cette éruption est parfois précédée ou accompagnée de dou-
lancinantes, et quand elle se montre à la partie interne des
res, il n'est pas rare qu'elle entraîne un état inflammatoire des
ou l'engorgement des ganglions de l'aisselle ou de l'aine; elle
oïncider aussi avec une éruption furonculeuse à l'instar du
elle est d'ailleurs précédée de prodromes inflammatoires graves
u moins marqués : anorexie, pâleur générale, chaleur de la
soif, fièvre. Elle se montre ou à l'état discret dans une surface
endue, ou avec une certaine confluence ; mais l'ecthyma gé-
n'est propre qu'à l'enfance. Dans l'adolescence et dans l'âge
, la maladie n'atteint le plus souvent qu'une partie ou la tota-
n membre. Voici d'ailleurs ce que la statistique nous a appris
égard. La maladie n'est pas commune, parce que nous ne la
ons notée que vingt fois sur dix-huit cents cas de maladies de
n. C'est principalement de quinze à vingt-cinq ans qu'elle s'est

fois sur vingt, l'ecthyma a été observé en été et au printemps ; le plus souvent il était dû à un excès de travail, à la fatigue. Les mains, les avant-bras, les cuisses et les jambes étaient les parties le plus communément atteintes. Cette affection pourrait être chiffrée beaucoup plus haut par quelques médecins qui aujourd'hui considèrent la gale pustuleuse comme une gale compliquée d'ecthyma. Mais tout en admettant que l'ecthyma puisse venir compliquer la gale, comme il complique le prurigo et le lichen, nous ne saurions partager cette manière de voir, ainsi que nous le dirons à l'article GALE PUSTULEUSE.

La marche de l'ecthyma peut être aiguë, c'est celle que nous venons de décrire. Cette forme aiguë peut parcourir ses périodes dans un espace de temps circonscrit, un ou deux septénaires ; ou au contraire l'ecthyma se montrera successif, à évolutions successives, *diutinum :* c'est ce qui a lieu surtout dans l'ecthyma à forme chronique. Alors il peut envahir graduellement une grande étendue de la surface du corps. A cet égard, il est une observation importante que nous avons faite et que nous croyons devoir consigner ici : c'est que plus les pustules d'ecthyma qui apparaissent en dernier lieu sont petites, plus la maladie approche de la guérison, semblable en cela au pemphigus et au zona, dont l'éruption décroissante est toujours annoncée par une diminution dans le volume des vésicules.

L'*ecthyma infantile* affecte principalement les enfants à la mamelle. Il coïncide avec une alimentation insuffisante, un lait de mauvaise qualité. Cette éruption est générale ou limitée, mais le plus souvent générale et successive. C'est surtout à la figure, au cou, à la poitrine qu'elle se montre contrairement à l'adulte. Sa durée n'a pas de limites précises ; elle s'accompagne fréquemment de diarrhée plus ou moins abondante et elle dénote un affaiblissement très compromettant pour la vie de l'enfant. Ce n'est pas que l'ecthyma de l'adulte ne puisse se lier à quelque irritation gastro-intestinale, à quelque entéralgie, à quelque état morbide interne ; il en est assez fréquemment le reflet, surtout quand il se montre sous forme chronique, car l'ecthyma aigu est le plus souvent franchement inflammatoire.

Quant aux deux variétés d'*ecthyma luridum* et *cachecticum* des

auteurs, et que je regarde comme une seule et même affection, leur description en a été faite dant le troisième groupe.

Nous avons décrit l'impétigo ecthymatiforme page 352.

Traitement. — Les distinctions assez tranchées que nous avons établies entre les diverses espèces d'ecthyma tracent naturellement la marche qu'il y a lieu de suivre dans le traitement de cette affection. L'invasion de la maladie a-t-elle eu lieu avec une forme aiguë ; est-elle d'ailleurs accompagnée de symptômes généraux fébriles ou d'un état de pléthore assez marqué, ou encore de furoncles, d'engorgements des ganglions, de phlébite commençante, il y a lieu de recourir au début à une émission sanguine. A cet égard, s'il y a phlébite coïncidante, il faut préférer les sangsues à l'anus à la saignée générale ; dans le cas contraire, ne pas hésiter à pratiquer celle-ci sur le membre qui n'est pas affecté d'ecthyma, car lorsque la peau est malade et enflammée sous quelque forme que ce soit, il y a toujours inconvénient à y pratiquer une plaie, quelque petite qu'elle puisse être. Les boissons rafraîchissantes, les dérivatifs sur le canal intestinal, l'amidon en poudre sur les surfaces malades, et, s'il y a trop d'inflammation, les cataplasmes de fécule, les bains, tels sont les moyens à mettre en usage.

Lorsque l'ecthyma a une forme chronique, il est rare qu'il ne soit pas lié à un état interne morbide quelconque. C'est moins alors l'éruption pustuleuse qu'il faut traiter que l'état morbide général ou local de l'économie. Ce que nous pouvons avancer, c'est que l'ecthyma est une maladie qui repousse en général la série des moyens ou agents dits dépuratifs qui conviennent à un certain nombre d'affections cutanées.

Quant à l'ecthyma rupiforme désigné par les auteurs sous le nom de *luridum* ou *cachecticum*, c'est un tout autre ordre d'idées qui doit diriger le praticien. Ici la maladie comme dans le rupia est le reflet d'un affaiblissement de l'économie, et tout en traitant la forme inflammatoire par les émollients pulvérulents, l'amidon, la poudre de riz, il faut soutenir les forces du malade par une bonne alimentation ayant pour base les viandes rôties en même temps que l'on administre les amers, les ferrugineux, le quinquina. — Tous les agents externes aqueux, relâchants, doivent aussi être exclus du

traitement. Ils favorisent l'inflammation des pustules, l'agrandissement des ulcères à forme déjà atonique par eux-mêmes; aussi le médecin doit-il être très sobre de cataplasmes, de bains et de tout ce qui relâche les tissus.

SYCOSIS (σύκωσις); mentagre, de *mentum*, menton, et de αγρα, prise; maladie du menton.

Simplex.	*Compositum.*
Suivant la forme :	Impétigo sycosiforme.
Tuberculeux.	Herpès sycosiforme.
Pustuleux.	
Suivant le siége :	
Sycosis menti.	
Sycosis capillitii ou *pilaris.*	

Bateman est le seul auteur qui ait donné une idée exacte de cette affection. Tous ceux qui l'ont suivi ne nous ont tracé qu'une description incomplète ou confuse de cette maladie. Tous l'ont rapprochée ou confondue avec l'acné dont elle diffère; aucun d'eux n'a parlé du *sycosis capillitii* dont Bateman avait cependant retracé les caractères avec assez de soin pour faire voir qu'il s'agissait d'une forme morbide à part. Essayons de suppléer à ces lacunes.

Et d'abord je commence à élaguer de cette description le mot *mentagre*, qui exprime une maladie dont le siége exclusif est au menton, ce qui n'est pas exact. La source de ce nom est dans une épidémie de *sycosis* qui a régné chez les Romains et dont Pline a retracé la description dans son *Histoire naturelle* (liv. XXVII, chapitre 1). M. Gibert a donné la traduction de ce passage que nous reproduisons ici. « Une maladie inconnue jusqu'alors, non-seulement à l'Italie, mais encore à l'Europe presque tout entière, vint sévir à cette époque sur le visage de l'*homme*. Elle se répandit peu en Illyrie, dans les Gaules, en Espagne et ravagea de préférence Rome et ses environs. Causant à la vérité peu de douleur, et n'entraînant pas de danger pour la vie, cette maladie amenait de si hideuses difformités que la mort eût été préférable. On lui donna en premier lieu le nom grec de *lichen;* mais bientôt, à cause de son siége spécial au menton, elle reçut d'abord par plaisanterie (les

hommes ne sont que trop enclins à se rire du mal d'autrui), le nom de *mentagre*, qui lui est demeuré depuis.

« Chez beaucoup de sujets, elle ne se bornait point au menton, mais elle envahissait le visage tout entier, à l'exception des yeux; elle s'étendait même au cou, à la poitrine, aux mains qu'elle couvrait de hideuses écailles. Ce mal, inconnu à nos pères, se montra pour la première fois en Italie vers le milieu du règne de Tibère Claude César. On raconte qu'un chevalier romain la rapporta d'Asie, où régnait cette affection, et la transmit ensuite *par contagion* aux habitants de Rome. *Les femmes n'en furent point affligées;* le peuple et même la classe moyenne en furent exempts: mais les grands et les nobles en éprouvèrent cruellement les atteintes, *l'affection se propageant rapidement chez eux par le baiser* (*dont ils se saluent habituellement*).

» Ceux qui se faisaient traiter offraient au visage des cicatrices plus hideuses que le mal lui-même. La méthode de traitement consistait en effet dans l'emploi des caustiques, qui n'empêchaient pas le mal de reparaître si les chairs n'avaient été brûlées jusqu'à l'os. Cette cruelle ressource fut la seule qu'apportèrent d'Égypte les médecins qui vinrent de ce pays s'enrichir à nos dépens. »

C'était bien là en effet le *sycosis menti;* mais l'affection pouvant se montrer ailleurs, sa dénomination de *mentagre* doit disparaître. Ce passage de Pline est très significatif sous plusieurs rapports. Voilà une épidémie; les hommes seuls sont atteints, et aujourd'hui que nous établissons d'une manière très nette le diagnostic des maladies de la peau, nous pouvons répéter avec Pline: les hommes seuls sont atteints de cette maladie lorsqu'elle a son siége au menton. Les femmes en sont exemptes parce qu'elles n'ont pas de barbe, et si un auteur a pu déclarer que la maladie pouvait aussi affecter la femme, il aurait dû ajouter, des femmes qui auraient de la barbe, car je n'ai jamais observé le *sycosis menti* chez la femme.

Mais le *sycosis capillitii* est une affection commune à la femme comme à l'homme, parce qu'elle a son siége dans les cheveux. Ce n'est pas que dans l'un comme dans l'autre cas la barbe ou les cheveux soient toujours malades, et cela est si vrai, que si la barbe tombe dans le *sycosis menti*, elle repousse le plus souvent après la

guérison. Il y a plus : le *sycosis capillitii* vient très fréquemment au sommet de la tête de personnes chauves, il s'étend sur le front et aux tempes ainsi que nous le dirons plus loin. Cherchons donc à donner le cachet de la forme morbide du sycosis. Disons tout de suite qu'il se présente sous deux aspects différents, suivant qu'il constitue la mentagre ou qu'il affecte les parties recouvertes de cheveux ou de poils.

Sycosis menti. — Ici deux variétés : on peut l'observer ou sous la forme de tubercules, ou sous celle de grosses pustules. (Le menton peut être le siége d'un eczéma impétigineux, ainsi que d'un impétigo sycosiforme, mais ce n'est pas là le sycosis.) Dans le premier comme dans le second cas, le menton devient le siége d'un sentiment de chaleur, de cuisson, de turgescence, à la suite duquel se manifestent dans certains points des tumeurs du volume d'une noisette, à surface rouge, lisse, quelquefois granulée et que l'on a comparée avec raison au parenchyme de la figue ou à la surface d'une framboise. Ces tubercules sont agglomérés, mais disposés par groupes, le plus souvent au voisinage du menton, quelquefois vers l'angle de la mâchoire. Ils se succèdent dans l'espace de huit à quinze jours, temps durant lequel la maladie est dans sa période d'accroissement ; et lorsque l'affection est intense, lorsqu'elle attaque une assez grande surface, quand ses tubercules se multiplient, on conçoit que le menton et le bas de la figure puissent doubler et tripler de volume en même temps que sa surface est hérissée de champignons ou tubercules plus ou moins proéminents. Tous ces tubercules sécrètent, mais d'une manière tout à fait disproportionnée avec l'état inflammatoire et avec les productions morbides. C'est une espèce de suintement mucoso-purulent, qui se concrète en partie sous la forme de croûtes d'un gris sale, assez minces, et qu'un peu d'axonge, un cataplasme appliqué pendant quelques heures, suffit pour faire tomber ; alors se montre une surface humide qui donne à toute cette peau mamelonnée un aspect luisant des plus désagréables.

Y a-t-il dans cette description quelque chose que l'on puisse comparer avec l'acné ? Évidemment ce n'est pas là la maladie qui porte ce nom ; on l'a donc rangée à tort dans l'histoire de

cette affection. Arrivons à la description de la seconde espèce de mentagre.

Dans celle-ci ce ne sont plus des tubercules, ce sont de véritables pustules, mais si dissemblables de celles de l'*acné*, qu'il est impossible de s'y méprendre. Les prodromes de l'affection sont les mêmes; seulement, au lieu de voir surgir des tubercules inflammatoires à aspect charnu, ce sont des noyaux d'engorgement ayant la forme plus ou moins acuminée, et du sommet desquels s'échappe du pus. La base de ces pustules, dont le volume égale quelquefois celui d'une noisette, repose elle-même sur un tissu largement enflammé. La suppuration ne dure que douze à quinze jours, après laquelle reste un état inflammatoire encore très prononcé, mais stationnaire, et fournissant çà et là, à des distances variables, des pustules nouvelles ou des engorgements acuminés qui sécrètent du pus.

Dans ces deux variétés de *sycosis menti* les poils tombent, et cependant les follicules pileux ne sont pas le siége de l'affection : c'est la peau dans toute son épaisseur, c'est le tissu cellulaire sous-cutané, ce sont les ganglions du cou même qui peuvent se prendre et s'engorger; ce sont enfin, mais dans des cas tout à fait exceptionnels, les joues, les oreilles, qui sont atteintes, ainsi que cela a eu lieu dans l'épidémie romaine.

Sycosis pilaris (*sycosis capillitii* de Bateman). — Cette forme morbide est toute différente et aussi tout à fait distincte des variétés d'*acné*. Elle est d'autant plus importante à connaître qu'elle a son siége dans des parties où les syphilides se montrent ordinairement, notamment le *corona Veneris*, et qu'elle en a souvent imposé pour une maladie vénérienne secondaire. Cette affection se développe également chez l'homme et chez la femme. Elle apparaît ordinairement à l'âge critique, c'est-à-dire vers quarante-cinq ou cinquante ans. On la trouve le plus souvent au sommet de la tête, le long des cheveux qui bordent le front, aux tempes, à l'occiput, mais elle peut être disséminée çà et là dans les cheveux. On la voit aussi au pubis au milieu des poils; à la peau du sternum des personnes velues; en un mot, dans les parties habituellement tapissées de poils. Il faut cependant en excepter les aisselles et les jambes, où elle se montre fort rarement.

Elle apparaît toujours avec un développement et une marche lente, insidieuse, discrète. Ce sera un ou deux boutons qui se montreront et qui amèneront une sensation non pas de démangeaison, mais de chaleur, d'élancement, de picotement, qui conduit à un grattage toujours douloureux pour le malade et éveillant une sorte d'élancement ; le malade écorche et s'arrête. Ces boutons ont le volume d'une très petite lentille, leur grosseur est d'ailleurs variable ; ils sont durs, peu inflammatoires, semblent s'entr'ouvrir à leur sommet, quoiqu'ils aient une forme plate. On aperçoit à leur centre une petite sécrétion jaune grisâtre formant croûte, de niveau d'ailleurs avec le reste de l'engorgement.

Chose remarquable, leur aspect a une teinte jaune rougeâtre cuivrée qui tend à les rapprocher des pustules du *corona Veneris*. D'ailleurs les papules ou pustules ne sont pas traversées par un poil. Il faut quelquefois des mois entiers pour que cette éruption, qui se succède très lentement, arrive à envahir l'étendue de la racine des cheveux et à couvrir le front. Si les boutons affectent cette partie, c'est de préférence aux tempes sous les bandeaux que portent les femmes et le long des cheveux, que l'éruption est plus confluente. D'ailleurs fermes, durs au toucher et peu douloureux à la pression, ils sont beaucoup plus discrets sur la poitrine et sur le pubis ; mais ils y suivent la même marche de développement et ils y observent la même forme morbide. — Comme on le voit encore, il n'existe dans cette variété de *sycosis pilaris* aucune analogie avec l'acné.

Voila donc trois formes morbides bieu tranchées de sycosis. Deux appartiennent au *sycosis menti*, et la troisième au sycosis que j'appelle *pilaris* ou *pilosum*, parce que je généralise le *sycosis capillitii* que Bateman a décrit avec beaucoup de raison, mais qu'il n'avait su reconnaître qu'à la tête. Indiquons maintenant la marche que suivent ces diverses affections. Si les deux premières formes de mentagre que nous avons décrites ont une invasion généralement aiguë, si leur debut est accompagné de phénomènes inflammatoires locaux très intenses, il faut dire que cet état s'arrête en général dans les quinze premiers jours, mais pour rester stationnaire durant un mois, six semaines; état indolent, quoique toujours inflammatoire, sans diminution bien sensible dans le volume du menton, et qui va

perdre avec le temps de son intensité pour entrer dans la voie de la résolution. Mais combien celle-ci est lente à s'effectuer ! Le moindre écart de régime, le moindre excès en liqueurs spiritueuses, suffit pour ramener une éruption nouvelle ; durant ce laps de temps le menton conserve cette hypertrophie si caractéristique que nous avons décrite et qui lui donne un aspect si hideux. Enfin peu à peu les tubercules ou les grosses pustules diminuent pour ne plus laisser que des engorgements partiels qui peuvent encore ne pas être très appréciables à la vue, mais qui le sont au toucher, et qui sont disséminés dans l'épaisseur du menton pour se terminer après plusieurs mois par résolution, ou pour persister pendant longtemps sous la forme chronique. Je suppose la maladie non traitée et abandonnée à elle-même.

La maladie n'a pas toujours l'acuité que nous venons de peindre. Elle peut se présenter d'une manière discrète, partielle; elle peut même s'offrir sous la forme de quelques faibles noyaux d'engorgement disséminés çà et là et se succédant sans amener d'augmentation de volume, de sorte que l'on peut observer toutes les nuances depuis le cas le plus simple jusqu'au cas le plus grave.

Le *sycosis pilaris* ou *capillitii* peut être aussi très discret et ne consister que dans quelques boutons épars, mais il a la même ténacité. J'ai donné des soins à une dame de quarante-cinq ans qui depuis quatre mois était atteinte de cette maladie. L'affection avait débuté par des boutons ou papules à évolution éloignée qui se sont successivement montrés au voisinage des tempes, et dont la marche avait été si lente, qu'on n'en comptait encore que dix à douze tant d'un côté que de l'autre. Elle en était là lorsqu'elle fut prise de céphalalgie, de malaise général causé par une exposition au froid. Il est survenu un leger mouvement fébrile qui cependant ne lui a pas enlevé l'appétit, et cette indisposition passagère a suffi pour développer à la racine des cheveux, sur la totalité du front, au cuir chevelu, des boutons ou pustules très nombreuses, confluentes, dont le sommet est devenu légèrement sécrétant; l'engorgement persistait malgré la secrétion. Ainsi il y a, comme on le voit, analogie de marche, de durée, d'âge, de développement dans ces formes de sycosis.

Pour nous, dans la mentagre, tout le tissu de la peau et tous les organes contenus dans ce tissu sont malades. On observe bien dans certains cas l'existence d'un cryptogame, le *tricophyton tonsurant*, que nous avons vu, mais qui est loin d'être constant. Dans la plupart des cas, il s'arrête au bulbe pileux et ne va pas au delà. Celui-ci comme nous l'avons dit, est enflammé, déformé et malade.

Formes composées. — *Impétigo sycosiforme* (voy. p. 330).

Herpès sycosiforme. — Cette variété n'a pas été décrite ; nous ne l'avons observée qu'une seule fois, mais elle était tellement caractérisée, que nous en avons fait faire le dessin. Nous en joignons ici l'observation. La maladie remontait à cinq ans, elle avait une forme circinée des mieux caractérisées. La surface malade, large d'une pièce de 1 franc, était circonscrite par un bourrelet épaissi, pustuleux, induré, qui s'étendait lentement par sa circonférence, laissant tout son centre dépourvu de poils au milieu d'une barbe épaisse et noire. Les cataplasmes, les douches de vapeur, les pommades, les cautérisations superficielles, ne firent rien pour le malade. Nous ne parvînmes à détruire cette affection qu'à l'aide de trois applications légères du caustique de Canquoin, faites par tiers sur la surface du bourrelet.

Le nommé Riere (Guillaume), quarante-trois ans, menuisier, demeurant rue du Faubourg-Saint-Martin, entre à Saint-Louis le 19 septembre 1850 et occupe le lit n° 25 de la salle Saint-Louis.

Antécédents. — D'un tempérament bilioso-sanguin et d'une bonne constitution, il a eu en 1832, époque où il faisait partie de l'expédition d'Anvers, des ulcérations à la verge et un bubon. Ces accidents se sont montrés successivement et ont été traités à l'hôpital militaire de Lille par de simples émollients qui auraient suffi pour les faire disparaître dans l'espace de quinze jours, le bubon n'ayant pas suppuré. Interrogé et examiné avec soin, le malade ne paraît pas avoir éprouvé depuis cette époque des accidents syphilitiques secondaires ni tertiaires. Il n'aurait jamais pris de mercure. Quant à l'affection qui l'amène aujourd'hui à l'hôpital, son début daterait de cinq ans. Il aurait, à cette époque, vu survenir à sa lèvre supérieure une éruption qui, après avoir duré une année, aurait disparu au moment même où quelques boutons paraissaient sur le côté gauche du menton. Ces derniers boutons auraient ensuite persisté en se succédant dans le même lieu et en gagnant un peu, mais très

lentement, en surface. Entré pour des fièvres d'accès à l'hôpital de la Charité, à une époque où son affection du menton avait une étendue moindre de moitié que celle qu'elle offre aujourd'hui, on aurait cautérisé la surface malade avec du nitrate d'argent fondu. — Postérieurement à sa sortie de la Charité, il serait entré deux fois dans le service de M. Devergie à Saint-Louis pour ses boutons de la lèvre ; mais obligé chaque fois, pour des affaires d'intérêt, de quitter l'hôpital avant d'avoir vu disparaître cette maladie, il revient une troisième fois dans l'espoir d'obtenir une guérison complète.

Examen du malade le 24 octobre 1850. — L'affection siége principalement sur le côté gauche du menton et présente deux aspects différents, savoir : 1° une portion centrale qui est rougeâtre et complétement glabre; elle est arrondie, large comme une pièce de 50 centimes et un peu déprimée; 2° une portion périphérique, hérissée de poils et présentant une série circulaire de petites croûtes ; celles-ci sèches, brunâtres, isolées les unes des autres, forment un anneau qui encadre exactement la portion centrale. Chacune de ces petites croûtes repose sur une petite saillie rougeâtre, enflammée, du volume d'une grosse tête d'épingle, un peu acuminée, et excoriée à son sommet, lequel donne issue à des poils et à un léger suintement qui, en se concrétant sur place et en se mêlant à quelques particules épidermiques, constitue les croûtes isolées. Sous ces petites saillies enflammées qui paraissent avoir pour siége les follicules pileux, la peau est assez tuméfiée pour former un léger relief. La portion centrale, véritable cicatrice d'une affection éteinte, est lisse et le siége d'une exfoliation épidermique. Elle n'est point sensible à la pression. La portion périphérique au contraire montre la maladie dans son état ; elle est sensible à la pression et le siége, par moments, d'une douleur chaude spontanée. Les deux portions réunies constituent une plaque ayant à peu près les dimensions d'une pièce de 1 franc. En dehors de cette plaque les parties sont saines. Quelques autres pustules isolées, semblables aux précédentes, sont disséminées sur le côté droit du menton et dans le sillon mento-labial ; mais, dissimulées par une barbe épaisse elles sont beaucoup moins apparentes.

Traitement. — Je ne connais aucun traitement interne qui puisse être dirigé avec avantage contre le sycosis, à moins que cette affection ne soit liée avec un état morbide de quelque organe, et lorsque l'on prescrivait l'hydrochlorate d'or ou l'arséniate de fer comme agent thérapeutique, du temps de Biett, on y ajoutait le remède le plus efficace, les douches de vapeur. Mais à cette époque l'arsenic était une espèce de panacée. Or, aujourd'hui, les malades affectés de sycosis guérissent au moins aussi promptement sans cet agent si puissant d'ailleurs pour d'autres cas. Aussi nous bornons-nous à

conseiller l'usage des moyens suivants : Saignée générale au début pour arrêter les progrès de la maladie; cataplasmes sur les surfaces malades : c'est l'émollient, le sédatif par excellence de cette affection ; lotions d'eau de sureau, d'eau chlorurée ; purgatifs répétés ; douches de vapeur tous les deux jours sur les parties affectées, lorsque l'état de surexcitation a été un peu calmé. On ne saurait croire le bon effet de ces douches dont l'emploi répugne au premier abord en raison du développement inflammatoire des parties molles. L'onguent mercuriel simple sous les cataplasmes est très efficace. Puis, lorsque les tubercules sont sensiblement affaissés ou lorsque les pustules sont ramenées à l'état d'engorgement subaigu, passer çà et là le crayon de nitrate d'argent, et répéter cette opération tous les jours en agissant sur des points différents, ce qui n'empêche pas la continuation des cataplasmes. Ces cautérisations légères superficielles résolvent les noyaux d'engorgement comme par enchantement. Le tout est de saisir le moment opportun pour les opérer. La durée moyenne d'un traitement est de cinq semaines à deux mois.

M. Bazin, se fondant sur l'existence d'un cryptogame dans la mentagre, conseille, comme dans la teigne, l'épilation; il ajoute qu'il a guéri par ce moyen des maladies qui pendant six ou huit mois étaient en traitement. Je dois consciencieusement réfuter cette assertion. Le sycosis amène tout naturellement l'épilation, si l'épilation doit avoir lieu. Il n'est, à mon avis, jamais nécessaire de l'opérer; elle est au moins inutile. Dans la presque totalité des cas, cette opération spontanée n'est que temporaire, l'épilation artificielle ne devient nécessaire que dans quelques cas exceptionnels.

Le traitement du *sycosis pilaris* ou *capillitii* est beaucoup moins net, beaucoup moins franc. L'affection a cependant des formes morbides bien disproportionnées. Dans cette variété j'ai quelquefois donné l'iodure de soufre à l'intérieur avec avantage ; dans quelques cas, les sudorifiques et l'iodure de potassium, quoique la maladie ne reconnût pas de cause syphilitique. C'est aux cataplasmes, aux bains de vapeur et même aux douches, aidés des purgatifs, que j'ai le plus souvent recours. Des lotions d'eaux sulfureuses réussissent également. Les pommades sont sans succès. Quant aux eaux

minérales, celles de nature sulfureuse sont indiquées dans le traitement de tous les sycosis à forme chronique.

ACNÉ ἀκνή des Grecs; *varus* ou *vari* des Latins; *varus* d'Alibert, ou dartre pustuleuse; *gutta rosacea*; couperose; *acne rosacea*.

Il est peu de maladies à l'égard desquelles il ait été fait des descriptions plus variées suivant les auteurs qui en ont traité. Tous tendent à ne faire qu'une seule maladie de l'acné, de la couperose et de la mentagre. Plus récemment encore on a rapproché, avec raison d'ailleurs, une variété de *molluscum* que M. Bazin a désignée sous le nom d'*acné varioloïde*. Déjà nous avons isolé le sycosis ou mentagre de la catégorie des acnés, parce que ce n'est pas une maladie des follicules sébacés. Nous en ferons autant de la couperose dans laquelle les follicules sébacés ne deviennent malades qu'accidentellement ou successivement. Nous réservons exclusivement le nom d'*acné* à l'affection des follicules sébacés de la peau. La *couperose* est au contraire une dilatation active des vaisseaux capillaires des joues et du nez, qui peut aller jusqu'à l'hypertrophie tuberculeuse de la peau de ces parties. La *mentagre* est une inflammation tuberculeuse ou pustuleuse de la peau du menton ou des parties recouvertes de poils. Ces trois affections diffèrent donc essentiellement entre elles, non-seulement par la forme morbide, mais surtout par la nature des parties affectées. Voici les divisions que nous adoptons pour l'*acné* dans les diverses espèces sous lesquelles il peut se présenter :

Sans hypertrophie des follicules :	Avec hypertrophie des follicules :
Simplex ou *rosacea*.	*Acne sebacea hypertrophique*.
Indurata.	*Acné tuberculoïde*.
Miliaris.	
Punctata.	
Sebacea.	

La dénomination d'*acne simplex* est mauvaise, car il faudrait qu'il existât par opposition un *acne composita*. Nous préférerions qu'il fût appelé *rosacea*, de préférence à la couperose, maladie dont le nom dériverait de *gutta rosa*, d'où l'on aurait fait par corruption *couperose*. L'expression *rosacea* suppose une efflorescence, une mala-

ie ou éruption avec des phénomènes inflammatoires printaniers ; est en effet ce qui a lieu dans l'*acne simplex*, que nous proposons appeler *rosacea* par opposition à l'*acne indurata* qui offre le cachet une éruption à forme tout à fait chronique. Nous avons de plus éé une espèce particulière sous la dénomination d'*acne miliaris*, rme toute spéciale en raison de la petite dimension des pustules, leur confluence et de leur ténacité. Enfin nous divisons l'acné bacée en deux espèces : l'une est sans hypertrophie de follicules, st l'acné de Biett ; l'autre, avec hypertrophie des follicules, comend : 1° une espèce non décrite, que nous avons observée et qui hale la matière sébacée comme dans l'acné de Biett ; 2° la variété *molluscum* que quelques auteurs ont décrite à tort comme une ection tuberculeuse, que M. Bazin a nommée *acné varioloïde*, et e M. Piogey propose de dénommer *acné tuberculeux ombiliqué ;* is nous n'acceptons aucune de ces dénominations. Le *molluscum* st pas une affection *tuberculeuse* de sa nature, il faut donc rejeter nom. L'affection ne saurait être appelée *acné varioloïde*, parce 'elle n'affecte cette forme que lorsque le sac qui contient la mare sébacée est ouvert, que l'ouverture se déprime et forme un int noir comme dans la pustule de la variole. Ces motifs nous st donc aussi rejeter la dénomination de M. Piogey, qui, pour néliorer cette dénomination, y a ajouté la qualification de *tuberleux* Un acné tuberculeux indique évidemment tout autre chose. ns nous bornons donc à dire *acné sébacé à forme tuberculeuse*, in de faire pressentir seulement l'état et l'aspect sous lesquels il se ésente à l'observation, ou *acné tuberculoide*. Voilà les difficultés ui surgissent sans cesse quand on cherche à donner un sens à une nomination de maladie. La dénomination est bonne aujourd'hui ie l'on croit bien connaître la nature de l'affection, elle est mauise demain quand la nature en est mieux connue.

Toutes les variétés d'acnés naissent et se montrent presque tours sur une peau organisée d'une manière toute particulière : cette au est épaisse, plus ou moins blafarde, à sécrétion grasse, huise ; en l'examinant de près et notamment au visage, sur le nez rtout, on la voit criblée de petits points évasés, incolores, qui ne nt autres que les orifices des canaux des follicules sébacés qui ont

subi une certaine dilatation, et entremêlés de petits points noirs produits par la matière sébacée salie qui remplit les canaux de quelques follicules (*acne punctata*). En été, ces sortes de peaux transpirent et graissent les vêtements qui les recouvrent.

Acne rosacea (*simplex*). — Cette affection se montre surtout au printemps et en été. Elle apparaît chez les jeunes gens de douze à dix-huit ans par une série de boutons de volume divers qui se montrent principalement sur le visage à l'état disséminé, affectant surtout les joues et le front. Leur nombre est d'ailleurs très variable. Ils se manifestent par une élevure rouge, de forme pyramidale, avec état inflammatoire assez prononcé pour que leur base soit souvent accompagnée d'un état érythémateux très circonscrit. Mais ce qui le distingue de toute autre variété d'acné, c'est cette teinte rosée efflorescente qui est propre aux exanthèmes en général. Dans les premières ou secondes vingt-quatre heures au plus tard, le sommet de chaque bouton devient vésiculeux, purulent, et vers le troisième ou le quatrième jour ces boutons s'ouvrent spontanément pour donner issue à un pus lié. Alors l'engorgement pustuleux diminue peu à peu et disparaît pour laisser une petite cicatrice inappréciable au visage. Le tout se passe sans autre sensation qu'une légère chaleur. L'éruption s'opère en totalité dans l'espace de huit jours et se guérit par des moyens simples dans les deux ou trois septénaires de l'éruption, si les pustules ne sont pas irritées par les grattages ou par des applications intempestives de nature irritante. Mais la figure n'est pas le seul siége de cette affection, quoiqu'elle en soit le plus commun: elle apparaît aussi sur la peau du sternum et sur le dos; elle peut naître d'ailleurs sur tous les points du corps. Dans le dos elle y suit une marche plus lente, plus discrète, mais sous une forme tellement soutenue, qu'avec le temps le nombre des boutons est devenu considérable. Dans cette région aussi les pustules sont généralement plus volumineuses; elles n'amènent qu'une sensation de démangeaison au moment où le pus de la pustule va se faire jour au dehors. Si alors on comprime le bouton, on en fait sortir une sorte de bourbillon comme dans le furoncle. Enfin, lors de la guérison de la pustule, il se produit une cicatrice oblongue indélébile. Il en résulte que l'éruption revenant

pendant quatre ou cinq ans à chaque printemps, l'individu finit par avoir les épaules et le dos couverts de ces cicatrices. C'est ce que l'on est à même d'observer sur beaucoup de baigneurs dans les bains froids de rivière où sont rassemblés un grand nombre de jeunes gens.

Alors aussi il est rare que l'*acne rosacea* du dos ne soit pas accompagné d'une part d'*acne punctata*, d'une autre part d'hypertrophie à divers degrés de follicules sébacés qui font saillie à la peau en formant une petite surface, arrondie, pâle, décolorée, et que l'on sent très distinctement en passant le doigt sur la peau. Tel est l'*acne rosacea*, qui se guérit à l'aide des moyens les plus simples, lorsqu'il se montre sous une forme aiguë à la figure; mais qui, naissant au printemps, disparaissant peu à peu en été lorsqu'il affecte le dos, se reproduit à chaque saison pendant quelques années pour diminuer de plus en plus et cesser tout à fait; beaucoup plus commun d'ailleurs chez les jeunes gens que chez les jeunes filles, quoiqu'on puisse aussi bien le rencontrer dans les deux sexes. L'état de la peau que nous avons décrit fait assez présumer qu'il se lie au tempérament lymphatique ou lymphatico-sanguin, mais il y a de plus dans cette peau, et indépendamment du tempérament, une organisation toute spéciale avec prédominance de développement des follicules sébacés.

Acne indurata. — Tous les auteurs s'accordent à donner les mêmes caractères à cette affection. Elle se montre sous une forme chronique, et débute par des pustules sucessives, disséminées çà et là sur la figure de préférence. Ces pustules sont lentes à se produire; elles sont assez volumineuses, elles n'ont pas cette teinte rosée inflammatoire qui est propre à l'*acne simplex*, que nous nommons justement à cause de cela *acne rosacea;* cette teinte est d'un rouge violacé. Les pustules s'arrêtent dans leur développement et restent à l'état d'induration pendant un temps plus ou moins long avant d'arriver à suppuration, de sorte que dans l'espace d'un mois à six semaines la figure, généralement pâle, est parsemée de boutons à diverses phases de leur développement. Toutes ces pustules d'*acne indurata*, c'est-à-dire à base dure, engorgée, entrant difficilement dans la voie de la résolution, ont d'ailleurs le caractère tranché que

nous avons assigné à ce second ordre de pustules (celles de l'acné et du sycosis, contrairement aux pustules d'impétigo et d'ecthyma), c'est-à-dire d'être formées dans les neufs dixièmes de leur volume par un engorgement inflammatoire, et d'avoir seulement un sommet vésiculeux rempli de pus ; quand on les comprime, on en fait sortir une sorte de bourbillon. Ce n'est pas seulement à la figure qu'on peut les observer, car on les rencontre fréquemment au dos, à la poitrine et même sur les membres ; mais la figure en est le siége le plus général. Cette description fait assez pressentir que l'*acne indurata* se présentera presque toujours aux médecins à l'état de maladie chronique datant de plusieurs mois et souvent de plusieurs années ; qu'elle est essentiellement liée à l'organisation de la peau que nous signalions précédemment ; qu'elle reflète un tempérament lymphatique, mais surtout une peau lymphatique : aussi son traitement principal consiste-t-il surtout dans des moyens qui redonnent à la peau cette énergie qui lui manque ; aussi l'âge, en modifiant tout l'organisme et la peau elle-même, fait-il peu à peu disparaître cette maladie. C'est de quinze à ving-cinq ans surtout qu'elle se montre, et à partir de cette dernière époque elle tend à se guérir ; mais elle a laissé des traces de son passage, et la partie qui a été le siége de l'affection se trouve, au bout de quelques années, couverte de cicatrices très petites, il est vrai, cependant très appréciables. Ajoutons que chaque pustule qui se guérit laisse à sa place une tache de longue durée et des petits noyaux d'engorgement longs à se résoudre.

Acne miliaris.—Voici une variété d'acné dont je forme une espèce particulière et dont les dermatologistes ne se sont pas occupés, quoiqu'elle mérite de fixer toute leur attention. On la trouve surtout chez la femme, de vingt à trente ans ; elle apparaît par une série de petites pustules acuminées confluentes, quoique successives, ayant leur siége au voisinage du menton et du nez, au pourtour des ouvertures naturelles, à l'instar des syphilides : or, dans les variétés d'*acne simplex* et *indurata*, c'est principalement les joues dans toute leur surface et le front qui sont atteints. Il résulte de là que tout d'abord, à la vue de cette affection, la pensée d'une cause syphilitique surgit dans l'esprit du médecin ; mais tandis que dans les

syphilides les pustules sont beaucoup plus volumineuses, plus discrètes, plus ramassées aux angles des ouvertures naturelles, là au contraire elles sont plus nombreuses, plus disséminées, du volume d'un grain de millet, toutes d'ailleurs à peu près égales entre elles. Enfin elles se distinguent surtout des syphilides par la coloration rosée des pustules, qui n'ont pas cette teinte cuivrée qui est propre à ces sortes d'affections. D'ailleurs marche chronique, durée persistante pendant des mois entiers, et puis ces pustules se guérissent incomplétement et laissent pendant longtemps de petits engorgements papuleux ; jamais cette forme ne change, toujours la même disposition. Chose remarquable, cette sorte d'acné ne siége plus sur ces peaux blafardes, épaisses, opalines, comme dans les espèces précédentes, mais bien sur des peaux fines que l'on croirait devoir être exemptes de cette affection.

Acne punctata, tannes. — On appelle ainsi une variété d'acné qui existe quelquefois à l'état de maladie, mais qui le plus souvent n'a pas assez d'importance pour nécessiter un traitement. Dans cette affection il y a hypersécrétion de la matière sébacée, mais dans une proportion assez faible pour ne pas développer une affection inflammatoire. Cette hypersécrétion est fort lente d'ailleurs à se produire dans un tissu sans réaction sur la matière sécrétée, qui se laisse distendre peu à peu et ne la rejette pas suffisamment au dehors. Or le canal excréteur des follicules sébacés ayant une certaine longueur, la matière sébacée s'y accumule, le dilate graduellement, y séjourne, s'y concrète et s'y solidifie. Cette concrétion est d'autant plus complète que la matière avoisine l'extrémité du canal qui s'ouvre à la surface de la peau, de sorte qu'elle y forme une substance adhérente qui oblitère cette ouverture. La matière sébacée, ayant le contact de l'air, s'y noircit, et l'on voit au bout de quelque temps cette matière se dessiner par un petit point noir situé à l'orifice du conduit sébacé. De là le nom d'*acne punctata.* La maladie se dessine donc par un, plusieurs ou une multitude de petits points noirs qui s'observent à la surface de la peau, à l'extrémité de l'orifice des canaux excréteurs des follicules sébacés. Les détails dans lesquels nous venons d'entrer rendent parfaitement raison de cette circonstance, qu'en comprimant la peau de chaque côté de ces *acne punctata*, on

fait sortir la matière sébacée sous la forme d'un petit ver; mais la coloration noire n'existe qu'à l'extrémité de cette matière, parce que cette extrémité seule était exposée au contact de l'air. Cette constance de forme a fait penser qu'il y avait dans cette production un insecte, et M. le docteur Simon, de Berlin, examinant ce produit sécrété, affirme y avoir rencontré un insecte assez voisin de l'acarus de la gale. Erasmus Wilson de Londres, Vogt de Munich, Henle, ont reconnu le même fait. Suivant M. Gruby, cet animalcule siégerait à tous les âges de la vie dans les follicules malades; il en occuperait le canal excréteur, la tête toujours dirigée vers la glande. Il l'a retrouvé quarante fois sur soixante personnes atteintes.

Il suffit de faire sortir le petit ver ou tanne par pression, de le diviser dans de l'huile d'amande douce et de chauffer à 30 degrés, pour observer l'insecte sous le microscope. Alors on trouve la tête avec deux papilles contractiles, organes du toucher; une prolongation cannelée entre ces papilles, organe de succion; un peu en arrière, deux petites surfaces bombées avec un globule au centre; ce sont les yeux. La face supérieure du thorax est convexe, la face inférieure est plate, avec trois lignes apparentes, une au centre et une de chaque côté. Les membres sont situés entre les lignes moyennes et les lignes latérales; quatre membres à quatre articles de chaque côté. Abdomen conique, cylindrique, deux à quatre fois plus long que le tronc, avec stries ou raies transversales comme dans les ascarides lombricoïdes; organes génitaux mâles et femelles. On voit dans les follicules sébacés des granules qui bientôt prennent la forme d'une chrysalide qui poursuit peu à peu son développement. Ces animalcules marchent comme les écrevisses en avant et en arrière, leurs mouvements sont très lents. On les retrouve chez les chiens dont la peau est malade d'impétigo ou d'herpès tonsurant; il y en a 80,000 sur une surface d'un centimètre. Telle est la description donnée par M. Gruby, qui émet la crainte d'une transmission à l'homme par cet insecte.

Quelque recherche que nous ayons faite à cet égard, nous n'avons pu l'apercevoir. Après la sortie de cette matière, le canal se resserre, mais il ne revient jamais à l'état naturel, son ouverture extérieure reste béante et très apparente à l'œil nu.

L'acne punctata peut présenter une forme aiguë comme une forme chronique ; alors on voit apparaître ordinairement sur les joues, au voisinage du nez ou sur le front, des centaines de ces petits points noirs extrêmement rapprochés qui criblent la peau ; d'ailleurs nulle trace d'inflammation et pas d'autre sensation qu'un fourmillement, ce qui fait supposer aux malades l'existence d'un insecte. Nous avons vu plusieurs cas de ce dernier genre tout à fait exempts de pustules ou autres boutons d'acné, et c'est avec surprise que nous lisons dans le *Traité des maladies de la peau* de M. Cazenave, que l'*acne punctata* est plutôt une complication qu'une espèce ; il est vrai que l'*acne punctata* discret coïncide souvent avec l'*acne simplex* ou *indurata*, mais il peut être tout à fait indépendant de lui et sous une forme confluente ; si cette dernière forme est l'exception, elle n'en existe pas moins comme maladie indépendante.

Acne sebacea sans hypertrophie des follicules. — Biett a fait connaître cette variété : c'est, comme la précédente, une hypersécrétion de la matière sébacée, mais dans une proportion et dans un état de diffluence tels, que la matière s'échappe immédiatement des canaux sébacés pour se répandre à la surface de la peau. Cette matière sécrétée, plus liquide que dans l'espèce précédente, a comme elle l'a propriété de se concréter et de brunir à l'air ; aussi, sans que la peau soit essentiellement malade, sans qu'elle soit le siége de sensibilité et de chaleur notables, on voit dans la forme aiguë de cette affection surgir une sécrétion grasse qui s'étale à la surface de la peau, s'y concrète au contact de l'air, y devient dense, d'un gris jaunâtre sale, et se dessèche de plus en plus. Le frottement ne l'enlève pas, non plus que le linge, mais un léger grattage à l'ongle enlève cet enduit sans faire souffrir le malade. Quelquefois l'enduit gras sébacé est tellement desséché, qu'il faut du saindoux sous un cataplasme ou une pommade au carbonate de potasse pour le faire tomber. Chose remarquable, l'affection ainsi développée au front ou aux joues envahit très rapidement la figure, la recouvre d'un masque laid et hideux, qui reste et persiste pendant fort longtemps. On voit aussi la maladie se manifester avec beaucoup d'intensité dans quelques cas, et telle est sa tendance à se généraliser qu'elle a pu

envahir toute la surface du corps chez certains enfants. On l'observe principalement dans le jeune âge, mais elle peut aussi se développer au delà de trente ans; elle tend à devenir chronique et à durer plusieurs mois.

On juge du désespoir d'une jeune femme qui, dans l'espace de quelques jours, se voit la figure couverte d'une crasse sale qu'elle ne peut enlever par les lavages ou par les corps gras et qu'elle est destinée à conserver pendant un laps de temps plus ou moins long. Chose remarquable, cette forme d'acné est, comme les autres affections aiguës, souvent accompagnée de poussées, c'est-à-dire d'une éruption nouvelle sur le lieu même où on la croyait guérie. Lorsque la peau est très blanche et très fine, on peut apercevoir toutes les phases de cette éruption à forme aiguë. Le premier jour, sensation de chaleur à la figure avec état comme érythémateux très léger de la peau; mais cette rougeur, au lieu d'être lisse, unie, douce au toucher comme dans l'érythème, est à surface hérissée d'aspérités très fines: ce sont évidemment les follicules sébacés qui ont pris du volume; la circonférence de ces plaques enflammées se perd insensiblement avec la peau saine, de manière que la coloration et le sentiment de granulation qui existe sous le doigt finissent par se confondre avec elle en se décolorant. Puis le lendemain apparaît la sécrétion, qui s'accroît le jour suivant alors qu'elle a atteint son maximum d'intensité. Là elle reste stationnaire ou n'augmente plus que d'une manière tout à fait insensibble. J'ai donné des soins à une dame, jeune et jolie, qui depuis deux ans était atteinte de cette maladie et qui avait mis en usage de nombreux traitements. Tous les mois à chaque époque menstruelle, il se produisait sur les deux côtés du nez une traînée inflammatoire de ce genre et qui disparaissait plus ou moins complétement dans l'espace de quinze jours. Dans quelques cas c'était un masque complet sur la figure. On conçoit la désolation d'une jeune et belle femme habituée à vivre dans le grand monde et obligée pendant si longtemps de se sevrer de ses rapports avec les personnes les plus proches, mari, enfants, mère, etc. On comprend la désolation d'une mère qui ne peut embrasser son enfant, soit qu'elle se trouve elle-même affectée, soit que la maladie ait pris siége sur l'enfant; et, remarque digne d'at-

tention, c'est presque toujours la figure qui est atteinte, parce que les follicules sébacés y sont très nombreux.

Acne sebacea avec hypertrophie des follicules. — L'observation suivante peint aussi bien qu'il est possible de le faire la première forme de cette maladie dont j'ai vu plusieurs exemples, et qui se reproduira probablement à l'observation, aujourd'hui que l'attention va être fixée sur elle.

Le 11 juin 1852, est entré à l'hôpital Saint-Louis, dans la salle Saint-Louis, lit n° 33, le nommé Gravet (François), âgé de soixante ans, journalier. Cet homme, d'un tempérament lymphatique nerveux, est ordinairement logé et nourri d'une manière convenable. Ses parents n'ont jamais eu de maladie de peau, et lui-même n'a été atteint d'aucune affection cutanée avant celle pour laquelle il est soumis aujourd'hui à l'observation.

Il y a quatorze mois environ, il vit apparaître, au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index et du médius gauche, deux poireaux qu'un médecin brûla avec l'acide chlorhydrique, après les avoir préalablement coupés. Mais à la suite de ce traitement, l'affection, loin de diminuer, changea de caractère, et augmenta d'étendue, de sorte qu'il y a dix mois, la moitié du dos de la main était envahie par une sécrétion de couleur grisâtre, qui se concrétait peu à peu, et formait ainsi une sorte d'enduit gras. Des frictions avec de l'eau-de-vie camphrée et une pommade dont il ne peut préciser la nature lui furent ordonnées ; mais la maladie ne céda pas à cette médication.

Enfin, le 11 juin, neuf mois après l'invasion de la maladie, cet homme se décida à entrer à l'hôpital.

A son arrivée, voici l'état où il se trouvait : tout le dos de la main gauche et celui de la première phalange des deuxième et quatrième doigts étaient couverts d'un enduit gras, grisâtre, à surface inégale, fendillé par places, durci et très adhérent à la peau. Cet enduit était épais de plusieurs millimètres à sa partie moyenne ; cette épaisseur allait en diminuant vers la circonférence, irrégulièrement découpée, qui cependant offrait une sorte de bourrelet, et était ainsi plus élevée que la peau saine. La matière morbide avait assez l'apparence de couches de pommade accumulée pour que l'on pût croire à des applications réitérées de corps gras et au défaut de soin que prenait le malade pour tenir sa main dans un état de propreté. Aussi des injonctions lui furent souvent faites à cet égard, mais l'adhérence de l'enduit était telle qu'il lui fut impossible de l'enlever. La sécrétion se faisait toujours avec abondance, et le malade souffrait beaucoup; il éprouvait des cuissons très vives : c'était comme un feu, dit-il. Des cataplasmes, des bains alcalins, la pommade de tannin camphrée furent ordonnés, et l'usage en fut continué pendant un mois, sans résultat apparent. Vers le 15 juillet, cette médication fut

remplacée par des douches de vapeur, et à l'intérieur par l'huile de foie de morue et le sirop d'iodure de fer. Les deux derniers remèdes furent supprimés au bout d'un mois, parce que l'estomac du malade était fatigué. Les douches seules furent continuées. Ce ne fut que sous l'influence de ce moyen que cet enduit finit par disparaître ; la sécrétion cessa en même temps, ainsi que les douleurs. Ce résultat fut obtenu vers le 20 septembre.

Alors on put voir la peau boursouflée, épaisse, rouge, champignonnée, et ulcérée même dans quelques points, mais sans régularité, formant un bourrelet général autour d'une surface centrale beaucoup plus étendue, où la peau était déprimée, comme amincie, quoique très douce et très grasse au toucher. Peu à peu ces quelques érosions de la circonférence disparurent, la peau reprit son niveau, et aujourd'hui, 10 novembre, on voit une surface malade dont la peau est blanche opaline, grasse, douce, comme par le passé. Elle offre d'ailleurs encore dans quelques points de la circonférence un léger engorgement rougeâtre correspondant aux espèces de tubercules qui existaient ; mais on reconnaît aussi le signe caractéristique de l'affection, car on voit disséminée sur la totalité de sa surface une série de petites éminences coniques d'un rose violet, qui sont évidemment des follicules sébacés développés outre mesure, offrant l'image des follicules nombreux qui ont donné lieu à cette sécrétion. Quant à la sécrétion elle-même, elle est complétement nulle sur le dos de la main, à part le voisinage du poignet, où deux plaques arrondies, comme érodées à leur centre, champignonnées, donnent encore une certaine sécrétion ; plusieurs cautérisations ont été faites avec le nitrate d'argent ; des douches sulfureuses ont été mises en usage. Le malade, dont l'affection a été guérie dans les sept huitièmes de son étendue, n'est donc pas encore débarrassé de cette singulière maladie qui n'est ni un lupus, ni un rupia, et qui a entraîné une hypertrophie considérable de tous les follicules sébacés.

Deuxième forme d'acné avec hypertrophie (*acné tuberculoïde ; molluscum* de quelques auteurs; *tumeurs folliculaires* de M. Rayer ; *ecdermoptosis* de M. Huguier ; *acné varioliforme* de M. Bazin ; *acné tuberculeux ombiliqué* de M. Piogey). —Cette maladie, observée de longue date, n'a jamais suffisamment fixé l'attention des dermatologistes. En 1850, le docteur Caillaut, alors interne de l'hôpital des Enfants, y a observé 31 cas de cette maladie. En 1851, M. Bazin l'a décrite sous le nom d'*acné varioliforme*. Cette dénomination est tellement mauvaise, que dans cette maladie il y a des tumeurs folliculeuses qui atteignent le volume des plus grosses noix, et par conséquent toutes les nuances intermédiaires de grosseur. Évidemment M. Bazin a déduit ce nom de l'aspect d'un cas de ce genre à forme aiguë, dont nous rapporterons plus loin une observation analogue.

llons nous attacher à en reproduire ici les principaux traits.
montre le plus souvent dans les premières années de la vie,
lle peut se développer à un âge beaucoup plus avancé. Elle
s de siége bien précis, elle affecte de préférence le dos,
:ine, le ventre, le cou et la figure. Elle apparaît d'une manière
e ou confluente sous forme de très petites tumeurs arrondies,
nes, quelquefois pédiculées, quelquefois adhérentes à la peau
e large surface. Ces petites tumeurs, dont le volume le plus
re égale celui d'un gros pois, ont la couleur de la peau;
ıand elles sont très volumineuses, il n'est pas rare de leur
e teinte plus blafarde, jaunâtre, qui tient probablement au
paisseur de la cuticule qui sert d'enveloppe à la matière
: et qui lui donne ainsi une certaine transparence. Cette ma-
dans son développement deux marches distinctes : ou elle
t d'une manière lente et graduée, quelques mois après la
ce, et suit une marche chronique qui se prolonge des
pour devenir à peu près stationnaire pendant toute la vie; ou
:raire son développement présente une marche aiguë, comme
observation ci-après. Un fait, mais un seul fait, que j'ai
, tendrait à faire admettre la contagion de cette maladie :
lui d'une mère qui, après avoir pris l'avis de M. Rayer, voulut
nssi le mien. Son enfant, âgé de dix-huit mois, avait sur le
oit du ventre et de la poitrine une douzaine de ces petites
s, et la mère depuis peu de temps avait vu naître à sa figure
ses avant-bras quelques petites élevures du même genre. Je
: un point d'interrogation et ne présente cette circonstance
s la forme d'un doute.

qu'il en soit, la maladie reste fort longtemps stationnaire;
ıt même décroître spontanément et disparaître. Mais on peut
voir faire des progrès, et alors deux choses se passent : ou
ıeurs folliculeuses s'élargissent, se distendent, se rompent,
t évacuation à la matière sébacée, et un point central, le per-
l'ouverture, s'ombilique à la manière de la pustule de la
pour se guérir ensuite; de là la dénomination donnée par
n; ou les tumeurs restent constamment indolentes et sans
ıter de volume; ou enfin les tumeurs se pédiculisent après

[illegible] haricot, d'une noisette, et même d'une [illegible] finissent par se détacher en laissant une [illegible] insertion à la peau : il semble qu'il s'opère là [illegible] du pédoncule, car les petites tumeurs [illegible] saillantes au moindre attouchement et tom- [illegible] qui ne porte d'ailleurs aucune atteinte [illegible] paraît plutôt refléter un état morbide local

[illegible] trente-neuf ans, conducteur au chemin de [illegible] lymphatique sanguin. Il y a quatre mois il éprouve [illegible] plusieurs jours, et bientôt il est averti par un [illegible] couvert de boutons qui avaient le volume d'une tête [illegible] jours après, quelques boutons avaient atteint le [illegible] démangeaisons diminuèrent ensuite, mais le ma- [illegible] après être resté quelques moments en décubitus dor- [illegible] l'hôpital, tout le dos présente de petits tubercules [illegible] par toute leur étendue, lenticulaires; quelques- [illegible] moindres en volume, et ne dépassent pas une grosse [illegible] couleur jaunâtre tranche sur la peau, qui est épaisse, [illegible] sont disséminées sur toute l'étendue du dos, espacées [illegible] Elles forment en cinq ou six points des groupes [illegible] que relient entre eux de petits tubercules isolés [illegible] de l'un à l'autre. A la région scapulaire, de droite [illegible] de vingt ou vingt-cinq tubercules irrégulièrement [illegible] de ces tumeurs, un peu pédiculées, molles, char- [illegible] base, représentent assez bien l'aspect de ces signes de [illegible] trouve à la peau. — Quelques-unes se sont vidées en [illegible] un point noir central déprimé, un peu ombiliqué; [illegible] complétement vides et guéries, laissent une trace rouge au [illegible] se trouve une cicatrice; mais ces deux cas ne sont que [illegible] généralité est intacte. Ces tumeurs indolentes au toucher; [illegible] entrée du malade le siége d'aucune sensation. Sous l'influence [illegible] suivant, et pendant les vingt jours d'hôpital, un grand nombre [illegible] tubercules se sont élargis, distendus, rompus, et ont laissé sortir un [illegible] granuleux blanc grisâtre, et sont remplacés aujourd'hui par une série [illegible] — Le 27 juillet, le malade sort complétement guéri de son acné. [illegible] *traitement.* — Tisane de fumeterre, sirop sulfureux, tablettes soufrées [illegible] bains sulfureux ; application de pommade sulfo-alcaline et même épispatique [illegible] atténuée: Inflammation des tumeurs, ouvertures spontanées ; la matière folli- [illegible] culeuse s'échappe, et la cicatrisation s'opère successivement.

ıt des diverses sortes d'acnés. — Tout *acne simplex* ou
me je l'appelle, exige un traitement émollient ordinaire,
sa forme aiguë. La poudre d'amidon surtout, puis la
n de préférence aux corps gras ; des bains simples et
fraîchissante tant que dure l'éruption à l'état croissant.
se rencontre plus de nouveaux boutons, il faut entrer
des résolutifs légers ; les lotions alunées, une pommade
nt sulfureuse et très légèrement alcaline (voy. *Formu-*
ins sulfureux, quelques lotions d'eau de Baréges artifi-
uches sulfureuses (voy. *Formulaire*), suffisent au traite-
érieur quelques amers, quelques sulfureux. — Si cet
é à l'état chronique, il demande une médication toute
i est celle de l'*acne indurata.* A cet égard, rien ne réussit
de médication *naturelle* que les eaux des Pyrénées en
ains, en douches. A défaut de l'usage de ces eaux, on
térieur une tisane amère, du sirop antiscorbutique, du
ne, cinq ou six tablettes soufrées dans le cours de la
l'extérieur l'usage de douches de Baréges en arrosoir
: jours pendant vingt minutes, sur la partie affectée ;
e soufrée, faible d'abord, plus forte ensuite ; des lotions
e ou cinq fois dans les vingt-quatre heures, et plus
fin du traitement, des lotions de sublimé ; mais il faut
malade ne prenne plus de douches sulfureuses. Les
, les lotions d'eau salée, conviennent parfaitement dans
n, comme aussi dans l'acné qui se montre sur le dos
ens. S'il restait quelques noyaux d'engorgement qui
as se résoudre par ces moyens, on pourrait les toucher
e infernale.

ıaris est beaucoup plus rebelle aux traitements. Le
uels qu'ils soient, réussissent peu. L'amidon, la poudre
douches sulfureuses très faibles avec un arrosoir très
nné à cet égard les résultats les plus favorables ; mais
, et de persévérance cette forme d'acné exige, sous le
régime surtout ! Il faut proscrire tout excitant, toute
rte, insister d'ailleurs sur les lotions résolutives, et ter-
térison en touchant quatre ou cinq fois les surfaces

malades avec une solution de nitrate d'argent au dixième. C'est assez dire que pendant un certain temps la femme qui en est atteinte est condamnée à une réclusion presque complète.

L'*acne punctata* peut être attaqué avec plus de vigueur, mais toujours au moyen des douches sulfureuses, des pommades de même nature et des lotions résolutives, excepté le cas où il se fait brusquement éruption. Ces diverses maladies ne tiennent pas à un état général de l'économie, mais plutôt à une organisation spéciale de la peau.

Il n'en est plus de même de l'acné sébacé. Il faut distinguer la forme aiguë de la forme chronique. Ce n'est que par l'emploi du saindoux, du cold-cream, des bains émollients et des tisanes rafraîchissantes que l'on doit arrêter les progrès de cette maladie. Devenu stationnaire, il faut mettre en usage les pommades alcalines légères, ce sont les seules qui nettoient la peau et dissolvent la matière concrète qui la recouvre; on y joint les bains alcalins et plus tard les bains sulfo-alcalins; à l'intérieur les amers, les sulfureux. Les eaux minérales sulfureuses guérissent aussi cette maladie quand elle est arrivée à l'état chronique; mais il faut craindre la prolongation de leur emploi, car elles peuvent amener une surexcitation en vertu de laquelle il suinte continuellement des ouvertures des follicules sébacés une huile non concrescible qui graisse la peau, les poils, et les cheveux au point de rendre ceux-ci tellement luisants et gras, qu'il suffit de les passer dans la main pour laisser des traces de cette matière après les doigts et pour graisser tous les linges avec lesquels on les frotte. C'est un effet que nous avons souvent remarqué pour la chevelure.

Dans la forme chronique de cette affection avec récidives successives, j'ai employé avec succès la solution de Fowler portée à la dose de 12, 14 et 16 gouttes par jour et continuée pendant six semaines à deux mois. Les bains de vapeur, les douches sulfureuses ou sulfo-alcalines sur les parties malades, les pommades alcalines et soufrées, tels sont les moyens qui m'ont amené les meilleurs résultats. Mais dans cette forme aussi il y a lieu de modifier la vitalité de la peau, qui a été longtemps affectée, au moyen des lotions à l'alun, au bichlorure de mercure et au nitrate d'argent,

toute speciale d'organisation locale qu'il faut chercher
re ; que la peau qui coïncide avec ce développement de
est lâche, plus ou moins molle, jouissant de peu de toni-
il y a lieu de chercher à lui rendre de l'énergie par des
opriés ; que cette peau, enfin, reflète par son organisation
ament plus ou moins lymphatique qui doit diriger le mé-
s le choix de la médication interne.

indiquer le traitement de l'*acné sébacé à forme tubercu-*
luscum des auteurs. Il n'y a rien à faire lorsque l'acné
monte à la naissance ou lorsqu'il est ancien, sauf à lier
soie le pédicule des tumeurs les plus grosses, pour en
r la chute. Mais il faut, au contraire, profiter du déve-
t sous forme aiguë de cette maladie pour en accélérer la
déterminer l'inflammation des tumeurs et amener leur
, ainsi que nous l'avons fait dans l'exemple que nous
(page. 290) en employant une pommade sulfo-alcaline
épispastique mitigée, ainsi que des bains sulfureux.
etite tumeur suppure, se vide et se cicatrise ; c'est là
t que le médecin peut envier, la sortie de la matière
ccumulée dans l'épaisseur de la peau : aussi quelques
, voyant la nature opérer cette ouverture, ont conçu la
pratiquer une petite incision sur chaque tumeur. Ce
us paraît presque ridicule pour certains cas : ce sont ceux
ion est confluente. Tout au plus pourrait-on autoriser une
semblable quand l'affection consiste seulement dans une

ment saillant et blanchâtre, de manière que la peau, un peu amincie, permettait par sa transparence d'apercevoir la matière sébacée. Cependant nous ne mîmes pas l'incision en pratique, nous cherchâmes d'abord à amollir la peau par des cataplasmes, puis à l'aide de douches vivement administrées nous excitâmes la peau ; nous parvînmes à déterminer une inflammation, et plus tard une ouverture spontanée des tumeurs qui se vidèrent ainsi tout naturellement de la matière accumulée. Nous cautérisâmes alors les parois de ces petites poches avec la pierre infernale ; peu à peu elles revinrent sur elles-mêmes et le malade sortit guéri. Telle serait, je crois, la conduite à tenir en pareil cas. Mais quand on a affaire à huit ou dix petites tumeurs d'acné tuberculoïde espacées les unes des autres, ou à des centaines de ces tumeurs réunies sur une surface plus ou moins étendue et confluentes par rapport à l'espace, que ferait l'incision ! Évidemment il faut suivre la marche que nous avons prise pour le malade dont nous avons retracé l'histoire (pag. 290) : c'est-à-dire surexciter toutes les petites tumeurs, les enflammer et déterminer ainsi spontanément l'évacuation de la matière sébacée.

Couperose, *gutta rosea, cuperosea* par corruption ; goutte rose ou couperose.

La *couperose* est une maladie des vaisseaux capillaires de la peau. Si les follicules sébacés sont quelquefois affectés, ce n'est qu'accidentellement, et c'est là ce qui me fait isoler la couperose de l'acné, que la généralité des auteurs a confondu avec cette maladie. Mais si l'on observe la couperose à son début, si on la suit dans ses progrès, dans sa marche et sa terminaison, on conviendra avec nous que la distinction que nous établissons est fondée. C'est généralement sur les côtés du nez, ou plutôt entre le nez et les joues, en un mot, de l'angle des yeux, aux pommettes, que débute la couperose sous la forme d'une traînée d'un rose rouge peu étendue, sans sensation aucune, augmentant de coloration après les repas ou par l'exposition de la figure à la chaleur. Vue de près,

te rougeur n'est pas exanthémateuse, c'est-à-dire qu'elle ne colore s uniformément et complétement la peau; mais on voit qu'elle est mée par des vaisseaux capillaires injectés, distendus, hypertro-iés et gorgés de sang. Souvent même, et avant une rougeur appré-ble, on aperçoit la prédisposition à la rougeur par des vasculari-ions espacées et diffuses. Cependant si l'on exerce une légère ssion sur la peau, cette coloration disparaît sous le doigt comme ns l'*érythème* et contrairement à ce qui se passe dans le *purpura:* t que dans la couperose le sang est encore contenu dans les vais-ux qui ne sont qu'augmentés de dimension, tandis que dans le pura il a transsudé à travers les parois vasculaires. Les femmes, igneuses de leur figure, connaissent parfaitement le début de e maladie; elles s'en préoccupent fortement aussitôt qu'elles ent paraître cette vascularisation. Peu à peu et avec un temps s long, des années, la vascularisation de la superficie de la peau des progrès en étendue, car ce ne sont d'abord que les capil-es sous-épidermiques qui sont malades. Alors se montre sou-t un troisième point de départ : c'est le dos et le bout du nez ; s les plaques finissent par se réunir, s'étendre sur les joues pour colorer aussi. La coloration, qui au début n'était appréciable à certains moments de la journée, devient permanente: c'est un ond degré de la couperose; et alors la figure représente celle n individu qui fait usage outre mesure du vin et des liqueurs ritueuses. Enfin, dans un troisième degré, toute la peau s'affecte, alors elle semble tuméfiée, elle est plus épaisse. Sur quelques ts, principalement au bout du nez, elle peut devenir le siége de nctions charnues, rugueuses à leur surface, comme tubercu-es, et vivant assez d'une vie toute spéciale pour se pédiculiser ir même par se détacher presque entièrement : c'est la coupe-e tuberculeuse. Ainsi trois degrés : la couperose au premier gré, sans épaississement de la peau, ou couperose érythémateuse; couperose avec épaississement uniforme de la peau, et enfin la perose tuberculeuse, ordinairement circonscrite au nez. Ce n'est re que dans la variété de couperose avec épaississement général la peau que l'on voit accidentellement surgir des pustules d'*acne*, s la forme de boutons plus ou moins volumineux arrivant à

suppuration ; mais cet état n'est que passager et tout à fait ac-
lentel.

Cette maladie attaque les peaux les plus fines comme les p
épaisses. Elle se montre sans qu'il y ait aucune coïncidence a
trouble quelconque dans les fonctions organiques ; elle est tout à f
indépendante d'une hygiène mal observée, car elle se manif
très souvent, on pourrait dire le plus souvent, chez les personnes
plus sobres qui n'usent que d'eau pour boisson et qui ne consom
ment jamais de vin. Aucune liaison d'ailleurs soit avec tel tempé
ment, soit avec telle constitution. En sorte que la cause de la co
perose reste le plus souvent inconnue, et que dans quelques cas
est tenté de la rattacher à certaines conditions d'organisation de
peau de la figure. Aussi est-ce une affection très rebelle, à marc
lente, qui ne pardonne guère et qui donne ouverture à un gra
nombre de moyens différents que le charlatanisme exploite a
plus ou moins de succès. Et, en effet, quoi de plus tenace que c
maladie que l'on guérit quelquefois, mais qui souvent aussi échap
aux moyens les plus énergiques ? A cet égard, voici les modes
traitement qui réussissent le plus souvent : les purgatifs répé
tous les jours à dose modérée ; les eaux sulfureuses employé
de la manière suivante. On fait mettre le malade dans un demi-
bain assez chaud pour exciter les membres inférieurs, et en
même temps on donne une douche fraîche en arrosoir sur la
figure, en garantissant la poitrine du malade de ce contraste de l'eau
à une température si opposée.

MM. Rochard et Sellier ont fait connaître en 1851 une méthode
de traitement qui a pour base l'emploi du sel de M. Boutigny
d'Évreux, c'est-à-dire l'iodure de chlorure mercureux ou hydrar
reux. Cette méthode avait été peu répandue. Depuis cette époque
M. Boinet a conseillé l'usage d'une pommade au proto-iodure de
mercure de 1 à 2 grammes pour 30 grammes d'axonge, une onctio
une fois par jour (*Moniteur des hôpitaux*, janvier 1856). Quant à la
pommade de MM. Rochard et Sellier, elle est composée de 75 centi
grammes d'iodure de chlorure mercureux en poudre, a
60 grammes d'axonge. Il faut d'abord savoir que ce sel n'existe pas
en proportion définie, c'est-à-dire que sa composition n'est pas tou

ns la même. Certains chimistes n'admettent l'existence que d'un ul composé, d'autres, et M. Bouchardat est de ce nombre, en mettent deux. Ensuite il est fort peu stable, et se décompose très ilement. Bien préparé, il est très actif.

Le composé de MM. Rochard et Sellier, le sel de M. Boinet, nous nissent formulés à dose trop forte. Ainsi j'ai vu survenir un éry-ple de la face et du cuir chevelu après une seule application de r pommade; aussi je ne la formule qu'à la dose de 25 centi-mmes pour 30 grammes au début, et souvent je ne suis pas ligé d'augmenter la dose. Ces pommades ne doivent être éten-es sur les surfaces malades qu'une seule fois par jour, et en che légère, pendant trois, quatre ou cinq jours de suite, en un t, jusqu'à ce que la peau soit surexcitée, qu'il y naisse une cer-ne rougeur, un état érythémateux même sécrétant, et alors s'ar-er pendant trois ou quatre jours, recommencer de nouveau, et si de suite jusqu'à guérison.

Nous avons mis en usage ce mode de traitement chez un certain mbre de malades, et nous pouvons assurer qu'en général, s'il ne drit pas, il amène une amélioration assez marquée. Nous le yons applicable surtout aux acnés chroniques.

CINQUIÈME GROUPE.

Maladies papuleuses.

Ce groupe comprend trois maladies qui ont entre elles de l'ana-gie dans la forme morbide et dans les phénomènes qu'elles déve-ppent. Toutes trois, en effet, ont pour élément des éruptions pa-puleuses. Dans ces trois affections le système nerveux paraît jouer certain rôle soit secondairement, soit primitivement; il est géné-lement surexcité, et dans l'une de ces maladies il semble seul ade, car l'état cutané est loin d'être en rapport, quant à son nsité, avec les accidents généraux qui l'accompagnent. Deux de s affections atteignent un âge peu avancé de la vie, la troisième propre, au contraire, à la vieillesse. On a considéré ces mala-s comme étant essentiellement nerveuses; M. Casenave professe

cette opinion ; il en place le siége dans des papilles de la pe
dans cette hypothèse les symptômes généraux viennent naturell
se grouper autour de l'état local. Déjà nous avons exposé (p
et 44) les motifs qui nous empêchent d'adopter cette manièr
voir ; nous ajouterons que l'une de ces trois maladies exige u
tement stimulant, l'emploi des sulfureux par exemple, ce qu
stitue encore une circonstance peu favorable à une pareille op

LICHEN, *lichen* (Hippocrate), prurigo lichénoïde ou fur
d'Alibert.

Simplex.	*Compositus.*
Diffusus.	Ortié ou urticans.
Circumscriptus.	Eczémateux.
Perpendicularis.	Herpétiforme.
Pilaris.	Aigu.
Lividus.	Chronique.
Agrius.	
Diffusus.	
Circumscriptus.	
Gyratus.	

Cette affection est définie par les auteurs une maladie no
tagieuse, caractérisée par l'existence de papules à la surf
la peau. Nous avons fait connaître ce qu'il fallait entendr
le nom de *papules*, et nous avons établi que la papule éta
production pathologique qui n'avait aucun rapport avec
pille : nous ne reviendrons pas sur ce point (voy. p. 44)
ce qu'il faut attaquer de front, c'est la définition des aute
vertu de laquelle ils considèrent le lichen comme n'étant
nature contagieuse. Et d'abord il y a plusieurs sortes d
tagion, et nous restreignons cette expression, en ce qui co
cette maladie, à celle qui s'entend de la transmission de l'a
au moyen d'un contact plus ou moins prolongé. Sous ce
j'ai par-devers moi un certain nombre de faits dont je pu
quelques exemples, et qui ne sauraient laisser subsister d
dans mon esprit. — Une femme, dont le mari avait un atelie
fèvrerie, m'amena à la consultation de l'hôpital cinq appren
dans l'espace de deux mois ont été successivement atteint
d'eux ayant été primitivement affecté ; tous avec lichen diff

à la figure que sur les membres. Cette femme les croyait atteints de la gale; l'usage de bains alcalins a suffi pour les guérir : aucun autre ouvrier d'ailleurs n'avait contracté cette maladie. Ces apprentis couchaient ensemble dans la même salle.—Une cuisinière affectée d'une plaque de lichen au dos de la main gauche avait l'habitude de porter un enfant de trois ans sur les bras et de le promener. L'enfant fut pris de lichen diffus aux fesses, qui s'étendit ensuite à la figure et sur les membres. Bientôt la mère de l'enfant fut atteinte, et plus tard le père. En cet état le médecin de la maison crut à l'existence de la gale et institua dans cette famille un traitement par les sulfureux. L'affection fut exaspérée par ce traitement, et c'est dans ces circonstances que je fus consulté. Inutile de dire qu'il n'existait pas de gale et qu'une médication alcaline intérieure et extérieure fit justice d'une maladie qui persistait depuis plusieurs mois. Voici un troisième exemple qui a été recueilli par un de mes meilleurs élèves internes, M. le docteur Faget, médecin distingué de la Nouvelle-Orléans. Le 24 janvier 1844 est reçu dans mon service de l'hôpital un jeune homme de seize ans qui a eu la gale à l'âge de trois ans et à l'âge de sept à huit ans. Depuis son arrivée à Paris il y a cinq ans, il a eu tous les printemps une éruption papuleuse qui se dissipait seule. Il y a deux mois cette éruption se montra avec une certaine intensité et devint confluente, mais sous forme de plaques de lichen. Il couche avec son frère âgé de douze ans, qui a bientôt été atteint de la même maladie et qui est allé se faire soigner à l'hôpital des Enfants. Ces trois exemples me paraissent suffisants pour justifier l'assertion que je viens d'émettre, et dire que le lichen est contagieux dans certaines conditions de contact prolongé, et qu'il se transmet d'autant plus facilement que les contacts ont lieu avec des enfants.

Quoi qu'il en soit, le lichen est au nombre des affections non sécrétantes de la peau; il s'y montre par des élevures papuleuses discrètes ou confluentes, ramassées ou diffuses, et qui sont toujours accompagnées d'une démangeaison plus ou moins vive. Cette maladie siége ordinairement, surtout quand elle est diffuse, à la partie interne des membres, au cou ou à la figure; mais quand elle est ramassée, circonscrite, figurée, c'est-à-dire sous forme de plaques,

elle occupe presque toujours les surfaces externes. Qu'on se figure donc, à l'état aigu, une série plus ou moins considérable de petites papules rosées, de forme pyramidale, acuminées, diffuses ou ramassées à la surface de la peau, amenant constamment de la démangeaison, surtout la nuit, et l'on aura une idée du lichen. Cependant cette affection sécrète quelquefois; c'est accidentellement, ainsi que le disent les malades, et lorsqu'ils ont opéré des grattages. Alors il se fait à l'extrémité de chaque papule un petit suintement séreux à peine perceptible, suintement d'une sérosité qui se concrète aussitôt et se transforme en une petite pellicule ou écaille adhérente, très mince, mais très roide au toucher; de sorte que si la maladie est ancienne, si le lichen a envahi toute la surface de la peau, si les grattages sont incessants, la sécrétion est devenue plus marquée, les écailles ou concrétions plus nombreuses et l'état rugeux plus dessiné, en même temps que la forme aiguë a disparu. Cet aspect écailleux est assez prononcé dans quelques cas pour représenter les lichens qui enveloppent les arbres et qui s'y multiplient; de là la dénomination donnée à cette maladie et dont l'état exagéré a constitué le type ou le cachet qui ne se fait observer qu'accidentellement. Le nom est donc mauvais pour la généralité des cas; mais il remonte à Hippocrate, il faut le respecter.

Ceci posé, disons que le lichen peut se rencontrer sous trois dispositions différentes, *lichen diffus*, *lichen circonscrit*, *lichen perpendiculaire* ou *en ruban*. On entend par *lichen diffus*, celui qui se montre sur une partie quelconque du corps, une jambe, un avant-bras, la poitrine, sous forme de petites papules disséminées, espacées les unes des autres sans affecter aucun état groupé régulier. Dans le *lichen circonscrit*, au contraire, il se développe un nombre plus ou moins considérable de papules confluentes, se touchant à leur base et ramassées sous forme d'une plaque arrondie, qui a généralement un autre siége. Au lieu d'occuper les régions flexueuses du corps et la partie interne des membres, cette affection se développe sur le dos des mains, sur la longueur des membres et plus souvent en dehors qu'en dedans. Cette variété, qui amène d'ailleurs les mêmes démangeaisons, est beaucoup plus sujette que la précédente à la sécrétion et surtout à passer à l'état de lichen eczémateux. Quant au *lichen*

gyratus, c'est une forme fort rare qui a été signalée pour la première fois par Biett, et que nous avons été à même d'observer, tant à l'état de *lichen simplex* qu'à celui de *lichen agrius*. M. Cazenave retrace ainsi cette variété d'après Biett (*Abrégé pratique des maladies de la peau*) : « Les papules, disposées en petits groupes, formaient une espèce de ruban qui, partant de la partie antérieure de la poitrine, gagnait la partie interne du bras, dont il longeait en se contournant tout le bord externe jusqu'à l'extrémité du petit doigt, en suivant exactement le trajet du nerf cubital. » Voici une observation recueillie par M. le docteur Faget en 1843, dans notre service, et qui donne une idée exacte de cette affection :

Le nommé Loddet, âgé de trente-sept ans, d'un tempérament nerveux, bijoutier, sans antécédents maladifs, entre à l'hôpital Saint-Louis dans le service de M. Devergie le 3 mars. Il y a dix mois, à la suite d'un travail assidu pendant quinze à dix-huit heures chaque jour, il est pris de démangeaisons à l'aine ; trois semaines plus tard, petits boutons à la partie interne et supérieure de la cuisse qui s'étendirent très rapidement à toute la longueur du membre. Il garde cette affection sans y apporter de remède, et à son entrée on aperçoit une disposition méthodique de papules sous la forme d'un ruban très étroit qui, partant du pli des fesses, se contourne à la partie interne de la cuisse, gagne le creux poplité et la face postérieure de la jambe et du talon pour venir s'éteindre sur le bord externe du pied en descendant ainsi sous la forme d'un ruban très étroit, de la largeur d'un centimètre au plus ; ce ruban est à peine interrompu dans toute la longueur de son trajet. Ce malade reste trois mois à l'hôpital ; il est mis à l'usage de la teinture de cantharides à l'intérieur, des pommades au proto-iodure de mercure, des applications d'iode caustique, de nitrate d'argent, d'emplâtre de Vigo : les cautérisations argentiques ont seules déterminé la résolution.

Mais, sous quelque forme que se présente le lichen, il peut être discret ou confluent, aigu ou chronique. Il est rare qu'il affecte la forme confluente et étendue lorsqu'il se montre à l'état aigu ; presque toujours son extension se fait graduellement, insensiblement, sous l'influence de traitements mal dirigés, de grattages, ou d'un défaut de soins. Chez les enfants, il présente un caractère aigu très dessiné. Se manifestant à l'époque du printemps, dans l'adolescence ou dans l'âge adulte, on y porte peu d'attention, à cause du peu d'importance de l'affection, qui se montre à la peau par quelques éle-

vures papuleuses et cède aux grattages ; c'est ainsi que la maladie s'étend et se multiplie. Il peut d'ailleurs, par suite d'excès, de fatigue, de veilles, avoir de nouvelles recrudescences qui viennent s'ajouter successivement aux premières apparitions, et il arrive alors un moment où, après des années de l'existence de cette maladie, on la voit envahir toute la surface de la peau, particulièrement les membres et la figure. C'est alors que toutes ces papules, qui sont à divers instants de la nuit et du jour le siége de grattages, amènent l'épaississement du tissu de la peau, donnent lieu à des suintements séreux qui se transforment en écailles sèches, très fines, se détachant par le frottement et par petits points isolés de la surface malade; ces écailles, libres dans la majeure partie de leur surface, adhèrent seulement par un point aux papules ou à la peau, de manière à représenter le lichen des arbres.

En cet état, il faut le dire, c'est le lichen confluent et chronique; c'est la maladie la plus cruelle par la démangeaison qu'elle cause, et c'est à cette forme qu'il faudrait donner le nom de *lichen agrius, ferox*. En effet, les démangeaisons ont d'abord lieu à toute heure du jour, si le malade s'expose à la chaleur, s'il fait une course, s'il s'échauffe de quelque manière que ce soit. Mais c'est surtout le soir, quelque temps après être au lit, qu'il s'éveille après un premier sommeil d'une heure ou une heure et demie, et qu'alors il se gratte, se frotte, de toute manière et dans tous les sens, quitte le lit, se promène en chemise, prend le frais ; et quand la chaleur qu'il a acquise dans le lit a cédé, quand les démangeaisons sont calmées par le froid, il se couche, se lève une heure après pour se rafraîchir et recommencer les mêmes manœuvres jusqu'à l'aube du jour. Quelques malades sont même obligés de s'étendre nus sur le carreau pour y trouver le calme qu'ils recherchent. Chose remarquable, les grattages sont agréables, comme dans la gale ; ils apaisent momentanément la démangeaison, parce qu'ils font place à un sentiment de cuisson moins excitant, moins provoquant. Mais ce n'est réellement qu'à l'aube du jour que les démangeaisons cessent et que le malade, épuisé de fatigue, goûte pendant quelques heures un sommeil calme et réparateur. Le lichen arrivé à cet état est réellement de toutes les maladies de la peau la plus tenace, la plus cruelle et

la plus difficile à guérir, surtout en été; à cette époque de l'année, elle devient le siége de démangeaisons plus vives, et, sous l'influence de ces surexcitations répétées, d'un développement de furoncles plus ou moins nombreux à la surface de la peau. Les variations de température, les variations atmosphériques, les temps d'orage, font naître des démangeaisons auxquelles le malade ne peut résister. Ainsi, comme on le voit, le lichen chronique, qui peut ainsi envahir toute la peau, l'épaissir, lui faire sécréter de la sérosité ou suinter du sang; qui trouble le sommeil au point d'y mettre quelquefois l'obstacle le plus complet, constitue une affreuse affection à laquelle on pourrait à plus juste titre donner le nom de *lichen agrius* ou *ferox*, au lieu de l'appeler *lichen simplex*. Ne soyons donc pas surpris si cette maladie fait naître chez quelques personnes des idées de suicide.

Il est peu de maladies de la peau qui soient plus accompagnées de symtômes nerveux que celle-là. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette liaison n'est pas telle que l'excitation nerveuse générale, par exemple, existe en raison de l'étendue et de l'intensité de l'affection. S'il en était ainsi, je n'hésiterais pas à considérer avec mon collègue Casenave le lichen comme une maladie du système nerveux; mais souvent, l'excitation nerveuse est tout à fait disproportionnée avec la maladie cutanée. J'ai par exemple, en ce moment, dans mes salles, un homme de cinquante-huit à soixante ans qui a une éruption lichénoïde très discrète et très limitée à la partie interne des jambes. Or vers le soir il se montre chez ce malade une surexcitation nerveuse si considérable, qu'il se plaint, s'agite, dépeint ses souffrances, exprime une grande anxiété, et cet état dure plusieurs heures, pour se calmer peu à peu, sans que l'éruption en reçoive une influence marquée. Or aucune application extérieure n'a calmé cet état, et l'opium seul, à la dose de 20 centigrammes d'extrait, a pu atténuer cette surexcitation, sans exercer d'ailleurs d'influence sur l'éruption. En opposition avec ce malade, je pourrais citer bon nombre d'exemples de lichens généraux confluents qui étaient loin de développer de pareils phénomènes. On verra rapporté un fait fort remarquable du même genre dans l'histoire du prurigo, où il s'agit d'un prurigo aigu sans

papules; le système nerveux paraissait donc malade encore dans ce cas, indépendamment de l'éruption cutanée.

Il est une forme de lichen très limitée d'ailleurs, et qui a une grande ténacité, c'est celle qui se montre le long des doigts, souvent aussi dans leur intervalle et à leur naissance, de manière à simuler la gale. Ce lichen est diffus, disparait et reparait successivement, de manière à se perpétuer aux mains sans plus d'intensité, mais pendant des mois et des années. C'est surtout chez les enfants très jeunes, et chez les jeunes femmes à peau fine et délicate, qu'on le rencontre.

Le lichen est d'ailleurs une maladie assez commune. Sur 1800 maladies de peau, je trouve notés 156 lichens, dont 119 hommes et 37 femmes. Elle nait dans le jeune âge et dans l'adolescence surtout. Je compte 70 cas de lichens développés de 15 à 25 ans, 51 de 25 à 35 ans. A partir de cette époque, décroissance marquée ainsi: de 35 à 45 ans, 23 cas; et de 45 à 55 ans, 11 seulement. Elle se lie éminemment aux tempéraments nerveux ou sanguins, à tel point que ces tempéraments figurent 109 fois sur 140 dans la statistique de cette affection. Elle tend à prendre une marche chronique; car sur 126 cas je n'en trouve que 14 de moins de 1 mois; 8 cas, de 1 à 2 mois; 32 cas, de 2 mois à 1 an; 54 cas, de plus de 1 an, et 18 cas, de plus de 10 ans. C'est qu'en effet, cette maladie s'entretient surtout par les grattages, qui développent d'autres papules à côté de celles qui existent, et qui en multiplient ainsi le nombre d'une manière incessante.

Son siége le plus fréquent est aux jambes, 100 fois; aux avant-bras et aux bras, 98 fois; puis viennent les cuisses, 93 fois; les mains, 67 fois; la poitrine, 50 fois; la face et le cou, 38 fois. La complication la plus commune est avec le *lichen agrius*, 28 fois, et l'eczéma 11 fois. Il a été héréditaire 10 fois; contagieux dans un nombre de cas indéterminé.

Toutes les fois qu'une personne atteinte de *lichen simplex* à forme aiguë et récente est soumise à un régime doux, à des bains aqueux, à de l'amidon et du saindonx à l'extérieur, il est rare que l'affection ne cède pas seule dans l'espace de quinze jours à trois semaines. La maladie ne se perpétue en général que lorsqu'elle est circonscrite,

ou lorsque, diffuse, elle a été exaspérée par des écarts de régime ou des soins mal entendus. Il n'en est pas de même du lichen circonscrit, et à plus forte raison du *lichen gyratus*. Le premier est rebelle de sa nature et tend à se perpétuer sous la forme de plaques ; le second est plus rebelle encore ; tous deux exigent presque toujours, indépendamment d'un traitement général, l'usage de modificateurs locaux.

Lichen pilaris. — Cette variété de *lichen simplex* est toute spéciale. Elle affecte surtout les jambes là où existent des poils. Elle offre cela de remarquable, que les papules de lichen sont plus fortes, et que chacune d'elles est traversée par un poil, la papule naissant à la base même du poil. La coloration des papules est aussi plus foncée, d'un aspect plus sombre ; les démangeaisons sont peut-être moins vives. C'est toujours à l'état diffus que se montre cette variété de lichen.

Lichen lividus. — On donne ce nom à une variété de lichen qui se montre chez les personnes âgées, surtout aux jambes, et qui se distingue des précédents par la couleur sombre de ses papules et par leur coïncidence avec des taches de purpura. Cette variété amène aussi beaucoup moins de démangeaison.

Lichen agrius. — Voici une espèce très commune et qui mérite de fixer toute l'attention des praticiens. Elle a pour cachet le développement de grosses papules dont la majeure partie donne lieu, avec le temps, à une sécrétion purulente à son sommet comme les pustules ; leur volume est d'ailleurs très divers ; toutefois la sécrétion au sommet de la papule n'est que momentanée, en sorte que l'état papuleux reste comme caractère prédominant.

Cette maladie, qui se montre principalement à partir de l'âge de douze à quinze ans, peut se présenter sous trois formes différentes : *lichen agrius diffusus*, *circumscriptus* et *gyratus*, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que le *lichen simplex*. Mais dans le *lichen agrius circumscriptus* les papules sont beaucoup moins disséminées ; elles occupent une surface plus circonscrite, quoique disposées sans ordre. C'est presque toujours à la face interne des cuisses et des jambes que se développe le lichen *agrius ;* et si l'on examine l'éruption en général, on voit qu'elle a de la tendance à y former des trai-

nées de papules obliquement dirigées de dehors en dedans, et si confluentes, qu'elles amènent l'épaississement de la peau dans l'étendue de leur trajet. Ainsi surface plus ou moins large d'une éruption de grosses papules assez aplaties dont une partie fournit à son sommet une sécrétion purulente, qui parfois se concrète et couronne la papule d'une croûte grisâtre.

Le *lichen agrius circumscriptus* n'a plus ni la même forme, ni le même siége; c'est sous la disposition d'une plaque qui occupe une surface plus ou moins grande du pli des jarrets ou du pli des bras qu'il se montre : là la peau est épaissie, rougeâtre, parsemée de quelques écailles ou lamelles épidermiques à son centre, et est bordée d'un nombre plus ou moins considérable de papules confluentes, qui sécrètent surtout de la sérosité. Il en résulte une peau tendue, douloureuse dans les mouvements, et qui parfois est le siége de cassures saignantes. Mais dans bon nombre de cas l'affection n'est pas aussi dessinée, la peau est moins profondément malade, et l'état papuleux est ce qui frappe le médecin. Ainsi cette variété diffère, comme nous le disions, et par le siége, et par la forme.

Quant au *lichen agrius* à forme *gyratus*, il est très rare, et ne se distingue du *lichen simplex* de même disposition que par le volume des papules qui le constituent.

On serait porté à croire, d'après l'épithète donnée à cette maladie, qu'elle cause des démangeaisons horribles : c'est une erreur. Certes elle en détermine, mais les malades atteints de *lichen agrius* se plaignent et souffrent beaucoup moins que ceux qui sont affectés d'un *lichen simplex* confluent.

Le *lichen agrius* est constamment lié à un tempérament lymphatique nerveux, ce qui explique les succès que l'on obtient, dans cette maladie, d'un médicament plus propre à combattre un ensemble lymphatique qu'un état nerveux général; nous voulons parler de la teinture de cantharides dont nous exposerons le mode d'administration en traçant la thérapeutique du lichen.

Relativement à la marche du *lichen agrius*, c'est une des affections les plus tenaces, les plus soutenues et à forme la plus chronique. Il est des enfants qui gardent cette maladie durant de lon-

gues années. Elle s'améliore l'été, elle reparaît l'hiver, ce qui est le contraire du *lichen simplex* ordinaire. A cet égard, la statistique nous démontre que le *lichen simplex* débute principalement dans deux saisons de l'année, en hiver 34, en été 31, tandis que l'on ne compte de ce lichen que 9 cas en automne et 11 cas au printemps; ce qui ne détruit en rien l'influence de l'été sur le *lichen agrius*, attendu qu'en général toute affection cutanée qui est à son *maximum* d'intensité en hiver tend à disparaître au printemps. Ce n'est pas que l'on ne puisse arrêter un *lichen agrius* à son début; mais sa marche lente, insidieuse, amène de la part des parents des démarches tardives auprès des médecins, qui ne connaissent pas toujours l'agent curatif par excellence de cette affection.

Formes composées.

Lichen urticans. — C'est là une espèce toute particulière qui a été signalée par Bateman, et que l'on doit considérer plutôt comme un exanthème que comme un lichen. En effet cette maladie, propre surtout à l'enfance, est ordinairement précédée des symptômes généraux qui constituent les prodromes des exanthèmes; il est vrai qu'ils sont légers: courbature, céphalalgie, anorexie, quelques nausées et fièvre; puis apparaissent à la peau, soit en dehors, soit en dedans des membres indistinctement, des groupes de rougeurs moins étendues que dans l'urticaire, plus acuminées que dans cette affection, avec un point central papuleux qui semble se confondre à sa base avec l'élevure rosée, *moins décolorée* d'ailleurs à son centre que dans l'urticaire. L'éruption se fait d'une manière successive, mais au lieu de disparaître dans l'espace de quelques heures, elle persiste pendant vingt-quatre heures, et ce laps de temps écoulé, il reste la papule de lichen qui met encore deux ou trois jours à céder complétement. Dans cette forme de *lichen urticans* la sensation n'est plus celle de l'urticaire: dans cette dernière maladie il y a picotement, cuisson; dans l'autre il y a surtout démangeaison.

Lichen eczémateux (*eczéma lichénoïde*). — Cette forme composée, à la fois papuleuse et vésiculeuse, est commune. Elle affecte la partie externe des membres sous la disposition de plaques arrondies

disséminées, sécrétantes, surtout au début de la maladie, et donn alors de la sérosité roussâtre comme l'eczéma ; puis la sécré s'arrête peu à peu et l'état papuleux se montre nettement des Cette variété d'eczéma lichénoïde est plus facilement curable le lichen circonscrit ou en plaques nummulaires.

Lichen herpétiforme. — Cette espèce n'est pas très rare ; elle comme la précédente, sous forme de plaques, mais qui sont ne ment arrondies et terminées par un *bourrelet*. Parsemées d'aill de papules nombreuses et sans sécrétion appréciable, elles ont grande ténacité et une grande durée. Elles tendent sans ce s'élargir et amènent des démangeaisons très prononcées. La d rence principale qui existe entre ces deux variétés, c'est que la mière est sécrétante, ce qui la relie au tempérament lymphatique nerveux ; la seconde sécrète peu et se relie au tempérament bili et nerveux. Quant à ce qui différencie surtout le lichen herp forme du *lichen simplex circumscriptus*, c'est l'existence d'un b relet à la circonférence du premier, et par lequel s'opèrent les grès incessants de la maladie, tandis que le lichen circonscrit assez stationnaire.

Diagnostic. — Telles sont les variétés assez nombreuses que p offrir le lichen; ces variétés diverses nous conduisent à tracer caractères différentiels de chacune d'elles. On voit d'abord d lichens simples qui diffèrent entre eux par le volume de leurs papul c'est le *lichen simplex* et le *lichen agrius*. Le caractère de la prem espèce se déduit de la petitesse des papules, qu'il soit *diffusus*, *circ scriptus* ou *gyratus*, tandis que dans le *lichen agrius* la papule volume double, triple ou quadruple; les papules, dans ce dern donnent souvent lieu d'ailleurs à une sécrétion que le *lichen si plex* ne fournit jamais que très accidentellement d'une manière sensible, à la suite de grattages, par exemple. Le *lichen pilaris* très facile à distinguer, puisque chaque papule est traversée par poil, phénomène qui, pour le dire en passant, détruit entièrem l'opinion de ceux qui font résider le siége anatomique du lich dans les papilles de la peau. Quant au *lichen lividus*, on compren facilement combien la coloration vient ici apporter un cachet t particulier à cette maladie, lorsqu'on se pénétrera de cette pe

que le lichen a généralement, à l'état aigu, une teinte rosée qui tend à le rapprocher des affections exanthémateuses. Mais il est une maladie avec laquelle on confond souvent le lichen : c'est la gale. Bon nombre de médecins commettent des erreurs à cet égard, et il faut dire qu'il n'est pas de diagnostic plus difficile dans quelques cas ; c'est qu'en effet le lichen a parfois le même siége que la gale, entre les doigts et à leur naissance. C'est surtout chez les jeunes enfants que l'erreur est commune, parce que le lichen est souvent diffus, restant disséminé sur le ventre, la poitrine, les membres et les doigts, comme la gale. Sous ce rapport cependant il est une circonstance particulière à la gale, et qui ne se rencontre pas dans le lichen : c'est l'absence de boutons à la figure ; tandis que le lichen se rencontre aussi bien à la figure, et même plutôt à la figure que sur les autres parties du corps. Mais c'est surtout par l'absence de vésicules au sommet des papules, par l'absence de sillons ou galeries d'acarus le long des doigts et à la verge, faits pour lesquels nous renvoyons à l'histoire de la gale (article *Diagnostic*), que l'on arrive par le secours de la loupe à établir ces différences : c'est une étude toute spéciale à faire.

Causes. — Si nous avons insisté sur la liaison du lichen avec le tempérament nerveux, il ne s'ensuit pas que nous regardions ce tempérament comme la cause unique et essentiellement prédisposante de cette maladie ; nous serions d'ailleurs dans l'erreur à l'égard du *lichen agrius*, dans lequel une certaine prédominance lymphatique existe toujours. Nous devons dire que le *lichen simplex* est le reflet le plus fréquent de divers états généraux, et notamment d'un état gastralgique ou entéralgique. A cet égard, il est très commun de rencontrer le lichen lié avec la gastralgie qui amène des rapports acides, et souvent aussi avec le *pyrosis* ou cette sorte d'ardeur épigastrique et œsophagienne qui est assez commune ; on l'observe encore dans les états morbides légers du foie. Ce sont ces circonstances qui viennent justifier les indications que nous donnerons sur le traitement interne du lichen. Enfin le lichen repose toujours sur des peaux fines, délicates, plus ou moins blanches, et l'on verra que le prurigo a des conditions de siége souvent opposées.

dissémi[illegible]
alors d[illegible] thérapeutiqu
s'arrêt[illegible] de faits : 1° de l
Cette [illegible] ; 3° de la lia
le lich[illegible] du système n
Lic[illegible]ndépendance de to
comm[illegible] quelle qu'en soit
ment [illegible] antiphlogistique
de pe[illegible] rafraîchissants à l'i
grand[illegible] sur les surfaces n
s'élar[illegible] les aliments. On v
rene[illegible]ment. Toutefois cette
mièr[illegible] au lichen diffus ; car le
nerv[illegible] soins plus soutenus, q
et [illegible] discret. Nous en dirons
form[illegible] que par le repos des m
rela[illegible] extérieurs, les cataplasm
gré[illegible] l'amidon le jour, que l'on
ass[illegible] souvent nécessaire d'a
[illegible] surtout à l'application de n
off[illegible] *Formulaire*, LOTIONS n° 1)
ca[illegible] au lichen ait été négligé ou n
lich[illegible] chronique ; il n'est d'ailleurs
c'[illegible] de tendance à suivre cette ma
es[illegible] des médications générales pa
se[illegible] prolongés. Ici se présentent,
v[illegible] en raison de la prédominanc
d[illegible] nerveuse, ou de la forme du l
[illegible] lorsque la surexcitation nerv
[illegible] la combattre par l'opium à dose
[illegible]diques connus. Deux autres médic
[illegible] mises en usage avec beaucoup de suc
[illegible] l'éruption ; l'une a pour base les alcali
[illegible] *vesicatorius*. La première se rattac
[illegible] qui est lié surtout au tempérament bilieu
[illegible] trait au lichen *agrius* qui coïncide presqu
[illegible]ment lymphatique nerveux. Toutes les varié

[illegible]que *simplex* proprement dit se guérissent sous l'influence des [illegible]alins. Les variétés de *lichen agrius* cèdent à merveille par la tein[illegible]ure de *meloe vesicatorius*; seulement il faut savoir graduer la dose de cette teinture suivant l'âge du sujet. Je renvoie, pour tout ce qui concerne l'une et l'autre médication, à la médication alcaline [illegible] antinerveuse (voy. page 123) et à la médication par la teinture de cantharides (voy. page 129).

C'est assez dire qu'il doit exister des eaux minérales naturelles plus appropriées au lichen que d'autres, et à cet égard nous citerons celles de Vichy, de Plombières et de Louesche. Ces dernières m'ont procuré des succès fort remarquables, surtout dans les lichens circonscrits que je guérissais difficilement et qui exigeaient des soins prolongés. Entre autres faits je citerai une personne de trente-deux ans qui, depuis deux ans, voyait revenir en hiver un lichen des mains et que je n'avais pu guérir sans récidives. Je l'envoyai à Louesche au mois d'août, il en revint tout à fait débarrassé ; mais vers le milieu de décembre il se manifesta de nouveau quelques pa[illegible]les, et comme son séjour à Louesche lui avait été si utile, il vint me demander s'il ne pouvait pas aller aux bains dans cette saison. [illegible]formations prises, le trajet était encore praticable malgré les [illegible]ges. Il eut le courage de s'y rendre, et, seul dans l'établissement, [illegible]prit en plein hiver une nouvelle saison d'eaux, qui le débar[illegible]a complétement.

Ce ne serait à aucune de ces eaux qu'il faudrait envoyer un ma[illegible] atteint de *lichen agrius*. Cette forme réclame l'emploi d'eaux [illegible]fureuses ou sulfo-alcalines. Les eaux sulfureuses des Pyrénées [illegible]bord, puis après leur usage celles de Bagnères-de-Bigorre pour [illegible]er la surexcitation nerveuse, telle est la marche qu'il faut faire [illegible]re aux malades atteints de cette affection.

[illegible]is c'est dans les lichens chroniques plus ou moins circonscrits, [illegible]ces, rebelles, qu'il est souvent nécessaire de modifier les sur[illegible]s malades par des cautérisations superficielles au nitrate d'ar[illegible]t. Je ne connais pas de maladie qui change plus la vitalité du [illegible] de la peau que celle-là. Si Alibert avait constamment son [illegible]yon de nitrate d'argent à la main dans les dernières années de sa [illegible]tique, cette méthode, portée chez lui jusqu'à l'abus, était bien

justifiée pour cette affection ; à plus forte raison lorsqu'il s'a
lichens eczémateux et herpétiforme. Dans ce dernier cas, c'est
le bourrelet qu'il faut toucher. Dans le lichen eczémateux ré
n'hésite pas à faire suppurer la surface malade à l'aide de po
épispastique étendue d'axonge, de manière à modifier la vit
tissu. — Ces divers moyens que je viens d'énumérer n'exclu
l'usage préalable des pommades résolutives ordinaires au tal
l'oxyde de zinc, celle au nitrate de bismuth associée surtou
modificateurs du système nerveux, le chloroforme et le cam

Quant au *lichen urticans*, c'est une éruption que l'on peu
dérer comme un exanthème, et qui veut être respectée et tra
les émollients simples tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les
rafraîchissantes, l'amidon en poudre et les bains simples.

Strophulus, feux de dents.

Intertinctus.	*Confertus.*
Albidus.	*Volaticus.*
Candidus.	

Willan a donné cette richesse de dénominations à diverses d'une forme de lichen qui affecte les enfants à la mamelle, lièrement à l'âge où s'opère le développement des dents. Cet tion papuleuse se distingue en général du lichen par le volu considérable des papules, qui ont presque toujours un aspe thémateux plus ou moins marqué. La dénomination de *feux* fait assez sentir à quelle cause on rattache généralement le pement de cette maladie. Sans nier l'existence de cette ca joue un rôle très grand dans la naissance des maladies des e la mamelle, M. Rayer fait observer avec raison que l'alim de l'enfant, souvent trop forte et amenant une irritation intestinale, doit être pour beaucoup dans son développemen

Quoi qu'il en soit, le strophulus peut se montrer sur to parties du corps, mais principalement au visage, sous fo grosses papules diffuses avec démangeaison plus ou moins modes pour l'enfant. L'éruption, quelquefois accompagnée d est souvent successive ; elle se guérit dans un point pour re

autre, et elle n'a guère qu'une durée de sept à huit jours
que papule, et quelquefois moins. Voici maintenant les
s qui différencient les espèces. Si les papules sont d'un
iné, proéminentes, éparses et entremêlées de rougeurs
teuses d'une étendue variable, c'est le *strophulus inter-*
ui disparaît souvent le matin pour reparaître le soir, et se
en prenant une teinte jaunâtre, avec desquamation. Si les
ont petites, blanchâtres à leur centre et rouges à leur cir-
ce, c'est le *strophulus albidus*, plus proéminent que le pré-
affectant principalement la face, le cou et la poitrine. On
e *candidus* lorsque les papules sont plus larges et unifor-
blanches ou espacées les unes des autres, et affectant de
e les membres. Enfin Willan a fait deux variétés basées
nfluence des papules, *strophulus confertus*, et sur l'état suc-
de peu de durée de chaque groupe d'éruption, *strophulus*
Dans la première de ces deux variétés, c'est surtout le dos
e qui sont le siége de l'éruption; il existe alors une petite
séreuse généralement résorbée d'ailleurs, mais que l'on
écouler à l'aide de la piqûre avec une aiguille, et qui est
s profondément que sous l'épiderme, ainsi que cela a lieu
vésicules: aussi on le confond souvent avec la gale. Ces
ont de plus longue durée et ne se terminent guère que
nce de quinze jours, tandis que dans la seconde variété
roupe d'éruption se termine par desquamation dans l'es-
rois ou quatre jours; les papules sont d'ailleurs beaucoup
es.

au traitement, c'est évidemment à une médecine d'obser-
il faut avoir recours; il y a lieu surtout de surveiller l'all-
de l'enfant, le lait de la nourrice, d'administrer quel-
s à la fin de l'éruption, et au besoin de saupoudrer d'un
don les surfaces malades.

PRURIGO. *Pruritus, morbus papulosus; scabies papuliformis. Morbus pedicularis; phthiriasis*; maladie pédiculaire.

Avec papules :	Sans papules :
Prurigo mitis.	Prurigo général.
— *formicans.*	— partiel.
— *senilis.*	— *pedicularis.*
— *pedicularis.*	— *pudendi muliebris.*
	— *scroti.*
	— *plantaris.*

Tous les auteurs ont dépeint avec raison cette maladie sous couleurs les plus sombres, sous le rapport de sa ténacité et des mangeaisons qu'elle cause, se rapprochant en cela du lichen chronique arrivé à sa dernière période. C'est qu'en effet, il y a de cette affection quelque chose de tout particulier et qui diffère de toutes les autres maladies, en ce sens que la lésion locale n'est pas toujours en rapport avec les phénomènes généraux qu'elle développe. Dans certains cas même le phénomène général existe sans lésion locale, et lorsque Alibert a parlé du *prurigo latent*, qu'il n'a fait qu'indiquer d'ailleurs, il a été dans le vrai, puisqu'il est des malades qui ne présentent à la peau aucune altération, et chez lesquels on observe la démangeaison et la surexcitation nerveuse la plus vive. Aussi n'hésitons-nous pas à admettre l'existence d'un prurigo sans papules, contrairement encore à l'opinion de tous les auteurs qui ont écrit après Alibert. M. Rayer seul reconnaît qu'il est des cas où il n'y a aucune proportion entre la démangeaison et l'éruption. J'ai vu trop d'exemples de prurigos sans papules pour ne pas admettre cette espèce. D'ailleurs, longtemps avant Alibert, Lorry, qui, sous le nom d'*intertrigo*, a décrit le *prurigo pudendi muliebris* avec tant de talent, a fait ressortir cette variété de prurigo sans papules en parlant de ce prurigo partiel.

On nous a objecté que dire qu'il existe un prurigo sans papules, c'est dire qu'il existe un prurigo sans prurigo, puisque l'état papuleux est le cachet de l'affection. Cela est vrai pour les médecins qui ne voient dans les maladies de la peau que l'état anatomico-pathologique; mais dans le prurigo, les phénomènes de démangeaison, dans certaines conditions données toujours les mêmes

caractérisent autant quelquefois la maladie que l'état papuleux ; et puis, dans cette forme de prurigo sans papules, il naîtra accidentellement, et sous l'influence de grattages, quelques papules isolées qui disparaîtront en très peu de temps, et qui ne présenteront pas tout à fait les caractères spéciaux de cette maladie, mais qui s'en rapprocheront assez pour que l'ensemble morbide fasse rattacher cette affection au prurigo; je persiste donc dans la variété que j'ai signalée.

Mais, chose remarquable, le prurigo peut être circonscrit à une surface de quelques centimètres, comme celle que représente le périnée de la femme, où il peut être général; de là nos deux sous-divisions. Nous attachons d'ailleurs fort peu d'importance à ces variétés de *prurigo mitis*, *formicans*, *senilis;* la forme morbide est toujours à peu de chose près la même.

Il n'en saurait être ainsi de la distinction entre le prurigo simple et le prurigo pédiculaire, qu'il ne faut pas confondre avec la maladie pédiculaire. Les poux, dans le prurigo pédiculaire, ne sont pour ainsi dire qu'une complication, qu'un accident. La maladie pédiculaire a au contraire son évolution, sa forme morbide toute différente de celle du prurigo. Quoi qu'il en soit, établissons les caractères qui sont propres à cette affection.

Le prurigo est une maladie à forme papuleuse, mais la papule morbide ne ressemble ni à celle du lichen, ni à celle du strophulus ou de la gale. Dans ces trois dernières maladies les papules sont acuminées, plus ou moins rosées; terminées dans la gale par une très petite vésicule, elles sont consistantes et charnues dans toute leur étendue pour les deux autres affections; d'ailleurs toujours plus ou moins rosées dans les trois cas et ayant pour siége presque exclusif la partie interne des membres, le devant de la poitrine, et pour deux de ces maladies, le lichen et le strophulus, la figure. Si l'on gratte ces papules, on en fait sortir de la sérosité dans la gale; et il faut des grattages réitérés coïncidant avec une date ancienne de maladie pour amener ce résultat dans le lichen et le strophulus. Les papules ne s'excorient que difficilement dans ces deux affections : les grattages sont a cause du développement de nouvelles papules à côté des anciennes, mais elles ne sont pas généralement accompagnées d'une sécrétion.

Le prurigo au contraire affecte exclusivement le dos et la partie externe des membres. Toutes les papules qui le constituent sont extrêmement petites, peu élevées au-dessus du niveau de la peau, presque plates, peu enflammées, s'excorient avec une grande facilité, et fournissent un peu de sang ; de sorte qu'après quelques grattages chaque papule se trouve recouverte d'une petite lamelle de sang coagulé. L'existence de ce sang coagulé, réuni au siége de ces papules, leur donne un aspect tout spécial, et tellement caractéristique qu'il suffit d'avoir vu un prurigo nettement tranché pour ne jamais confondre cette maladie avec aucune autre : d'ailleurs elle est accompagnée d'une vive démangeaison qui, comme le lichen et la gale, augmente par la chaleur, mais qui se montre, comme dans ces affections, de préférence le soir, et souvent lorsque le sujet qui en est atteint se déshabille. Tels sont les principaux traits qui caractérisent cette maladie. Il faut cependant retrancher de ce tableau tout ce qui a trait au prurigo sans papules, et qui offre d'autres caractères que nous spécifierons lorsque nous en traiterons en particulier.

Le prurigo papuleux affecte en général deux âges opposés de la vie, l'enfance et la vieillesse. Cependant on peut aussi le rencontrer dans l'âge adulte. Willan et Alibert lui assignent principalement comme siége une peau blanche plus ou moins épaisse. Cela est exact pour le prurigo de l'enfance ou de l'adolescence, mais il est très commun de le rencontrer sur des peaux épaisses et brunes. Il est vrai que ce second cachet de peau est surtout celui du prurigo sans papules.

Tous les auteurs ont répété avec Willan que le prurigo papuleux pouvait être *mitis*, *formicans* et *senilis*. Ces variétés ne diffèrent que par l'intensité de la maladie et par la sensation différente qu'elle peut faire naître. Nous ajouterons, quant au *prurigo senilis*, la ténacité du mal et la difficulté d'en débarrasser ceux qui en sont atteints.

Le *prurigo mitis*, qui est généralement propre à l'enfance et à l'adolescence, se manifeste sur les épaules, les lombes, la partie externe des membres, par une démangeaison incommode avec développement de papules qui ne paraissent pas enflammées, à moins

les ne soient grattées; ces papules s'excorient par le grattage couvrent d'une croûte sanguine : c'est surtout quelque temps être au lit que se déclarent les démangeaisons qui privent le de de sommeil pendant un certain temps.

n'en est pas tout à fait de même du prurigo *formicans* qui e plutôt l'âge adulte. Dans cette variété la sensation n'est plus d'une démangeaison ordinaire, c'est la sensation d'une foule urmis qui parcourent la peau ou d'un grand nombre d'insectes iendraient à ramper sous la peau. D'ailleurs, ce n'est pas tou- la même sensation : certains malades se sentent la peau tra- é par des milliers d'aiguilles brûlantes; tous accusent une ur, une âcreté du sang. Mais quelle que soit la sensation, elle ive, pénible, porte le trouble dans tout le système nerveux, et ne elle apparaît le soir, peu de temps après être au lit, elle che tout sommeil, elle force le malade à se lever, à se pro- er en chemise pour prendre le frais; s'il se recouche, il est é de se lever de nouveau et souvent de s'étendre nu sur le sol calmer ses démangeaisons; enfin, ce n'est que vers le milieu nuit, ou quelquefois à l'aube du jour, qu'il commence à goûter epos. Inutile de dire qu'il se gratte, qu'il s'écorche la peau, et n dehors des papules excoriées on trouve souvent sur la peau traînées sanguines d'ongles qui se sont promenés avec violence satisfaire les démangeaisons.

maladie semble dans quelques cas héréditaire; il n'est pas rare voir se manifester chez plusieurs membres d'une même famille. lle n'a pas dans ces diverses formes la même intensité et la ne durée. Ainsi le prurigo *mitis* est loin de persister et d'être lle aux traitements comme le prurigo *formicans*, et surtout le rigo *senilis*. Mais tous les auteurs se sont accordés à regarder e affection comme étant rebelle; peut-être ont-ils exagéré cette nière de voir. Pour moi au moins, la ténacité du prurigo est en on de deux circonstances, son ancienneté d'abord, puis sa loca- tion. Ainsi il est beaucoup plus facile de guérir un prurigo éral qu'un prurigo partiel, même de date récente. Quant au pru- o général, on le guérit assez facilement et assez vite, à moins il ne soit fort ancien.

[illegible] la misère, la malpropreté et les [illegible] causes de cette affection, pour l'âg[illegible] causes expliquent comment le prur[illegible] vieillards généralement peu soucieux d[illegible] voir ce que la statistique nous a [illegible] de prurigo recueillis dans mon serv[illegible] hommes et 20 chez les femmes ; 28 se [illegible] sanguin ou au tempérament sanguin [illegible] lymphatique nerveux ; 6 seulem[illegible] nerveux et 2 au tempérament bilieux. Il y a, c[illegible] différence marquée entre cette affection papu[illegible] essentiellement au tempérament n[illegible] On avait tenu compte des maladie[illegible] fois. Sur ces 59 cas on comptait 4 [illegible] de 1 mois à 1 an ; 16 de plus de [illegible] ce qui prouve l'incurie de ceux qui [illegible] faire traiter, la difficulté de la guérir[illegible] récidives faciles. C'est surtout en [illegible] sur 24 cas il y en a 12 développés [illegible] compte de quelques chiffres par r[illegible] cas à leur première récidive, 1 à [illegible] multiples et 3 récidives annuelles dep[illegible] avait été plus complète, elle eût [illegible] grande proportion. 10 fois sur 1[illegible] sont désignées comme cause ; 2 fois sur [illegible] justifie encore ce que les aute[illegible] développe la maladie. Ainsi sur 51 [illegible] développés de 15 à 25 ans ; 3 se [illegible] progression croissante, c'est-à-dire [illegible] de 35 à 65, et 5 de 65 à 75. Il fa[illegible] petit nombre d'individus q[illegible] chiffres sont considérable[illegible] la période de 25 à 35 et à celle [illegible] développement de la maladie il [illegible] moins qu'il ne s'agisse du prur[illegible] tout sentir sur les épaules,

démangeaison habituelle peut développer tous les accidents que développe la suppression d'une sécrétion de longue date à la peau. La poitrine se prend, s'embarrasse, la respiration devient anxieuse, sifflante, le pouls s'affaiblit et prend de la fréquence, la figure s'altère, tout cela dans l'espace de quelques heures, et l'individu est en danger de mort, comme si une surface eczémateuse s'était brusquement desséchée. Il faut donc dans le traitement prendre en grande considération l'état de la poitrine du sujet et guérir d'autant plus lentement que le prurigo est de date plus ancienne. Inutile d'ajouter qu'après la guérison il faut recommander aux malades des soins de propreté et l'usage de bains alcalins ou savonneux. (Voyez *Formulaire.*)

Prurigo pédiculaire. — Je ne prétends pas décrire la maladie pédiculaire dans l'histoire du prurigo, je la renvoie au groupe des maladies avec parasites animaux ; mais il m'est impossible de séparer le prurigo pédiculaire du prurigo ordinaire, quoique le prurigo pédiculaire soit accompagné d'une production accidentelle de poux. Pourquoi, la maladie pédiculaire proprement dite, et dont on retrouve des exemples très tranchés dans ces foyers de poux qui surgissent soit à la surface de la tête, soit à la surface du corps, est autre chose. Dans le prurigo pédiculaire il semble que les poux soient une complication. Ainsi l'on observe à cet égard deux ordres de faits : chez un individu déjà atteint de prurigo général avec papules localisées comme nous les avons décrites, il va se manifester quelques poux, parce que cet individu est couché avec un individu qui a été porteur de poux ; mais alors ils seront rares, disséminés à la surface du corps. Les produits morbides de la peau provenant de la morsure de ces insectes ne seront qu'accidentels, tandis que les papules du prurigo constitueront le cachet principal de l'affection ; c'est ce que l'on observe chez beaucoup de vieillards malheureux et malpropres.

Quoi qu'il en soit, voici quel est le cachet du *prurigo pédiculaire.* Comme dans le prurigo simple, il existe des papules à croûtes sanguines disséminées sur le dos et sur la partie externe des membres ; mais on voit en outre sur le devant et sur le haut de la poitrine, sur le ventre, ainsi qu'entre les papules de prurigo qui occupent la

partie supérieure du dos, une série de petites excoriations de la p et une foule de petits points enflammés très élevés au-dessu niveau de la peau, se rapprochant un peu du lichen sans en la forme conique bien tranchée ; çà et là des petites surfaces lé ment suintantes, et d'où s'échappe un peu de matière à la séreuse et muqueuse, de sorte qu'au lieu d'avoir un état papu à croûte sanguine bien arrêté, bien net, sur une peau saine, un mélange de toutes les altérations que nous venons de déc reposant sur un fond plus ou moins rouge de la peau. Cet dans la région antérieure du corps simule la gale du ventre et d poitrine.

Inutile de dire que le prurigo pédiculaire amène aussi des mangeaisons, mais celles-ci ne sont plus de même nature ; sont une double conséquence et de l'affection prurigineuse et l'existence d'une proportion plus ou moins grande d'insectes qu promènent à la surface de la peau.

Dans la maladie pédiculaire soit de la tête, soit du corps, il n plus du tout le même cachet. L'état papuleux du prurigo pro ment dit n'existe pas ; on n'aperçoit à la peau que la trace de g tages. L'altération morbide est donc tout autre. Je sais combie sera difficile dans certains cas de poser la limite entre les d affections, mais, sous le rapport scientifique, je crois qu'il important d'établir la distinction.

Quant à la durée de l'affection, elle est illimitée comme toutes maladies avec production végétale ou animale ; tant que la so de ces productions n'est pas détruite, la maladie persiste ; mais, faut le dire, rien de plus facile à guérir qu'un prurigo pédicula les bains sulfureux et la pommade sulfureuse simple (voy. *Form laire*) suffisent parfaitement ; il n'est même pas besoin d'emplo une pommade sulfo-alcaline. Ici un précepte que nous avons d établi à l'égard du prurigo trouve plus entièrement encore son plication, à savoir, qu'il ne faut pas guérir trop vite la maladie, surtout ne pas détruire trop rapidement les poux. Au surplus, renvoyons à cet égard le lecteur à la description que nous fer de la maladie pédiculaire. Il suffit donc d'un bain sulfureux t les deux jours, puis après trois bains, des onctions avec la pomm

douloureuse sans qu'on soit obligé d'employer de frictions comme pour le traitement de la gale.

Prurigo sans papules. — Alibert n'a fait qu'entrevoir cette maladie; c'est en quelques lignes qu'il cite l'exemple d'une jeune religieuse carmélite, qui était tellement tourmentée par cette affection, que dans la nuit elle s'élançait précipitamment de sa couche et trouvait une sorte de soulagement à se placer à nu sur le carreau de sa chambre. Il attribue cette affection à ce que cette religieuse portait par mortification une chemise de laine; c'est là une erreur : combien de personnes qui sont couvertes de laine de la tête aux pieds et qui n'ont pas de prurigo ! Il cite encore le cas de la fille d'un pâtissier qui eut cette maladie jusqu'à son mariage où, déplacée de l'habitation de son père et loin de la chaleur continuelle d'un four, elle vit disparaître cette maladie. Alibert a désigné cette variété sous le nom de *prurigo latent*. J'ai eu occasion de l'observer si souvent, que je n'hésite pas à en faire une variété très distincte, et je rattache à cette espèce les prurigos partiels décrits par les auteurs sous les dénominations de prurigo *podicis*, *pudendi muliebris*, *scroti lanitaris*. Dans tous ces prurigos on retrouve des caractères communs très nets qui les rapprochent : 1° La démangeaison plus vive, plus poignante, plus irrésistible que dans toutes les autres variétés de prurigo papuleux; 2° l'absence absolue de papules ou une disproportion énorme entre la démangeaison et l'existence de quelques rares papules, incapables de la justifier; 3° l'état endurci, presque *tanné* de la peau, qui, dans certains cas, est porté si loin, que un malade atteint de prurigo général de cette espèce se gratte à outrance tous les soirs et qu'il n'en reste pas de traces le lendemain, l'ongle éraille légèrement l'épiderme, il n'en enlève qu'une pellicule très mince sans amener aucun suintement sanguinolent; certes ces malades ne ménagent pas les grattages; 4° quand le prurigo sans papules est partiel et qu'il attaque une partie muqueuse dans un état de contact constant avec la peau voisine, comme les bourses, le périnée, la marge de l'anus, alors il s'opère accidentellement un suintement, il est muqueux, plastique, et la peau, sans être très sensiblement excoriée, en devient seulement plus épaisse et moins souple; 5° enfin tout prurigo sans papules est d'une guérison bien

plus difficile que le prurigo papuleux. C'est au prurigo sans pap qu'il faut rattacher tout ce que disent les auteurs des difficultés le médecin éprouve à guérir cette maladie. Voilà donc un *pru bien spécial* et qui se différencie nettement du prurigo papul Nous n'avons rien forcé dans les caractères que nous en avons d nés. Ajoutons que, lorsqu'il est général, on le rencontre sur chez les individus d'un tempérament bilioso-lymphatique, à p brune ; qu'il s'observe le plus souvent à un âge assez avancé de la qu'il se relie parfois à des lésions chroniques des organes abdo naux, soit des tumeurs du côté du foie, des augmentations de lume ou engorgements de la rate, ou à des tumeurs abdomin de nature diverse Il paraîtrait aussi se rattacher à certaines p fessions, car un boulanger auquel j'ai donné des soins l'a conse pendant dix-huit à vingt ans, exposé qu'il était continuellemen la chaleur de son four, et à l'instar de la fille de ce pâtissier tra par Alibert. Il est des individus qui en restent atteints pendant longues années et pour lesquels la démangeaison devient un bes de tous les jours. Aussi, quand on les débarrasse trop rapidem ou quand par une cause accidentelle cette démangeaison vien disparaître, ils sont pris tout à coup d'accidents les plus graw ordinairement du côté de la poitrine ou du côté des intestins : s pour la poitrine, l'anxiété de la respiration et tous les phénomè de l'engorgement séro-sanguinolent des poumons ; soit pour l intestins, d'une diarrhée très abondante ; la vie du malade étant danger dans les deux cas.

Depuis deux ans (*Journal de médecine et de chirurgie pratiqu* avril 1855), mon attention a été appelée sur la coïncidence prurigo avec des affections du foie chez deux malades, dont l'i est atteint de calculs biliaires, et dont l'autre a une hypertrop du foie, et, suivant quelques médecins qui ont été à même de visiter avec moi, aurait aussi des calculs biliaires. Mais, à cet égar ce ne sont que des présomptions basées sur l'état général du m lade et sur une sensation de bruit de frottement qui aurait perçue. Chose remarquable, le prurigo, chez ces deux malad précède l'invasion de l'ictère et l'annonce ; les bains alcalins l'arr tent quelquefois, mais ne le font pas céder entièrement, les pos

t presque sans succès contre cette affection. Lorsque les
léterminés par les calculs biliaires viennent à céder par
ı des calculs dans les garde-robes, alors le prurigo
ı à peu et disparaît. On comprend que ce n'est là qu'un
: de réflexion morbide, et l'on conçoit aussi que la thé-
dirigée ordinairement contre le prurigo ne doive pro-
n résultat en présence de la maladie du foie qui en est
lais personne n'a signalé cette liaison, et il était bon de
nnaître. D'ailleurs, malgré les grattages incessants sur
rface du corps, il n'y a qu'un simple arrachement pelli-
l'épiderme, sans émission de sang ou de liquide séreux,
:une trace de papules. C'est donc vers le foie que doit être
. le traitement.

ard, l'eau de Vichy est le moyen qui, au premier abord,
ttention du médecin, et cependant, je dois le dire, elle
t insuffisante, comme on le verra dans une des observa-
ıntes. Chez ce malade, ce qui m'a le mieux réussi, c'est
calomel à dose très fractionnée, et employé tous les jours,
mmes à 1 décigramme.

ıier des faits que je vais rapporter à l'appui des assertions
ens d'émettre appartient à ma pratique de la ville.

ıgé de quarante-huit ans, est depuis huit ans sujet à des jaunisses
l'abord, se sont ensuite renouvelées deux et trois fois par an. Elles
primitivement une durée ordinaire. Quelques sangsues à l'anus,
le la tisane et du régime suffisaient pour les faire disparaître. Mais
s ont pris une durée beaucoup plus longue, jusqu'à persister pen-
ıurs mois; elles ont été rebelles au traitement ordinaire ; les eaux
le séjour à Vichy, d'abord utiles, sont devenus infructueux ; enfin
l par rendre par les garde-robes des calculs biliaires prismatiques,
e ceux qui sont quelquefois si multiples dans la vésicule, et, chaque
ı calculs ont été rendus, l'ictère a disparu quelque temps après,
emps que l'estomac et les intestins sont rentrés dans leurs fonc-
tuelles. En effet, il y avait presque constamment de l'anorexie
me du dégoût pour les aliments, et il existait une constipation
ıvec matières décolorées et ressemblant à de la terre glaise. Des
ɛpatiques extrêmement violentes précédaient constamment l'émis-
alculs. Le foie débordait sensiblement le bord des fausses côtes.
jouter qu'une foule de médications ont été mises en usage, et nous

devons dire que celle qui a eu le plus de succès a consisté dans l'emp[illegible] matin et soir, d'une pilule de calomel à 0,05 centigrammes. Tel est l'[illegible] sommaire de ce malade.

Ce qui doit surtout attirer l'attention dans ce fait, c'est que chaq[illegible] jaunisse a toujours été précédée d'une démangeaison à la peau, [illegible] a persisté pendant toute la durée de chacune d'elles, et qui, [illegible] son intensité, réflétait l'intensité et la durée de la jaunisse. Ce n'ét[illegible] pas une simple démangeaison provenant d'une rougeur accide[illegible] telle de la peau, par exemple : c'était un véritable *prurigo sans p[illegible] pules*. Le malade, à divers instants de la journée, et notamment [illegible] soir, lorsque se faisait sentir la chaleur du lit, se grattait tout [illegible] corps et même la figure. La peau semblait se tanner et durcir [illegible] proportion de l'intensité des démangeaisons, *et les grattages n'[illegible] développaient aucune papule ;* ils n'y laissaient que la trace d'exc[illegible]riations linéaires épidermiques dues à l'action des ongles. Des bains alcalins de deux à trois heures calmaient seuls ces démangeaisons. La diminution du prurit, qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu d[illegible] calculs rendus, annonçait le retour à la santé avant même la colo[illegible]ration de matières fécales, avant la décoloration des urines et de la sclérotique.

Je puis, à côté de ce fait, en placer un second tout à fait analogue et tiré de mon service à l'hôpital ; c'est celui d'un malade qui était couché au n° 13 de la salle Saint-Louis.

Le nommé Mahy (Louis), âgé de trente-huit ans, cordonnier, d'une complexion fort délicate, est habituellement d'une assez bonne santé ; sauf les petites indispositions qu'entraînent de temps en temps les excès de fatigue.

Il y a trois mois, à la suite d'un érysipèle de la face, qui fut de courte durée, il fut pris de violentes douleurs siégeant au creux de l'estomac. En même temps l'appétit diminua et se pervertit, au point qu'il survint un dégoût insurmontable pour certains aliments, et notamment pour toutes les choses sucrées. Les douleurs épigastriques devenaient de plus en plus intenses, principalement la nuit, sans qu'il ait jamais été possible de les rattacher à la nature des aliments. Puis, au bout de quelques semaines, se montra une jaunisse qui ne tarda pas à devenir extrêmement prononcée.

Au bout de trois semaines, c'est-à-dire aussitôt que l'ictère fut établi, les coliques hépatiques, car c'en était évidemment, avaient cessé, mais la peau était devenue le siége d'une démangeaison excessivement intense sur toute la

surface du corps; le contact des vêtements ne pouvait même plus être supporté. Le séjour au lit était devenu impossible, et par conséquent aussi le sommeil; à peine la chemise pouvait-elle être tolérée : le malheureux patient ne se trouvait bien que complétement nu, assis sur une chaise, ou dans un bain.

Cette effroyable hyperesthésie de la peau pouvait-elle être attribuée à une éruption papuleuse, à un prurigo, dans l'acception ordinaire du mot? Pas du tout. La peau était sèche et lisse et ne présentait que les traces de grattages et de frottements violents.

Il y a maintenant trois mois que la maladie dure en s'atténuant. L'ictère est très prononcé, le bord inférieur du foie déborde les fausses côtes de trois travers de doigt. Quelques papules excoriées font voir çà et là de ces petites croûtes sanguines qui constituent le caractère classique du prurigo. On en peut compter deux ou trois par exemple sur chaque bras et autant sur le tronc. Lorsque, il y a quelques jours, je pressais le malade de me dire si ces papules n'étaient pas plus nombreuses autrefois, alors que la démangeaison était beaucoup plus vive, il m'affirma très explicitement que jamais il n'en avait autant vu qu'à présent, et que pendant bien longtemps même toute la peau était restée complétement dépourvue de ces sortes de boutons. Il y a plus : depuis une quinzaine de jours, bien que l'ictère soit resté stationnaire, la démangeaison a presque entièrement disparu, et les mêmes papules, toujours fort rares, de prurigo ont persisté. Il ne suffisait pas de leur absence pour démontrer qu'elles ne sont pas essentielles au prurigo : leur présence même ajoute actuellement une nouvelle preuve à cette vérité déjà évidente auparavant.

Il faut ajouter que, depuis un mois que ce malade est à l'hôpital, l'usage des alcalins à l'intérieur et sous forme de bains a rétabli les fonctions digestives dans presque toute leur intégrité, et que, malgré la persistance de son ictère, les coliques n'ont pas reparu depuis deux mois; ces bains ont puissamment contribué, cela est probable, à diminuer la démangeaison qui n'est plus que passagère et très supportable.

A ces deux faits si curieux, il me serait possible d'en joindre deux autres tout à fait semblables, dont l'un nous a passé sous les yeux à la consultation publique, et dont l'autre se trouve encore maintenant dans un autre service à l'hôpital. L'un et l'autre sont relatifs à deux femmes âgées atteintes également d'un ictère symptomatique d'une affection ancienne du foie.

Ces faits, qui sont loin d'être rares, ne démontrent pas seulement la liaison du prurigo avec l'ictère : ils établissent encore d'une façon irrécusable l'existence et la ténacité du prurigo sans papules.

Mais le prurigo sans papules et général peut se présenter à l'état aigu comme à l'état chronique. Je ne l'avais pas encore observé

sous cette forme, lorsqu'une personne du monde, homme lettré, vint me consulter dans un état de désordre moral grave résultant des souffrances excessives auxquelles il était en proie depuis peu de temps. Si quelques prodromes avaient précédé cet état, ainsi qu'il le mentionne dans la note qu'il a rédigée lui-même, et que je reproduis ici, il faut dire que tout à coup des souffrances aiguës se sont montrées. Depuis quinze jours il était sous leur influence, et jusque-là il n'avait éprouvé qu'un certain trouble dans le système nerveux, résultant de démangeaisons passagères qu'il éprouvait. Il n'a pas relaté suffisamment ce passage brusque à cet état de souffrance, mais il me l'a nettement dépeint lors de la première consultation que je lui ai donnée. Laissons donc parler le malade.

Prurigo sans papules. — État aigu. — Guérison. — M. G..., âgé de soixante-un ans, résidant à Paris, ressentit dans les derniers jours du mois d'avril 1855, vers la région du périnée, des douleurs lancinantes très vives, analogues à celles que produisent les clous. Après deux ou trois jours de souffrances et de nuits sans sommeil, il consulta un médecin de province, son ami, accidentellement à Paris, qui déclara, après examen des boutons, que c'était un zona. — Des bains de son, des cataplasmes avec tête de pavot furent prescrits, et le malade n'ayant aucun symptôme de fièvre put prendre une nourriture de légumes et de viandes blanches. Le docteur H..., qui quittait Paris le lendemain, annonça que cette affection cutanée pouvait durer huit ou dix jours; qu'elle serait douloureuse, qu'il y aurait privation de sommeil, besoin de mouvement; mais qu'elle n'avait aucun caractère inquiétant. Il engagea à prendre, comme purgatif, quand les boutons commenceraient à sécher, une quantité de sel de Sedlitz, dont il détermina la dose. — M. G... suivit rigoureusement ces prescriptions; mais les douleurs du zona étaient à peine terminées qu'il éprouva, le 5 ou 6 mai, dans le bas des reins, aux cuisses, aux jambes et aux bras, des démangeaisons intolérables, sans que des boutons ou des rougeurs se manifestassent à la peau. — Le besoin de gratter se faisant sentir, M. G... se servit, pour éviter les déchirures des ongles, d'une brosse à habits un peu rude. Il en résultait une espèce de soulagement; mais à la suite du brossage se montraient, sur certaines parties, des cloches, comme celles que produisent des morsures de puces; d'autres fois, de petites pustules qui rappelaient des piqûres d'orties; d'autres fois encore, de petits points rouges, comme quand on a la chair de poule. — Les douleurs du prurit étaient insupportables, surtout la nuit, qui se passait toujours sans sommeil. Pendant le jour, la distraction, le mouvement, la promenade éloignaient ou suspendaient la crise des démangeaisons, qui reparaissaient dans le repos. — Pensant qu'elles pouvaient être la suite ou la fin du zona, le malade avait continué l'usage des bains et

les cataplasmes ; mais le 11 mai, les démangeaisons furent si vives, si continues, si générales, qu'il se décida à consulter le docteur B... — Après avoir pris connaissance de l'affection et de ses phases, M. Bergeron ordonna des bains de sous-carbonate de soude et de gélatine, puis des lotions d'eau vinaigrée sur les parties où les démangeaisons se faisaient sentir. L'absence continue du sommeil lui fit aussi prescrire une potion calmante. — Ces moyens amenèrent le jour même de leur emploi un peu de calme et un sommeil de une heure ou deux, quoique lourd et interrompu. Ce soulagement ne fut toutefois que momentané; et malgré la continuation du même régime, les démangeaisons continuèrent aussi violentes que par le passé. — Le malade fit alors connaître à M. Bergeron qu'il était sujet tous les hivers, au moment où il se mettait au lit et où le froid des draps se faisait sentir, à un prurit analogue à celui qu'il éprouvait. Seulement il ne se montrait qu'aux cuisses et dans leur partie interne. Il ajouta, qu'après le frottement avec la brosse, ce prurit, dont la durée était variable, s'apaisait peu à peu, et que le sommeil finissait par revenir. Dès que la saison était plus douce, les démangeaisons qui s'étendaient quelquefois au delà de la région indiquée disparaissaient. — Il rappela aussi qu'un médecin, consulté l'année précédente, avait conseillé des bains sulfureux dont on n'avait pas encore fait usage, et M. G... demanda s'il pouvait en essayer. - Sans compter sur leur effet, M. Bergeron crut pouvoir les autoriser. Quatre furent pris dans l'espace de huit jours. Ils furent sans résultat. Impatient de souffrir aussi longtemps, M. G... parla d'un purgatif, comme dérivatif. Le docteur Bergeron, qui reconnaissait une affection nerveuse chez un malade, n'en espérait aucun succès. Toutefois, il prescrivit 15 grammes d'eau-de-vie allemande, mêlée à 10 grammes de sirop de nerprun dans un julep simple. — La médecine fut sans effet sensible. Reprise à même dose le lendemain, elle n'eut guère plus de résultats. L'affection cutanée continua de subsister. — L'état empirait. Le malade était toujours sans fièvre, il est vrai ; mais il maigrissait par suite de la diète à laquelle il s'était volontairement soumis, et s'affaiblissait par la privation continue de sommeil. Ce fut alors que, guidé par un sentiment de bienveillance, M. Bergeron engagea M. G... à se présenter, en son nom, chez son ancien maître, aujourd'hui son collègue, M. Devergie. — Après avoir pris connaissance des faits qui précèdent, M. Devergie reconnut, le 23 mai, à M. G... une affection nerveuse et un prurigo particulier. Il prescrivit, sur les parties du corps où les démangeaisons se faisaient sentir, des lotions d'eau froide, à l'aide d'une éponge largement mouillée, puis les bains de vapeur. Des aspersions d'eau tempérée devaient être faites au milieu de chaque bain. Il proscrivit l'usage de la brosse. — Deux ou trois jours de ce régime firent disparaître les grandes démangeaisons ; et chaque nuit le malade put goûter deux ou trois heures de sommeil, quelquefois davantage. Plus tard un bain froid fut pris tous les soirs avant de se mettre au lit. Aujourd'hui, 15 juin, il y a un mieux très sensible. — L'état n'est cependant pas normal. M. G... ressent encore, même pendant le jour, des piqûres peu

douloureuses sans doute, et d'autres fois, en marchant, une sensation ana-blable à celle de petits boutons froissés ou irrités par le frottement des vê-ments. Pendant la nuit, c'est un besoin de mouvement, un malaise indéfi-sable, accompagné ou suivi de démangeaisons locales, peu étendues, mais souvent très vives. Elles cèdent à des lotions d'eau froide, à une promenade par la chambre, et peut-être aussi à l'influence des bains de vapeur que le malade a toujours continués. — Quoique la position soit très supportable aujourd'hui, la guérison n'est pas encore complète, et c'est arrivé à ce point que M. G... s'est rendu de nouveau chez M. Devergie. Cet honorable docteur l'a engagé à se soumettre pendant un mois à un traitement hydropathique.

Ce traitement offrit cela de particulier, que tout emploi d'eau froide par irrigation ou par frottement sur la peau, telles que douches en jet, en arrosoir, en jets circulaires, en bain de siége irrigateur, développait après le bain une surexcitation nerveuse avec chaleur et cuisson à la peau, qui durait une demi-heure, et qui jetait M..... dans un état de malaise inexprimable. On dut s'en tenir aux sudations et aux immersions dans l'eau froide. La guérison fut ainsi obtenue. Mais tel était l'état du malade, que lorsqu'il vint me consulter, il exprimait des souffrances assez grandes pour que les personnes qui l'entouraient craignissent qu'il se suicidât.

Dans cette variété, la forme aiguë a donc été très distincte, et il nous a fallu nous adresser pour la guérir à un tout autre ordre de moyens. Il n'en est pas de même pour le prurigo général sans papules et chronique. C'est encore aux sulfureux qu'il faut avoir recours dans le traitement de cette maladie. Aussi les eaux thermales de cette nature conviennent-elles parfaitement, mais elles sont souvent insuffisantes; de là l'emploi des alcalins en pommade, en bains, de la pommade au précipité blanc, celui de l'huile de cade (voyez *Formulaire*), les bains de mer, etc., ceux à l'alun et même au sublimé. C'est assez dire, en présence de modificateurs si variés, combien de médecins échouent souvent.

Prurigo sans papules partiel. — On peut réunir dans la même description les variétés de *prurigo podicis*, *pudendi muliebris*, *scroti*, etc. En effet, c'est la même maladie localisée dans un endroit différent et n'amenant de la variété dans les symptômes qu'en raison même du siége qu'elle occupe. Et d'abord, rappelons comme un fait général que chacun de ces prurigos est plus difficile à guérir

rurigo général. C'est encore une circonstance qui vient con-
me assertion que j'ai émise dans mes notions de pathologie
e, à savoir que toute maladie de la peau limitée à un seul
u corps est toujours d'une curation plus difficile qu'une
disséminée à sa surface.

s diverses affections la plus commune est celle de l'anus,
podicis; elle affecte principalement les hommes. Celle qui
espond chez la femme est le prurigo du périnée, qui s'étend
peu aux grandes lèvres, mais dans leur partie postérieure
ent, ce qui le distingue du *prurigo pudendi muliebris*, qui
contraire en avant. Le prurigo *podicis* se montre à tous les
partir de l'adolescence et de la jeunesse; il est cependant
mmun dans l'âge adulte qu'à toute autre époque de la vie.
pourtour de l'anus qu'il naît d'abord; il s'étend peu au
ais il se prolonge en arrière le long du raphé qui gagne le
et en avant vers le périnée. Toutefois il n'atteint que lente-
s parties; il n'est pas rare de le voir se relier, comme la fis-
ale, sinon à la phthisie directement, au moins à des poi-
délicates; et alors cette circonstance doit appeler toute
on du médecin, car une guérison intempestive peut être
es plus graves accidents. J'ai donné des soins à un jeune
at qui était atteint de cette maladie depuis plusieurs an-
lle en était arrivée à ce point, qu'il ne pouvait plus siéger à
ice, obligé qu'il était de se déplacer continuellement de
t de gauche sur son siége. La santé générale était bonne,
ne peu forte. Cependant, j'eus beaucoup de peine à guérir
igo, et quoiqu'il n'y ait eu qu'une extinction graduée de
angeaison, il survint quelque temps après, çà et là, une
ration sanguinolente, plus tard deux hémoptysies; à une
plus avancée, l'hémoptysie et les accidents de la poitrine
rent pour faire place à des douleurs vésicales, accom-
bientôt d'un état catarrhal de la membrane muqueuse.
idie de vessie fut remplacée par une gastralgie, et ce n'est
le concours de soins empressés et soutenus que la santé
e fut complétement rétablie, sans retour du prurigo. Je
toujours demandé, à l'occasion de ce fait et de quelques

autres plus ou moins analogues, si la guérison, quoique graduée, quoique lente, d'un prurigo devenu insupportable d'ailleurs, n'avait pas été pour quelque chose dans le développement consécutif des accidents.

Je ne saurais trop appeler l'attention des médecins sur la liaison du prurigo du périnée ou de l'anus avec des poitrines tendant à l'hémoptysie. J'ai vu des jeunes gens à poitrine large parfaitement conformée, et ne présentant aucun indice de phthisie, chez lesquels s'observait cette coïncidence. Ainsi durant le traitement externe que j'emploie, et dont les douches forment l'un des agents les plus puissants, je n'hésite jamais à prescrire l'usage de l'huile de foie de morue associée au sirop sulfureux.

Dans cette maladie les démangeaisons sont excessives, et cependant on ne voit rien à la peau; mais lorsque la maladie est de date assez ancienne déjà, on peut, en examinant ce tissu d'un peu près, reconnaître que là où elle siége le plus fortement existent des parties de peau qui, malgré l'absence de toute inflammation, semblent transformées en une sorte de tissu doux au toucher et presque muqueux. Elles sont blanchâtres, lisses, onctueuses au toucher, et cet état de la peau fait contraste avec la peau saine qui reprend alors son aspect sec et ferme. Ceci est très important à connaître pour juger des progrès de la guérison; tant que la peau n'a pas acquis sa densité, sa sécheresse, elle n'est pas guérie. D'ailleurs çà et là quelques papules rares, et encore souvent il n'en existe pas. Les démangeaisons n'ont pas de moment, d'heure régulière où elles se montrent; cependant, c'est surtout pendant la nuit qu'elles sont plus fortes, et qu'elles causent alors une insomnie de plus ou moins de durée. Le malade fait taire momentanément ces symptômes par le grattage auquel succède une cuisson plus ou moins vive, qui n'est que momentanée, et qui fait place à une démangeaison nouvelle. Rien de plus pénible que cette maladie chez les jeunes filles quand elle siége au périnée. Quoique le périnée soit très court chez la femme, le prurigo y prend siége pour s'étendre ensuite à la partie postérieure des grandes lèvres. Un sentiment de pudeur bien naturel conduit ces jeunes personnes à cacher même à leurs proches cette affection; mais bientôt l'impossibilité de s'asseoir, parce que le

indre frottement, le moindre mouvement dans la situation assise eille leurs souffrances, les amènent à avouer leur maladie. Les lorations médicales deviennent bientôt nécessaires, et alors, en sence d'un état local qui paraît presque normal, le médecin est duit à rechercher si l'utérus ne serait pas malade, et si ce ne ait là qu'un reflet d'un état morbide des parties génitales internes. st ainsi conduit d'erreurs en erreurs ; il n'apporte aucun soulanent aux souffrances de la jeune personne, et bientôt le moral en affecté; surviennent la tristesse et le chagrin quelquefois le plus fond ; puis le séjour sur une chaise longue qui prive de tout rcice, de toute promenade, car la marche elle-même réveille les nangeaisons; puis se montre une altération générale de la santé, nécutive au chagrin et à des fonctions digestives qui s'opèrent l. C'est ainsi qu'une maladie d'apparence si légère peut être commettante pour les personnes qui en sont atteintes.

Mais cette même maladie siégeant au pubis, à la partie supérieure grandes lèvres et au voisinage du clitoris, devient pour la femme e nouvelle source de symptômes des plus pénibles. Le *prurigo lendi*, dont les démangeaisons sont agréables, éveille essentiellement les désirs vénériens avec d'autant plus de vivacité que la perne qui en est affectée est plus ou moins portée à les satisfaire. st alors chez certaines femmes une lutte sans cesse renaissante i leur fait fuir jusqu'à leur mari, dont les approches ne font que rter plus loin une première sensation, un premier désir ; lutte de s les moments, qui se réveille avec plus d'énergie durant le me et la solitude de la nuit, et que rien ne peut apaiser dans elques cas, voire même les applications les plus froides, la glace r exemple. Sorte de torture lente pour des religieuses, par mple, qui ne peuvent trouver de consolations à leurs maux que s leur foi profonde et leur amour pour Dieu.

La femme n'est pas seule vouée à de pareilles souffrances, le urigo peut atteindre les bourses et le périnée, et développer ez l'homme les mêmes sensations. Elles sont quelquefois assez res et assez insupportables pour inspirer une tristesse profonde i peut aller jusqu'au suicide.

Voici la narration que m'adressait un monsieur de Province

atteint de cette maladie, en me demandant un traitement. Elle peint parfaitement l'état dans lequel se trouvent ces sortes de malades.

Observation de M. V..., âgé de quarante-un ans. — Nature de l'affection. — Prurit aux bourses, principalement au périnée. Rougeur accompagnée de démangeaisons tantôt sur une partie du corps, tantôt sur l'autre. — Maladie de la peau avec légère sécrétion, mais sans démangeaisons, entre les doigts de pieds.

Antécédents. — A quinze ans, il a eu des boutons dans le dos, et il en a encore. — A dix-neuf ans, léger écoulement par suite d'un échauffement sans communication de mal vénérien : un traitement rafraîchissant, un régime lacté pendant quelques mois, ont suffi, avec quelques injections astringentes, pour l'arrêter complétement. — De vingt-cinq à trente ans, époque à laquelle l'affection s'est déclarée ou plutôt localisée : emploi sédentaire laborieux, défaut d'exercice. Maîtresse. Désirs lascifs. Inquiétudes. Trouble dans les voies digestives. Marié depuis dix ans, ayant un emploi actif et suivant un ordinaire régulier, son estomac fonctionne mieux, surtout pendant l'été ; mais il y a des choses qu'il ne digère pas.

Le mal se déclare. — A vingt-neuf ans, il ressent souvent des picotements partout, principalement dans les bras et parfois aux bourses. Des bains de rivière y ont mis fin du moins au périnée ; mais l'année suivante, pendant l'été, ces démangeaisons sont devenues plus cuisantes aux bourses, et malgré tout ce qui a été fait, elles n'ont jamais entièrement cessé, surtout la nuit. — Le médecin que j'ai consulté a commencé par me saigner deux fois et, depuis, je l'ai été au moins une fois par an, au printemps. Il m'a fait prendre des grands bains, des bains de siége presque froids et simples ou avec addition d'amidon ou de son ; il m'arrivait de ressentir la démangeaison dans le bain. Il m'a fait mettre des cataplasmes et fait faire des lotions avec de l'iode ou de l'eau-de-vie camphrée étendue d'eau, des frictions avec une pommade contenant un peu de précipité blanc, avec du suif liquéfié, avec la pommade antidartreuse de Dumont, de Cambrai, pour répercuter, disait-il ; mais tout cela ne m'a pas guéri ; ce qui était actif me faisait même du mal et il fallait revenir bien vite aux émollients. — Cependant, après un an de traitement suivi, un mieux s'est manifesté, et c'est pendant la durée de ce mieux que, de l'avis de ce médecin, je me suis marié en m'allianl à une honorable famille. J'ai eu une petite fille après cinq ans de mariage. — Ces démangeaisons aux bourses, principalement au raphé, sont revenues comme par le passé et cuisantes et fréquentes, et chaque fois qu'elles arrivaient, précédées d'une chaleur anormale, la peau blanchissait, c'est-à-dire séchait, se fendillait et j'éprouvais le besoin de frotter pour la faire partir, plusieurs fois par jour, plus souvent la nuit. S'il n'y a pas transpiration, il y a un fourmillement, un picotement qui appelle la compression, le grattage, et lorsqu'on a commencé,

démangeaison s'étend et *il faut frotter ou gratter partout* au risque de écorcher par places, lorsqu'on est à moitié endormi. J'ai dit bien des fois en e mettant au lit : voici mon martyre qui commence ; cependant, soit parce ue l'affection est à l'état chronique, soit par une autre cause que j'indiquerai ut à l'heure, les démangeaisons sont moins fréquentes et la peau ne se sèche s toujours. — Voyant que les moyens externes étaient sans effet, on m'a nseillé le Rob de Boyveau. J'en ai pris quatre litres qui m'ont fait du mal ; ais je dois dire que le sirop de salsepareille, le sirop de Larrey, les tisanes : salsepareille, de douce-amère, de chicorée sauvage m'ont soulagé. Inutile ajouter que je ne bois que de l'eau légèrement rougie. Je n'ai, d'ailleurs, mais fait d'excès en spiritueux. — Le docteur C....., de Vitry-le-François, ue j'ai eu occasion de consulter, m'a rendu un grand service, d'abord en connaissant le varicocèle qui nécessite un suspensoir et en me recommandant ne lotion préalable d'eau fraîche qui calme la démangeaison, puis une friction huile d'olive. Plus tard, j'ai remplacé l'huile par le cold-cream qui adoucit la au, lui donne de la souplesse, en sorte qu'elle ne s'écorche plus chaque fois u'il arrive une cuisson. — Heureux de ce soulagement et fatigué de suivre un aitement produisant peu d'effets, je m'en tiens donc, depuis plusieurs années, cette lotion d'eau fraîche matin et soir, je m'essuie sans frottement, je fais ne friction de cold-cream et je mets le suspensoir renfermant un linge qu'on eut renouveler. Je me fais saigner au printemps, lorsque la démangeaison qui arcourt le corps devient cuisante ou lorsque le prurigo revient à l'état aigu. Je ois des tisanes rafraîchissantes, je prends un grand bain et, de temps en temps, es bains de siége presque froids. Si j'en prenais trop souvent la peau se dessécherait. Je prends aussi des bains de rivière qui amènent une réaction ; mais uelque temps après je me sens mieux. Enfin, lorsque les démangeaisons ne ecalment pas la nuit avec une friction de cold-cream, je suis obligé de placer ur les parties et au périnée une serviette imbibée d'eau fraîche. Si je la ettais plus de deux ou trois nuits de suite, la peau se dessécherait plus vite. les bains de siége gélatineux m'ont fait du bien sans dessécher la peau. — l'est-il permis d'espérer une guérison complète ? M'est-il au moins permis l'espérer un plus grand soulagement ? Parviendrai-je même toujours à entretenir le prurit à l'état chronique ? Ce n'est, d'ailleurs, pas vivre que de ne pouvoir dormir une nuit sans être reveillé plusieurs fois ! Mais ce qui m'inquiète, c'est que la rougeur paraît vouloir s'étendre ou se multiplier ; c'est qu'au commencement je n'avais qu'un ou deux doigts de pieds affectés et maintenant j'en ai plusieurs ; cependant la pommade de Dumont, de Cambrai, réussit mieux aux pieds qu'aux bourses ; enfin c'est qu'il résulte du prurit et du frottement qu'il nécessite, un frissonnement, un chatouillement qui s'étend le long des jambes jusqu'à l'orteil et à la plante des pieds, et attaque le système nerveux. Souvent la nuit et quelquefois le jour, j'ai des irritations nerveuses.

Voici maintenant un exemple des conséquences affreuses du prurigo sans papules quoique limité.

[illegible] de cinquante-six ans, directeur d'un des grands établissements, [illegible] est toujours très bien porté. Il y a quatre ans, sans [illegible] atteint d'une démangeaison très vive, sans aucune [illegible] peau, siégeant en arrière des bourses et en avant de [illegible] la jarretière.

[illegible] plus en plus par ce prurit, dont les exacerbations lui [illegible] intolérable, M. X. s'est adressé successivement à un grand [illegible] les plus en renom à Paris, et a épuisé toute la liste des [illegible] adoucissants, soit irritants, indiqués par les formulaires. [illegible] en obtenir autre chose qu'un soulagement momentané. [illegible] on lui présente un formulaire, à peine trouve-t-il une pommade [illegible] dont il n'ait pas encore fait usage, et toujours avec le même insuccès.

[illegible] été en proie à des actes de désespoir qui lui ont inspiré tantôt [illegible] suicide, tantôt le désir d'une mutilation qu'il demandait à grands [illegible] enfin à tout entreprendre pour obtenir une guérison sans laquelle [illegible] paraissait insupportable, il voulut entrer comme pensionnaire à [illegible] Saint-Louis, afin d'y subir tous les traitements que les spécialistes [illegible] conseileraient : notre honorable collègue M. Hardy lui a donné ses soins. [illegible] quinze jours qu'il est entré ici, la pommade au chloroforme a seule [illegible] calmer pour un instant ses souffrances. On le trouve souvent en [illegible] en proie au plus affreux désespoir. La démangeaison a gagné une [illegible] bourses et le pourtour de l'anus, mais son siége est toujours au [illegible] *la moindre papule ne révèle l'existence de la maladie.* Quelques [illegible] nous, résultat de grattages immodérés, sont la seule altération [illegible]

[illegible] nombreux accès de prurit qui se succèdent sans qu'on puisse [illegible] la cause, M. X. paraît être sous le coup d'une atteinte d'aliéné[illegible] il pleure, gémit, s'irrite et invoque la mort comme l'unique [illegible] maux.

[illegible] M. X. se brûle la cervelle de désespoir, bien qu'il fût père de [illegible] les renseignements qui nous ont été donnés par l'interne [illegible] et que nous avons cru devoir rapprocher des faits qui [illegible]

« — Si à côté de ces tristes tableaux nous pouvions [illegible] thérapeutique méthodique et surtout efficace, nous au[illegible] la consolation de remédier rapidement à des maux [illegible], mais malheureusement il n'en est pas toujours [illegible] cependant à mettre entre les mains du médecin [illegible] ressource et propre à secourir de pareilles infortunes. [illegible] tels que bains sulfureux, pommades, sont le

commun de la trouver liée au *pityriasis versicolor* ou *nigra*, que pendant longtemps j'ai pensé que les auteurs en avaient à tort fait une maladie à part ; lorsqu'il y a deux ans j'ai observé un exemple d'achromie sans coloration de la peau autour de la décoloration. Ainsi, un seul cas en seize ans d'observation ! Mais cet exemple a été si net, si tranché, que nous ne pouvons plus révoquer en doute l'observation du passé. Toutefois cette circonstance nous conduisit nécessairement à modifier la description qui en a été donnée. Ce groupe comprend les variétés de *pityriasis*, l'achromie ou *vitiligo*, le *psoriasis*, le *lepra vulgaris* et l'*ichthyose*. Ces diverses maladies ont un premier rapport commun, c'est l'*hérédité*. Elles se transmettent fréquemment de génération en génération, et il n'est pas rare de voir cette disposition héréditaire assez marquée pour que l'affection passe sur une génération sans l'atteindre et affecte la suivante. Parmi ces affections, celle qui sous ce rapport présente ce cachet a un degré plus prononcé, c'est l'*ichthyose*. Il est rare qu'elle pardonne. Elle manifeste même sa présence au début de la vie, soit à la naissance, soit quelques semaines ou quelques mois après. Vient ensuite le *psoriasis*, puis le *lepra vulgaris*. Il est beaucoup plus rare d'observer l'hérédité dans les deux autres affections.

Nous avons dit que toutes ces maladies présentaient la forme *squameuse*, c'est-à-dire qu'elles ont pour cachet une sécrétion épidermique exagérée. Que faut-il entendre par cette sorte de sécrétion ? Il serait plus rationnel de dire qu'elles fournissent des productions épidermiques, sauf à distinguer entre elles ces productions.

A cet égard, on doit en reconnaître de plusieurs espèces : *farine*, *furfures*, *pellicules* et *squames*. Spécifions chacune de ces dénominations afin d'établir les moyens de les distinguer entre elles. On appelle *farine* une sorte de duvet épidermique souvent peu appréciable à l'œil nu, mais qui vient à se dessiner quand on frotte la peau malade avec une étoffe de laine de couleur foncée, le drap noir, par exemple. Le mot *furfure* exprime des lamelles épidermiques très petites, plus adhérentes et plus apparentes ; très sensibles, par exemple, quand on promène le doigt à la surface de la peau ; mais sans régularité, sans forme marquée. On nomme *squames* ou

es des agglomérations de lamelles épidermiques superposées, d'une manière irrégulière, d'un reflet plus ou moins argenté, les en épaisseur, ayant parfois un reflet assez poli pour figurer ur disposition des *écailles de poissons* ou présenter un aspect u moins éloigné de la *peau d'une anguille*. Je dis plus ou moins é, car les comparaisons que l'on a faites à cet égard man- : généralement de justesse. On appelle au contraire *lamelle* ou *le épidermique* ce qui n'est formé que par un seul feuillet lerme ayant alors de l'analogie avec une pelure d'oignon : ainsi, certaines périodes de maladies sécrétantes, la formation des les épidermiques succède à la sécrétion séreuse, impétigi- ou autre ; ces lamelles peuvent même se détacher dans une ue plus ou moins considérable ; elles ne constituent ni les fur- , ni les squames, de quelque dimension qu'ils soient ; les res sont toujours formés par la superposition de lamelles épi- iques très adhérentes entre elles, qui lui donnent une opacité uée. Cette superposition, plus considérable encore, constitue le cachet de la squame ; mais dans une squame, quelque ée qu'elle soit, il y a toujours huit ou dix lames épidermiques rposées et larges. Il en est qui acquièrent ainsi une grande seur ; c'est surtout ce que l'on observe dans l'*ichthyose nacrée atine* et dans quelques *psoriasis* anciens.

s maladies qui composent ce groupe ont encore un caractère mun fort remarquable : c'est qu'elles ne sont accompagnées cune sensation incommode à la peau, ou qu'au moins, s'il e quelque démangeaison, c'est dans une proportion si faible lle est à peine sensible. Il n'en est qu'une qui sécrète, encore e dans son état aigu, et cette sécrétion est plutôt une sorte de spiration cutanée qu'une sécrétion morbide.

u d'entre elles se relient à un état de santé générale ou locale l'on puisse combattre utilement, et, chose remarquable, elles se trent chez des individus forts, bien constitués, jouissant de eilleure santé et de la meilleure organisation ; souvent même t dans la force de l'âge que l'affection se manifeste sans cause nue. A part le *pityriasis versicolor*, toutes les autres maladies t dans ce cas.

Enfin, ces diverses affections réclament à peu près les mêmes moyens, et dans leur traitement les préparations arsenicales jouent généralement un grand rôle. L'ensemble de ces faits justifie donc suffisamment le rapprochement que nous avons établi entre elles.

PITYRIASIS, de πιτυρον, son; *dartre furfuracée volante, éphélides hépatiques.*

Alba.	*Fugax.*
Rubra.	*Persians.*
Versicolor.	*Diffusa.*
Nigra.	*Circumscripta*, taches hépatiques.
Pilaris.	

On désigne sous le nom de *pityriasis* une affection de la peau dont le produit épidermique morbide est tellement ténu, qu'on l'a comparé à du son; il est le plus souvent accompagné d'une légère démangeaison, et peut se montrer sur la peau avec ou sans changement dans la couleur de ce tissu; de là les quatre variétés que nous avons établies sous les dénominations de *pityriasis alba, rubra*, *versicolor* et *nigra*. Ces quatre espèces sont très nettement tranchées. Quant aux variétés *fugax*, *persians*, *diffusa*, *circumscripta*, des auteurs, ce sont des distinctions tout à fait insignifiantes.

Dans le *pityriasis alba* il faut distinguer deux variétés. Dans la première, la peau conserve sa couleur ordinaire, mais toute la surface affectée est *farineuse*, sans autre altération; c'est à peine si elle donne lieu à quelque démangeaison à sa naissance. On l'observe principalement à l'âge de dix-huit à vingt-quatre ans, sur les côtés du menton, sur les joues, sous forme d'une plaque régulièrement ou irrégulièrement arrondie; quelquefois aussi dans les cheveux ou à la barbe: c'est un état fugace, que quelques bains, un peu d'axonge ou de cold-cream font disparaître. Si dans cette forme il existe un cryptogame, il naît et disparaît sans aucun soin. Cette forme se montre au printemps et elle disparaît ordinairement dans l'espace de sept à huit jours. Toutefois, lorsqu'elle se manifeste dans les cheveux, elle a de la tendance à devenir chronique et à

causer un peu plus de démangeaison, en sorte qu'elle doit dans ce cas, quoique maladie légère, appeler l'attention du médecin.

La seconde variété de *pityriasis alba*, c'est celle qui est persistante. Elle constitue le pityriasis du cuir chevelu, des sourcils, de la barbe et des poils du pubis. Beaucoup plus commune à la tête et aux sourcils que partout ailleurs, elle a été décrite par les auteurs sous la dénomination de *pityriasis capitis*. S'il est vrai que sur cent cas on en observe quatre-vingt-dix à la tête, c'est une chose toujours mauvaise que de dénommer une affection quelconque par son siége, lorsque ce siége n'est pas exclusivement borné à la dénomination du point du corps qui lui a été donnée.

Le *pityriasis alba* est souvent *persistant* ou chronique; c'est une maladie très commune dans les deux sexes, et principalement chez la femme. Elle débute toujours par une exaltation de la sensibilité du cuir chevelu, qui se change bientôt en démangeaison. Celle-ci reste tenace pendant des mois entiers. En même temps, et au début du mal, apparaît une petite sécrétion d'épiderme qui se détache de la peau sous la forme de son ou de farine, parcourant ainsi la longueur des cheveux et tombant sur les vêtements, de sorte que le collet des habits des hommes qui en sont atteints se recouvre continuellement de cette poussière blanche. Les femmes, qui ont grand soin de leur chevelure et qui s'attachent surtout à faire disparaître tout ce qui peut en détruire le charme et la beauté, passent alors deux ou trois heures à leur toilette pour se faire enlever à l'aide du peigne et des brosses la secrétion de farines épidermiques qui ont pu se former pendant la nuit; elles se frottent et se grattent le cuir chevelu, et alors il arrive ceci: c'est que plus elles prennent soin de leur chevelure, plus elles apportent de ténacité dans l'emploi des peignes, des brosses dans l'enlèvement des pellicules, plus elles en accroissent la formation et en multiplient les effets. La maladie dure pendant un temps plus ou moins long, quelques mois ou même quelques années, sans porter atteinte aux cheveux; mais bientôt, et sous l'influence de ses progrès, ceux-ci commencent à tomber; alors on redouble de soins, on accroît l'usage du peigne, et chaque matin on enlève une masse de cheveux plus ou moins grande. Chose remarquable, c'est principalement dans les parties supé-

rieures de la tête que la maladie se montre en premier lieu, et c'est aussi dans ce point qu'il est ordinaire de voir survenir la chute précoce des cheveux. A cet égard, il est important d'établir une distinction. La chute des cheveux peut être naturelle, elle peut suivre une longue maladie où la tête a été tenue enveloppée et les cheveux non démêlés; elle peut surtout se montrer à la suite des couches, tout cela sans aucun phénomène appréciable à la peau, sans *pityriasis;* ce sont donc d'autres conditions morbides; comme aussi elle peut dépendre d'affections de la peau de la tête autres que le pityriasis (voy. MALADIES DU CUIR CHEVELU, ALOPÉCIE), de sorte que, dans le pityriasis, ce ne sont pas, je crois, les bulbes des poils qui sont malades, mais bien la peau, ou s'ils deviennent malades, ce n'est que secondairement. Je suis d'autant plus fondé à établir cette proposition, qu'ayant donné très fréquemment des soins propres à guérir cet état si commun, la chute des cheveux, j'ai vu survenir une maladie des follicules sébacés consécutivement à l'emploi de douches sulfureuses, par exemple, et un phénomène tout opposé à celui qui est propre au pityriasis se produire alors, c'est-à-dire la transsudation graisseuse. Il résulte en effet de mes observations que, dans le pityriasis chronique de la tête, *les cheveux sont toujours secs*, contrairement à ce qu'avance M. Rayer en vue de rapprocher le pityriasis de l'adulte de la teigne *amiantacée* d'Alibert, ce qu'il a fait avec raison; mais Alibert a lui-même confondu la teigne *amiantacée* avec l'eczéma chronique du cuir chevelu. Eh bien, si en présence de ces cheveux secs on détermine, par l'emploi de douches excitantes *prolongées*, une modification utile à la peau, en ce sens que le pityriasis disparaîtra et que la chute des cheveux s'arrêtera, on amène, en continuant les douches, une surexcitation des follicules sébacés qui donne alors lieu à une sécrétion huileuse abondante qui renouvelle à son tour la chute des cheveux. De secs qu'ils étaient, les cheveux deviennent donc très gras et trop gras. Deux maladies de la peau se sont donc succédé avec un siége différent et avec le même résultat final; dans le passage de l'une à l'autre, l'affection qui amenait la chute des cheveux s'est guérie; celle-ci a été arrêtée, puis elle a reparu, alors que des organes étrangers aux bulbes des poils ont été malades: d'où j'en conclus que, dans les

deux cas, les bulbes des poils ont été étrangers aux deux maladies, malgré la chute des cheveux ; mais que ces maladies exercent toutes deux une influence sur la nutrition du bulbe des poils et des cheveux, puisqu'elles amènent la chute de ceux-ci. Quoi qu'il en soit, l'affection, accidentellement développée par les douches, est un acné sébacé.

Ce qui se passe aux cheveux s'opère de la même manière aux sourcils et à la barbe; on les voit s'éclaircir peu à peu ; la croissance de ceux qui restent est suspendue, et enfin ils tombent tellement qu'ils menacent d'une chute complète.

Je dois faire remarquer qu'il est quelques pityriasis que l'on garde durant des années et même toute la vie, sans que pour cela il en résulte la chute des cheveux. Certes, ces personnes perdront leurs cheveux plus tôt peut-être qu'elles ne l'auraient fait, mais la maladie, dans ce cas, a une part assez faible dans la chute plus ou moins prématurée.

Ainsi la maladie, *pityriasis*, est primitive; elle peut exister pendant huit ou dix ans dans quelques cas, sans amener la chute des cheveux , j'en ai vu de nombreux exemples ; elle finit toujours par la produire. La peau seule est-elle malade? Je le crois. Le bulbe reste-t-il sain ? Je ne pourrais l'affirmer ; car si dans cette maladie il se forme un cryptogame comme dans le pityriasis versicolor, il serait fort possible qu'il attaquât les cheveux sans attaquer leurs bulbes, mais sa production ne serait toujours qu'accidentelle, puisque pendant un grand nombre d'années l'affection n'aurait exercé aucune influence sur la chute des cheveux.

Le *pityriasis* est souvent héréditaire, de même que la chute des cheveux sans maladie est aussi héréditaire. Il est très tenace, très difficile à guérir. Les personnes du monde ont l'habitude de se faire raser la tête plusieurs fois pour combattre les effets du pityriasis, elles ne font qu'accroître l'affection par l'irritation qu'amène l'action du rasoir. Il est d'ailleurs assez rare que la maladie s'arrête sans qu'elle soit enrayée dans sa marche par une médication appropriée.

Il existe une variété de *pityriasis alba capitis*, dans laquelle la production épidermique est très abondante, quoique les pellicules se détachent moins. C'est peut-être à cette circonstance qu'il faut attri-

buer l'aspect que prend alors la tête dont les cheveux tombent presque tous. Elle ressemble à une coiffe d'amiante; et comme cette maladie est assez commune chez l'enfant, dans la première année de la vie, Alibert a désigné cette variété sous le nom de *teigne amiantacée*. A cet égard, des erreurs ont probablement été commises, car Alibert signale dans cette maladie, improprement nommée *teigne*, par ce médecin, une sécrétion qui colle et agglutine les cheveux; or cette sécrétion ne saurait être rattachée qu'à un *eczéma chronique;* le pityriasis ne sécrète pas ordinairement, et si par hasard il donnait lieu à une sécrétion accidentelle, ce serait comme dans les affections squameuses, une transpiration aqueuse née d'un état suraigu (*pityriasis rubra*), qui, loin d'agglutiner les cheveux comme dans l'eczéma, se bornerait à les mouiller.

Dans l'eczéma qui affecte la tête des enfants, la sécrétion est, au contraire, assez visqueuse pour produire cet effet; et dans la période décroissante et chronique de cette affection, il se forme des lamelles épidermiques rompues, brisées, qui peuvent être prises pour celles du pityriasis. Cette forme, avec abondance d'écailles épidermiques, se montre encore à l'âge critique chez la femme, et à la même époque environ de la vie chez l'homme, mais elle est beaucoup plus commune chez l'enfant. Il n'est pas rare aussi de la voir affecter une partie seulement du cuir chevelu, le tout ou la moitié de la tête, tandis que la première forme de pityriasis, qui est la plus commune, atteint presque toujours la totalité de la tête. Enfin le favus ou teigne amiantacée offre dans beaucoup de cas de l'analogie avec cette variété de pityriasis, et l'analogie est dans quelques circonstances assez grande pour avoir besoin de s'aider du secours du microscope, afin de résoudre la question d'une manière certaine.

Il est peu d'affections que l'on puisse confondre avec le pityriasis, en dehors de la période décroissante de l'eczéma. Seulement, lorsque le pityriasis affecte les favoris ou la barbe, on peut le confondre avec certains herpès furfuracés qui siégent souvent dans cette région. Mais les plaques de pityriasis ne sont jamais limitées à leur circonférence par un bourrelet nettement arrêté, ce qui a toujours lieu pour l'herpès. La même considération de forme arrêtée, limitée, distingue toujours le *pityriasis capitis* de l'*herpès tonsurant* et du

decalvans, qui tous deux entraînent la chute des cheveux.
yriasis des cheveux peut aussi se rencontrer sur les parties
et des membres qui sont couvertes de poils; il s'y mani-
des plaques diffuses et sans forme régulière; la peau *farine*,
siége de démangeaisons peu intenses; la maladie n'offre
s la même ténacité, et au lieu de se développer sur des
ns, comme nous l'avons dit, quand elle siége à la figure,
ontre sur des personnes adultes de préférence, la peau con-
l'ailleurs la couleur qui lui est propre.

nent du pityriasis alba. — Ainsi que nous l'avons dit, les
de *pityriasis* qui se montrent de dix-huit à vingt-cinq ans
ure des jeunes gens doivent être traitées par quelques bains
un peu de saindoux ou de cold-cream, et un régime ali-
convenablement réglé; plus, quelques bains sulfureux à
l'éruption; le plus souvent, l'affection se termine seule et
les parents y portent leur attention.

est pas de même du *pityriasis alba perstans* ou chronique,
siége le plus communément à la tête et aux parties recou-
poils (*pityriasis capitis* des auteurs); il exige des soins sou-
n rapport avec l'état récent ou ancien de la maladie. Il
notre expérience que cette maladie est souvent indépen-
n état de la santé générale ou même d'une affection des
stives et biliaires, non pas qu'elle ne puisse s'y rattacher,
t beaucoup plus commun de rencontrer cette affection
onnes conditions de santé que de la voir se relier à un état
général ou local; d'où la conséquence qu'il faut s'adresser
la maladie en elle-même. Dans l'hypothèse d'une affection
ccompagnée d'un sentiment léger de chaleur à la peau,
teinte rosée de ce tissu, et des démangeaisons fréquentes,
e l'usage des bains de vapeur, qui font fonctionner la peau
l; ils y amènent une fluxion temporaire très propre à di-
fluxion locale. Mais ce ne sont pas des bains de vapeur
u'il faut mettre en usage, ce sont des bains russes, c'est-à-
e bain se composera du bain de vapeur proprement dit et
d'une pluie d'eau fraîche de deux minutes sur la *tête* et
ps, au milieu et en sortant du bain; d'une vergeture de

toute la peau au balai de bouleau, après la première douche en pluie, et d'une douche d'eau chaude sur les pieds, avant de se rendre au lit, pour y transpirer modérément : ces bains, pris tous les deux jours, amènent d'excellents résultats. En même temps, il faut faire saupoudrer matin et soir le cuir chevelu d'amidon en poudre en couche très légère, ou de poudre de riz ; et dans la journée, si la saison le permet, si la personne n'est pas sujette à s'enrhumer, faire faire cinq ou six lotions sur les parties qui démangent, en passant légèrement une éponge imbibée d'eau contenant par litre deux à trois cuillerées de vinaigre. Ces lotions calment les démangeaisons d'une manière marquée. C'est dans le même but que l'on emploie aussi avec grand avantage une pommade au chloroforme deux fois le jour (voy. *Formulaire*), ou au camphre, mais la première est plus calmante que la seconde. Dans le cas d'emploi de ces deux moyens à la fois, l'amidon ou la poudre de riz et l'une des pommades, on commence par saupoudrer la tête, puis on étend la pommade. Il semble que, dans ce mélange, la raison exclut l'un des deux moyens, et cependant bon nombre de malades nous en ont rendu un bon témoignage, que nous n'hésitons pas à le conseiller. Mais il est impossible de mettre en usage longtemps ces moyens sans que la pommade rancisse sur la peau, ou sans que la poudre employée fasse avec les productions épidermiques un *magma* incommode et fâcheux; aussi faut-il recommander les lotions savonneuses tous les cinq ou six jours (voy. *Formulaire*, LOTION SAVONNEUSE). On conçoit combien l'emploi de ces diverses moyens devient difficile avec une chevelure longue. Ici deux partis à prendre : ou consacrer un temps suffisant à ces soins, et avec l'aide d'ailleurs d'un domestique ; ou faire tomber les cheveux en les tenant coupés courts et non pas les faire raser. Chez l'homme, aucun inconvénient ; mais chez la femme, on comprend combien il est pénible de faire couper une longue et belle chevelure. A cet égard, il y a deux conseils à donner. Si les cheveux ne tombent que peu ou point par le fait de la maladie, il faut faire tous ses efforts pour les conserver; si, au contraire, leur chute est incessante, et si la personne n'a pas dépassé vingt-cinq ou vingt-huit ans, il ne faut pas hésiter à en conseiller la section complète. Avec une pratique opposée, on ne conservera que des cheveux mal

gres et chétifs. La section redonnera de la vie à ceux qui restent; elle permettra de guérir complétement, et alors pourra repousser une chevelure tout aussi belle et tout aussi longue. Une fois les cheveux coupés, convient-il de les remplacer par une perruque? Je n'hésite pas à répondre par la négative. Toutes les maladies des cheveux ont besoin d'air; il s'opère à la tête une transpiration permanente qui, réunie aux produits de sécrétion, devient irritante pour la peau, si on l'enferme surtout sous une perruque qui se graisse elle-même et qui présente les mêmes inconvénients; il faut, au contraire, faire porter des bonnets à claire-voie, et laisser aux dames le soin de parer aux inconvénients de la section des cheveux à l'aide de bandeaux.

Arrive la période décroissante, celle où toute inflammation de la peau a cessé, où la rougeur est tombée avec le sentiment de chaleur, où enfin les démangeaisons seules, mais moindres, persistent avec la formation des pellicules, soit que l'on ait amené cet état à l'aide des moyens précédents, soit que le temps l'ait produit, et que le médecin soit appelé dans la période chronique. Les bains de vapeur peuvent encore être utiles durant un certain temps pour cette seconde période. Il faut, de plus, entrer dans la voie des résolutifs, tels que la pommade au tannin camphré, à l'huile de cade au 30e, à l'oxyde de zinc camphré ou chloroformé (voy. *Formulaire*), insister sur les lotions alcalines; un peu plus tard, étendre tous les trois jours une très légère couche d'huile de cade dont on laisse le moins possible. En cas d'insuccès, on peut tenter les sulfureux ou les alcalins en pommade, et les douches sulfureuses en arrosoir faible sur la partie affectée; mais elles ne doivent être prises que tous les deux jours, pour ne pas trop exciter les follicules sébacés de la peau.

De toutes les médications internes, je n'en connais qu'une seule qui puisse être appropriée à cette maladie, ce sont les préparations arsenicales; elles sont même d'une telle efficacité que je n'hésite pas à en prescrire l'emploi, lorsque l'état de santé générale le permet. (Voyez, pour leur mode d'administration, *la médication antisquameuse*, *Pathologie générale*, p. 130). On voit que dans ce traitement nous ne nous préoccupons pas du tricophyton ou cryptogame; c'est que, quoi qu'en ait écrit M. Bazin, il n'y a pas à s'en préoccuper. (Voy. *Maladies parasitaires*.)

PITYRIASIS RUBRA.

Les dermatologistes ont presque passé sous silence cette ladie, quelques-uns même ne l'ont jamais connue; ils mette doute son existence, et cependant c'est la seule affection qui, le psoriasis aigu, puisse envahir à la fois toute la surface de la du corps de l'homme. Il n'y a d'ailleurs aucune analogie de f et de traitement entre les variétés de *pityriasis alba*, *versicolor*, et le *pityriasis rubra aigu*.

Cette maladie ne se montre guère que vers l'âge de quara quarante-cinq ans, c'est-à-dire vers l'âge critique et au delà ; on serve plus souvent chez la femme que chez l'homme.

Elle apparaît à la peau indistinctement sur une partie quelco du corps, mais principalement à la partie antérieure du tron la partie interne des membres. C'est par une rougeur à forme ér mateuse qu'elle se montre. Mais cette rougeur a cela de partic qu'elle est dès l'abord vive et foncée, uniformément colorc bords arrêtés, de manière à faire contraste sur ses bords av peau saine. Puis la rougeur s'étend et prend une couleur foncée, la peau s'épaissit, devient humide, et il se forme des s mes épidermiques qui se détachent au moindre frottement. I sensation de chaleur, de cuisson, de démangeaison même. I peu, et dans un espace de temps assez court, la rougeur s'éla le *suintement* augmente, les lames épidermiques deviennent de en plus larges et continuent de se détacher.

Si l'éruption cutanée est un peu forte, on voit en quelques j une large surface de la peau envahie, et il n'est pas rare que un espace de temps variable entre quinze jours et un mois tou

blable à de la sueur; cette exsudation est assez abondante pour que le malade change de chemise deux ou trois fois dans la nuit. Mais cette sorte de sueur, tout en empesant le linge, ne le colore pas très sensiblement en gris noirâtre, ainsi que le fait la sérosité de l'eczéma. Il se forme aussi quelques lames épidermiques très minces qui se détachent en assez grande abondance durant la nuit. Plus tard et lorsque la sudation a diminué, lorsqu'elle a été remplacée par des lamelles épidermiques, il n'est pas rare de voir des malades qui, le matin, ramassent dans leurs draps de quoi remplir de ces squames un, deux et même trois litres. Et cependant quelques-uns de ces malades ont encore transpiré pendant la nuit; mais il faut que toute la peau soit entreprise et que l'affection dure depuis un mois ou six semaines.

On comprend tout de suite qu'une maladie dans laquelle on trouve la peau enflammée, sécrétante, avec chaleur et démangeaisons, puisse être confondue avec l'eczéma. Voici quelles en sont les différences. Dans l'eczéma, la peau est rouge, mais d'un rouge plus vif, et cette rougeur, quelque intense qu'elle soit, *se perd insensiblement* avec la peau saine; dans le pityriasis, cette rougeur est nettement tranchée d'avec la couleur naturelle de la peau. La rougeur peut envahir la *totalité de la peau* dans le *pityriasis rubra;* jamais dans l'eczéma général la totalité de la peau n'est affectée, il reste toujours des portions de peau saine. Dans l'eczéma, la peau n'est pas sensiblement épaissie; elle l'est toujours dans le *pityriasis rubra;* le tissu cellulaire sous-cutané est un peu tuméfié. La démangeaison est beaucoup moins vive dans cette dernière affection, mais elle est remplacée par une chaleur brûlante et très sensible à la main. La sécrétion n'est pas non plus la même: tandis que l'eczéma fournit une sérosité qui tache le linge en gris roussâtre et l'empèse, le *pityriasis rubra* donne une sorte de sueur qui empèse le linge, mais qui ne le *salit pas très sensiblement*. Dans l'eczéma à sa dernière période, il se forme des écailles épidermiques, mais seulement à sa période décroissante. Dans le *pityriasis rubra aigu*, ces écailles se produisent même dans les premiers jours de la maladie; elles ne sont pas adhérentes, on les enlève comme on veut; elles se détachent par les mouvements des malades dans le lit, tandis que dans

cette troisième période de l'eczéma elles adhèrent dans les dix-neuf vingtièmes de leur surface et paraissent à peine détachées à leur circonférence : on ne saurait d'ailleurs les enlever sans causer de la douleur aux malades. Enfin la peau n'est pas ponctuée, piquée de points rouges et sécrétants dans le *pityriasis rubra aigu*, ce qui s'observe dans l'eczéma aigu.

Ces caractères, explorés avec soin, établiront des différences notables entre ces deux maladies dont le diagnostic exige quelque soin. Quelques médecins se sont demandé et ont même émis la pensée dans leurs publications que nous aurions fait une maladie nouvelle d'un état morbide qui n'était autre que le pemphigus chronique général dans sa période décroissante. Le *pityriasis rubra* est, il est vrai, assez rare, mais il existe entre les deux maladies des différences tellement tranchées, qu'il est impossible de les confondre; la ressemblance serait encore bien plus grande entre le pityriasis rubra et le psoriasis aigu, mais ce dernier ne sécrète jamais. Voici au surplus les caractères qui différencient le pemphigus chronique du pityriasis rubra. Il est bien vrai que le pemphigus chronique, à une certaine période, ne donne plus de bulles, qu'il ne fournit plus que des lames épidermiques; mais celles-ci sont adhérentes ou ne se détachent que lentement; c'est d'ailleurs un épiderme sale, humide, odorant; le malade est dans un état d'épuisement extrême, il est amaigri, la peau est terne et terreuse. Dans le pityriasis rubra, c'est un malade plein de vie, à peau rouge d'écrevisse, tuméfiée, sans odeur; en sorte qu'il suffit de voir une fois ces deux maladies pour trouver en elles le contraste le plus complet.

Cette affection est aussi tenace et quelquefois plus difficile à guérir que l'eczéma; quand elle a fait de grands progrès, quand elle a envahi la plus grande surface du corps, elle sécrète et donne des lames épidermiques pendant des mois entiers : il en résulte que la formation de cette production morbide finit par affaiblir les forces du malade, l'amaigrit, en même temps que la ténacité de l'affection porte atteinte à son moral et à ses forces digestives. Il est aussi très commun de voir se montrer de la diarrhée qui vient concourir au même résultat. C'est surtout chez les personnes âgées que cet épuisement se fait sentir. Il est rare chez les adultes.

Et puis, quand la maladie diminue, quand la guérison paraît prochaine, il est fréquent de la voir récidiver avec plus ou moins d'intensité. Il y a plus, il est rare qu'elle se termine sans récidiver durant le cours de son traitement.

La période décroissante est toujours annoncée par la diminution de la sécrétion et de la chaleur : l'une et l'autre cessent, mais la production épidermique continue. Aussi existe-t-il deux périodes distinctes dans cette affection : celle de l'acuité, celle de décroissance. Dans la période d'acuité le malade brûle dans son lit, il ne peut supporter qu'un drap, même en hiver; aussi reste-t-il avec beaucoup d'avantage pendant deux ou trois heures dans le bain sans en être affecté.

Si le pronostic du *pityriasis rubra* n'est pas en général grave, il peut l'être chez les personnes *débilitées et âgées;* mais il est fâcheux en raison de la persistance de l'affection d'une part, de l'autre en raison de l'une de ses complications. Sous le premier rapport on peut dire que lorsque l'on ne saisit pas le moment où l'affection entre en voie de résolution, pour favoriser cette période par des moyens appropriés, on risque fort de la voir passer à l'état chronique; et ce ne sont plus alors des mois pendant lesquels elle persiste, ce sont des années, durant lesquelles les malades sont dans des alternatives de mieux et de mal, heureux quand l'appétit se soutient, quand la nutrition s'opère; quand ils ne sont pas très impressionnés par la saison froide; qu'il ne s'établit pas de répercussion, qu'il ne se montre pas de diarrhée; car alors celle-ci est difficile à arrêter, l'amaigrissement survient, le moral perd de sa vigueur, le malade se débilite peu à peu, s'affaisse et finit par succomber.

En fait de complication, il en est une des plus graves, c'est le cas où le *pityriasis rubra* se transforme en *pemphigus*. On en trouvera deux exemples à la fin de cet article. Les cas n'en sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. C'est surtout sous des influences morales pénibles que cette complication survient, et alors elle entraîne toutes les fâcheuses conséquences du pemphigus. On voit alors la maladie prendre un tout autre aspect. Ce n'est ni le *pityriasis rubra* proprement dit, ni le pemphigus; on ne s'aperçoit pas des larges

bulles qui peuvent se développer; la sécrétion qui s'établit n'est plus franchement séreuse comme dans le pemphigus : c'est une sécrétion muqueuse, filante, d'une odeur fade, nauséabonde, qui se transforme en larges écailles beaucoup plus épaisses que celles du pityriasis, et forme des espèces de croûtes squameuses qui se détachent dans de larges surfaces et mettent à nu le corps muqueux d'un rouge foncé, lubrifié de mucosités. En même temps le malade devient très impressionnable au moindre froid, et suivant que la sécrétion est plus ou moins abondante, il en résulte un amaigrissement proportionné. On comprend dès lors quelle gravité vient s'ajouter à l'état préexistant; les jours du malade sont souvent mis en danger, et quoi qu'il arrive, la maladie a toujours une longue durée. Ce sont ces complications qui ont pu faire douter de l'existence indépendante de la maladie.

Quant au traitement, les bains prolongés et répétés tous les jours, durant la période aiguë du *pityriasis rubra;* l'usage du saindoux appliqué plusieurs fois par jour sur la peau, car il ne faut guère songer à des cataplasmes, à moins que les surfaces affectées ne soient suffisamment limitées; l'amidon en poudre, les tisanes rafraîchissantes, tels sont, avec les bains de vapeur dans quelques cas, les seuls moyens à employer jusqu'à ce que la période aiguë soit tombée.

A cette époque, on peut, si les forces du malade le permettent, employer à l'intérieur les préparations arsenicales. Je ne connais que cette médication capable de vaincre l'affection; mais dans beaucoup de circonstances on en est réduit à soutenir, au contraire, les forces des malades et à employer des moyens externes.

C'est avec l'huile de cade ou le goudron que l'on peut composer des pommades utiles (voy. *Formulaire*, POMMADES, n° 1 de ces deux substances). Il faut y joindre les bains alunés d'abord; puis, lorsque l'irritation est fortement tombée, que la maladie est à son déclin, prescrire les bains de sublimé à 4 grammes d'abord, et en augmentant tous les trois bains de 2 grammes, de manière à arriver à 8 grammes. Il n'y a pas lieu de craindre des accidents mercuriels : la peau enflammée n'absorbe que peu ou point. Enfin, on se trouve bien de l'usage de l'huile de cade, promenée tous les

deux ou trois jours sur les surfaces malades, à la condition de n'y laisser que l'huile qui, après le frottement avec du coton sec, peut rester adhérente. Voici les deux exemples de pityriasis pemphigoïde dont je parlais tout à l'heure. Mais ce n'est là qu'une complication de la maladie.

La nommée H..., âgée de soixante et un ans, est entrée dans notre service le 3 février 1853. Elle avait depuis trois ans un ulcère de peu d'étendue à la jambe, 15 millimètres environ, mais suppurant constamment. Il y a deux mois et demi, cet ulcère a cessé brusquement de fournir du pus. Quelques jours après, en même temps qu'un malaise général, il s'est manifesté des rougeurs à la peau sur diverses parties du corps, avec chaleur, démangeaison, sécrétion et formation d'écailles squameuses. Elle prit peu de soin de son état, qui fit des progrès constants, et à son entrée à l'hôpital on voyait toute la peau avoisinant les parties génitales, le dedans des cuisses, la majeure partie de la surface du ventre, l'intervalle des seins, quelques portions du cou, le pourtour de l'ulcère de la jambe droite, le pourtour d'un vésicatoire qu'elle avait mis au bras gauche, tout cela atteint de rougeurs foncées à limites très tranchées, recouvertes de larges écailles moitié libres, moitié adhérentes. C'était un *pityriasis rubra* assez étendu sans être général. Le vésicatoire qui avait été prescrit à la malade était devenu, comme l'ulcère, un centre de fluxion autour duquel le pityriasis avait pris siége. Des pommades avaient d'ailleurs été employées, mais elles avaient exaspéré le mal. — En cet état, nous prescrivîmes une tisane amère, quelques ferrugineux, de l'amidon en poudre sur les surfaces malades. — Vers le quatrième jour de l'entrée, la malade est prise de diarrhée, puis de fièvre à forme intermittente, mais sans stades bien nets et bien tranchés. Cependant le sulfate de quinine arrête la périodicité, mais n'arrête pas complétement la fièvre, ainsi que l'état général de fatigue, de courbature, l'anorexie, etc. Il se développe alors deux érysipèles : l'un dans presque toute l'étendue de la jambe ulcérée, il est léger, se guérit promptement ; l'autre à l'avant-bras gauche et au bras, dans le voisinage du vésicatoire. Cet érysipèle est avec larges phlyctènes ; on le saupoudre d'amidon, il se guérit ainsi que l'autre, mais en même temps toute sa surface prend les caractères du *pityriasis rubra*. — Durant cet espace de temps de dix à douze jours, pendant lequel un état fébrile s'est montré, le *pityriasis rubra* que portait la malade à son entrée a changé de nature. Toutes les surfaces affectées se sont étendues en même temps qu'elles ont sécrété un fluide visqueux d'une odeur fade et nauséabonde ; de sorte qu'au lieu de squames, ce sont des croûtes squameuses qui se détachent dans une large surface, ce qui laisse à nu le corps muqueux suintant, et donne çà et là, tantôt dans un point, tantôt dans un autre, naissance à des sécrétions nouvelles sous forme bulleuse, mais dont les bulles, qui se rompent aussitôt, ont pour enveloppe

les squames préexistantes. Peu à peu l'état général s'est amendé, mais cette femme est vouée par le fait de cette complication à une maladie, et plus longue, et plus grave, dont l'observation suivante présente le tableau.

Au numéro 12 de la salle Saint-Louis est couché le nommé M..., âgé de cinquante-deux ans ; il est entré à l'hôpital le 17 juin 1852. Peu intelligent, il rend mal compte de ses antécédents. Sa maladie remonte à *cinq ans* ; il a été fort longtemps traité à l'hôpital de Reims par des bains et des pommades, mais sans succès. Arrivé à Saint-Louis, il portait un *pityriasis rubra* qui occupait la presque totalité du membre supérieur et inférieur, la plus grande partie du tronc et la figure. Amaigri d'ailleurs par cette affection de longue durée, par un séjour prolongé dans un hôpital ; offrant dans son ensemble peu de force, peu de résistance, je me bornai à un traitement fortifiant, ayant pour base les ferrugineux et le quinquina. Son corps fut saupoudré d'amidon ; il ne prit que peu de bains, car il était très impressionnable au froid. Durant les deux premiers mois, il fut pris à deux ou trois reprises de diarrhée. Vers la fin du troisième mois un état fébrile général se montra durant lequel son affection, qui ne suintait plus et ne donnait plus que quelques squames rares, prit brusquement un accroissement rapide, et donna lieu aux phénomènes du pemphigus avec cette odeur nauséabonde et cette sécrétion muqueuse qui caractérisent cette affection. Depuis cette époque, le malade a eu des intervalles de mieux et de mal, et aujourd'hui, 1er mars 1853, il est encore recouvert de ces squames croûteuses, mélange de pityriasis et de pemphigus, sans que d'ailleurs la maladie se soit étendue. Elle s'est même guérie dans une partie de sa surface.

Voilà donc, dans ces deux cas, une complication qui ne constitue pas à mes yeux une forme composée primitive comme la généralité des formes composées que j'ai décrites. Mais c'est là une des complications du *pityriasis rubra* dont les auteurs qui m'ont précédé n'ont pas parlé et que j'ai tenu à faire connaître ; elle exige d'ailleurs le même traitement.

Pityriasis versicolor. — Cette maladie, très commune d'ailleurs, a des caractères nettement tranchés ; elle se présente sous la forme de plaques arrondies irrégulières, d'un jaune verdâtre, ou sous celle de plaques limitées et régulières ; de là des divisions en *pityriasis versicolor diffusa* et *circumscripta*. Le premier n'a pas reçu d'autres noms ; le second constitue ce que l'on appelle des *taches hépatiques*, à cause de leur liaison assez fréquente avec des maladies de l'appareil gastro-intestinal et des organes biliaires. Le cachet

du *pityriasis versicolor*, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, est tout spécial : la peau s'est colorée en jaune plus ou moins verdâtre, sans aucune sensation le plus souvent; quelquefois avec de légères démangeaisons, et formation de petites pellicules adhérentes à leur surface qui constituent une sorte d'état farineux. Ainsi, dans la généralité des cas, le seul phénomène observé, c'est le changement de couleur de la peau, conservant d'ailleurs sa souplesse, sa finesse, sa douceur au toucher. *Diffus*, il peut occuper une surface souvent très étendue, comme la moitié ou la totalité du dos ou de la poitrine ; *circonscrit*, il constitue des taches couleur café au lait sont discrètes, rares et espacées sur les côtés du cou, sur le devant de la poitrine ou sur le ventre; mais la figure peut aussi être le siége de *pityriasis*, et notamment le front, chez les personnes à peau brune; de là, pour les femmes, une maladie difforme qui les impressionne vivement.

Le *pityriasis* s'observe dans deux conditions opposées de peau : sur des peaux brunes chargées en couleur, et alors d'une certaine épaisseur et surtout d'une certaine densité; et sur des peaux blanches, mais lymphatiques : aussi le *pityriasis circonscrit*, ou taches hépatiques, est-il assez commun chez les phthisiques. Les diverses circonstances précédentes tendent à établir, médicalement parlant, une distinction importante dans les deux variétés de *pityriasis*. La première, le *pityriasis diffusa*, ou amorphe, étant le plus souvent idiopathique ; la seconde, le *pityriasis circumscripta*, ou taches hépatiques, constituant une affection presque toujours symptomatique. C'est à ce point de vue surtout que nous envisageons la thérapeutique de ces variétés.

Le *pityriasis versicolor diffusa* apparaît à la peau sans aucun symptôme précurseur ; il se montre peu à peu, graduellement, gagnant en surface et en étendue dans un espace de temps souvent très long; mais dans quelques cas son développement est plus rapide; la tendance à la forme chronique est pourtant un cachet de cette affection. Laissant de côté tout ce qui regarde l'étendue d'ailleurs très variable de cette maladie, il peut s'observer seul ou compliqué d'achromie. Dans cette dernière forme, on voit une ou plusieurs taches blanches contrastant par leur pâleur avec la couleur verdâtre de la peau, et, chose

particulière, cette tache blanche nettement circonscrite et arrondie, se trouve entourée d'une coloration plus foncée du *pityriasis* qui va en s'atténuant de plus en plus au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la partie affectée d'achromie. Il semble donc que la peau décolorée ait perdu sa matière colorante, qui s'est reportée à la circonférence de la décoloration pour rendre celle-ci plus intense, et je serais d'autant plus porté à le croire, que, d'une part, ce fait est le plus général; qu'en second lieu, durant le traitement, la matière colorante foncée de la circonférence s'affaiblit de plus en plus, tout en gagnant la partie décolorée; enfin, nous ajouterons que nous n'avons observé qu'un seul cas d'achromie sans liaison avec le *pityriasis versicolor*. Je sais bien que cette explication est peu en rapport avec les idées anatomiques du jour sur la peau; mais celles-ci ne sont pas tellement positives, qu'on ne puisse émettre une opinion qui leur soit opposée. Quoi qu'il en soit, cette variété est à forme très tenace, très rebelle, sujette à récidive, tandis que le *pityriasis diffusa* simple est d'une guérison en général facile. Il est une variété de *pityriasis diffusa* aussi très tenace : c'est celle qui affecte le front. Elle est assez commune chez la femme; elle atteint les deux côtés du front plus encore que les tempes ; elle se montre par de petites taches irrégulières qui se multiplient et se confondent entre elles, laissant le milieu du front avec sa couleur à peu près naturelle, en sorte qu'il en résulte un très vilain aspect. Ces taches, sous l'influence des émotions, de la colère, du chagrin, tendent à prendre de l'accroissement et surtout à devenir de plus en plus foncées, au point de se transformer en *pityriasis nigra*, qui n'est lui-même qu'un état plus avancé du *pityriasis versicolor*.

Quant au *pityriasis circumscripta*, ou taches hépatiques, il est toujours beaucoup plus discret. Il se montre par des taches de la largeur d'un franc ou de deux francs, occupant les régions antérieures du tronc, et d'un jaune café au lait assez marqué. Cet état de la peau coïncide le plus souvent avec des gastralgies, et si on les rencontre chez les phthisiques, c'est généralement à une époque où déjà les fonctions digestives et biliaires sont dérangées. Il est aussi très fréquent de les observer chez les femmes enceintes, où elles portent le nom de *maculæ gravidarum*, ou à la suite d'aménorrhée.

Ces taches sont toujours discrètes, espacées les unes des autres, mais persistantes comme la cause qui les a fait naître.

On a reconnu l'existence d'un cryptogame dans cette maladie. Nous l'avons cherché plusieurs fois sans le rencontrer : c'est le *microsporon furfur* de M. Ch. Robin; ou *fungus seu epiphytus pityriasis versicoloris* de M. Th. Sluyter. Nous en donnerons la description dans le groupe des maladies à parasites végétaux ; mais nous n'avons pas cru devoir séparer l'histoire du pityriasis de celle des autres maladies squameuses, à cause de l'assimilation qui existe entre ces maladies. Au moment où nous écrivons, quelques personnes mettent en doute l'existence de ce champignon.

Ces deux formes de maladies de la peau peuvent persister sans porter par elles-mêmes la moindre atteinte à la santé. Elles se guérissent quelquefois spontanément; c'est le cas où, nées dans une saison donnée, elles disparaissent dans une autre ; mais alors il est très commun de les voir reparaître l'année suivante dans la saison où elles avaient paru primitivement.

Il est impossible de confondre cette maladie avec aucune autre, et après la description que nous en avons donnée, nous pensons qu'il est inutile d'insister sur ce point.

Traitement. — L'étiologie que nous avons établie des deux principales variétés de pityriasis nous dirige naturellement dans le traitement qu'elles réclament. Le *pityriasis diffusa* n'est pas, avons-nous dit, symptomatique, et en effet nous l'avons presque toujours vu coïncider, sauf quelques exceptions, avec l'état parfait de la santé ; aussi est-il très facilement guéri par une médication locale. Ce sont les sulfureux qui en font justice : on peut et l'on doit les employer sous toutes les formes. A l'intérieur, quelques tablettes soufrées, cinq ou six, ou une cuillerée à bouche matin et soir de sirop sulfureux (voy. *Formulaire*), à moins que le sujet ne soit d'un tempérament bilieux très dessiné, car alors le soufre serait trop excitant ; il faudrait le remplacer par les alcalins en boissons; à l'extérieur, les bains sulfureux et une pommade à la fleur de soufre ; quelques bains gélatineux précédant ces moyens quand le pityriasis est récent : et l'on guérit généralement cette maladie. Non pas que je prétende que l'on puisse tout guérir : il est des malades qui ne songent

à s'en débarrasser qu'après huit ou dix ans de son existence. Alo il faut faire subir une ou plusieurs fois ce même traitement ou mêm s'adresser à la solution de Fowler pour obtenir une guérison com plète ; ajoutons que dans certains cas de pityriasis très ancien on peu échouer. C'est aussi dans le pityriasis que les eaux minérales sulfu reuses des Pyrénées peuvent être préconisées avec grand succ C'est à l'aide de douches sulfureuses que l'on peut attaquer av avantage le pityriasis du front ; on y joint les pommades, comm pour celui du corps. Inutile d'ajouter qu'il n'y a pas à se préoccup du cryptogame.

Achromie et pityriasis nigra.

Tout en déclarant que l'achromie ou absence de coloration de peau puisse exister, bien rarement, il est vrai, d'une manière isolé puisqu'en seize ans j'en ai vu un seul cas, il m'est impossible de ne p faire l'histoire de cette affection en même temps que celle du *pity riasis nigra*, forme morbide décrite pour la première fois par Will qui en a constaté la présence sur des enfants nés dans les Ind L'achromie n'est caractérisée que par un fait, la décoloration de peau constituant une ou plusieurs surfaces nettement limité ovoïdes ou rondes, ou occupant la surface palmaire d'un doigt, d'u orteil, ou la moitié inférieure de la circonférence de la verge. P de chaleur, de rougeur, de démangeaison, de furfures ; la peau se a changé de couleur en conservant toutes ses qualités. Alibert, c observateur si remarquable, ce peintre si habile à reproduire tableau des maladies, nous a laissé une observation bien remar quable de *pityriasis nigra* qui vient tout à fait justifier notre m nière de voir ; il est tracé dans son petit ouvrage en deux volum « Le nommé Honoré Grandery, commissionnaire, âgé de soixan six ans, est entré à l'hôpital Saint-Louis et nous a présenté le tabl d'une maladie aussi rare que surprenante. Ce fut au sein de la m sère et de la détresse que cette maladie prit naissance. L'indivi dont il s'agit, doué d'un tempérament lymphatique, habitait Ar avant la révolution. C'est dans cette ville qu'il fut employé à d travaux pénibles durant le régime de la *terreur*. Depuis cette époq il a langui dans les rues et les carrefours, demandant l'aumône

faisant des commissions, et manquant quelquefois des choses les plus nécessaires à la vie. Dans le mois de juillet 1856, il éprouva des démangeaisons très incommodes dans toutes les parties du corps. A ces démangeaisons succédèrent des taches d'abord grisâtres, puis d'un brun-café ; elles s'élargirent au point d'occuper une étendue considérable. Toute la surface cutanée était marquée de ces taches ; dans certains endroits elles étaient très larges ; dans d'autres endroits elles étaient d'une petite circonférence. Il est à considérer, que dans les parties saines, la peau était d'un *blanc d'albâtre* analogue à *celui de la peau des cadavres ;* ce contraste était surprenant ; le malade paraissait chamarré comme un zèbre ou comme certaines vaches des campagnes de la Bretagne ; cet homme éprouvait des démangeaisons considérables sur divers parties du corps. Sa peau offrait aussi des écailles furfuracées qui provenaient des frottements réitérés qu'il exerçait sur la peau pour apaiser le prurit dont il était dévoré. La face du malade était d'un jaune plombé. Il chancelait en marchant, tant sa faiblesse était extrême. » Alibert décrit cet état sous le nom d'*éphélides scorbutiques.* Il est probable que cet homme avait deux choses, un *prurigo* et un *pityriasis nigra* réunis, comme cela arrive presque toujours, à de l'*achromie.*

Mais l'achromie n'est pas seulement liée avec le *pityriasis nigra :* elle peut s'observer très souvent, comme je l'ai dit, avec le *pityriasis versicolor*, et c'est ce que l'on voit quand elle se montre à l'état de taches disséminées. Elle accompagne au contraire toujours le *pityriasis nigra*, lorsqu'elle occupe la face palmaire d'un doigt ou la verge. C'est là une disposition fort remarquable, et qui n'a pas été décrite par les auteurs. On trouvera chez un malade toute la moitié supérieure d'un doigt d'un brun noirâtre, et la moitié inférieure d'un blanc mat. Cette disposition est fort régulièrement dessinée. Le contraste dans la couleur suit une ligne longitudinale très régulière, qui partage le doigt en deux parties parfaitement égales dans son épaisseur. Il en est de même pour la verge, qui de sa base à sa pointe est d'un brun noirâtre supérieurement, et d'un blanc mat inférieurement. D'ailleurs, aucune sensation dans cette double maladie ; ce qui me fait dire que le malade d'Alibert avait de plus un *prurigo.* Cette sorte d'achromie est presque toujours *congénitale ;* on lui a

donné un nom spécial, celui de *vitiligo*, nous l'acceptons à la condition qu'il s'agit d'état congénital incurable (voir au surplus la description du *vitiligo*). Mais, ainsi que je l'ai dit, l'achromie peut exister seule à l'état de décoloration de la peau et sans *pityriasis versicolor* ou *nigra*. Pour ce qui est du *pityriasis nigra* lui-même, il ne consiste que dans une coloration plus foncée de la peau qui se rapproche de la teinte brune; c'est donc un degré plus avancé du *pityriasis versicolor*.

Quant au traitement, il est le même que celui du *pityriasis versicolor*, mais la maladie cède bien plus difficilement, et quelquefois ne guérit jamais; l'achromie de naissance est incurable; celle qui naît accidentellement est difficilement curable.

PITYRIASIS PILARIS.

La maladie que je vais décrire, et que j'ai observée pour la première fois à la fin de l'année 1854, n'a pas encore frappé l'attention des dermatologistes.

Il s'agit d'une forme squameuse nouvelle à ajouter à celles déjà connues. Je la désigne sous le nom de *pityriasis pilaris*, quoiqu'elle tienne aussi bien des caractères propres au psoriasis; mais comme elle a été constamment précédée de pityriasis, que d'ailleurs ses squames sont très petites et qu'elles se détachent aussi facilement, j'ai cru devoir pencher vers ce nom plutôt que vers celui de *psoriasis pilaris*.

L'observation de cette affection, fort curieuse d'ailleurs, m'a conduit à émettre des doutes sur une forme de psoriasis palmaire qui me paraît plutôt devoir appartenir au pityriasis qu'au psoriasis, ainsi que je le dirai en traitant des variétés de psoriasis palmaire. Afin de fixer à cet égard l'attention des médecins, je crois devoir rapporter d'une manière sommaire ce qui caractérise le *pityriasis* et le *psoriasis* de manière à en faire ressortir les différences qui peuvent servir à les distinguer et à justifier le choix de la dénomination à laquelle je me suis arrêté.

Tout psoriasis entraîne avec lui l'idée d'un épaississement de la peau avec état inflammatoire aigu ou chronique, à la surface du-

quel existent des plaques épidermiques épaisses, d'apparence nacrée, fort adhérentes d'ailleurs. Le séjour dans l'eau ou le contact avec des corps gras fait détacher assez facilement ces squames que l'ongle ne saurait enlever sans difficulté, et dans beaucoup de cas sans amener un écoulement de sang. La squame enlevée, il reste un état persistant de la peau, caractérisé par l'épaississement et la rougeur du tissu malade, qui renouvelle sans cesse les squames que l'on en a détachées. J'ajouterai que très rarement, c'est-à-dire dans une seule de ses variétés (forme composée de l'affection que j'ai fait connaître, *psoriasis herpétiforme*), il y a de la démangeaison. Celle-ci n'est donc qu'une exception dans cette maladie, et cette circonstance est importante à noter à l'égard de l'affection nouvelle que je vais décrire.

Le *pityriasis*, comme nous l'avons dit, est une affection squameuse beaucoup plus superficielle. Dans sa forme la plus bénigne, elle ne se dessine que par des furfures épidermiques, sans aucune altération apparente du tissu de la peau. Tantôt restant à l'état albide, tantôt se manifestant avec une nuance jaune verdâtre, *pityriasis versicolor*, ou avec une nuance noirâtre, *pityriasis nigra*. Mais dans tous ces cas la portion squameuse ne consiste que dans un état plus ou moins farineux du tissu. Il faut cependant en excepter la forme aiguë dont j'ai tracé les caractères, *pityriasis rubra*.

Toutes ces variétés de pityriasis sont assez souvent accompagnées de démangeaison. Elles guérissent plus facilement que le psoriasis, et elles sont moins sujettes à récidiver, et aussi moins transmissibles de père en fils.

Ceci posé, je place en regard de ces deux maladies la maladie nouvelle que j'ai observée.

1° Elle a essentiellement son siége dans la peau qui recouvre les bulbes pileux, car elle se montre principalement là où ces derniers sont plus dessinés et plus développés. Je dis bulbes pileux, et non pas bulbes des cheveux, car je ne l'ai jamais observée à la tête, mais elle siége a la partie externe des membres, notamment aux avant-bras et aux jambes, et elle atteint surtout ces groupes de bulbes pileux disposés en plaques ovoïdes sur le dos des premières phalanges des doigts. Elle peut cependant se montrer sur toute la

surface du corps, le cuir chevelu exceptés, quoique ces parties soient plus abondamment fournies de poils.

2° Elle amène un épaississement de la peau qui avoisine et recouvre le bulbe des poils avec rougeur chronique de ce tissu, de manière à représenter à la base de chaque poil une petite pyramide conique du sommet de laquelle s'échappe le poil. Chacune de ces petites pyramides est isolée du bulbe voisin par une portion de peau saine, de manière que dans les parties affectées la peau représente cet état que l'on a désigné sous le nom de *chair de poule*.

3° Au sommet de ces élevures conoïdes traversées par le poil, existe une petite lamelle épidermique assez dure, en partie libre, en partie adhérente, et même fort adhérente, au toucher; de sorte que, si l'on vient à frotter la peau, on a la sensation d'une râpe rude.

4° Il suffit d'un bain de peu de durée, ou de quelques lotions aqueuses, pour détacher toutes ces lamelles épidermiques, et rendre à la peau la douceur au toucher qu'elle offre généralement, à part les saillies conoïdes qui persistent au même degré, lorsque la maladie est antérieure, mais qui disparaissent complétement quand elle est récente, sauf à reparaître quelques jours plus tard.

5° Cette affection est le plus souvent exempte de démangeaison, et cette circonstance tend à la rapprocher du psoriasis; mais on remarquera que le pityriasis ne produit qu'accidentellement ce phénomène.

Tel est l'état anatomico-pathologique de la maladie. Cherchons actuellement à tracer les traits généraux qui lui sont propres.

Dans les quatre observations que j'ai pu recueillir, la maladie s'est développée vers l'âge de seize à dix-huit ans. Elle a été constamment précédée des trois affections suivantes: *psoriasis palmaria*, *pityriasis capitis* et *pityriasis rubra* plus ou moins général. Ces affections se sont manifestées dans l'ordre de leur énumération.

Toutefois la forme du psoriasis palmaire qui la précède est toute spéciale, et à cet égard il faut se rappeler que les dermatologistes ont décrit le psoriasis palmaire comme étant très étendu. J'ai surtout insisté dans cet ouvrage, plus qu'aucun autre auteur, sur les différences qui distinguent ces deux variétés de psoriasis palmaria; j'en ai fait deux formes distinctes, et dans la marche et dans le trai-

tement. En effet, dans la variété de psoriasis palmaire qui précède le pityriasis pilaris, toute la paume de la main est rapidement envahie par le psoriasis; la face palmaire des doigts se prend en même temps; les écailles d'épiderme se détachent assez facilement; la peau se casse, saigne, amène des démangeaisons, tandis que dans le psoriasis palmaire pur ou type, la maladie est très discrète; elle fait des progrès très lents, et elle n'occupe que le centre de la paume des mains.

Aujourd'hui que nous savons que la même variété de psoriasis palmaire, celle qui marche avec rapidité et qui gagne bientôt toute la surface palmaire, précède constamment les *pityriasis capitis* et *rubra*, qui précèdent eux-mêmes le développement du *pityriasis pilaris*, nous nous demandons si la deuxième variété de psoriasis palmaire, celle que les dermatologistes ont décrite, ne serait pas plutôt un pityriasis qu'un psoriasis. Je suis porté à le croire, car je retrouve dans cette forme les démangaisons et la marche rapide du pityriasis, et je n'y vois pas les caractères du psoriasis aigu, dont la rapidité de développement pourrait seule expliquer l'envahissement si prompt de la surface interne des mains.

Le *pityriasis pilaris* s'est jusqu'alors présenté à notre observation avec une marche chronique et une très longue durée.

C'est une affection des plus rebelles quand elle est de date ancienne. Elle résiste au traitement arsenical, et elle a résisté chez la jeune malade du service de M. Hardy aux pommades à l'huile de cade, au goudron, aux alcalins. La pommade au chlorure de zinc est la seule qui ait produit quelque amélioration.

Lorsque dans un des cas cités, celui du malade traité par notre collègue Gibert, l'affection a disparu, ce n'a été que très momentanément, puisque six semaines ou deux mois après la maladie se montrait de nouveau.

Voilà donc une forme squameuse nouvelle, plus rebelle encore peut-être que toutes celles qui ont été décrites, l'ichthyose exceptée, mais qui a cela de plus fâcheux, c'est d'atteindre des parties à découvert que l'ichthyose respecte, c'est-à-dire la figure, le cou, le bas des avant-bras et les mains.

Je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion de traiter l'un de ces ma-

[illegible] persévérance du r
[illegible] psoriasis rubra co
[illegible] de la maladie
[illegible] lecture des obser
[illegible] j'ai tracé l'histoi
[illegible] direction de deu
[illegible] toujours en
[illegible] les auteurs si je re
[illegible] à celle que je vien
[illegible] de psoriasis rappo
[illegible] a été recueilli et
[illegible] Saint-Barthélemy, de L
[illegible], et dans le cours d
[illegible] chose de particulie
[illegible] l'autre importance. I
[illegible] le malade était plutôt at
[illegible] coïncidant ave
[illegible], car M. Rayer n'a d
[illegible] confusion entre c

[illegible] *capilier de la peau des men*
[illegible] — *Psoriasis rubra.* (Recueillie
[illegible] service.) — Marie X..., âgée
[illegible] à la consultation de l'h
[illegible] d'un psoriasis palmair
[illegible] *psoriasis rubra* de la figure e
[illegible] qui ne sont pas atteintes par l
[illegible] squames squameuses, qui corre
[illegible] syphilitique : engorgemen
[illegible] bien du côté de l'hérédité.
[illegible] fille, qui était alors occupé
[illegible] vit se former au centre de la pa
[illegible] sèche, sans démangeaison et sa
[illegible] suppression des règles coïncida a
[illegible] successivement le cuir chevelu et
[illegible] inutile par la pommade au tanin
[illegible]-Louis, et fut guérie après quelques mo
[illegible] pas plus de deux mois : cependant

Enfin toute la portion de la peau des membres et du cou, qui n'est pas envahie par le pityriasis, offre une altération singulière dont l'aspect est à la fois papuleux et squameux.

Ces papules sont extrêmement nombreuses, écailleuses à leur sommet, constamment sèches, n'occasionnant aucun prurit, aucune douleur, mais communiquant à la peau une rudesse extrême; leur centre est traversé par un poil, et elles-mêmes ont pour siége les bulbes pileux.

A la partie antérieure du cou, elles sont d'autant plus confluentes qu'on s'éloigne davantage de la ligne médiane, de sorte que sur les côtés elles se rapprochent tellement les unes des autres qu'elles finissent par se confondre et par se réunir en une plaque non interrompue, qui n'est autre chose que la limite même du pityriasis.

De même, sur les épaules, la peau est demeurée saine, et forme comme un îlot au milieu des parties environnantes, qui sont complétement atteintes de pityriasis; et cette portion de peau saine est parsemée d'une myriade de ces papules rudes et squameuses dont l'ensemble constitue le *pityriasis pilaris* qui se continue sur le tronc et sur le bras.

Les bras et les avant-bras sont presque entièrement couverts par la rougeur squameuse du pityriasis. Toutefois leur face interne en est restée dépourvue; elle est seulement parsemée des mêmes papules que le cou et les épaules. Enfin le pourtour entier du poignet, avec le tiers inférieur des avant-bras, le dos de la main et la face dorsale des premières phalanges, sont criblés de ces mêmes petites saillies dures et indolentes.

Sur le dos des premières phalanges en particulier, elles sont ramassées en un groupe très nettement circonscrit, qui correspond exactement à la touffe de poils qui s'y trouvent normalement implantés.

Aux limites de la portion dorsale de la main couverte de papules et sa portion palmaire qui est altérée par le psoriasis, on peut suivre la transition insensible qui s'opère entre les amas papuleux et les parties squameuses. Les faces latérales des doigts, au contraire, sont parfaitement intactes et saines.

Il en est de même aux membres inférieurs, où les cuisses offrent à leur face externe du pityriasis qui semble résulter de la réunion et de la fusion intime de ces papules squameuses qui couvrent en très grand nombre la face interne du membre. Aux jambes, au contraire, on ne trouve que des papules. Elles y sont plus volumineuses que partout ailleurs, c'est-à-dire qu'elles atteignent jusqu'à la grosseur d'une tête d'épingle ordinaire.

Il est remarquable en même temps qu'en avant de la rotule elles ont acquis un volume plus considérable, et qu'elles y sont tellement rapprochées que la partie antérieure du genou présente l'aspect d'une plaque de psoriasis qui serait parsemée de petites éminences coniques très régulières.

Mais il faut se rappeler que ni le cuir chevelu, ni la peau du visage, ni même celle du front qui est en grande partie restée saine, ne sont dépourvus de ces

mêmes papules bien que les poils y soient plus ou moins abondants et plus ou moins volumineux.

Aux pieds l'état papuleux se continue sans ligne de démarcation bien tranchée avec le psoriasis plantaire.

Cet état squameux et papuleux, qui se présente à présent avec son expression la plus tranchée, est promptement modifié par l'usage des bains et des pommades. Il suffit de trois ou quatre bains, par exemple, pour faire complètement disparaître toutes les papules en question : de même aussi qu'il suffit de huit jours d'interruption des bains pour les voir toutes reparaître.

Pour terminer l'histoire pathologique de ce malade, il faut ajouter que la bronchite dont il est atteint depuis trois mois ne s'est nullement améliorée, qu'elle s'accompagne, au contraire depuis quelque temps, de sueurs nocturnes et de mouvements fébriles de plus en plus fréquents, que des vomissements opiniâtres se reproduisent pendant la nuit depuis plus de quinze jours sans qu'aucun médicament ait pu les arrêter définitivement, et qu'enfin l'auscultation, pratiquée avec soin ces jours derniers, a fait trouver au sommet du poumon droit une diminution de sonorité, retentissement normal de la voix, de la rudesse de la respiration, et même des craquements humides en arrière dans la fosse sous-épineuse.

Il en résulterait par conséquent que la maladie de la peau, dont l'origine remonte à treize années, se serait compliquée dans ces derniers temps d'un développement de tubercules pulmonaires.

Quoi qu'il en soit, le malade, fatigué de l'hôpital, demande et obtient sa sortie le 6 mars, sans qu'on ait cru devoir rien tenter pour modifier son affection cutanée en présence d'une poitrine déjà compromise. Toutefois il résulte évidemment du résultat obtenu précédemment de l'usage des bains de vapeur, de la pommade au goudron et de la solution arsenicale que cette maladie est heureusement modifiée par le traitement ordinaire des maladies squameuses anciennes et invétérées.

Psoriasis général; apparence particulière de la desquamation sur les points occupés par les poils. — Tel est le titre de l'observation de M. Barral, rapportée par M. Rayer. (*Traité théorique et pratique des maladies de la peau*, t. II, p. 158.) — Mais il est aisé de voir que la description qui suit appartient au *pityriasis rubra* et nullement au psoriasis.

Il est question dans cette observation d'un jeune homme de vingt-neuf ans, qui depuis dix-huit ans est affecté d'une maladie qui commence à former des plaques rouges ou écailleuses sur le thorax. Peu à peu cette éruption finit par envahir à peu près la totalité du corps. Après deux ans de durée la maladie fut guérie, et ne revint qu'après sept années de guérison. Quand elle revint, elle fut beaucoup moins intense que la première fois, mais elle ne disparut plus.

Le cuir chevelu est entièrement couvert d'écailles farineuses. Le front offre

plusieurs plaques d'une couleur brune rougeâtre qui fait une légère saillie au-dessus du niveau de la peau et qui sont couvertes de squames. La peau de la face est dure, épaisse et roide; on aperçoit facilement la gêne que le malade éprouve pendant la conversation. Derrière les oreilles les squames sont plus larges et la peau plus rouge. « Le cou et la poitrine sont, de toutes les régions, les plus profondément affectées. Ces parties sont couvertes de squames: la peau est très rouge, fendue et roide. Dans les mouvements qu'il fait exécuter à ces parties, le malade éprouve une sensation fort désagréable causée par la sécheresse et la roideur des téguments ; les autres parties du corps présentent le même état pathologique, mais à un degré moins marqué. En examinant la face dorsale des doigts, on voit de petites aspérités squameuses, isolées, parfaitement rondes, percées à leur centre par un poil. Au toucher, la peau couverte de ces petites aspérités est très dure, à peu près comme une lime. Ces aspérités existent seulement là où il y a des poils : c'est-à-dire au milieu de la face dorsale des premières et secondes phalanges. »

M. Rayer n'ayant pas décrit le *pityriasis rubra*, est embarrassé pour donner une place à cette observation qu'il met à côté du psoriasis, tout en disant qu'elle offre une apparence particulière.

Psoriasis. Dartre squameuse sèche; dartre écailleuse ; dartre squameuse lichénoïde; herpès furfureux.

Simplex.
Aigu général ou local.
Chronique général ou local.
Guttata.
Gyrata.
Nummularia.
Punctata.

Psoriasis localisés.
Palmaria.
Plantaria.
Capitis.
Unguium.
Composita. Psoriasis eczémateux.
Psoriasis herpétiforme.

Le psoriasis est une affection essentiellement squameuse, et l'une des plus communes des maladies de la peau ; aussi vient-elle pour le chiffre le plus élevé après l'eczéma dans notre statistique. Nous comptons en effet 280 malades atteints de psoriasis sur 1800 maladies de la peau. Cette circonstance doit appeler toute l'attention du médecin, qui sera bien souvent appelé à donner ses soins pour combattre une forme morbide trop souvent rebelle et si sujette à récidives.

Quelle que soit la partie du corps qu'elle affecte, elle est caractérisée par trois phénomènes : 1° la présence de squames épidermiques nacrées ; 2° la rougeur de la peau sous les squames; 3° l'épais-

sissement de la peau. Il n'y a pas en général de psoriasis sans trois conditions pathologiques: dans l'une, la présence de squames peut manquer, si le malade les a fait tomber par des bains ou par l'emploi de corps gras; mais comme du jour au lendemain ces écailles se forment, il est difficile que ce phénomène ne se traduise pas aux yeux du médecin dans un espace de temps fort court. Insistons sur ces trois caractères. Déjà nous avons dit que la squame était formée par la superposition irrégulière de lames épidermiques, qui, par leur réunion intime, donnaient naissance à des lames plus ou moins épaisses, qui prenaient alors un aspect nacré et argentin. Dans le psoriasis, ces lames ou productions épidermiques adhèrent à la peau; elles ne se détachent que très rarement, on ne peut les enlever qu'avec l'ongle. Elles masquent souvent la rougeur de la peau, parce qu'elles recouvrent le tissu malade; elles tombent assez facilement à l'aide des bains et mieux à l'aide des pommades.

Rougeur. — A moins d'un psoriasis aigu, la rougeur de la peau n'est jamais vive. Elle n'a pas cette teinte rosée des exanthèmes; elle est d'un rouge plus ou moins foncé. Elle est masquée par la squame.

Épaississement de la peau. — Il est constant; quelquefois peu appréciable à l'œil, mais toujours sensible quand les productions épidermiques sont tombées; le psoriasis mince pourrait seul faire exception à cette règle. D'ailleurs, *pas de démangeaisons*, pas de sensation quelconque qui incommode; car du moment que la démangeaison coïncide avec le psoriasis, c'est que celui-ci n'est pas simple, qu'il est à forme composée d'herpès ou d'eczéma. Il faut en excepter les cas de psoriasis palmaire ou plantaire qui se trouvent dans des endroits de flexion et qui sont parfois accompagnés de cassures douloureuses dépendantes de la pression exercée par l'épiderme. Mais déjà nous avons dit, article PITYRIASIS PILARIS, que nous sommes disposé à considérer ces psoriasis comme des pityriasis.

Ces caractères morbides ainsi établis, nous dirons que le psoriasis peut être à forme aiguë ou à forme chronique. Le psoriasis aigu est très rare par rapport au psoriasis chronique, car nous croyons être dans le vrai, en disant qu'on l'observera une fois sur 80 ou 100 cas. Les hommes sont beaucoup plus sujets au psoriasis

que les femmes ; sur 270 cas, nous en trouvons 245 chez l'homme et 25 chez la femme. Il est aussi plus propre à certains âges qu'à d'autres. Ainsi, lorsque le psoriasis n'est pas héréditaire, ce n'est guère que vers l'âge de vingt à trente-cinq ans qu'il se développe. Sur 268 cas nous en trouvons 174 qui se sont montrés de vingt à trente-cinq ans ; puis nous voyons le développement de cette maladie diminuer de fréquence dans les époques suivantes de la vie. Ainsi 50 cas de trente-cinq à quarante-cinq ans ; 24 cas de quarante-cinq à cinquante-cinq ; et 20 cas au delà de cinquante-cinq ans. On peut donc dire que cette maladie appartient essentiellement à l'âge adulte. Les professions n'exercent aucune influence sur son développement ; l'hérédité est, au contraire, très puissante. A cet égard nous ne pouvons fournir aucun chiffre de quelque valeur, attendu que la catégorie d'individus sur laquelle reposent nos relevés s'inquiète fort peu des maladies de leurs parents et surtout d'affections qui ne portent aucune atteinte à leur santé. Chose remarquable, le psoriasis se relie à la meilleure constitution et au meilleur tempérament. Sur 227 cas, nous trouvons notée 206 fois la constitution comme étant parfaite. 162 fois sur 200 on rencontre cette maladie sur des sujets d'un tempérament sanguin ou sanguin-lymphatique. C'est en été, en hiver, qu'elle se développe surtout ; aussi ces deux saisons donnent-elles le chiffre de 103 sur 154 cas notés ; restent donc 51 seulement pour les saisons de printemps et d'automne. La statistique démontre encore combien cette maladie affecte la forme chronique et combien elle est persistante ; sur 221 cas on n'en trouve qu'un seul ayant moins d'un mois ; 35 d'un mois à un an, 116 de plus d'un an, et 69 de plus de dix ans. C'est qu'en effet il n'est pas rare de trouver des sujets qui portent cette affection depuis vingt ou trente ans.

Ceci posé, il est important de dire ce que l'on doit entendre par psoriasis général ; en effet, on pourrait être porté à croire qu'il s'agit d'une affection envahissant toute l'étendue de la peau du corps. Il n'en est rien, cette maladie, quelque aiguë qu'elle soit, ne recouvre jamais la *totalité* de la surface de la peau, et dans un psoriasis général ordinaire, on veut seulement énoncer ce fait, qu'il existe des plaques de cette affection qui sont disséminées sur tout le corps, et plus ou moins espacées d'ailleurs les unes des autres, contrairement

un psoriasis discret, qui n'atteint que quelques points de la surface des membres.

Psoriasis aigu.—Cette forme est rarement primitive, elle se montre plutôt après plusieurs mois ou plusieurs années de l'existence du psoriasis à l'état chronique ; ceci n'est pas absolu, nous signalons seulement ce qui se passe le plus ordinairement. Quelquefois, sans cause connue, mais le plus souvent à la suite d'excès, l'affection, qui n'occupe que quelques centimètres de surface dans divers points du corps, prend tout à coup un développement considérable. Les plaques primitives s'enflamment, la peau se couvre çà et là de rougeurs successives nouvelles ; ces rougeurs s'élargissent en même temps qu'elles deviennent le siége d'une chaleur insolite. Il ne se fait là aucune sécrétion de liquide, mais il se montre quelques petites écailles épidermiques épaisses qui recouvrent les surfaces malades, et rendent la peau sèche et rude. Si l'affection devient plus générale, ce qui exige alors plusieurs semaines de développement, elle s'étend aussi bien à la tête qu'au corps et aux pieds ; elle envahit d'abord le cuir chevelu, gagne ensuite la figure ; mais, chose remarquable, jamais elle n'existe, même au degré le plus élevé, sans laisser des parties de peau saine sur le tronc et sur les membres. Un peu plus tard, la sécrétion épidermique augmente et il se détache dans le lit des *écailles*, des *squames* petites et épaisses, en quantité plus ou moins considérable. En cet état, le psoriasis aigu, que l'on pourrait appeler *rubra*, ressemble beaucoup au *pityriasis rubra aigu* que nous avons décrit page 262 ; car le corps est aussi rouge qu'une écrevisse (que l'on me passe cette comparaison) ; mais il en diffère en ce qu'il n'existe pas de sécrétion aqueuse, et en ce que le pityriasis, au lieu de fournir des *écailles*, donne surtout des *lamelles* épidermiques minces et plus ou moins larges. D'ailleurs, dans le *pityriasis rubra aigu*, il existe souvent de la démangeaison, tandis que dans le *psoriasis* il n'y a que de la chaleur à la peau dont le malade a le sentiment.

Arrivé à ce point, le psoriasis est une maladie longue et rebelle ; il faut s'attacher à combattre la forme inflammatoire par les bains d'une heure, de deux heures, trois heures même, lorsque le malade peut les supporter ; souvent on retire un très grand avantage, au

début, de la saignée générale. Localement, on ne peut que prescrire les corps gras simples : axonge, cold-cream, saindoux sans addition d'aucun médicament ; régime hygiénique convenable, cessation complète de travail, le malade s'y trouvant d'ailleurs forcé.

Survient la période décroissante, qui s'annonce par la diminution de la chaleur de la peau et par celle de la rougeur inflammatoire, qui, d'un rose vif d'abord, devient moins intense ensuite. C'est le moment qu'il faut choisir pour entrer dans la voie de la résolution à l'aide de bains et de pommades. Ainsi, les bains d'alun d'abord, et plus tard ceux au sublimé ; les pommades au tannin camphré, à l'huile de cade au 50e. Mais ce qu'il est difficile de saisir, c'est le moment opportun pour l'emploi de ces moyens ; nous ajouterons qu'en cas d'insuccès, c'est encore à la solution de Fowler qu'il faut avoir recours. Cette affection ne peut guère être guérie dans un espace moindre de trois à six mois.

Psoriasis chronique. — Formes morbides. — Les auteurs qui nous ont précédé ont attaché une certaine importance à des divisions du psoriasis chronique, basées sur la forme morbide. Ainsi, Willan et Bateman, et après eux les dermatologistes qui les ont suivis, admettent l'existence des variétés suivantes : *Psoriasis guttata*, *diffusa*, *gyrata* et *inveterata*. A part cette dernière distinction, qui conduit à une médication tout externe dans l'impossibilité où l'on est de guérir par d'autres moyens, les trois premières n'ont de valeur que comme indication de forme morbide ; au point de vue pratique, elles ne conduisent à rien : il faut même ajouter que ces divisions sont incomplètes, puisqu'il est très commun d'observer deux autres espèces que nous avons fait connaître, avec plus de raison, car elles ne se comportent pas de la même manière. Ce sont le psoriasis *nummularia*, ou disposé par plaques arrondies de la largeur de pièces de 2 à 5 francs, et le psoriasis *punctata*, toujours limité à des surfaces malades de quelques millimètres d'étendue, susceptible de se multiplier et non de s'étendre ; ajoutons que cette forme est, de toutes, la plus difficile à guérir. Les auteurs ont de plus négligé les formes composées de *psoriasis*, bien autrement importantes, puisqu'elles conduisent à des indications thérapeutiques spéciales. Nous croyons

ıucoup plus logique en distinguant le psoriasis en aigu et en
ue. Le premier pouvant être général ou local, jamais, dans
e aiguë, on ne retrouve ces distinctions de *psoriasis guttata*,
etc.; aussi rattachons-nous ces diverses formes au psoriasis
ue qui les rassemble toutes. Les diverses variétés n'appar-
t qu'à ces psoriasis; quant aux psoriasis localisés, on en a fait
ces, parce que l'affection est limitée à une partie et qu'elle
t qu'elle indépendamment de toutes les autres. Cependant,
admets que quatre sortes différentes: *psoriasis capitis*, *plan-*
almaria et *unguium*. Les formes *scrotalis*, *præputialis*, *ophthal-*
e sont pas des psoriasis, mais des *pityriasis rubra*. Que l'on
ge les malades à cet égard, ils vous diront que cette affection
té par moments; qu'elle cause parfois de la démangeaison;
, elle donne des lamelles épidermiques et non pas des
, tous caractères qui doivent être rapportés au pityriasis. Les
ont gardé le silence sur le *psoriasis unguium*, c'est pourtant
ladie assez fréquente et difficile à guérir; ils n'en ont parlé
soirement ou qu'à l'occasion du *psoriasis inverterata*, c'est
erreur et une lacune. Nous allons décrire successivement
e de ces formes morbides du psoriasis chronique.

soriasis est une des affections que l'on rencontre jour-
nt; elle débute, comme on l'a vu, vers l'âge de vingt à
ns, à moins qu'elle ne soit héréditaire; toujours elle a une
excessivement lente; elle apparaît d'abord aux coudes et
oux, sous la forme de petites plaques d'une étendue très
et variée, mais si lente que le malade ne s'en aperçoit pas;
st accompagnée d'aucune sensation, et après s'être déve-
pendant trois semaines ou un mois, elle reste stationnaire
des mois et quelquefois des années; mais la maladie peut à
ut affecter une forme spéciale et prendre alors les dénomi-
que nous avons indiquées et dont il nous faut faire connaître
ctères. Si les petites plaques de psoriasis ont la largeur d'un
un centimètre, si elles sont arrondies de manière à ressem-
s ou moins à une goutte d'eau *étalée* (comparaison assez peu
our le dire en passant), on l'appelle *psoriasis guttata*; alors l'af-
se montre ordinairement sur la partie externe et postérieure

des avant-bras et à la partie antérieure et externe des jambe
l'appelle *diffusa* quand le psoriasis se développe par plaques
gulières plus ou moins larges et sans forme précise; ces plaqu
plusieurs centimètres d'étendue en longueur et en largeur,
quefois 15 à 20 centimètres et plus. On le nomme *gyrata* lorsq
surfaces malades sont étroites, très allongées, de manière à r
senter plus ou moins un *ruban*. Je lui donne l'épithète de *nu*
laria lorsque les plaques sont toutes arrondies et variabl
étendue, depuis une pièce de 1 franc jusqu'à une pièce de 5 f
et plus, mais toujours à forme orbiculaire. Quant au *psoriasis*
tata, c'est une variété assez commune et toute particulière,
sens que les surfaces malades sont circonscrites à quelques
mètres, espacées les unes des autres et assez multipliées. Quel
la cause de ces formes diverses? on l'ignore. Les variétés de
riasis *guttata*, *punctata* et *nummularia* sont toujours à plaque
ou moins multiples; elles peuvent affecter toutes les parti
corps. Il est commun de les rencontrer aussi sur le dos, la po
et le ventre; mais principalement sur le dos. Le *psoriasis gyr*
le plus discret; quant au *psoriasis diffusa*, c'est là une dénomin
que l'on pourrait aussi bien rattacher à toutes les espèces
dentes, mais dans laquelle les plaques existent disséminées
corps, plutôt en surface qu'en nombre. Dans le psoriasis
nique, la seule partie du corps qui soit généralement prés
c'est la figure; toutes les autres peuvent être atteintes; les f
punctata, *guttata* et *nummularia* prédisposent à cette confluen
mais il est d'observation, qu'avant d'attaquer ainsi toutes les p
il s'écoule souvent plusieurs années. C'est cette circonstance,
au lieu d'invasion de la maladie, qui a toujours fait dire que l
riasis était essentiellement une maladie *des coudes et des g*
ainsi que de la partie externe des membres et du dos.

Que doit-on entendre par la dénomination de *psoriasis*
rata? Nous avons déjà déclaré que ce ne pouvait être là une va
le psoriasis ne devient *inveterata* que par sa permanence et ses
dives. Il faut savoir, en effet, que cette maladie ne pardonne
qu'une fois développée, on peut la guérir, ou en éviter les pro
que liée à l'incurie, à la malpropreté et placée en dehors de

giéniques, elle tend sans cesse à récidiver et à prendre à récidive plus d'étendue. On a vu, en effet, que cette ma- développait surtout en été et en hiver. Dans les premiers lle se guérit complétement sous l'influence d'une saison à sa manifestation ; plus tard, elle ne fait que diminuer, paraître plus forte l'année suivante ; ou bien, si le malade a traitement plus ou moins palliatif, ou si, ayant subi un trai- curatif, il reste sans entretenir par des bains et des onctions es fonctions de la peau, il voit reparaître à nouveau son avec plus de force. Il est des sujets atteints depuis trente soriasis, qui ont eu vingt à vingt-cinq poussées, comme ils lent ; c'est que, dans un grand nombre de cas, ils n'ont pas s: *ils ont été blanchis*, ainsi qu'ils le disent. Alors, on trouve t tout le corps maculé de plaques de psoriasis, qui n'est *uttata*, ni *gyrata*, ni *nummularia*, etc. ; la forme en a dis- tcepté dans certains d'entre eux, et notamment dans le *diffusa* où les plaques se sont de plus élargies sans être de- plus nombreuses ; mais c'est un psoriasis général sans forme Les surfaces malades ont perdu alors beaucoup de leur té ; il semble que la peau y soit tannée, rien ne l'irrite. Ces supportent les pommades les plus fortes, et le goudron pur quefois insuffisant à les guérir.

t état, la maladie exerce une certaine influence sur l'éco- n général ; ces sujets s'amaigrissent, perdent de leurs forces, souplesse dans les mouvements ; ils deviennent un peu , en même temps, les doigts et les orteils se roidissent ; rticulation des phalanges prend tout à fait la disposition ffre dans la goutte arrivée a l'état chronique ou dans le me goutteux ; les doigts sont anguleux, fléchis vers la le la main, sans tophus, mais sans qu'on puisse aussi les r. Les ongles eux-mêmes deviennent malades, ils sont le me hypertrophie plus ou moins considérable ; et de deux une : ou l'ongle a été atteint de psoriasis, et alors il est a perdu sa transparence, il est déchaussé et séparé de sa n même temps que toutes les lamelles qui le composent sont les unes des autres, grisâtres et épaisses ; ou bien l'ongle

n'a pas participé à l'affection, il n'a fait que croître avec forme vicieuse, c'est-à-dire qu'il est devenu le siége de rainures et de lignes saillantes nombreuses; que son extrémité s'est effilée et a crû dans une telle proportion, qu'il prend la forme d'un bec de corbeau. Alors le malade est dans l'impossibilité d'exercer aucune profession; sa marche est difficile, chancelante; il s'amaigrit peu à peu, tout en conservant un assez bon état des voies digestives; aussi ces malades meurent-ils tous âgés, mais infirmes. Je me suis plusieurs fois demandé si cet état des mains, qui ressemble à celui des goutteux, les tophus osseux exceptés, dépendait exclusivement du psoriasis; ou s'il ne se montrait pas sous l'influence de cette maladie, lorsque le sujet avait été atteint autrefois de douleurs rhumatismales, ce que je suis porté à croire. Mes observations ne sont pas suffisantes pour résoudre la question que je soulève, et qui sera sans doute mise en lumière par mon honorable collègue, M. Moissenet, médecin de l'hospice de la vieillesse (hommes). Il a dans son service un très grand nombre de ces individus infirmes, et notamment de ces vieux psoriasis, admis aux Incurables pour cause d'infirmité. Tous les auteurs rapportent d'ailleurs cette maladie des ongles à l'affection squameuse.

Formes composées. — Jusqu'alors nous ne nous sommes occupé que des formes simples du psoriasis; voici ce qui a trait à ses formes composées. J'en admets deux espèces: l'eczéma psoriasiforme ou psoriasis eczémateux, et l'herpès psoriasiforme ou le psoriasis herpétiforme. L'eczéma psoriasiforme a son siége principal aux jambes et aux avant-bras. Il se montre sous une forme chronique, par une ou plusieurs surfaces plus ou moins étendues, qui, dès l'abord, se recouvrent d'un mélange de squames et de lamelles épidermiques, tout en causant des démangeaisons et en fournissant de temps à autre de la sérosité. Ces démangeaisons conduisent au grattage, à l'enlèvement de squames plus ou moins larges, ou à leur fendillement, toutes circonstances qui ne s'observent jamais dans le psoriasis simple, et qui donnent d'ailleurs un cachet tout spécial à cette forme de psoriasis; sa marche est d'ailleurs à peu près la même, avec cette différence que, d'un moment à l'autre, l'affection peut prendre une forme aiguë et sécréter plus ou moins abondamment. Ce qui importe dans cette distinction, c'est la thérapeutique. Cette

forme morbide demande d'autres soins, d'autres médicaments que le psoriasis simple ; il en est de même de la forme suivante, qui exige un tout autre traitement.

Les caractères du *psoriasis herpétiforme* sont très nettement dessinés. La maladie atteint au moins autant la partie interne des membres et la région antérieure du tronc que leur partie externe et le dos ; elle se montre par de petites élevures rouges disséminées, ressemblant à des papules plates, qui, peu après leur développement, se dépriment à leur centre, s'évident, se guérissent, en même temps qu'un bourrelet se forme à la circonférence, grandit, s'étend de plus en plus, de manière à former un cercle entier complétement dégagé au centre, où la peau est saine. Ces bourrelets ont quelquefois des dimensions considérables ; ils vont s'élargissant de plus en plus et se confondent bientôt entre eux ; ils forment alors des surfaces ondulées dans lesquelles on trouve des segments de grands cercles. Ajoutons que dans cette affection il peut exister le même symptôme que dans l'herpès circiné ordinaire, c'est-à-dire le développement du trichophyton ou champignon, ainsi que j'en ai constaté la preuve chez un malade de la ville, dont j'ai tracé l'histoire (page 270). C'est là une première variété d'herpès psoriasiforme qui correspond à l'*herpès circiné ordinaire*. Mais il en est une seconde, plus difficile à reconnaître, et qui n'est pas moins spéciale ; elle correspond à l'*herpès nummulaire*. Dans cette variété, la surface reste malade au centre, mais elle est bordée par un bourrelet comme dans la précédente. Elle fait alors moins de progrès en étendue, les plaques en sont généralement beaucoup plus petites. Ces deux variétés amènent quelques démangeaisons, surtout lorsque la malade est en sueur. Elles sont très rebelles, et notamment la première. (Voy. *Maladies parasitaires, herpès circiné*.)

Il est difficile de confondre le psoriasis, quelle qu'en soit la forme, avec aucune autre maladie, si l'on tient compte des trois caractères que nous lui avons assignés ; les seules affections sur lesquelles on pourrait émettre des doutes, sont la lèpre vulgaire et l'ichthyose ; pour la lèpre surtout, en ce qui concerne le psoriasis herpétiforme circiné ; mais il sera toujours facile d'éviter la méprise, si l'on tient compte de cette circonstance que la lèpre figure toujours un *fer à*

cheval, c'est-à-dire que l'affection squamiteuse représente les caractères du psoriasis sous la forme d'un cercle ovoïde ayant un tiers de moins de sa circonférence (voyez les planches); tandis que le cercle de l'herpès psoriasiforme a toujours les dispositions d'un cercle complet. Quant à l'ichthyose, c'est une maladie à surface uniformément squameuse, disséminée sur les membres, en occupant presque toute l'étendue, et par conséquent d'un diagnostic différentiel facile.

Psoriasis localisé. — Psoriasis palmaria et plantaria. — Cette affection offre plusieurs variétés. Dans l'une, la plus simple, la plus bénigne, on voit apparaître au centre de la face palmaire d'une seule main une petite écaille épidermique. Le malade n'y fait même pas attention; un peu de graisse, un bain la font disparaître; mais elle se reproduit; et le matin elle est plus sensible qu'après les soins de toilette, pendant lesquels elle disparaît; elle a d'ailleurs la largeur de quelques millimètres seulement. Parfois le malade l'arrache, l'enlève; cet état ne s'accroît qu'avec une extrême lenteur, car il est des personnes qui conservent pendant douze ou quinze ans ce psoriasis si discret, et il n'a acquis alors que l'étendue d'un centime. Il est rare que le médecin soit consulté pour cette affection lorsqu'elle est dans de pareilles conditions.

Mais dans une forme moins bénigne, le psoriasis palmaire apparaît au centre de la main avec plus de vigueur; il gagne assez rapidement en surface pour envahir toute l'étendue de la face palmaire dans l'espace de quelques semaines. Alors il est souvent accompagné de cassures très douloureuses, l'épiderme est épaissi, les squames sont très dures et se renouvellent très rarement. Enfin, dans une troisième variété, l'affection, le plus souvent déjà ancienne et discrète, prend tout à coup un grand accroissement et gagne non-seulement la paume de la main, mais encore la face palmaire des doigts jusqu'à une ligne médiane qui séparerait l'épaisseur des doigts en deux parties égales. Dans ces deux variétés il est rare que les deux mains ne soient pas atteintes; cette maladie est d'ailleurs incommode, car la pression un peu forte d'un corps dur amène de la douleur et l'écoulement du sang des coupures; la main est le siége d'une chaleur insolite, mais la peau n'est pas sensiblement épaissie, comme on l'observe dans les diverses variétés de psoriasis.

Nous ajouterons que, dans la généralité des cas, elle n'a pas non plus la teinte rouge de peau enflammée. Ce qui se passe aux mains peut aussi exister aux pieds, et l'on comprend combien dans de telles conditions la marche devient douloureuse et difficile; contrairement aussi aux autres formes de psoriasis, le *psoriasis palmaria* n'atteint que la surface interne des mains, la face dorsale en est toujours exceptée. Dans le *pityriasis rubra*, au contraire, elle peut devenir tout entière malade. Mais, ainsi que je l'ai dit en traitant l'histoire du *pityriasis pilaris*, je me demande si le véritable psoriasis palmaire ne serait pas le psoriasis borné à la paume de la main, et si les deux autres variétés ne seraient pas plutôt des pityriasis.

Psoriasis capitis. — Le cuir chevelu peut être affecté isolément et indépendamment de l'existence de psoriasis sur le reste du corps, mais alors les coudes et les genoux présentent généralement une peau rude, épaisse et dans un état anormal. Néanmoins j'ai observé les cas de psoriasis du cuir chevelu qui étaient presque indépendants d'un psoriasis général, et où la tête était parsemée de plaques de psoriasis de 1 centimètre de diamètre. Cette affection débute presque toujours par la partie antérieure du cuir chevelu; elle gagne peu à peu en surface, en arrière, en même temps qu'elle s'élargit et qu'il se développe dans divers points de la peau des plaques morbides analogues. Mais ici deux formes possibles peuvent se présenter: ou celle de *psoriasis* franc, qui s'arrête à la racine des cheveux; ou celle de psoriasis herpétiforme, qui est terminé en avant par un bourrelet ondulé qui gagne de plus en plus sur le front. Les cheveux peuvent donc, dans l'une des formes, cacher cette affection, car, chose remarquable, quoique la peau soit rouge, épaissie, beaucoup plus malade que dans le pityriasis, par exemple, les cheveux ne tombent pas; mais si l'on vient à les faire couper, si le malade ne met aucune pommade, on voit alors les surfaces affectées recouvertes d'écailles épidermiques uniformes, sans aucune sécrétion, avec leur aspect nacré. Il n'est pas possible de confondre cette maladie avec le pityriasis qui est à l'état de furfures, ou avec l'eczéma suintant sans cesse de la sérosité, ou avec l'impétigo donnant une sécrétion purulente. Mais il n'en est pas de même du pityriasis chronique des adultes à forme *amiantacée;* il est vrai que la dis-

tinction a peu d'importance, parce que le traitement est à peu près le même.

Psoriasis unguium. — Cette maladie non décrite est assez commune et peut-être tout à fait indépendante ; elle se montre ordinairement après l'âge de trente ans, toujours à une époque assez avancée de la vie. Elle affecte un ou plusieurs ongles des doigts, sans coïncidence de tel ou tel doigt de la main. Elle apparaît à l'extrémité des ongles ; mais avant que ce qui constitue son cachet essentiel se manifeste, les ongles présentent quelques phénomènes particuliers : ils prennent plus d'épaisseur, se couvrent de quelques saillies longitudinales et de cannelures, comme chez les personnes âgées ; ils se déforment ; on voit alors l'extrémité libre de l'ongle s'épaissir, devenir opaque, grisâtre et présenter l'aspect d'une série de lames épidermiques mal jointes ; en même temps, cette extrémité libre s'élargit et se déchausse : alors, si le malade veut se servir de cet ongle pour arracher quelque chose, faire un effort, l'ongle casse à son extrémité ; puis la maladie s'étend aussi de la partie libre de l'ongle à la partie adhérente, en le déchaussant de plus en plus, en se déformant aussi de plus en plus et en prenant un aspect fort désagréable, jusqu'à ce que sa chute s'opère en définitive. L'affection n'amène ce résultat qu'après un laps de temps extrêmement long, des années. Chose remarquable, les parties molles restent tout à fait saines, et il n'y a pas de traces de psoriasis sur les autres parties du corps. C'est ordinairement au printemps que cette affection se manifeste ; alors, comme il existe un état aigu très tranché, on aperçoit distinctement autour de la partie de l'ongle qui va devenir malade, et sur la surface de l'ongle même, un liséré rouge inflammatoire, qui existe dans la substance même de la partie cornée de l'ongle, ou qui semble résider dans son épaisseur : c'est par ce liséré que la maladie fait des progrès, et c'est là ce que l'on peut appeler la forme aiguë de l'affection. La maladie procède donc bien évidemment de l'extrémité libre de l'ongle à sa base et à sa matrice ; celle-ci reste saine, au moins en apparence, pendant longtemps, puis elle se tuméfie, devient squameuse, présente des cassures et semble s'éloigner de l'ongle ; l'ongle seul est malade, paraissant vivre d'une vie propre. Le psoriasis des ongles peut coïncider avec le psoriasis général, mais

s alors la même maladie. Dans les psoriasis très anciens, ongles s'épaissir sans s'altérer sensiblement, et par cou- ersales concentriques du sommet à la base. L'ongle de- oup plus dur, beaucoup plus corné; il s'allonge sans que s se séparent; il s'effile, se courbe et devient pointu à ité, de manière à figurer des becs-à-corbin. C'est donc e d'hypérémie des ongles dans le psoriasis général, mais s le psoriasis des ongles que nous venons de décrire.

sis unguium a donc aussi sa forme aiguë, qui se montre ps et à l'automne. Elle est caractérisée par une petite ge linéaire, qui se montre autour de la portion malade ité libre de l'ongle, et qui persiste tant que le psoriasis our s'éteindre par les émollients au moment où l'affec- gle s'arrête. J'ai suivi ces phénomènes inflammatoires de ez une personne qui était atteinte de cette maladie, et je vés sur plusieurs autres.

ment de cette forme est tout spécial. Toutes les fois que ce *guium* est récent, il faut le combattre par les émollients, ent lorsque le liséré inflammatoire existe; cataplasmes, ndoux. Quand il est chronique, faire coucher le malade, doigts enveloppés de laine grasse; faire graisser deux fois s doigts avec de l'huile de cade pure ou avec des pom- uile de cade ou au goudron : c'est une maladie qui de- ntiellement l'usage des corps gras, mais ce n'est qu'avec e persévérance dans l'emploi de ces moyens qu'on ar- guérison. Les préparations arsenicales font peu de chose e affection; les eaux de Louesche l'améliorent sans la

nt des diverses formes de psoriasis. — Tout psoriasis aigu nollients, comme si c'était une affection sécrétante de la s pour exercer une influence un peu puissante sur cette faut des agents émollients prolongés. Dans quelques cas, avec avantage la saignée, comme dans le *pityriasis rubra al.* Les bains prolongés chaque jour pendant plusieurs onctions avec des corps gras sans addition de quelque que ce soit, l'axonge, le saindoux, le cold-cream, tels

sont les moyens à l'usage desquels il faut se borner pendant un mois ou six semaines; car cette maladie, quoique aiguë, suit une marche décroissante très lente; à l'intérieur, des tisanes rafraîchissantes, un régime alimentaire approprié, quoique le malade soit sans fièvre. Les onctions doivent être générales, et le malade doit conserver sa chemise et les draps dans lesquels il couche, imbibés pour ainsi dire de graisse; aussi en hiver ces vêtements sont-ils très froids et difficilement supportés par les malades.

La période aiguë tombée, ce qui se reconnaît à l'absence de la formation de squames, à l'abaissement de la rougeur et de la chaleur de la peau, il y a deux indications à remplir : ou le malade est dans un état de santé général tel qu'il peut sans aucun inconvénient supporter la médication arsenicale ; ou, au contraire, la faiblesse de l'estomac, des intestins délicats, ne permettent pas l'usage de cette médication. Dans le premier cas, on la prescrit d'après les errements que nous avons tracés (voy. MÉDICATION ARSENICALE, p. 130); dans le cas contraire, il faut entrer dans la voie des résolutifs en pommades et en bains. Toutes les affections squameuses se trouvent à merveille de l'emploi des corps gras. On débutera donc par des pommades au 50e d'huile de cade ou de goudron, et l'on fera faire une onction générale sur la peau matin et soir ; puis, au fur et à mesure que l'inflammation tombera, on rendra les pommades de plus en plus fortes. Toute la difficulté du traitement consiste à saisir l'indication de la force des agents que l'on emploie. Ce n'est pas ici le cas de mettre en usage les bains de vapeur : ils exaspèrent l'affection ; il faut s'adresser aux bains alunés, salés, ou avec addition de sublimé. (Voy. *Formulaire*, BAINS.)

Le psoriasis aigu local doit être traité de la même manière, en proportionnant les moyens à l'étendue des parties affectées. Il est rare que, dans un psoriasis limité à une surface qui représente la vingtième ou la quarantième partie de l'étendue du corps, on ait recours à la solution de Fowler.

Traitement du psoriasis chronique. — Quelle que soit la forme de l'affection, le traitement est le même ; à cet égard, nous avons besoin d'entrer dans des préceptes généraux relatifs à cette thérapeutique. Le médecin, en présence d'un psoriasis chronique de date récente,

st-à-dire de quelques mois ou d'un à deux ans, et lorsque aucun itement n'a été fait, doit s'attacher à débarrasser pour toujours le lade de cette affection. Il faut donc qu'il s'adresse tout d'abord ne médication interne efficace ; c'est toujours la méthode la plus e et celle qui compte le plus de succès; la forme du psoriasis orte fort peu, et c'est en cela que nous nous sommes élevé avec on contre ces divisions de *psoriasis guttata*, *diffusa*, etc.

Les médications internes ne comportent guère que deux ou trois ires de substances : les préparations arsenicales, antimoniales et rcurielles. Toutes portent une certaine atteinte à la santé géné-e, d'où la nécessité de ne les employer que si la constitution sujet, l'état de ses organes peuvent le permettre; à cet égard, us établirons quelques propositions qui serviront de guide aux decins :

1° Les préparations arsenicales doivent être préférées à toutes autres.

2° Les préparations antimoniales et mercurielles réussissent quel-efois, lorsque les préparations arsenicales ont échoué.

3° Lorsque les préparations arsenicales ont été employées à une se suffisante et pendant un temps assez long pour consolider une érison de psoriasis obtenue par ce moyen, et que le psoriasis a suivi de récidive à une époque assez rapprochée, il est inutile de renir à l'emploi de ces préparations.

4° Il est fort douteux que l'on puisse guérir à toujours un malade un psoriasis qui a eu des récidives nombreuses, quoique les pré-rations arsenicales n'aient pas été employées pour obtenir la érison.

5° Tout psoriasis invétéré doit exclure l'emploi des préparations senicales.

6° La condition essentielle de l'usage de ces préparations, c'est bon estomac, de bons intestins, une bonne poitrine.

7° Il est rare qu'un individu disposé à la diarrhée ou habitué à s garderobes fréquentes, supporte des doses suffisantes d'ar-nic et pendant un temps assez long, pour obtenir une guérison urable et même une disparition complète de son affection par

8° Il faut craindre d'employer l'arsenic chez les sujets atteints d'affections catarrhales chroniques de la poitrine, ou d'asthme, à plus forte raison s'il s'agit d'un jeune homme à poitrine étroite, à membres grêles, où l'on ait à supposer la possibilité d'un développement de tubercules.

9° Il est, au contraire, des individus qui supportent parfaitement l'arsenic ; les femmes nous semblent sous ce rapport avoir un avantage marqué sur les hommes.

J'ai exposé (pag. 130 et suiv.) les accidents qui peuvent accompagner l'administration de l'arsenic et les effets qu'il produit sur l'ensemble de l'économie en général ; j'ai fait connaître comment et à quelle dose il fallait l'employer, je n'ai donc pas à y revenir ; j'en ai fait autant pour les préparations antimoniales (voy. pag. 139 et suiv.). J'ai de plus, lorsque j'ai traité de la médication antisquameuse, exposé les méthodes externes et internes que l'on pourrait mettre en usage ; il me reste donc peu de chose à faire pour instituer la thérapeutique du psoriasis.

D'après les propositions que nous venons d'émettre, un psoriasis peut être traité par des moyens externes seulement, par des moyens externes et une médication interne à la fois, ou enfin par une médication interne seule. Toutes les fois que le médecin voudra être sûr des effets de l'agent interne qu'il aura mis en pratique, il faudra qu'il s'abstienne de toute pommade extérieure propre à guérir elle-même ; mais il est rare que l'on ne joigne pas à cet agent l'usage de bains. Nous préférons à tous les bains ceux de vapeur, excepté dans les trois mois les plus chauds de l'année. On les donne tous les deux jours (voy. BAINS DE VAPEUR) ; on peut les remplacer par des bains alcalins, lorsque les malades ne peuvent pas supporter les bains de vapeur.

La médication externe repose exclusivement sur l'emploi de bains et de pommades ; et parmi ces dernières, les plus employées sont celles qui ont pour base l'huile de cade, le goudron et le précipité blanc. La dose d'huile de cade et de goudron à incorporer avec l'axonge varie en raison de l'âge du sujet, de la finesse de la peau et de l'ancienneté du psoriasis ; en général, on débute par des pommades au 20°, et tous les quinze jours ou trois semaines, on rend la

nade plus forte en la portant au 15e, au 10e et même au 5e d'huile le ou de goudron. C'est à la condition de graisser largement rfaces malades avec la paume des mains, et fort au delà des s affectées, que l'on obtient une guérison; il faut aussi porter ɔi des chemises salies par la graisse et ne les changer que tous iinze jours; il semble que l'atmosphère d'huile et de goudron on enveloppe les malades contribue à obtenir une guérison prompte et plus facile. Dans quelques psoriasis invétérés, on ɔuvent obligé d'employer le goudron et l'huile de cade à l'état ɯreté. On conçoit qu'un pareil traitement ne puisse guère fait qu'avec l'isolement complet du malade. Un inconvénient grave de ces sortes de pommades, c'est de tacher les linges et ie pouvoir enlever complétement ces taches à la lessive. A l'hô- l il existe des draps et des chemises exclusivement affectés à ces es de traitements; l'odeur ne porte d'ailleurs aucune atteinte à ınté.

ous avons cité, page 141, les essais que nous avions faits, à l'aide ı sirop contenant une grande quantité de goudron, essais qui ıvaient, qu'administré à l'intérieur, cette substance était sans ıs sur les affections squameuses. Nous rapporton ıci l'obser- on de cette malade.

ɯriasis *chronique*. — Métivier Anaïs, dix-sept ans, ouvrière aux tabacs, ne de Lowendal, 55, dixième arrondissement, née à Paris, fille. — Con- tion lymphatique, réglée régulièrement, mais peu abondamment. — Il y a re ans, première apparition de plaques psoriasiques aux genoux et aux ies. Elle a été traitée à cette époque chez M. Bazin à Saint-Louis, par la nade au goudron, les bains de vapeur et alcalins. Le traitement fut suivi ıélioration, mais les plaques ne disparurent pas complétement. L'hiver ı s'effaçaient en partie, puis reparaissaient vers l'été. Cette année l'amé- tion n'ayant pas paru pendant l'hiver, M.... rentre à l'hôpital. — 4 mars ł. Larges plaques de psoriasis sur les genoux, la partie antérieure et supé- re des jambes, s'étendant par la partie externe des jambes pour gagner la ie postérieure. Quelques plaques à la partie externe des cuisses, de la ɯr de la paume de la main ou à peu près; une plaque sur les lombes; ı sur chacun des coudes. Surfaces couvertes de squames blanchâtres, fond ge, saillant, peau épaissie donnant la sensation du cuir. Un peu de déman- ıon. Sensibilité dans les mouvements imprimés à la peau. — Prescription. ıion; sirop de goudron une cuillerée à bouche matin e soir; bains de

8° Il faut craindre d'employer l'arsenic chez [illegible] gagné en p[illegible] d'affections catarrhales chroniques de la poitr[illegible] fréquemment, [illegible] plus forte raison s'il s'agit d'un jeune hom[illegible] [illegible] que leur ha[illegible] à membres grêles, où l'on ait à supposer l[illegible] veux, larges comme en[illegible] loppement de tubercules. [illegible] du bras droit et à [illegible] — 13 avril. Le rém[illegible]

9° Il est, au contraire, des individus qu[illegible] reste la rougeur à dimin[illegible] l'arsenic ; les femmes nous semblent sou[illegible] il n'y a pas de nouvea[illegible] tage marqué sur les hommes. [illegible] ave, ainsi que la sensibil[illegible]

J'ai exposé (pag. 130 et suiv.) les acc[illegible] [illegible]llerées de sirop. — 25 avril. [illegible] gner l'administration de l'arsenic [illegible] [illegible]in et soir depuis deux jours, [illegible], les plaques s'étendent et a[illegible] l'ensemble de l'économie en général [illegible] [illegible]e, en même temps que de nou[illegible] à quelle dose il fallait l'employer, j[illegible]ent, les anciennes se nettoie[illegible] ai fait autant pour les préparation[illegible] — Solution minérale de[illegible] suiv.). J'ai de plus, lorsque j'ai [illegible] à douze, en augmentant d'un[illegible] meuse, exposé les méthodes ent[illegible] petites (*psoriasis guttata*) m[illegible] mettre en usage ; il me reste d[illegible] cuisses, surtout du côté de l'e[illegible] tuer la thérapeutique du psori[illegible] [illegible]ent maintenant malades de[illegible]

D'après les propositions qu[illegible] coudes et des genoux ont rep[illegible] peut être traité par des moye[illegible] [illegible]ser de se recouvrir de squam[illegible] externes et une médication [illegible]. Sur le corps la maladie n'a f[illegible] cation interne seule. Tout[illegible] forment moins vite et en moi[illegible] des effets de l'agent inte[illegible] dimensions et fines. Les plaqu[illegible] qu'il s'abstienne de tout[illegible] elle sont plus souples. La couleur [illegible] même ; mais il est rar[illegible] de nouvelles taches psoriasiqu[illegible] [illegible] bonne, pas de démangeaiso[illegible] bains. Nous préférons [illegible] [illegible] les trois mois les plu[illegible] huile de noix d'acajou que M. [illegible] jours (voy. Bains su[illegible] de mettre en usage. On sait q[illegible] alcalins, lorsque le[illegible] colonies pour combattre les m[illegible] vapeur. [illegible] servent souvent pour la moind[illegible]

La médication [illegible]. J'ai dû m'adresser à des m[illegible] et de pommade[illegible] résistaient au goudron pur e[illegible] celles qui ont [illegible] succès. L'application [illegible] blanc. La do[illegible] sur une assez large surface, do[illegible] l'usage vo[illegible] [illegible]ment de brûlure souvent co[illegible] et de l'ancie[illegible] de la peau ; j'ai dû y renonc[illegible] malades au [illegible] incorporant l'huile de ro[illegible]

sans succès, ils irritent le plus souvent et ne guérissent pas. A les eaux des Pyrénées n'ont-elles aucune valeur dans cette mala je ne connais même pas d'eaux minérales qui guérissent cette a tion ; j'en excepterais peut-être les bains de mer, qui comptent q ques succès. Je fais une réserve pour le psoriasis à forme compo ainsi qu'on va le voir plus loin.

Tel est l'ensemble des médications qui comportent le plus succès dans le traitement du psoriasis général. Il est important d'é cider la question de savoir celle à laquelle le médecin doit accord le plus de confiance. En 1848, je fis faire le relevé des antécéde de seize malades affectés de psoriasis qui se trouvaient à ce m ment réunis dans nos salles ; il devait être continué de manière être établi sur une plus grande échelle ; cela n'a pas été fait. Ve toutefois à quelles données nous avons été conduit par rapport ces treize malades, qui avaient passé par divers services ; ainsi le 1er comptait 7 récidives ; le 2e, 6 ; le 3e, 5 ; le 4e, 3 ; le 5e, 3 ; le 6e, 3 ; le 7e, 6 ; les 8e, 9e, 1 ; le 10e, 2 ; le 11e, 4 ; le 12e, 5 ; le 13e et le 14e, 2 ; le 15e, 7 ; le 16e, 1. Il en est dont le premier traitement remontait à 1823 ; en sorte que ces divers malades avaient successivement passé par les services de Biett, d'Alibert, de Lugol, de MM. Emery, Gibert, Cazenave et le mien. Voici maintenant le laps de temps pendant lequel la guérison s'est soutenue depuis les diverses médications mise en usage.

Solution de Fowler. — 4 traitements, 4 guérisons. — Durée de la guérison.	1 an. 2 ans. 2 ans 1/2. 4 ans.
Solution minérale. — 2 insuccès, 4 guérisons. (C'est la solution de Fowler étendue d'après ma formule.) — Durée de la guérison.	8 mois. 9 mois. 1 an 1/2. 4 ans.
Solution de Pearson. — 1 traitement, 1 insuccès.	
Liqueur acide de M. Gibert. — 1 traitement, 1 guérison. (C'est une solution arsenicale.) — Durée de la guérison.	4 mois.
Pilules arsenicales. — 3 traitements, 1 insuccès. — Durée de la guérison.	3 mois. 6 ans.
Goudron. — 12 traitements, 6 insuccès. — Durée de la guérison.	6 semaines. 6 mois. 6 mois. 1 an. 2 ans. 2 ans 1/2.

Teinture de cantharide. — 2 traitements, 1 insuccès. — Durée de la guérison.	3 ans.
Iodure de potassium. — 1 traitement, 1 guérison. — Durée de la guérison.	4 ans.
Sulfureux. 2 traitements, 1 insuccès. — Durée de la guérison.	5 ans.

Que si l'on additionne la durée de la guérison des traitements par les préparations arsenicales comparée à la durée de la guérison dans le cas d'emploi de goudron, on arrive aux résultats suivants : Onze traitements par l'arsenic donnent vingt-trois ans de guérison ; six traitements par le goudron donnent six ans et sept mois de guérison. La différence en faveur des préparations arsenicales est donc du double ; peut-être même arriverait-on à un chiffre meilleur si le relevé, au lieu de porter sur des malades en petit nombre qui ont été traités à des époques déjà éloignées de nous, avait été fait sur des malades traités plus récemment. La différence qui existe entre un traitement purement externe et un traitement interne, est tellement anormale pour les malades eux-mêmes, que lorsqu'ils ont été seulement mis à l'usage du goudron ou des pommades, ils disent qu'ils ont été *blanchis*.

Une autre méthode générale qui compte quelques succès, surtout chez les personnes délicates, c'est l'hydrothérapie ; on sait qu'à Paris les premiers essais en ce genre ont été faits par M. Wertheim, à l'hôpital Saint-Louis, dans le service de M. Gibert et dans le mien. Des psoriasis de toute date ont été traités par la sudation à l'aide du drap mouillé et l'immersion dans l'eau froide ; on a obtenu quelques succès sur des psoriasis anciens comme sur des psoriasis récents. Cette méthode a l'avantage d'améliorer la santé générale et de guérir en même temps l'affection cutanée : dans deux circonstances elle a fait paraître à la peau une syphilide, à l'instar des eaux des Pyrénées qui fort souvent mettent à nu un principe syphilitique caché.

Mais quel que soit le traitement mis en usage, la maladie sera d'autant plus mise à l'abri de récidives, qu'il aura été plus complet. Ainsi il ne suffit pas d'arriver à la disparition des plaques squameuses ; il faut d'abord qu'elles disparaissent *toutes*, et ensuite que la peau rentre dans son état tout à fait naturel ; il faut, quand on

emploie les préparations arsenicales, obtenir les taches brunes que nous avons fait connaître, et continuer même le traitement un mois après les avoir obtenues. A cet égard il est mauvais d'allier ensemble la méthode externe et la méthode interne. Si l'on guérit plus vite, on guérit moins sûrement; il est rare même d'obtenir les taches arsenicales lorsque l'on traite à l'extérieur par le goudron et à l'intérieur par l'arsenic. On va plus vite peut-être, mais on va moins sûrement; le traitement d'un psoriasis exige presque toujours deux mois à trois mois de durée, et souvent plus quand le psoriasis est ancien (voy. MÉDICATION ARSENICALE).

Quelle que soit la méthode par laquelle on arrive à la guérison d'un psoriasis, ce n'est qu'à l'aide d'une hygiène longtemps observée que l'on peut éviter aux malades des récidives. Ces soins hygiéniques consistent, suivant nous, à graisser largement la peau avec du saindoux ou de l'axonge une fois par semaine durant huit ou dix mois; à prendre aussi par semaine un bain qui, pendant la saison chaude, sera alcalin, et de vapeur durant la saison froide, afin de faire fonctionner complétement la peau pendant la saison où la transpiration est généralement supprimée. Le malade doit, en outre, éviter les excès de tout genre et observer longtemps cette hygiène, sauf à la suivre moins sévèrement pendant plusieurs années.

Le traitement des *psoriasis composés* diffère des précédents. Ainsi, quant à ce qui concerne l'*eczéma psoriasiforme*, on ne peut lui appliquer, comme traitement externe, des pommades aussi fortes que pour le psoriasis, sans quoi on l'exaspère et on le fait sécréter; il faut s'adresser à des pommades au cinquantième ou au quarantième de goudron et d'huile de cade, et souvent les faire précéder de pommades au tannin et à l'oxyde de zinc. Dans cette variété, les préparations arsenicales réussissent à merveille.

Quant à l'*herpès psoriasiforme*, c'est une tout autre médication. Il réclame les sulfureux sous toutes les formes de préférence aux préparations arsenicales; les eaux minérales sulfureuses le guérissent très souvent, et lorsque la guérison n'est pas tout à fait complète par ces agents, on la parfait alors à l'aide des préparations arsenicales. Voici un fait qui prouve la supériorité de cette méthode: « Un malade nous a été adressé, il y a trois ans, par un de nos très

honorables collègues des hôpitaux de Metz; il avait cette affection aussi généralisée que possible; l'arsenic et plusieurs autres traitements avaient été employés sans succès pour la combattre. Entré par hasard à l'hôpital dans un service autre que le mien, il fut mis à la médication par l'huile de cade, mais sans succès. Ce fut alors qu'il demanda à venir dans notre service. Je reconnus facilement la forme composée de psoriasis dont il était atteint; le traitement sulfureux fut employé dans son ensemble tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en six semaines la disparition de l'affection était complétement obtenue. C'est néanmoins, il faut bien le reconnaître, une des formes les plus rebelles du psoriasis, et les détails que nous avons donnés à l'égard de l'herpès, le fait tout particulier d'herpès psoriasiforme que nous y avons cité en sont la preuve la plus évidente.

Il nous reste à faire connaître les particularités de traitement qui concernent les psoriasis locaux. Ce n'est guère que par des topiques que l'on guérit les *psoriasis palmaria* et *plantaria :* l'arsenic même, qui dans quelques cas réussit, échoue le plus souvent. C'est donc aux pommades aidées des bains alcalins qu'il faut recourir, à l'usage de gants de fil la nuit pour pouvoir maintenir les corps gras en contact avec la peau et, quand cela se peut, le jour même; ce qui réussit fort bien, surtout dans ces psoriasis, ainsi que dans celui des ongles, c'est de coucher, la nuit, les mains dans de la laine grasse, c'est-à-dire, avec son suint. On ne saurait se faire une idée de l'influence de ces auxiliaires sur la peau : quant au *psoriasis capitis*, il réclame essentiellement une médication générale, tout en appliquant des pommades convenables, coupant les cheveux, employant des lotions alcalines répétées et des bains de vapeur. Voici maintenant quelques observations de variétés de psoriasis.

Psoriasis guttata des membres. — Moiron, jardinier, âgé de vingt ans, entré le 24 mai, sorti le 29 août 1843; transmission nulle, cependant son frère a eu des dartres farineuses; constitution forte.

Il y a neuf mois, *psoriasis guttata*, guéri en quatre mois, dans le service de M. Gibert, par les bains de vapeur, lotions chlorurées, et à l'intérieur, la solution d'arséniate d'ammoniaque de Biett. Deux mois de guérison; antécédents inconnus, comme la première fois.

La maladie a reparu il y a trois mois; au début, petits boutons qui depuis se sont étendus de manière à former des petites plaques rouges arrondies, recouvertes de squames nacrées. Ces petits boutons ont paru d'abord au coude, puis au genou et sur les membres seulement. Il y a trois mois, deuxième récidive ; depuis le poignet jusqu'au-dessus du coude, depuis le cou-de-pied jusqu'à la partie supérieure de la cuisse. Forme squameuse : sur toutes les surfaces des membres, mais surtout aux parties externes et dans le sens de l'extension, on voit de nombreuses plaques, larges de 4 ou 5 millimètres à 1 centimètre de diamètre; elles sont très nombreuses au coude et au genou et rapprochées de manière à se confondre presque. Ces petites plaques rouges, sont arrondies, saillantes, dures et recouvertes généralement de squames blanches, brillantes, nacrées, tombant difficilement et seulement par le frottement des écailles minces et sèches.

29 mai. Toutes les squames sont tombées sous l'influence des bains et des frictions avec l'axonge ; administration de la solution de Fowler. Trois fois pendant le traitement on a suspendu cette solution pour accidents généraux ; à sa sortie, la peau est saine, mais colorée en brun dans les points qui ont été malades.

Psoriasis guttata général. — Minthe, terrassier, âgé de vingt-huit ans, entré le 31 mai, sorti le 5 septembre 1843 ; d'un tempérament sanguin, d'une constitution forte. Antécédents : il y a quatre mois, sans cause connue, la maladie apparut d'abord sur les bras, puis sur les jambes et enfin sur le tronc. Elle débuta par des petits boutons qui farinaient, surtout lorsqu'on les touchait ; ces petits boutons s'étendirent peu à peu et formèrent des petites plaques arrondies. Démangeaisons instantanées et légères. Toute la surface cutanée, excepté la face, le cou et le cuir chevelu, est le siége de petites plaques rouges, de 1 à 2 centimètres, arrondies, élevées au-dessus de la peau et recouvertes de squames sèches, blanchâtres, nacrées, qui par le frottement tombent en furfures. Ces squames sont sèches ; il y a peu de démangeaisons, elles sont seulement instantanées. Ces plaques squameuses sont beaucoup plus nombreuses à la surface externe des membres qu'à la surface interne, où il y en a à peine.

Dans certains endroits, ces plaques squameuses sont confondues et forment une seule et même plaque, circonscrite par un bourrelet peu saillant. Sous l'influence du traitement et surtout des bains alcalins, pris tous les deux jours pendant son traitement, ainsi que de l'emploi de la pommade de goudron à l'extérieur, les squames sont tombées peu à peu, les plaques se sont affaissées et leur coloration a diminué en commençant d'abord par le centre. A sa sortie, la peau est parfaitement saine.

Psoriasis de la face. — Leveau, musicien, âgé de vingt ans, entré le 25 octobre, sorti le 19 décembre 1843 ; transmission nulle. Parents exempts de toute maladie de peau ; tempérament lymphatique, constitution médiocre.

Il y a deux ans et demi, il a eu un écoulement, traité par la tisane d'orge

[illegible] bains émollients locaux. Cet écoulement a duré six mois, avec sa dispa[illegible] a coïncidé l'invasion du psoriasis. Depuis cette époque la maladie a été [illegible]; il a fait plusieurs traitements, tous sans succès; fumigations sulfu[illegible], homœopathie, pommade grise. Les joues ont commencé à être ma[illegible], c'étaient d'abord des plaques rouges avec quelques démangeaisons, puis [illegible] y est survenu des squames; il n'y a que cinq mois que le nez a été envahi, [illegible] l'affection occupe le nez et les joues.

A son entrée, il offre un psoriasis caractérisé par des plaques rouges, couvertes d'écailles larges, blanches, chatoyantes, très sèches et minces. Les joues sont affectées seulement dans leur tiers interne, la gauche plus que la droite; sur cette dernière la maladie ne descend pas plus loin que l'aile du nez; sur la gauche, elle va jusqu'à la commissure labiale. Elle remonte des deux côtés jusque près des yeux, mais sans les atteindre; le nez est affecté dans ses deux tiers supérieurs, et des deux côtés le psoriasis s'unit à celui des joues. Il y a en même temps sur la face un certain nombre de pustules d'acné; point de psoriasis sur d'autres points du corps. Coudes et genoux [illegible].

Traitement par l'arsenic.

30 octobre. Amélioration déjà très notable; moins de rougeur, moins de saillie des plaques.

6 novembre. Le psoriasis a pâli partout, il s'efface déjà dans certains points du centre à la circonférence.

9 novembre. Au lieu de la large plaque qui existait à l'entrée du malade, il en existe plusieurs, séparées les unes des autres.

25 novembre. Il ne reste plus des plaques du psoriasis qu'une teinte très faible; il ne se forme plus de squames.

5 décembre. La pommade au bichloro-iodure a fait depuis quelques jours rougir ces parties malades et a déterminé une véritable inflammation; on la remplace par de l'axonge.

La rougeur disparaît les jours suivants et le malade sort guéri le 19.

Herpès psoriasiforme. — Dibory (Antoine), menuisier; tempérament lymphatique.

A l'âge de dix ans il fut atteint d'une affection tout à fait semblable à celle qu'il porte maintenant; il entra à l'Enfant-Jésus, il y resta pendant deux ans. Pendant son séjour dans cet hôpital il lui survient une fièvre cérébrale, et c'est en guérissant de cette dernière maladie, qu'il guérit en même temps de son affection cutanée. La guérison s'est maintenue pendant seize ans environ, et pourtant le malade a fait dans cet intervalle des voyages de long cours; il est soumis au régime des marins sans éprouver rien qui annonce une nouvelle recrudescence. Depuis trois ou quatre mois la maladie est revenue, peut-être son retour est-il dû aux excès que fait parfois le malade et peut-être aussi aux privations qui succèdent.

La maladie est maintenant étendue à toutes les surfaces du corps. Au milieu de grandes plaques rouges rugueuses, recouvertes d'écailles épidermiques furfuracées, on rencontre comme de petites papules rouges arrondies, recouvertes aussi d'une écaille qui tombe. C'est par ces petites élevures que la maladie a commencé, bientôt elles se sont agrandies, pour former des plaques de la largeur d'une pièce de 50 centimes, dont les unes isolées, peu saillantes, se remarquent surtout sur le dos et un peu sur la partie antérieure de la poitrine, la face interne des cuisses; tandis que les autres, se réunissant par leur circonférence, forment de larges plaques irrégulièrement dessinées et qui me paraissent n'avoir rien de particulier pour le siége. Ces plaques, de grandeur différente, sont, de même que les taches qui les constituent, peu saillantes, rouges et recouvertes d'un épiderme que le frottement enlève par petites écailles. Sur la face, le front et dans le cuir chevelu, on en trouve encore, et dans ces parties elles sont moins apparentes, à cause de la finesse de la peau. *Elles sont toutes entourées d'un bourrelet saillant.*

Le malade éprouve, surtout sur la face antérieure des jambes, des démangeaisons si vives qu'il se gratte de manière à faire sortir le sang; aussi voit-on que par place l'épiderme a été enlevé avec les ongles. Traitement par la solution de Fowler; guérison avec coloration de la peau.

Eczéma psoriasiforme. — Boucher, charretier, âgé de soixante et onze ans, vigoureux. Un mois avant l'entrée, des boutons se montrent aux cuisses, à la partie interne et supérieure; démangeaison, rougeur, sécrétion roussâtre, qui tachait le linge et l'empesait. Quelques jours après, une pareille éruption se manifeste au nombril; puis bientôt sous l'aisselle, et enfin à la face palmaire des mains et à la face plantaire des pieds. Mais aux mains il n'y avait pas de sécrétion; la maladie gagna peu à peu. Une vaste plaque occupe à la fois la région hypogastrique, les aines, la verge tout entière, les bourses, la face interne et supérieure des cuisses dans une hauteur d'environ 1 décimètre, le périnée, la marge de l'anus, la partie interne des fesses et leur face postérieure jusqu'à 6 ou 7 centimètres du sillon en remontant à la moitié de la région sacrée. Au nombril, plaque régulièrement ellipsoïde de 5 centimètres de diamètre transversal sur 2 en hauteur; à l'aisselle, plaque qui en occupe toutes les parois et qui contourne même un peu en avant le bord de la saillie du grand pectoral. Ces plaques sont rouges, épaissies, couvertes de larges squames à demi détachées, transparentes, molles, humides; démangeaisons vives, sécrétion séreuse assez abondante pour tacher ou plutôt empeser le linge. Toute la face palmaire des mains et un peu la face dorsale des doigts, surtout au niveau des articulations, sont occupées par une seule plaque qui n'offre que de la rougeur, de l'épaississement, de larges squames sèches, opaques, blanches; il y aussi de la démangeaison. La plaque de la face plantaire des pieds offre exactement les mêmes caractères que celle des mains; seulement les squames sont plus épaisses, plus dures; elle est bornée à la face plantaire. — 17 janvier. Diminution de la rougeur et de la sécrétion au

arties génitales, au nombril, aux aisselles ; desquamation considérablement iminuée dans ces mêmes parties. Aux mains et aux pieds il ne reste plus u'une rougeur violacée, peu sensible, l'épaississement et la desquamation ont diminués : démangeaisons beaucoup moins fortes.

31 janvier. Les mains et les pieds sont guéris, la rougeur, la démangeaison ont considérablement diminuées, la sécrétion y est presque nulle, la plaque u nombril et les autres ont diminué de largeur en allant de la circonférence u centre. — 14 février. Le malade sort : la plaque du nombril ne consiste ue dans une rougeur un peu plus foncée que la couleur normale de la peau. A la partie interne des cuisses il reste une rougeur violacée sans démangeaison, sans sécrétion, sans état furfuracé appréciable. Les aisselles sont dans le même état que la partie interne des cuisses, à l'exception d'une légère démangeaison.

Lepra vulgaris. Dartre furfuracée arrondie, herpès furfureux circiné d'Alibert.

Le mot *lèpre* devrait être aujourd'hui exclusivement réservé à une maladie contagieuse des Grecs et des Arabes qui n'apparaît que rarement dans nos climats. Il a été appliqué par Willan à une variété d'affection squameuse, par cette raison que la disposition des squames est arrondie, plus ou moins circulaire et se rapprochant ainsi de ce que les Grecs ont décrit sous cette dénomination. Les modernes ont conservé ce nom fort impropre qui s'applique en général à tout ce qui est contagieux, à tout ce qui est d'un aspect repoussant ; or la lèpre vulgaire que nous allons décrire est loin de rentrer dans cette catégorie d'affections. De plus, Willan a adopté rois variétés dans cette maladie, *vulgaris*, *alphoïdes*, *nigricans*. La orme alphoïde n'est basée que sur la blancheur éclatante des écailles, les squames, surtout chez les enfants, différence bien naturelle à et âge, car toute maladie squameuse chez l'enfant très jeune rentre lans cette condition ; quant à la lèpre noirâtre ou brune, il y a eu quelque erreur de la part de Willan ; nous n'avons jamais rien vu de emblable. M. Cazenave regarde cette affection comme une syphilide ; d'autres auteurs en nient l'existence. Il y a plus, M. Gibert considère le *lepra vulgaris* comme ne constituant pas une espèce morbide et comme n'étant autre chose qu'une variété de forme du psoriasis. Pour moi, non-seulement j'admets l'existence du *lepra*

vulgaris, mais encore j'ajoute que tous les dermatologistes l'ont peu ou mal décrit; ils l'ont confondu, à l'instar d'Alibert, avec le *psoriasis herpétiforme* que nous avons fait connaître comme forme composée du psoriasis. Aussi Alibert lui a-t-il donné le nom d'*herpès furfureux circiné*. Dans toutes ces descriptions il nous semble qu'il y a des erreurs commises; nous allons donc donner les caractères distinctifs de ce que l'on doit entendre par *lepra vulgaris*. Nous ajouterons seulement que quoique exigeant à peu près le même traitement que le psoriasis, l'affection en diffère et par la forme et par l'époque de la vie à laquelle elle se développe, et par la facilité avec laquelle elle se guérit.

Le *lepra vulgaris* se montre de préférence sur le tronc et notamment dans sa région antérieure, première différence essentielle. Il peut apparaître dans les premiers temps de la vie, aussi l'observe-t-on quelquefois dans l'âge le plus tendre; on le voit presque toujours se développer dans les premières années. Quand, au contraire, il constitue une complication du psoriasis et qu'il coïncide avec lui, ce n'est que plus tard qu'il se développe.

Comme le psoriasis, il naît par une petite rougeur squameuse qui s'élargit assez rapidement et se dispose en *fer à cheval*, c'est-à-dire que, comme Willan l'avait fait observer, il a une forme ovoïde, il représente une anse ovale dont un segment manque, ce segment étant formé par la peau saine. En cet état il s'élargit peu et n'a que la dimension de 2 à 3 centimètres de diamètre au plus. Nous avons dessiné dans nos planches un exemple de cette forme. M. Cazenave s'est donc trompé quand il a décrit le *lepra vulgaris* comme représentant des cercles qui peuvent prendre une étendue très considérable et se confondre entre eux, c'est là le caractère du *psoriasis herpétiforme*.

L'affection n'amène aucune démangeaison. Arrivée à cet état de développement, elle se multiplie mais ne s'accroît pas dans ses plaques. Elle ressemble donc, sauf la forme, le siége et l'époque de la vie à laquelle elle s'est développée, au psoriasis.

Ainsi, on peut dire qu'il existe quatre affections squameuses à forme orbiculaire: le psoriasis nummulaire ou en plaques arrondies, mais sans bourrelet à la circonférence; l'herpès psoriasiforme

n plaques nummulaires sans dégagement de peau saine au centre, mais *terminée* à la circonférence par un bourrelet ; l'herpès psoriaforme en plaques arrondies terminées par un bourrelet, mais avec *peau saine au centre ;* et enfin le *lepra vulgaris* à plaques ovales, dégagées à leur centre, où la peau est saine, mais ayant un segment e leur circonférence qui manque, de manière à figurer un fer à heval.

La marche de l'affection est la même que celle du *psoriasis.* Sa urée est moins longue ; il n'est pas rare de voir le *lepra vulgaris* uérir seul, et les agents modificateurs du psoriasis en font justice vec beaucoup plus de facilité. Nous n'avons donc rien à dire sous e rapport thérapeutique ; ce sont les mêmes moyens à conseiller, mais il faut donner aux parents beaucoup plus d'espoir de guérison, cette affection étant plus facilement curable et moins sujette à récidive.

Elle n'est d'ailleurs pas très commune, et c'est à cette cause qu'il faut attribuer les variations dans les opinions émises par les dermatologistes à son sujet.

ICHTHYOSE.

Blanche.	Brune.
Farineuse.	Porc-épic.
Écailleuse.	
Nacrée serpentine.	
Nacrée cyprine.	

Cette dénomination a été employée par les anciens pour désigner ne maladie squameuse qui, à un degré très avancé, peut donner la peau une physionomie toute particulière et plus ou moins analogue à la peau des poissons.

L'affection, essentiellement héréditaire, est généralement incurable, pour ne pas dire absolument incurable. Certains auteurs ont apporté quelques faits de guérison d'ichthyose locale ou même 'ichthyose générale. Mais d'abord, dans l'état actuel de la science, n ne saurait admettre l'existence d'ichthyoses locales ; ensuite il st très probable, et c'est aussi l'opinion des dermatologistes modernes, que les cas d'ichthyose générale qui ont été guéris n'étaient as des ichthyoses.

Alibert, qui s'est beaucoup occupé de cette maladie, a admis des variétés sans aucun intérêt, car elles sont fondées sur une ressemblance plus ou moins éloignée avec tel poisson, telle ou telle espèce d'écorce d'arbres. Rien de plus inutile que ces distinctions, à moins qu'elles ne rappellent une ressemblance très frappante avec un objet connu, de manière à faciliter le diagnostic de la maladie. Mais il n'en saurait être ainsi qu'à l'égard de l'ichthyose porc-épic dont la dénomination fondée indique tout de suite le genre d'altération qui existe à la peau. Le mot ichthyose exprime d'ailleurs suffisamment les autres variétés de cette maladie pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'établir des divisions.

Pour nous, nous en distinguons trois espèces principales: l'ichthyose blanche, l'ichthyose brune et l'ichthyose porc-épic. — L'ichthyose blanche se présente sous trois formes distinctes: dans la première, qui n'est pas appréciable à première vue, la peau est seulement farineuse; frottée en divers sens, il s'en détache une poussière beaucoup plus appréciable quand on promène du drap foncé sur ce tissu. Il faut graisser la peau pour qu'elle devienne lisse. Dans une seconde espèce d'ichthyose blanche, la peau est recouverte d'écailles ou lames épidermiques *nacrées* tellement larges et rapprochées que cette peau a quelque analogie avec celle des poissons; mais il faut bien le dire, il est extrêmement rare qu'elle présente cet aspect sur toute la surface du corps; on ne la trouve ainsi que sur les avant-bras, les jambes et quelquefois les bras et les cuisses. Cependant il existe dans le musée anatomique de Berlin un fœtus monstrueux dont toute la surface du corps est recouverte d'une couche épaisse d'épiderme. La troisième espèce tient le milieu entre les deux précédentes, en ce sens qu'il existe des nuances intermédiaires très variées. De là les dénominations d'ichthyoses nacrée serpentine, nacrée cyprine. Le cachet de ces trois états a des degrés différents; c'est l'aspect incolore des productions épidermiques. Ajoutons enfin que, dans ces diverses sortes d'ichthyoses, toute la surface de la peau est plus ou moins habituellement atteinte, voire même la figure. Je n'admets pas l'existence de ce que les auteurs ont appelé ichthyose locale. L'ichthyose est toujours une maladie générale de la peau; elle ne se montre jamais par plaques limitées,

circonscrites, comme le psoriasis ou la lèpre vulgaire; elle est toujours diffuse, et quand un membre ou une étendue plus ou moins considérable d'un membre en est affectée, les trois autres membres le sont à peu près au même degré. On serait porté à croire, d'après la description qui a été faite de cette ichthyose locale, que l'on pourra trouver une plaque d'ichthyose sur un point donné de la surface du corps comme on trouve une plaque de psoriasis ; c'est là une erreur qu'il fallait détruire.

L'ichthyose brune n'a aucune ressemblance avec l'ichthyose blanche. Elle représente une production épidermique de couleur gris brun qu'au premier abord on pourrait prendre pour de la malpropreté; mais en passant la main sur cette surface, on sent qu'il s'y est produit un épiderme dur comme de la corne, cassé, fendillé régulièrement, ce qui tient à des conditions particulières que nous signalerons tout à l'heure.

Cette affection, contrairement à l'ichthyose blanche, ne siége en général qu'autour des genoux, au creux des jarrets, au pli de flexion de la jambe avec le pied, aux coudes et aux poignets; mais ce sont surtout les genoux et les jarrets qui sont atteints. Elle peut, comme l'ichthyose blanche, remonter aux premiers mois de la vie, mais en général elle se développe un peu plus tard.

Voici donc ce que l'on observe à cet égard, en supposant que l'enfant soit arrivé à douze ou quinze ans, c'est-à-dire où la forme morbide a acquis tout son développement. Toute la peau de la partie antérieure du genou, la rotule comprise, jusqu'au quart inférieur de la cuisse en haut, et au quart supérieur de la jambe en bas, est tapissée de cette matière cornée gris brunâtre que nous avons indiquée. Elle est divisée en un nombre plus ou moins considérable de petites lamelles quadrilatères placées les unes à côté des autres, et disposées symétriquement sous des zones plus ou moins courbes et concentriques à la rotule. Ces lamelles juxtaposées ont de 1 à 3 millimètres au plus de diamètre. Elles vont en diminuant d'épaisseur vers la cuisse et la jambe ; même disposition au creux du jarret, et là où elles se perdent avec la peau saine, celle-ci devient rugueuse comme dans l'ichthyose farineuse.

La disposition en ligne courbe est une conséquence des mouve-

ments d'extension et de flexion que l'articulation éprouve et qu'elle fait subir à la peau, en sorte que, si l'on vient à faire tomber par des corps gras toute la production épidermique, on trouve la surface de la peau sillonnée de plicatures correspondant à la disposition linéaire des écailles. Cet état dure toute la vie et il ne peut devenir que plus prononcé avec l'âge.

Quelques dermatologistes, M. Rayer notamment, voient dans ces ichthyoses une maladie des papilles de la peau et un développement exagéré de ces papilles. Nous ne saurions partager cette opinion, et nous croyons que les organes sécréteurs de l'épiderme sont seuls malades.

Quant à l'ichthyose *porc-épic*, [illegible]ts suivants en fournissent le type le plus prononcé [illegible] dans le comté de Suffolk, en Angleterre, un ho[illegible] u[illegible]na le nom d'*homme porc-épic*. Toute la surface d[illegible]s [illegible]rgée d'excroissances en forme de piquants ; le visag[illegible] mains et la plante des pieds étaient les seules parties [illegible]t exemptes. Ces appendices, d'un brun rougeâtre, [illegible]astiques, au point de faire du bruit lorsqu'on promenait la main [illegible]ur surface. Ces piquants, développés deux mois après la naissance, tombaient chaque hiver pour reparaître au printemps. Cet homme, au reste, se portait très bien ; il a eu six enfants qui ont tous été couverts des mêmes excroissances. Deux frères d'une famille du nom de Lambert ont été observés par Geoffroy Saint-Hilaire ; l'un était âgé de vingt-deux ans, l'autre de quatorze. L'aîné avait le corps entièrement épineux, si l'on en exceptait la tête et le dedans des mains et des pieds. Le cadet était nu dans quelques endroits, particulièrement à la poitrine ; mais des taches brunes indiquaient assez qu'il deviendrait avec l'âge aussi couvert d'épines que son frère. Les épines sur le dessus de la main étaient très larges et pouvaient être comparées pour leur diamètre aux tuyaux des porcs-épics ; celles qui entouraient les mamelles ressemblaient davantage à des écailles. C'étaient de petites lames longues, très nombreuses, extrêmement rapprochées, et qui étaient verticalement implantées dans la peau. Cet épaississement de l'épiderme était l'effet d'une maladie qui s'était transmise par voie d'hérédité, mais seulement de mâle en mâle. On comptait déjà

cinq générations atteintes de ce vice de conformation (*Bulletin des sciences de la Société philomatique*, n° 67, an II de la république).

Tels sont les caractères des diverses espèces d'ichthyose qui ne pourraient être confondues qu'avec les variétés de psoriasis ou avec le *lepra vulgaris*. Mais il est deux signes particuliers qui servent toujours à les en distinguer. 1° L'ichthyose est toujours diffuse; elle ne se présente jamais par plaques isolées; la maladie n'a pas de limite arrêtée; elle se perd avec la peau saine par une décroissance insensible. 2° Faites tomber la production épidermique quelle qu'elle soit, et vous trouverez au-dessous la peau saine. Dans les autres affections squameuses, au contraire, la peau est toujours malade et plus ou moins rouge. C'est pour cela que nous avons reproduit dans nos planches deux exemples de psoriasis, l'un avec son épiderme, l'autre avec sa peau rouge dépourvue d'épiderme. L'absence de toute inflammation de la peau est donc un caractère distinctif très puissant pour éviter de confondre l'ichthyose avec une maladie du même genre.

Nous avons dit que cette affection était essentiellement héréditaire et transmissible de génération en génération, sautant quelquefois par-dessus une génération pour se reproduire dans la suivante. Nous ajouterons que l'ichthyose est généralement une maladie incurable. Les exemples de curabilité de cette maladie rapportés par les auteurs ne présentent rien de certain, surtout à l'aide des moyens externes ou internes de fort peu d'énergie qui ont été employés.

Cette circonstance, admise et reconnue par tous les dermatologistes de nos jours, doit conduire le médecin à édifier les parents à cet égard. L'avenir des enfants y est attaché. Il faut qu'une famille sache qu'une jeune personne est vouée à une infirmité; qu'en la mariant il y a tout lieu de craindre qu'elle ne transmette à ses enfants la maladie dont elle est atteinte. Qu'il en est de même d'un enfant du sexe masculin; qu'à l'égard de celui-ci comme de celle-là, il y a peut-être lieu de diriger leur éducation en vue d'un avenir tout spécial qui leur est naturellement réservé. C'est donc là une question de moralité pour le médecin; nous n'avons jamais manqué

de remplir ce pénible devoir toutes les fois que nous avons été consulté pour des cas de ce genre. Il est entendu qu'il s'agit ici d'ichthyose bien dessinée et très étendue.

Cependant divers praticiens ont préconisé des traitements tant internes qu'externes, tous puisés dans l'usage des pommades de tout genre, qui peuvent être employées contre les affections de la peau. On a notamment insisté sur le goudron à l'intérieur et à l'extérieur, sur les préparations mercurielles, alcalines, etc. Il faut bien le dire, on s'est fait illusion. Si quelque chose pouvait réussir, ce serait l'arsenic, or l'arsenic échoue dans la presque totalité des cas.

Mais il est des p[illegible]ons qui en font disparaître les inconvénients, à la co[illegible]mployer toujours. Il faut excepter l'ichthyose [illegible]ue nous allons conseiller. Il suffit de graisser la [illegible]avec une pommade alcaline (voy. *Formulaire*), et a[illegible] quelques bains alcalins, pour voir disparaître toute [illegible]r une peau lisse qui, à l'aide d'onctions simplement graiss[illegible]étées tous les deux jours, conserve sa souplesse et sa do[illegible]oment que l'on cesse l'usage de ces moyens, que l'on rend moins incommodes en ne faisant l'application graisseuse que tous les six ou huit jours, on perd le bénéfice des soins primitivement donnés à la peau. Ces agents doivent être mis en usage dès l'enfance, car si on laisse s'accumuler les années, les écailles d'ichthyose blanche ou brune laissent leurs empreintes sur la peau, et il n'est plus possible de les faire disparaître. Dans plusieurs circonstances je me suis très bien trouvé, pour les enfants, de l'usage d'une lotion froide de tout le corps tous les matins, notamment dans l'ichthyose farineuse, celle qui est la plus légère; ce moyen a suffi pour faire disparaître, tant qu'il a été employé, toute trace de maladie. Ce sont là les seuls conseils que je donne en général. J'ai quelquefois employé la solution de Fowler avec succès, m'a-t-on dit; mais j'ai perdu de vue ces enfants, et je ne saurais dire si la guérison a été durable.

SEPTIÈME GROUPE.

Maladies à parasites végétaux.

Nous avons cru devoir faire un groupe à part, dans cette seconde édition, des maladies à parasites végétaux, non pas tant à cause de l'affinité qui relie entre elles les affections que comporte ce groupe par l'existence dans chacune d'elles d'un champignon, que pour faire connaître dans son ensemble la micrographie des maladies de la peau. En effet, nous ne saurions partager ni au point de vue de la cause des maladies que ce groupe comporte, ni au point de vue de leur thérapeutique, toutes les idées accréditées aujourd'hui par les micrographes et leurs partisans. Les états lymphatique, scrofuleux, bilieux, syphilitique, ne seraient que des coïncidences ou complications qu'il faudrait combattre *secondairement*. Suivant eux, la cause de l'affection réside tout entière dans la présence d'un champignon, d'où la conséquence qu'en détruisant le champignon on guérit la maladie.

Il faut bien reconnaître que cette manière de voir a pour elle des apparences assez rationnelles pour captiver beaucoup d'esprits. Mais quand on pénètre plus avant dans les faits, on ne tarde pas à reconnaître que dans ces maladies il y a deux choses: la maladie du tissu, qui souvent est le reflet d'un état morbide général, et en second lieu la production cryptogamique que la maladie engendre, ou qui s'est opérée au moyen de germes transmis, et qui dans tous les cas sert à la propager et à l'étendre. Ainsi, comme on le voit, nous ne nions pas l'existence des cryptogames, nous la constatons au contraire; seulement, au lieu de considérer les cryptogames comme cause absolue, constante, de la maladie, nous la considérons comme pouvant être tantôt effet, tantôt cause de l'affection, ce qui constitue une dissidence très grande d'opinion. On nous reprochait dernièrement, dans un journal de médecine, de n'avoir pas tenu assez compte des études micrographiques et de ne pas être au courant de leurs progrès et de leurs découvertes; et par contre, il y a quelque six ou sept ans qu'un jeune docteur, élève de M. Casenave, nous

reprochait de ne jamais marcher que le microscope à la main : c'est qu'en effet, nous avons été un des premiers parmi les dermatologistes à suivre pas à pas les travaux des micrographes, et par cela même nous avons appris à nous défier des illusions que peuvent faire naître les lentilles, avec oculaires d'un grossissement plus ou moins fort.

Quoi qu'il en soit, cherchons à faire connaître les raisons qui peuvent justifier notre manière de voir. Et d'abord les productions cryptogamiques sont communes aux végétaux comme aux animaux. Il est constant [illegible] elles se montrent sous une forme presque épidér[illegible]taines conditions atmosphériques données : [illegible] *s'usent* et *disparaissent* quand les causes atm[illegible]aient fait naître *disparaissent* aussi : or ce fait [illegible]gation *absolue* du cryptogame par des germes [illegible] plus il y aurait de végétaux atteints, plus il [illegible]ela indéfiniment, puisque le nombre des sp[illegible] une proportion considérable et propagerait la [illegible]smission au moyen des vents, en se multipliant. Or le contraire a [illegible]u, ce que l'expérience a démontré pour la maladie de la vigne, et pour celle de la pomme de terre, maladies qui ont décru ou qui se sont éteintes spontanément. D'une autre part, trois enfants porteront les bonnets de teigneux, et l'un d'eux seulement, ou pas un ne contractera la teigne, quoique ces bonnets contiennent tous des spores. Vous ferez coucher un chien très bien portant avec un chien ayant la gale: vous nourrirez très bien le chien qui n'est pas malade, et il ne contractera pas la gale ; vous le nourrirez mal ou vous le nourrirez peu, de manière qu'il ne reste pas dans les bonnes conditions de santé où il était, et il contractera alors la gale. Ce sont ces circonstances, dont nous pourrions multiplier les exemples, qui ont fait dire aux micrographes que les spores ou les ovules ne germent et ne se développent qu'à la condition de trouver un *sol*, c'est-à-dire un individu, végétal ou animal, dans des conditions favorables à leur développement.

Ainsi une affection cryptogamique est à leurs yeux une maladie qui a *nécessairement* été transmise par inoculation au moyen de

spores ; et d'une autre part il faut, pour que la transmission soit possible, que la spore trouve un sol favorable à son développement, sans quoi elle restera sans développer aucune affection du même genre. Or, grâce à ces deux conditions de transmission et de germination, les micrographes sont inattaquables dans leurs doctrines. Cite-t-on un fait de non contagion ? C'est, diront-ils, que le sol n'était pas propre à la germination. Cite-t-on un fait de contagion sans contact ? Les spores ont été transmises par l'air, par des contacts inaperçus, etc.

Pour nous, en présence de ces grandes phases que l'oïdium a offertes dans sa manifestation, comme dans sa disparition, nous nous demandons si certaines maladies ne peuvent pas faire naître spontanément des cryptogames, et si en détruisant *la maladie* par des agents généraux, on ne peut pas détruire aussi la production cryptogamique ? Non-seulement nous posons la question, mais encore nous la résolvons par l'affirmative. J'ai lu ce que l'on a écrit contre la génération dite spontanée, mais en fait de productions végétales qui occupent les derniers échelons du règne, je ne sais si ces motifs peuvent être invoqués d'une manière absolue.

D'ailleurs, lorsque sans l'emploi d'aucun agent extérieur, et uniquement sous l'influence d'une médication intérieure, je vois guérir la maladie et le cryptogame qui l'accompagne, je me demande si mon opinion n'a pas quelque raison d'être : or c'est ce qui a lieu dans l'*herpès circiné*, dans le *sycosis*, et notamment dans le *sycosis syphilitique*, ainsi que dans les *pityriasis alba* et *versicolor*.

Quoi qu'il en soit, je repousse de toutes mes forces cette opinion, qu'il suffit de détruire le champignon pour guérir la maladie. Si cela est vrai pour la teigne, ce n'est plus fondé pour l'herpès tonsurant, pour le *porrigo decalvans*, pour l'*herpès circiné*, pour le *sycosis*, et probablement aussi pour la *plique*.

J'ai vu dans le service de notre collègue Bazin des enfants affectés d'herpès tonsurant (teigne tondante de M. Bazin), et qui sont là depuis huit et neuf mois avec des herpès pourvus des mêmes cheveux cassés et garnis de trichophytons aussi abondants que le premier jour, malgré les avulsions de poils et les applications de lotions et de pommades parasiticides.

Concluons donc de ces faits qu'en saine pratique, il faut nous préoccuper de deux choses : de la maladie d'une part, du champignon parasitaire qui l'accompagne de l'autre. Laissons aux praticiens à dire leur dernier mot sur l'influence que peut exercer la micrographie sur la thérapeutique, et ne concluons pas trop vite d'un phénomène morbide nouveau à une thérapeutique entièrement nouvelle. Je rejette ces idées trop absolues, et je le fais avec d'autant plus d'insistance, qu'un de nos collègues, M. Bazin, les a entièrement adoptées ; qu'il les propage tous les jours, les étend au point, comme on le verra tout à l'heure, de bouleverser toute l'économie des maladies de la peau sans bénéfice pour la science, et il faut bien ajouter, pour les malades. Il a été conduit, par exemple, à proposer l'avulsion des poils, afin de faciliter la destruction des cryptogames, dans plusieurs cas où elle est parfaitement inutile. Je justifierai tout à l'heure ces assertions, et je rendrai à notre collègue tout ce qu'on lui doit pour sa part de travaux ; mais quand un praticien va trop loin, le médecin qui écrit pour la science doit frapper fort, alors qu'il y a péril. Ainsi dans le *porrigo decalvans* (teigne achromateuse, Bazin), les cheveux sont complétement tombés ; tout au plus l'avulsion de ceux de la circonférence a-t-elle pour but d'empêcher la maladie de s'étendre, si même elle l'arrête. Il en est de même dans l'herpès tonsurant (teigne tonsurante) : l'avulsion ne peut avoir lieu d'une manière efficace sur la partie la plus malade, attendu l'état cassé des cheveux. Aussi M. Bazin ne fait-il pas opérer cette avulsion, si ce n'est à la circonférence. Dans un grand nombre de cas l'inflammation de la mentagre fait tomber le poil, ou bien on peut les enlever sans peine et avec l'extrémité des doigts. Dans beaucoup d'herpès circinés il n'y a pas de poils apparents, et l'avulsion, quand il existe, est souvent inutile. Il en est de même dans presque tous les cas de pityriasis des cheveux et de la barbe. Le médecin qui, pour guérir un pityriasis général du cuir chevelu ou un pityriasis général de la barbe, ferait arracher tous les cheveux et tous les poils, se livrerait à une pratique barbare, en ce sens que l'avulsion est très douloureuse, et qu'elle est inutile. Nous croyons même que notre honorable collègue M. Bazin épile beaucoup moins qu'il ne le dit ou que ses élèves ne le lui font dire. Enfin la meilleure raison que

nous puissions donner à cet égard, c'est que si l'épilation a été recommandée pour la teigne, et cela de tout temps, soit à l'aide de pinces, soit à l'aide de la calotte, jamais on ne l'a préconisée contre les autres maladies ; et cependant jamais dermatologiste n'a déclaré l'incurabilité de ces affections.

Mais il y a plus, un des élèves de M. Bazin vient de soutenir sa thèse sur le *trichophyton* (thèse sur le doctorat, par M. Cramoisy, 1856), et dans laquelle il prétend traduire toutes les idées de son maître. Suivant M. Bazin, cinq maladies, fort distinctes d'ailleurs, ne formeraient qu'une seule maladie née sous l'influence de ce cryptogame, auquel il reconnaîtrait quatre périodes d'évolution. Dans la première, le cryptogame, à l'état le plus simple et sur la peau dépourvue de poils, constituerait l'*herpès circiné* et l'*herpès iris*, et s'il est sur la tête, l'*herpès tonsurant ;* dans la barbe, il produirait le *sycosis non pustuleux*, et aux parties génitales l'*intertrigo.*

(Il y a ici une erreur commise, et nous ne pensons pas la rapporter à M. Bazin. L'intertrigo des parties génitales, ou plutôt de la partie interne et supérieure des cuisses, n'est pas l'herpès circiné de ces parties. Dans l'herpès, il y a un bourrelet très franchement vésiculeux et très saillant, tandis que dans l'intertrigo *il n'y en a pas:* c'est un érythème par contact de sueur altérée.)

D'ailleurs, ajoute M. Cramoisy, dans cette période le trichophyton se manifeste par la rougeur de l'herpès circiné érythémateux, qui passe bientôt à l'état de vésicules, avec des couleurs plus ou moins vives (herpès iris) ; par des squames succédant à ces vésicules, et le champignon qui pousse sur la peau dépourvue de poils parcourt ses périodes en huit ou quinze jours pour disparaître. Le trichophyton meurt s'il ne trouve pas de poils en suffisante quantité pour se nourrir.

(Que d'erreurs ! L'herpès iris est une maladie qui a son siége le plus ordinaire sur le dos des doigts, là où se trouvent justement des groupes très abondants de follicules pileux et de poils. Or la maladie guérit seule à la manière d'un érythème. Et puis voilà maintenant le champignon qui ne peut vivre qu'aux dépens des poils ! Mais alors comment naîtrait-il primitivement sur la peau dépourvue de poils ? M. Gruby a été bien plus vrai et bien plus con-

séquent avec lui-même lorsqu'il l'a fait *naître* dans l'intérieur des bulbes des cheveux et des poils.)

Pour les cheveux, dans cette première période d'évolution du trichophyton, la maladie érythémateuse et vésiculeuse à forme circinée se transformerait bientôt en petites squames dans lesquelles se trouverait le champignon, qui atteindrait ainsi sa seconde période, une période pityriasique.

Dans cette seconde période, on ne trouverait plus le champignon que sur des parties affectées de poils. « Ici le champignon apparaît dans tout son éclat sur les poils, sous la forme de petites gaînes blanches, amiantacé[illegible] *blanc sale, gris*, demi-transparent. » (Bazin.)

A la troisième [illegible]ement du trichophyton, qui a trait à la teigne t[illegible] surant), apparaît un nouveau phénomène : les [illegible] pustuleuses et se couvrent de croûtes ; à la face [illegible] une succession d'éruptions boutonneuses, où [illegible] infinie variété, depuis la papule la plus si[illegible]ration en plaques formée par l'agglomération [illegible]es enflammées. Les poils y repoussent amaigris, flétris, mais non cassés comme dans la tonsure. (C'est là ce que nous avons appelé impétigo sycosiforme.)

(Voyez les conséquences de ces évolutions, et combien elles sont peu logiques. Dans la première période, le trichophyton était sur la peau ; dans la deuxième, il envahit les poils et les cheveux ; il les détruit au point de les casser à quelques millimètres de leur naissance et les transforme en une poussière grisâtre ; dans la troisième période, qui devrait comprendre une action plus énergique du trichophyton, les *cheveux repoussent* amaigris, il est vrai, mais *entiers*, seulement il y a des papules ou des pustules à leur base !)

Enfin, dant la quatrième période, l'affection est le plus souvent située au menton ! (Et pourquoi ?) Elle débute par quelques pustules isolés. (Et pourquoi dès le début serait-ce la troisième période du trichophyton qui paraîtrait en premier ?) La maladie semble se calmer. Il n'en est rien. L'éruption pustuleuse se rapproche, se montre en groupes, quoique attaquant isolément chaque poil, et forme des engorgements plus ou moins étendus. (C'est alors le véri-

ble sycosis tuberculeux et pustuleux.) L'inflammation se propage ıx dernières couches de la peau, et gagne les aréoles adipeuses u derme. Alors on voit survenir une énorme tuméfaction des ırties atteintes, et les saillies arrondies, variables du volume d'un ros pois à celui d'une grosse cerise, désignées sous le nom de *ıcosis tuberculeux*, etc., etc. (Chose remarquable, c'est dans les iverses espèces de sycosis à forme pustuleuse qu'on trouve le ıoins de production parasitaire.)

J'ai tenu à rapporter presque textuellement ces idées émises dans la ıèse toute récente de M. Cramoisy, parce qu'elles m'ont paru reprouire les idées actuelles de notre confrère Bazin, puisque, page 10, il exprime ainsi : « Je dois dire que ces assertions ont été tirées en rande partie du travail de M. Bazin sur la nature et le traitement es teignes. » Et il ajoute: « Je dois surtout exprimer toute ma gratude à M. Bazin, qui a bien voulu m'aider de sa vaste expérience. »

Malgré l'espèce de cachet d'authenticité dont elles semblent revêıes, je n'ose les rattacher d'une manière absolue à notre honorable ollègue ; ou il faudrait admettre que, se laissant aller à une idée remière, il a sacrifié tous les phénomènes pathologiques, toute la ymptomatologie, à cette idée, qui serait devenue dans son esprit ne sorte d'idée fixe, autour de laquelle il grouperait un grand ombre d'affections très dissemblables pour arriver à une thérareutique commune, et fort simple d'ailleurs: épilation, lotions avec ne dissolution de sublimé, pommade au turbith minéral. Sous influence de cette thérapeutique, se guériraient : 1° les diverses ariétés de teignes, ou favus proprement dit : 2° le *porrigo decalans*, teigne achromateuse avec ou sans dépression, de M. Bazin, exisınt soit à la tête, soit à la barbe ou sur toute autre partie revêtue le poils; 3° l'herpès tonsurant; 4° l'herpès circiné de la barbe, du ou ou de toute autre région du corps; 5° le pityriasis du cuir cheelu et de la barbe; 6° l'impétigo sycosiforme de la lèvre supérieure t du menton; 7° le sycosis tuberculeux; 8° le sycosis pustuleux; ° l'herpès iris. Liste à laquelle il faudra ajouter le pityriasis 'ersicolor et la plique.

Ce qui est plus grave peut-être, c'est le bouleversement que ces hangements de dénomination peuvent apporter dans les idées des

élèves et des médecins, toutes ces maladies étant désignées par M. Bazin sous le nom général de *teigne;* il admet alors l'existence de teignes des cheveux et de teignes de la barbe; il n'y a plus de sycosis, d'herpès circiné, d'herpès tonsurant; il n'y a que des teignes faveuse, tonsurante, mentagre, achromateuse et décalvante de la tête ou de la face. De sorte qu'en vertu de cette classification, la plus grande perturbation est jetée dans le diagnostic des maladies; des noms séculaires se trouvent remplacés par d'autres sans utilité; tout cela pour satisfaire à une idée non sanctionnée encore par l'observation, à savoir, que toutes ces maladies reconnaissent pour cause un cryptogame! Sachons, autant que possible, respecter les dénominations, fussent-elles fausses; c'est la base de notre langage en médecine, et puisqu'à ce langage se rattache une idée, conservons-le pour ne pas amener de confusion dans la science d'hier avec la science d'aujourd'hui, sans quoi nos idées neuves, si elles sont bonnes, ne se propageront que parmi les élèves du jour et non parmi nos confrères en médecine. Et d'ailleurs est-ce que toutes les maladies du menton sont semblables aux maladies du cuir chevelu, et *vice versâ?* Ainsi des deux formes de *favus*, le *favus scutulata* est le seul que l'on voie à la figure comme sur le corps; l'herpès tonsurant ne s'observe jamais à la barbe dans les conditions de celui de la tête; l'herpès circiné ne se voit pas à la tête, et M. Bazin lui-même en a fait l'observation. La mentagre, telle que tout le monde la connaît, c'est-à-dire le sycosis tuberculeux et pustuleux, ne se montre jamais à la tête; il en est de même de l'impétigo sycosiforme. Pourquoi donc faire une seule et même catégorie, et appeler du même nom de *teigne* les affections des deux régions. Enfin la teigne est une maladie essentiellement contagieuse. Or sur les huit maladies regardées comme des teignes par M. Bazin, il y en a quatre qui ne sont pas contagieuses. La contagion n'est-elle pas toujours un des caractères principaux de la teigne? Voyez d'ailleurs les conséquences thérapeutiques de ces idées, qui conduisent aux assertions suivantes. S'il n'y a pas de poil là où la maladie est survenue? Épilez. Ce n'est pas une plaque d'herpès, ce sont cent, deux cents plaques qui se trouvent sur le corps? Épilez, lotionnez. Il y a au menton une forme morbide qui fait tomber les poils *tout seuls* par les frot-

tements des linges, ou à l'aide seul des doigts? Épilez. Il existe une inflammation très aiguë du menton qui double et triple son volume, et qui amène la chute des poils que l'on retrouve dans les cataplasmes appliqués dans le but de calmer l'état inflammatoire? Épilez, lotionnez. Mais la maladie se caractérise essentiellement par la chute des cheveux, au point de laisser des surfaces complétement glabres où il n'y a plus rien à épiler? Épilez. Mais les cheveux sont tellement cassés et courts et friables, qu'on ne peut pas les enlever à la pince? Épilez.

Non, nous ne pouvons pas croire que ce soit là les doctrines vraies de notre collègue Bazin; nous ne pouvons pas penser qu'il rattache toutes ces maladies à une seule et même cause *externe;* qu'il ne voie dans aucune de ces maladies le reflet d'une cause générale; qu'il établisse que le trichophyton puisse naître sur un terrain où il ne peut vivre, et où il ne vivra qu'à la condition qu'il trouvera bientôt des poils pour y végéter; que ce cryptogame serait très évident à sa période de développement ou première période, et moins évident à sa quatrième période, là où il produirait des désordres jusque dans la profondeur du tissu de la peau, en y développant des tubercules et des pustules. Quant aux pustules de la seconde ou troisième période dans l'herpès tonsurant, elles sont comme celles de la teigne; elles en ont imposé comme origine et point de départ de la teigne, elles en imposent comme degré d'évolution du champignon. Dans l'un et l'autre cas, elles sont la conséquence des pommades et des corps irritants que l'on emploie dans le traitement de la maladie. Disons-le donc nettement, comme devant avant tout la vérité à nos confrères, ces idées sont exagérées: elles ne sont pas en rapport avec une saine pratique.

Enfin il est aussi de notre devoir de reporter à M. Baeresprung, et avant lui à M. Lebert, mais qui ne l'avait fait qu'entrevoir, l'honneur d'avoir prouvé que dans l'herpès circiné des parties du corps non recouvertes de cheveux ou de poils il existe souvent un cryptogame, qui n'est autre que le trichophyton de l'herpès tonsurant, et qu'avant eux, que nous sachions, M. Bazin n'avait énoncé aucun fait qui dût lui rattacher cette découverte. M. Bazin regarde l'herpès tonsurant comme une maladie différente de l'herpès circiné, mais

qui peut précéder son développement ou en être indépendant.

Maintenant on nous adressera peut-être le reproche de ne pas avoir donné dans ce chapitre la description complète de toutes les maladies cryptogamiques les unes à la suite des autres; mais par cela même que le cryptogame n'est souvent pour nous qu'un accident, nous n'avons pas voulu séparer de l'histoire générale de l'herpès, par exemple, deux variétés dans lesquelles l'état parasitaire a été constaté. Le sycosis devait rester à côté des affections pustuleuses dont il se rapproche; le pityriasis versicolor ne doit pas être séparé des affections squameuses: ce sont ces circonstances qui établiront notre justification. A cet égard, partout et toujours le rapprochement étiologique et thérapeutique est et sera notre drapeau.

Il n'est pas besoin d'un microscope à fort grossissement pour constater la présence d'un cryptogame, quelque petit qu'il soit, il suffit d'un grossissement de 200 à 300 diamètres. Ce qui importe, c'est de se procurer des lentilles d'une grande netteté. Il faut de plus une certaine éducation préalable, basée sur l'examen des produits de sécrétion, à l'état sec ou liquide, des cheveux, des poils, de l'épiderme; en un mot, avant d'examiner des produits morbides ou des végétaux accidentellement développés, il faut avoir fait une étude des produits naturels.

Nous avons fait connaître, page 51 et suivantes, les éléments dont se composent en général les cryptogames que l'on rencontre dans les maladies qui font l'objet de ce groupe; il ne nous reste donc qu'à faire connaître ici les diverses variétés de cryptogames que l'on peut rencontrer dans ces maladies; mais il est peut-être nécessaire de rappeler à la mémoire l'organisation d'un poil ou d'un cheveu, et c'est ce que nous allons faire.

Organisation des poils. — Un poil se compose de deux parties: 1° le poil proprement dit, extérieur à la peau; 2° la racine du poil et son bulbe, qui sont compris dans le tissu de la peau. Les poils se composent de deux couches superposées: couche externe, moins foncée en couleur et de nature fibreuse; couche interne, plus sombre et d'aspect grenu. La première en constitue la substance corticale; la seconde, contenue dans le canal que lui forme la première, a été

considérée comme une sorte de moelle, et désignée sous le nom de *substance médullaire*. Aussi, à un fort grossissement de loupe, aperçoit-on très bien le canal central des cheveux qui, dans l'état normal, règne dans toute sa longueur, et qui paraît d'un noir d'autant plus foncé que le cheveu est lui-même plus foncé en couleur.—Au microscope, la substance corticale paraît formée de deux espèces de fibres; la grande généralité est longitudinale; mais il en est un certain nombre qui sont obliquement contournées, de manière à paraître relier entre elles les fibres longitudinales. Quant à la substance médullaire, elle est grenue; elle forme quelquefois le tiers du diamètre des cheveux; elle est formée de noyaux de cellules enveloppées de *pigmentum* qui leur donne leur couleur. (Voy. planche micrographique.)

Partie dermique. — A sa partie inférieure, le poil, ou les cheveux, se renfle et constitue ce que l'on nomme la racine; celle-ci se relie insensiblement avec une partie plus volumineuse, que l'on appelle le bulbe: de sorte qu'à première vue l'un et l'autre ne semblent former qu'un tout; mais le bulbe est très mou et la racine présente plus de densité; elle offre d'ailleurs tous les rudiments du poil. Quant au bulbe, il termine inférieurement le poil; il est arrondi et logé dans le cul-de-sac que forment inférieurement les enveloppes des poils. On voit dans son intérieur une série de houppes noirâtres, qui ne sont autres que des groupes de cellules pigmentaires; il est terminé par les vaisseaux qui le nourrissent et le relient à sa membrane propre. Il n'est pas toujours arrondi; il peut être presque plan après son avulsion, ainsi que nous l'avons représenté dans la figure 1.

Enveloppes. — Les enveloppes des poils se composent: 1° d'une tunique fibreuse propre au follicule pileux: c'est la plus extérieure; 2° d'une tunique épidermique, ou reflet du prolongement de l'épiderme, qui pénètre dans toute la profondeur du bulbe, et qui va en s'amincissant de l'extérieur à l'intérieur; 3° on admet que le cheveu glisse facilement dans cette enveloppe épidermique, au point que l'on suppose qu'il existe entre elle et le poil un espace qui va aussi en se rétrécissant de l'extérieur à la partie la plus profonde du bulbe (voy. planche micrographique). Le bulbe du poil est engendré par la tunique fibreuse ou par des cellules organiques,

qui naissent à la surface du fond de cette tunique, et qui elles-mêmes développent le poil, de sorte que l'on peut avulser le poil et son bulbe, et voir renaître le poil après l'avulsion.

Quand on opère l'avulsion d'un poil, on enlève, en général, le poil avec toutes ses enveloppes prolongées jusqu'à la naissance du *bulbe*. L'avulsion des cheveux est généralement moins complète. La membrane propre du cheveu se dessine le plus souvent un peu au-dessus de la naissance du bulbe, ainsi que nous l'avons représenté dans la première et les trois autres figures. Si le bulbe reproduit n'a pas sa membrane épidermique, c'est qu'il eût occupé trop de place avec son enveloppe fibreuse ; il faut donc la supposer comme si elle existait.

L'avulsion du poil et des cheveux constitue l'épilation. Pour être bien faite, il faut se servir de pinces à mors plats et faites *ad hoc*. Il ne faut l'opérer que deux ou trois cheveux à la fois ; et de plus, prendre le soin d'avulser les cheveux dans la direction de l'implantation des bulbes dans le tissu de la peau, implantation qui varie suivant les points de la tête et ceux de la barbe ou de toute autre partie où se trouvent situés des poils. Il n'y a d'ailleurs aucune comparaison à établir entre le bulbe d'un cheveu et celui d'un poil : le premier est beaucoup plus long.

Végétaux parasites. — Les végétaux parasitaires que l'on observe dans les maladies cutanées sont des champignons. Ces champignons comportent trois genres différents : le *trichophyton*, le *microsporon* et l'*achorion*. Les caractères de chacun d'eux sont les suivants :

1° Trichophyton (Malmsten), de θρὶξ, cheveu, et φυτὸν, plante, de la tribu des Torulacées (Léveillé), caractérisé par l'absence de réceptacle et par des spores continues.

Caractères. — Végétal formé uniquement de spores rondes ou ovales, transparentes, incolores, à surface lisse. Intérieur homogène ; spores d'un diamètre variant entre $0^{mm},003$ et $0^{mm},008$; en moyenne, $0^{mm},005$. Ces spores apparaissent dans la racine des cheveux sous forme d'un amas arrondi. Elles donnent naissance à des filaments articulés, constitués par des spores enchaînées en filaments moniliformes qui, en se développant, rampent dans l'épaisseur de la substance du cheveu dans la direction de leur longueur.

Gruby, *Recherches sur les cryptgoames qui constituent la teigne tonsurante* de Mahon, ou l'*herpès tonsurant* de Cazenave.)

Guensburg aurait découvert un an auparavant, dans la plique polonaise, un végétal tout à fait semblable au précédent, auquel il aurait donné le nom de *trichomaphyte*. Vogel le considère comme identique avec lui; mais il nous semble qu'il doit exister entre eux une certaine différence, parce que les effets de ces deux champignons sur les cheveux ne sont pas les mêmes. Tandis que dans l'herpès tonsurant l'abondance de spores détermine l'atrophie et la cassure du cheveu à 2 ou 3 millimètres de sa sortie de la peau, les cheveux de la plique, au contraire, se tuméfient, s'allongent, s'entrecroisent et suintent même, ce qui n'a pas lieu dans l'herpès tonsurant, dont les cheveux sont secs et recouverts d'une espèce de cendre.

MM. Legendre et Bazin considèrent le champignon de la mentagre comme n'étant autre chose qu'un trichophyton, c'est-à-dire un végétal entièrement formé de spores et sans *mycélium;* qu'il se développe de la même manière dans le follicule et au dehors; que ce n'est pas là le *microsporon.*

Ce serait encore le trichophyton que l'on retrouverait dans le *porrigo decalvans* (teigne achromateuse); de sorte que le microsporon n'existerait plus que dans le pityriasis versicolor. (*Dictionnaire* de Nysten, par Robin, article TRICHOPHYTON.)

MICROSPORON (Gruby). — Filaments *ondulés*, suivant la direction des fibres des cheveux, transparents, larges de $0^{mm},002$ à $0^{mm},003$; pas de granules à l'intérieur; ils se bifurquent quelquefois sous un angle de 30 à 40 degrés. Les filaments et les branches constituent la couche interne d'une gaine que forme le végétal autour du cheveu; les sporules forment la couche externe. Ces spores ou sporules couvrent les tiges et quelquefois leurs branches. Elles sont pressées les unes contre les autres. Elles sont ordinairement rondes et quelquefois ovales; toutes sont transparentes, sans granules à l'intérieur.

MICROSPORON AUDOUINI (Gruby). — Cette espèce a été constatée dans le porrigo decalvans par M. Gruby. On vient de voir plus haut que, suivant MM. Legendre et Bazin, ce serait le trichophyton que l'on rencontrerait dans cette maladie.

Quoi qu'il en soit, il diffère du *trichophyton tonsurant* par des branches nombreuses, ondulées, par des spores granuleuses plus petites et toujours dépourvues de granulations à l'intérieur, par l'adhérence de celles-ci aux tubes ou filaments et à leurs branches.

Il naît à la surface des cheveux de l'homme, en dehors du follicule, depuis le niveau de la peau jusqu'à une hauteur de 1 à 3 millimètres au-dessus de sa surface, et forme une couche autour du cheveu, épaisse de $0^{mm},015$. Ces cryptogames sont rouges et feutrés, de manière à constituer un tuyau autour de chaque cheveu.

Dans ces deux espèces les filaments (*trichomata*) ont les caractères extérieurs des filaments du *mycélium* ou système végétatif, c'est-à-dire qu'ils sont ramifiés, sans articulations, peu ou point granuleux.

Telle est la description qu'en donne M. Robin dans son ouvrage sur les végétaux parasites et dans son Dictionnaire. Et, sans être micrographe, s'il nous était permis d'émettre une opinion, nous dirions que l'enroulement dont il est ici question, et dont nous avons représenté des dessins dans nos planches, se rencontre: 1° dans le pityriasis du cuir chevelu et de la barbe; 2° dans le porrigo decalvans et dans beaucoup d'autres affections, dans le lieu même d'élection désigné, c'est-à-dire à la sortie du cheveu ou du poil, et qu'il pourrait peut-être précéder la manifestation des spores. M. Gruby, à qui nous avons montré cet enroulement, a déclaré que ce n'était là qu'un état épidermique que l'on pouvait faire naître artificiellement par le grattage. Il est bien vrai que si l'on vient à couper une portion de l'épaisseur d'un cheveu et à enlever son enveloppe sur la moitié de sa surface, on fait naître, ainsi que l'a opéré plusieurs fois un de nos internes, M. Mauvais, d'après les indications de M. Gruby, un état qui a beaucoup d'analogie avec celui que nous dépeignons, et que nous avons reproduit sous deux formes dans notre planche micrographique. On peut même l'opérer aussi en rebroussant la membrane externe du bulbe sur le corps du cheveu; mais nous l'avons très souvent observé dans les états morbides, et nous ne l'avons presque jamais vu sur des cheveux sains, parfaitement exempts de pityriasis ou farine. C'est donc là un état maladif. Cet état figure d'ailleurs des ceps de vigne enroulés autour

d'une tige, et M. Baeresprung les a représentés dans les planches de son mémoire sur l'herpès circiné sous la désignation suivante : pellicule supérieure du cheveu épaissie, fendillée en forme de réseau. Il la considère comme précédant la formation du *trichophyton*.

On le rencontre en effet dans cette maladie, et coïncidant avec les spores du trichophyton. C'est, suivant nous, un état morbide d'une réflexion de l'épiderme de la peau sur la membrane extérieure du cheveu, mais ce n'est probablement pas une production végétale. M. Robin ne la regarde pas non plus comme étant de cette nature.

Il est constant que dans le sycosis tuberculeux et pustuleux, dans l'impétigo sycosiforme, dans le pityriasis de la barbe, dans l'herpès circiné de la barbe, dans le porrigo decalvans de la barbe et du cuir chevelu, on ne trouve souvent pas autre chose, sauf, comme nous le dirons, l'atrophie du poil ou sa tuméfaction dans certains cas. En vain dans un grand nombre de cas de ce genre on y cherche des spores ; et quand celles-ci se sont montrées, c'est que probablement il s'agissait d'affections chroniques, et non exceptionnelles, et non pas d'affections suppurantes ou sécrétantes. Non-seulement j'ai suivi cette année toutes les phases microscopiques de ces affections, mais encore trois internes de l'hôpital les ont poursuivies partout et avec le plus grand soin. Il y a plus, j'ai soumis à M. Robin les cheveux provenant de la circonférence de la limite immédiate d'un porrigo decalvans dont l'origine ne remontait pas à plus de quinze jours ou un mois : c'était des plaques de 1 à 2 centimètres de diamètre. Je ne lui ai pas fait connaître l'origine de ces cheveux, sur lesquels j'avais observé l'enroulement à forme végétante dont je viens de parler, et j'en ai reçu la réponse écrite suivante : *Les cheveux que vous m'avez fait remettre sont parfaitement sains ;* ce qui veut dire exempts de spores, quoiqu'ils eussent l'enroulement le plus beau. Ainsi, pour le dire en passant, c'était un *porrigo decalvans* dont les cheveux étaient, au dire d'un de nos micrographes les plus expérimentés, parfaitement sains, et qu'il fallait, suivant M. Bazin, traiter par l'épilation quand même et par les lotions de sublimé. Suivant nous, ces cheveux étaient malades de deux manières : par leur bulbe amaigri, atrophié, sans enveloppes adhé-

rentes extérieures. Plus nous réfléchissons à la cause de cet enroulement, plus nous nous arrêtons à l'hypothèse où l'on admettrait que l'épiderme se réfléchit, dans l'état naturel, de la peau sur le cheveu, ce qui n'est pas nettement formulé par les anatomistes et ce qui est très probable, pour former à la sortie du poil une enveloppe épidermique qui se prolongerait sur la membrane propre du cheveu dans une faible étendue. Du moment où l'on opérerait l'avulsion du poil, on arracherait cette membrane qui, par contractilité de tissu, viendrait former ces enroulements fibrillaires que je signale. L'effet se produirait difficilement et rarement sur le cheveu sain, parce que la gaîne épidermique, très adhérente au cheveu, se casserait nettement lors de son arrachement; il serait plus manifeste quand cette lame épidermique serait malade. Tout en donnant cette explication, je trouve q[illegible]es objections à y faire. D'abord on distingue très bi[illegible]e ces ondulations l'épiderme arraché, il y est en la[illegible]es dans divers sens; en second lieu, on voit d'abord cet enroulement ondulé dans un point, puis, au-dessus de lui, une portion de cl[illegible]eu saine et sans enroulement, puis un enroulement nouveau. Si ce[illegible] état provenait de la cause que nous supposons exister un moment, l'enroulement serait continu et décroissant, il n'enverrait pas de prolongements filiformes sur le poil où existe un bulbe, comme je l'ai fait dessiner sur la planche de micrographie; en troisième lieu, on devrait le retrouver sur beaucoup de cheveux sains : or, sur onze personnes sur lesquelles j'avais pris au hasard des cheveux, je n'ai observé ces enroulements que sur *tous* les cheveux de l'une d'elles, et celle-ci avait un peu de pityriasis. Il faut ajouter que la spore est le caractère essentiel du champignon; il est vrai que j'ai observé des filaments allongés, pendant le développement du trichophyton de l'herpès tonsurant, sur les cheveux les moins malades. Au surplus, ces détails ne dussent-ils servir qu'à mettre en garde les praticiens contre l'existence d'un parasite, qu'ils auraient leur côté d'autant plus utile que cet enroulement n'aurait pas encore été signalé.

Microsporon mentagrophyte de Gruby, découvert en 1842, ou cryptogame de la mentagre. — Spores partout en quantités innombrables, adhérentes d'une part à la surface interne de la gaîne du

il, d'autre part au poil; elles sont tellement fixées à la gaîne, l'on ne peut les en séparer sans les détacher; rondes et très pe-es; filaments ou tiges granulés à l'intérieur, et se bifurquant sous s angles de 40 à 80 degrés; rameaux striés. Il se montre prin-palement dans le follicule pileux des poils de la face, et en parti-lier du menton (mentagre), de la lèvre supérieure et des joues. Il diffère du *Microsporon Audouini* par des spores plus volumi-euses, des ramifications et des filaments plus grands. Il diffère ncore par le siége, attendu qu'il est situé dans la profondeur du ulbe pileux, entre lui et la membrane épidermique, et non pas dans épaisseur de la substance de la portion de poil placée dans le ulbe, comme le tricophyton tonsurant, ni autour de la partie rienne du cheveu, près du derme, comme l'est constamment le icrosporon d'Audouin.

M. Gruby nous a fait voir ce cryptogame, mais sur une préparaon dont nous ne connaissions pas l'origine. Or il résulterait de la escription des effets pathologiques de ce cryptogame « que toutes s parties de poil qui sont envahies par lui se couvrent d'écailles lanches, grises et jaunâtres. Ces écailles auraient de 2 à 6 millièmètres sur 3 à 8; à bords anguleux, un peu déprimés et traversés e toutes parts par des poils. Ces écailles sont très adhérentes à peau et aux poils. » (Ch. Robin.)

Je me demande ce que peut être cette maladie dont on dépeint forme. Je ne vois là aucun des caractères proprement dits de la ientagre, et je crois entrevoir un pityriasis de la barbe. Il faut bien dire, les micrographes ne sont pas dermatologistes, et pour onner un nom à un champignon, nom qui exprime la maladie à iquelle il imprime un cachet tout particulier, il faut puiser les oriinaux de ses observations à une source bien authentique, c'est-àire auprès d'un dermatologiste incapable de commettre une erreur e diagnostic. (On appelle cette mentagre *dermophytique*.) (Il est proable que pour bien voir ce champignon il faut diviser le bulbe sur a longueur.).

Microsporon furfur de Ch. Robin. (*Fungus seu Epiphytus pityiasis versicoloris*, de Th. Sluyter, 1847.) — Cellules allongées et amifiées (*fila, filamenta, trichomata*); partie de spores réunies en

groupes ou amas, ayant seulement quelques centaines de millimètre de diamètre. Le champignon est situé dans les squames épithéliales, ne dépassant jamais leur surface. Formées par des cellules fort étroites, allongées, pâles et ramifiées, ces spores ont seulement de 0mm,004 à 0mm,006 de diamètre; elles sont sphériques, réfractent faiblement la lumière; leurs amas adhèrent à l'épiderme; les plus grandes sont généralement au centre des amas. C'est à ce végétal que les micrographes attribuent la couleur jaune verdâtre du *pityriasis versicolor* (erreur complète). (Voy. pl. micrographique.)

Genre des Oïdiées, Léveillé: Achorion, Link et Remak.—*Achorion Schœnleinii*, Remak. — [illegible] de la teigne, Gruby, 1841 et 1842. — *Achorion Schœnlein* [illegible], 1845. — Champignon de la teigne scrofuleuse, Vogel, 18[illegible]

Schœnlein est le premier qui [illegible] connaître la nature du champignon de la teigne en [illegible] *uer Anat. und Physiol.*, p. 82, de J. Mueller.)

Le champignon de la t[illegible] n[illegible] npose d'une enveloppe extérieure, *stroma* ou *gangl*[illegible] d'un sixième de millimètre d'épaisseur. Ce n'est pas v[illegible] (Dieu[illegible]) nt une membrane, car on ne peut pas la séparer de la substance centrale. Elle ne dérive ni de l'épiderme, ni d'une exsudation albumineuse. Elle contient: 1° le *mycelium*, ou système végétatif du champignon; 2° le réceptacle, ou support des organes de reproduction; 3° ces organes, ou spores. La matière centrale retirée de cette enveloppe représente, au microscope, d'abord un grand nombre de spores libres ou réunies en chapelet, des tubes flexueux, ramifiés, non cloisonnés, vides ou contenant de rares granules, enfin des tubes droits ou courbes, sans être flexueux quelquefois, mais rarement ramifiés. Quant aux spores, elles ont en général une forme ronde ou ovale; leurs bords sont nets, mais moins accentués que dans le trichophyton ou dans le *Microsporon mentagrophyte*. Leur volume peut varier de 0mm,003 à 0mm,007. Ces spores n'ont pas la régularité ordinairement propre à ces organes de germination. Il en est d'ovoïdes, de sphériques, de presque quadrilatères ou triangulaires. (Voy. pl. micrographique.)

Pour examiner au microscope soit des cheveux sains, soit des cheveux malades, il faut d'abord les avulser complets, c'est-à-dire

vec leur bulbe, les mettre sur une goutte d'eau étendue sur le upport; placer un verre très mince à recouvrement, et procéder à n premier examen. Au bout de dix minutes de macération du poil ans l'eau qui a été mise entre les lames de verre, on saisit fortement les deux verres superposés entre les doigts, on fait frotter le heveu en divers sens par le verre à recouvrement, et l'on observe le nouveau; alors les spores se sont séparées du cheveu, celui-ci est levenu plus transparent, et l'on aperçoit les spores en nombre considérable disséminées sur les côtés du cheveu ou du poil.

De la description d'ensemble à laquelle nous venons de nous ivrer, il ressort que notre collègue M. Bazin a appelé de nouveau l'attention sur une complication de plusieurs des maladies des cheveux et de la barbe, que les micrographes avaient fait connaître, mais dont l'autorité en pareille matière n'avait pas été assez grande pour en faire prévaloir les conséquences; que les travaux de M. Bazin sur la teigne et sur ces maladies l'ont conduit à professer une doctrine trop absolue, à savoir, que du moment qu'il existe un cryptogame, ce parasite est la cause du mal, et qu'il suffit de le détruire pour guérir la maladie; qu'on y parvient à l'aide de l'épilation et de lotions de sublimé, agent parasiticide par excellence. Pour nous, tout en rendant justice aux travaux importants de notre honorable collègue, nous dirons qu'il y a toujours lieu, en effet, de se préoccuper de l'existence ou de l'absence d'un cryptogame dans certaines de ces maladies; que la présence d'un cryptogame peut être cause ou effet; que le cryptogame peut, dans bon nombre de cas, être cause de la permanence de l'affection; qu'il y a toujours lieu de le détruire; mais que, pour le détruire, l'épilation est le moyen exceptionnel; que toutes les préparations mercurielles, sulfureuses, l'huile de cade et une foule d'autres, sont plus ou moins parasiticides, et qu'une fois le champignon détruit, la maladie peut parfaitement persister; mais que le champignon doit être considéré comme une cause de permanence de l'affection.

Les maladies parasitaires connues aujourd'hui sont au nombre de sept; ce sont : la *teigne* et ses deux variétés principales, *favosa* et *scutulata;* le *porrigo decalvans*, l'*herpès tonsurant*, la *plique*, l'*herpès circiné*, le *pityriasis versicolor* et le *sycosis* ou *mentagre*. — On a pu

voir qu'il n'existe pas de champignon bien défini pour chacune de ces maladies; qu'en fait d'espèces, on n'en connaît que trois: l'achorion ou mycoderme de la teigne; le trichophyton, commun à l'herpès tonsurant, à la mentagre et à la plique, et le microsporon, commun au porrigo decalvans et au pityriasis versicolor. Il est vrai que dans la plique, M. Guensburge a admis l'existence d'une variété de trichophyton qu'il a appelée *trichomaphyte*; mais M. Robin ne la reconnaît pas comme espèce à part. Ces espèces n'ont donc pas encore une existence bien définie, bien arrêtée? Quoi qu'il en soit, nous dirons que l'achorion est le champignon le plus complet de tous: il est composé d'un mycélium, de tubes sporophores et de spores. Les autres sont des champignons plus rudimentaires ou moins complets.

Teigne. *Porrigo; Tinea lupinosa, ficosa; Tinea vera* de Lorry. *Porrigo lupinosa, favosa; favus; teigne faveuse, teigne scutulée.*

J'aborde une maladie qui, de tout temps, a été l'écueil des médecins par sa ténacité et sa résistance aux moyens thérapeutiques employés pour combattre les autres affections cutanées. Le mot *teigne* n'est pas pris ici dans une acception générale; il désigne une maladie toute particulière, qui se distingue de la généralité des affections cutanées par ce caractère essentiel qu'elle développe des corps organisés végétaux visibles à l'œil nu.

C'est à tort qu'Alibert, et, à son exemple, un grand nombre de médecins, ont compris, sous la dénomination de teigne, toutes les maladies du cuir chevelu qui affectent l'enfance et quelquefois l'adulte, telles que la teigne amiantacée, la teigne muqueuse, l'impétigo granulé, etc., etc.; toutes ces affections n'ont de commun avec la teigne que le siége; aussi Alibert est-il obligé de désigner lui-même par l'expression de *faveuse* les variétés de teigne que nous allons décrire et auxquelles doit seulement être appliquée la qualification de teigne. C'est donc aussi avec regret que nous voyons notre honorable collègue M. Bazin comprendre dans la dénomination de teigne toutes les maladies parasitaires du cuir chevelu et de la barbe, en se fondant sur ce fait que, dans ces maladies, il

existe une production végétale comme dans la teigne. Cette raison de pathogénie a sa valeur, mais il y a, sous le rapport du siége, de la cause, du traitement, de la durée relative de ces maladies et des difficultés qu'elle offrent pour leur guérison, des différences si grandes, que c'est jeter sans nécessité une perturbation dans la science, préjudiciable à ses intérêts et par conséquent aussi à ceux de l'étude et de la pratique médicale, sans bénéfice aucun pour la pathologie et la thérapeutique. Or déjà le diagnostic des maladies de la peau est assez difficile, sans venir jeter une perturbation profonde dans les noms qui les désignent.

Willan et Bateman ont été encore moins exacts qu'Alibert, car sous la dénomination de *porrigo*, ils admettent des variétés de *porrigo larvalis*, *furfurans*, *lupinosa*, *scutulata*, *decalvans* et *favosa*, maladies qui ne sauraient supporter la description qu'ils en donnent, attendu qu'elle est tout à fait éloignée de la vérité. Il faut même rendre cette justice à Alibert, que, sans le secours du microscope et bien avant les travaux qui ont été faits sur la teigne, il a reconnu la nature toute spéciale de cette affection que tous les auteurs regardaient comme une maladie pustuleuse : cette croyance à une affection pustuleuse était tellement générale qu'elle s'est propagée jusqu'aujoud'hui et que, dans le *Traité des maladies de la peau*, de M. Cazenave, on la trouve encore reproduite en 1847. Toutefois, nous voyons par le *Traité des maladies de la peau*, de M. Chausit, traité rédigé d'après les leçons de M. Cazenave, que ce médecin s'est enfin rendu à l'évidence des faits et qu'il n'admet plus comme autrefois la pustule élémentaire du favus ; mais il rejette la nature végétale du produit et il admet l'existence primitive d'une sécrétion à forme plus ou moins pustuleuse qui plus tard se concrète en croûte ; tant il est vrai qu'on a généralement peine à se dessaisir d'une idée, d'une manière de voir que l'on a soutenue et que l'on tient d'un maître, que l'on vénère avec raison, car Biett professait ces doctrines !

On sait que, de temps immémorial, cette maladie a appelé l'attention des médecins et des empiriques ; aujourd'hui encore elle est restée en partie dans les mains de ces derniers, et nous pourrions citer des villes considérables dans lesquelles l'administration muni-

cipale interdit même aux médecins le traitement de la teigne pour le confier exclusivement aux sœurs de charité ; Toulouse, par exemple, est dans ce cas : ce sont les sœurs de l'hôpital qui dirigent et soignent tous les enfants affectés de la teigne ; comme si cette maladie était purement locale ; comme si elle n'était pas liée le plus souvent à une constitution qu'il faut modifier en même temps qu'on la traite à l'extérieur. Il est vrai de dire qu'une méthode banale est employée depuis plusieurs siècles pour combattre cette affection, et qu'on a réduit ainsi à un pansement uniforme et à une opération toute manuelle la thérapeutique de cette maladie. Espérons qu'un jour viendra où l'autorité administrative, plus éclairée, comprendra qu'il n'est pas, ou qu'il existe fort peu de maladies complétement isolées du reste de l'économie ; qu'alors même que le mal est à son début tout local, il peut se relier d'un moment à l'autre à une affection d'un autre organe, et qu'ainsi il n'est pas une maladie, voire même de cause externe, qui ne nécessite les soins éclairés du médecin.

Schœnlein, en Allemagne, a le premier fait connaître la nature végétale du favus ; et Berg a le premier signalé les sporules qui caractérisent le développement du muguet : de là l'analogie entre les deux productions. M. Gruby a fait des expériences d'inoculation qui expliquent la nature contagieuse du favus, non-seulement de l'homme à l'homme, mais encore de l'homme aux végétaux. Alibert avait, avant eux, cherché à combattre cette opinion de Bateman qui range la teigne dans les maladies pustuleuses. Alibert regardait les godets auxquels cette maladie donne lieu comme une production particulière. Son talent d'observateur si parfait l'avait conduit à cette découverte, dont le microscope a fourni plus tard la démonstration la plus rigoureuse. Quant à nous, nous croyons aussi avoir fait quelque chose d'utile en démontrant la source de l'erreur de l'auteur anglais. En effet, si la teigne ne donne jamais lieu à des pustules lorsqu'elle est abandonnée à elle-même, le cuir chevelu peut en développer par suite des pommades irritantes et des emplâtres que l'on applique sur le cuir chevelu. On a donc pris pour l'origine et la forme du mal ce qui n'est qu'un accident consécutif au traitement employé, accident que l'on peut développer à volonté

sur toutes les parties du corps et par les mêmes moyens. C'est ce que nous avons constaté avec le plus grand soin, après avoir vérifié par nous-même l'exactitude des descriptions données par MM. Schœnlein et Gruby sur les productions végétales de la teigne. Pourquoi faut-il, si nous en croyons des doctrines émises par M. Cramoisy dans sa thèse pour le doctorat (1856), et qui ne seraient que celles de M. Bazin son maître, que l'on revienne en partie à ces idées passées en considérant les pustules comme un troisième degré, comme une troisième période d'évolution du trichophyton à l'égard de plusieurs maladies à productions végétales, alors que l'achorion ou cryptogame de la teigne n'engendrerait pas les pustules de cette dernière maladie. Quoi qu'il en soit, cherchons à dépeindre cette affection et à décrire ses productions.

Le premier phénomène que l'on aperçoit au début du mal consiste dans un petit cercle linéaire et jaunâtre à la base de chaque cheveu ; ce qui n'était qu'un simple liséré devient un bourrelet circulaire, traversé par conséquent par le cheveu ; ce bourrelet fait une saillie de plus en plus marquée. C'est une sorte de poche ou capsule qui le constitue ; on donne à cette capsule le nom de *mycoderme*. Ces micodermes ou capsules sont formées d'un *myscélium*, d'un réceptacle ou tubes sporophores et de spores ou granules. Ces spores sont adhérentes à un tissu filamenteux (tubes sporophores) qui sert de trame et qui, vu au microscope, représente parfaitement les arborisations ; de sorte que son image offre la plus grande analogie avec un arbrisseau sans feuilles, pourvu de graines ou fruits, déposés comme des grappes de raisin. (Nous avons représenté dans nos planches ces godets depuis leur état rudimentaire jusqu'à leur entier développement ; mais tous sont isolés et tels qu'ils se reproduisent dans une poussée ou récidive de l'affection sur une ancienne teigne dont la majeure partie des cheveux a été détruite par la maladie. (Voir la planche micrographique pour le cryptogame.)

Quand les micodermes sont par trop remplis de granules, leur poche ou sac s'ouvre et se détache du cheveu qui le traversait. En même temps, ce bord détaché semble se déprimer sur lui-même au fur et à mesure que la capsule s'élargit, en sorte que l'ensemble du produit organisé prend la forme d'un godet, que

nous comparerons, pour en donner l'image, à un petit lampion, le centre restant toujours traversé par le cheveu. De deux choses l'une: ou chaque godet s'est développé à une certaine distance l'un de l'autre, et alors il s'étale, s'élargit également, et produit une espèce d'écuelle en prenant des dimensions plus ou moins grandes; de là le nom de *favus scutulata* donné à l'une des variétés de la teigne faveuse; — ou bien les godets se sont développés d'une manière confluente, et avec de très petites dimensions, et alors ils se sont mutuellement gênés dans leur développement; ils n'ont bientôt plus formé qu'une masse étalée sous forme de croûte sèche, d'une étendue plus ou moins considérable, donnant seulement à sa circonférence l'image de petits godets, mais formant des groupes criblés de creux analogues à la surface d'un gâteau d'abeilles. On donne à cette seconde variété le nom de *favus lupinosa*, teigne lupineuse, à cause de son analogie avec les semences du lupin; telles sont les deux teignes généralement admises par les auteurs. Il en est deux autres espèces dont je reconnais l'existence, et qui offrent des différences assez tranchées. Dans la première, la production granuleuse étant très considérable, elle se détache par petits fragments informes qui suivent le trajet des cheveux en adhérant à ceux-ci, de manière à les recouvrir çà et là de granulations du volume d'un grain de millet ou de chènevis; j'appelle cette variété *teigne faveuse granulée :* c'est la variété désignée par M. Bazin sous le nom de *teigne squarreuse*. Dans la seconde, où la maladie est toujours très circonscrite et en plaques qui croissent d'une manière incessante, mais en s'élargissant peu à peu, la production végétale de la maladie ne s'opère que d'une manière excessivement lente pour produire une croûte informe, sèche, très adhérente, et embrassant à sa base un plus ou moins grand nombre de cheveux; j'appelle cette variété *eigne faveuse squameuse*, parce que la matière produite a de l'analogie, surtout à la surface, avec des squames ou écailles filamenteuses, amiantacées; mais en les écartant on distingue parfaitement la matière du *favus*.

M. Bazin (*Recherches sur la nature et le traitement des teignes*, Paris, 1853) admet l'existence de cinq espèces de teignes: 1° TEIGNE FAVEUSE, c'est celle que nous décrivons, qu'il divise en trois va-

riétés : *lupineuse*, *scutiforme* ou en *cercles* et en *anneaux*, *squarreuse*, qui correspond à la variété de teigne granulée que nous avons décrite depuis longtemps. 2° TEIGNE TONSURANTE ou *tondante* de Mahon, qui n'est autre que l'herpès tonsurant. 3° TEIGNE MENTAGRE, comprenant la mentagre ou sycosis et les formes composées de sycosis. 4° TEIGNE ACHROMATEUSE ou *avec décoloration du cuir chevelu*, qu'il regarde comme synonyme du *porrigo decalvans* de Bateman et du *vitiligo ;* il en admet deux variétés. 5° TEIGNE DÉCALVANTE ou *alopécie idiopathique*, qui ne nous paraît être autre, d'après la description qui en est donnée, qu'un *porrigo decalvans* plus ou moins étendu. On voit que M. Bazin a bouleversé toutes les idées reçues ; qu'il comprend sous la dénomination de teigne des maladies qu'on n'a jamais rapprochées les unes des autres. En cela il a suivi les idées de M. Gruby qui regarde l'herpès tonsurant et le sycosis comme étant des maladies semblables à la teigne, parce que dans ces affections il a trouvé une altération des cheveux et des poils qui s'en rapproche et qui aurait pour élément une production végétale. Si cette dernière assertion est vraie dans quelques cas elle ne l'est pas toujours; faut-il donc, sans aucun avantage réel pratique, changer les dénominations de ces affections et bouleverser des noms qui de tout temps ont exprimé pour le médecin une idée plus ou moins nette? En principe, nous n'hésitons pas à le dire, ces bouleversements dans les noms sont mauvais. Aussi toutes les nomenclatures nouvelles ne jouissent-elles d'aucune faveur ; mieux vaut cent fois conserver un mauvais nom que de créer un nom nouveau, si ce nom ancien est consacré par le temps. Vous rendrez l'étude de la science plus difficile et vous bouleversez sans aucun avantage les idées des praticiens du jour. Appelez teigne ce que tout le monde appelle teigne ; dites que ce mot doit nécessairement entraîner avec lui l'idée d'une production morbide végétale d'une nature particulière, et vous distinguerez ainsi la teigne des autres maladies du cuir chevelu ; mais n'allez pas plus loin, et ne rangez pas sans nécessité sous la dénomination de teigne des affections qui, outre qu'elles siégent ailleurs qu'à la tête, ne nécessitent pas l'emploi des mêmes moyens de guérison, n'ont pas la même ténacité, la même durée de traitement et encore moins le

même aspect. Je sais très bien que ces raisons jouissent de peu de faveur auprès de M. Bazin, car depuis la première édition de notre ouvrage il a publié un mémoire sur la mentagre où il admet, à l'égard des affections du menton, les mêmes maladies qu'au cuir chevelu. Il désigne ces maladies sous le nom de *teigne;* il admet l'existence des mêmes espèces; ce sont, suivant lui, les mêmes moyens curatifs; opinion qui n'est partagée par personne.

Quelle que soit la forme sous laquelle se montre la teigne, elle ne sécrète jamais, et à aucune époque de son existence, ni sérosité, ni pus, ni sanie : toujours elle se montre à l'état de croûte sèche. Si l'on détache cette croûte, on trouve sous le godet une lame épidermique appliquée sur la peau, sans que le tissu cutané soit excorié ou ulcéré.

Des opinions très divergentes ont été émises sur le siége primitif du cryptogame. Suivant M. Letenneur, le cryptogame aurait son siége primitif dans les follicules sébacés qui entourent les cheveux, parce que, suivant lui, les capsules des poils sont toujours parfaitement saines au-dessous des godets faviques. Les cheveux ne sont altérés qu'au-dessus de la croûte, et par le fait de la compression exercée par la tige du poil; si le cheveu tombe, c'est plus tard, par l'atrophie du bulbe résultant de cette compression. MM. Lebert et Charles Robin n'ont jamais constaté de favus dans les bulbes pileux; la capsule est en dehors de toute altération. M. Rayer a placé le siége du favus dans les bulbes pileux. Suivant M. Bazin, le favus, à son début, est toujours sous-épidermique; et plus loin M. Bazin ajoute : « ou plutôt intra-épidermique. » (Et en effet comment, en enlevant le champignon entier, trouverait-on l'épiderme intact immédiatement au-dessous de lui?) Au moment où le godet se déforme, en s'ouvrant à son centre, l'épiderme se rompt. D'où la conséquence que le godet favique n'aurait pas d'enveloppe propre, comme M. Gruby et d'autres le prétendent. Le champignon s'étendrait peu à peu dans les membranes qui enveloppent les bulbes pileux, dans le bulbe pileux lui-même, de manière à ce que le bulbe du poil, la souche, le prolongement radiculaire, fussent parsemés de spores et de filaments tubuleux; on retrouverait des sporules et des tubes de mycélium sur les membranes capsulaires des cheveux, principale-

ment entre la tunique capsulaire et le canal épidermique du bulbe des cheveux. Quant à ceux-ci, le canal central aurait disparu; on retrouverait çà et là sur la tige des fragments de matière faveuse. Les fibres longitudinales du cheveu paraîtraient plus larges et plus grosses que dans l'état normal. Les cheveux auraient perdu leur brillant à l'extérieur. Toutes ces altérations peuvent exister d'ailleurs à divers degrés, suivant la durée et la confluence de la maladie; d'où M. Bazin conclut que non-seulement le champignon croît au pourtour et à la naissance des cheveux sous le prolongement épidermique qui se réfléchit autour du bulbe, mais encore qu'il envahit le bulbe et le cheveu; d'où la conséquence de l'épilation pour atteindre les spores profondes du favus, et la destruction des cheveux, non par atrophie et par compression des bulbes ou des cheveux, mais par envahissement de ces organes par le cryptogame. Tout cela me paraît parfaitement fondé.

Quant aux caractères micrographiques du favus, voici en quoi ils consistent (voy. planche de micrographie) : Formé par les diverses parties du champignon appelé *achorion*, il n'existe pas encore, en tant que *favus*, lorsque les spores du végétal sont encore sèches; celles-ci venant à germer, constituent des filaments de *mycélium;* puis naissent des tubes sporophores, les spores se multiplient au point que le tout forme une masse visible à l'œil nu (voy. pl. III, fig. 3). L'ensemble du champignon est-il enveloppé d'une membrane propre? Sont-ce des lames épidermiques qui lui forment une enveloppe? C'est une question encore controversée. Toujours est-il que jusqu'au moment où l'enveloppe s'ouvre, la surface du godet paraît lisse, ronde, unie; le godet venant à s'ouvrir, on voit au microscope qu'il est formé : 1° de tubes flexueux, ramifiés, non cloisonnés, vides ou contenant quelques rares granules moléculaires (*mycelium*); 2° de tubes droits ou courbes sans être flexueux, quelquefois, mais rarement, tuméfiés, contenant des granules ou de petites cellules rondes, ou des cellules allongées, placées bout à bout, de manière à représenter des tubes cloisonnés, avec ou sans traces d'articulations étranglées (réceptacles ou tubes sporophores à divers états de développement); 3° enfin de spores de diverses formes, libres ou réunies en chapelets (voy. planche micrographique) (Robin, *Diction-*

naire de médecine et de chirurgie, etc., 1855). Quant aux spores, elles sont extrêmement petites. Que si l'on examine, suivant M. Bazin, une petite parcelle de matière faveuse en la plaçant dans l'eau entre deux plaques de verre, on voit qu'elle se compose de sporules, de tubes vides (mycélium), de tubes chargés de sporules simples ou complexes (sporidies) ; les unes sont très petites, à peine peut-on les distinguer des granulations noires; les autres ont de $0^{mm},005$ à $0^{mm},008$ de longueur. Les plus grosses paraissent avoir une double enveloppe, dont le centre est composé de granules, ce qui ne se voit qu'à un grossissement de 800 diamètres. Elles sont ovoïdes, triangulaires ou étranglées vers le milieu, réunies bout à bout en chapelets. Les tubes sont flexueux, simples ou ramifiés, vides ou chargés de spores ou de granules; accolés les uns aux autres, ils forment des tiges, et quelquefois comme des arbustes. (Voy. la planche de micrographie.)

Quant aux cheveux, leur bulbe est d'abord parsemé de spores à sa surface et à sa base; ces spores se disséminent aussi à la surface des cheveux. Plus tard, le bulbe lui-même s'atrophie et perd peu à peu de son volume, en même temps que les spores et les filaments tubuleux se propagent le long du cheveu; celui-ci s'amaigrit de plus en plus, devient terne, et puis se décolore. Quant à sa partie médullaire, elle disparaît une des premières.

Démontrons maintenant que le produit morbide est de nature végétale: déjà on a pu voir que l'inspection microscopique donnait des caractères d'organisation dont on ne saurait mettre en doute l'existence. Une expérience de M. Gruby prouve jusqu'à l'évidence, sans le secours d'instrument de grossissement, qu'il en est ainsi. Il a pris un certain nombre de granules contenus dans ces petits sacs ou mycodermes, il les a déposés sur un point de l'écorce d'un chêne en pleine végétation, et, après avoir fait son expérience dans des conditions favorables, il a vu se développer une production teigneuse tout à fait semblable à celle qui naît sur la tête des enfants. Le développement de ce produit végétal a eu lieu à l'instar de celui du lichen. Cette pièce a été montrée à l'Institut, nous l'avons vue nous-même ; les caractères du développement nous ont paru identiques avec ceux du godet de la teigne. Cette inoculation peut

l'ailleurs s'opérer tous les jours d'individu à individu. Ainsi il doit tre évidemment reconnu aujourd'hui que le produit de la teigne st un produit organique de nature végétale, et la démonstration le ce fait rend parfaitement compte de la manière dont la maladie e transmet le plus souvent d'enfant à enfant. On sait que c'est 'une des maladies les plus contagieuses, et que presque toujours lle vient de ce que des bonnets portés par un enfant teigneux ont été par d'autres qui gagnent la teigne; ou bien de ce que des nfants non teigneux ont couché avec d'autres enfants teigneux. La oussière dite *granules* ou *sporules* on *spores* est excessivement fine; lle adhère facilement aux vêtements, elle s'échappe sous forme de oudre quand un enfant se secoue ou se frotte la tête, et l'on conoit dès lors qu'elle puisse facilement servir de moyen d'inoculaion entre deux personnes.

J'ai eu dans mon service à l'hôpital un jeune homme de quinze ans ui y est arrivé avec une teigne des plus étendues, et qui l'a gagnée en ortant une casquette qui avait appartenu à une famille de teigneux; inq enfants et la mère avaient à la fois cette maladie qui, chez le eune homme dont il est question, datait de quatre ans seulement.

De ce que la teigne est contagieuse et qu'elle se propage d'enfant enfant au moyen d'une sorte de semence, s'ensuit-il qu'elle ne uisse se développer spontanément? A cet égard tous les auteurs adnettent qu'elle peut naître sous des conditions de misère, de mauaise alimentation, de malpropreté, etc. Mais aujourd'hui, c'est une nanière de voir que beaucoup de modernes et tous les naturalistes ejettent.

Le *favus* ou teigne est une affection de l'enfance et de l'adolesence. Elle peut cependant se montrer à tous les âges de la vie; nais il est rare qu'après vingt ans la maladie se développe autrenent que par transmission, soit directe et par contact, soit indirecte t par suite d'un bonnet, casquette ou chapeau d'un teigneux porté ar un sujet sain, qui devient bientôt malade.

Cette affection peut, dans l'une de ses formes, le *favus scutulata*, eigne scutulée ou en écuelles, se montrer à toute la surface du corps; nais dans la très grande généralité des cas, elle est bornée à la tête.

Notre collègue M. Bazin rattache essentiellement la teigne à

l'existence des poils, et il va si loin à cet égard qu'il déclare qu'il ne peut pas se montrer de favus là où il n'y a pas de poils. Je concevrais cette opinion si la teigne avait son siége principal et son point de départ dans les bulbes des poils, mais il n'en est pas ainsi ; en admettant même parfaitement exactes les recherches de M. Bazin, on conçoit que l'affection développée à l'union du bulbe avec le cheveu puisse envahir le bulbe du poil, mais nous ne saurions considérer la présence du favus comme nécessitant celle d'un poil ou d'un cheveu. D'ailleurs M. Lebert a trouvé des godets faviques sur la verge et sur des parties du corps exemptes de poils (Ch. Robin, *ouv. cit.*). Sans nous appuyer du secours du microscope nous ferons de suite ressortir la différence qu'il y a entre la guérison de la teigne scutulée qui peut atteindre la figure et les autres parties du corps, d'avec la teigne faveuse qui ne se montre jamais qu'à la tête ; Mahon a parfaitement établi cette distinction. On guérit une teigne scutulée de la face et du corps dans l'espace de peu de temps : on guérit même une teigne scutulée du cuir chevelu dans un temps plus court que pour la teigne lupineuse. Mais malheureusement quand on est conduit à émettre une idée nouvelle, on est porté à tout faire plier à cette idée ; c'est ce qui est arrivé à notre honorable collègue M. Bazin.

Tantôt la teigne affecte une partie seulement du derme chevelu, tantôt la totalité. Elle peut être bornée à une surface de quelques centimètres de diamètre, et, dans d'autres cas, s'étendre partout où il y a des cheveux, de manière à former une sorte de calotte. — Elle apparaît ou sur un seul point ou sur plusieurs à la fois qui, en s'élargissant peu à peu, se réunissent pour former une plaque unique. Toutes les fois que le favus se montre dans un seul point, il reste toujours plus ou moins limité ; mais il peut survenir des récidives, ou bien la partie, après avoir été traitée, peut redevenir le siége d'une nouvelle poussée ; alors il est rare que d'autres points du cuir chevelu ne deviennent pas malades. Dans tous les cas, si l'on en excepte le *favus scutulata*, dont le développement est souvent très rapide, on peut dire que la marche des teignes a lieu d'une manière lente et que la maladie ne fait de progrès très sensibles que dans un espace de temps assez long.

es circonstances d'étendue et de multiplicité des plaques sont mises à certaines données générales que nous ferons connaître : teigne lupineuse tend presque toujours à occuper une assez nde surface. Quand elle est spontanée elle se limite le plus sou- ıt à une seule plaque. Quand la teigne est contractée par des ınets ou casquettes il est assez commun de la trouver en pla- ɜs multiples. La teigne squameuse est toujours très circonscrite, is à plaques multiples. On peut donc avoir à traiter une teigne ; limitée comme une teigne très étendue.

Ceci posé, on reconnaîtra la teigne à l'apparition, sur un point sur une surface plus ou moins large du derme chevelu, ne sorte de croûte jaune orangé ou blanc jaunâtre, croûte ıt la surface tombe en poussière, sans sécrétion aucune, et andant une odeur plus ou moins fétide, que l'on a comparée l'odeur de souris. Jamais comparaison ne fut plus exacte. — ; de démangeaisons très notables ; chute plus ou moins complète ; cheveux, et ceux qui restent encore sur les points malades, s amincis, très chétifs et frisés ainsi que le représente la figure e nous avons donnée de cette maladie. La chute des cheveux est, effet, une conséquence nécessaire de l'existence du favus par la ɜssion que le mycoderme exerce sur le bulbe du poil et par l'ex- ısion de la germination du favus à ces bulbes.

Quand on examine ces cheveux à la loupe, on voit qu'ils sont plus moins malades. L'altération morbide peut exister à la tige seule, r laquelle on trouve des fragments de matière faveuse. Parfois on rouve des tubes de *mycelium* et la matière faveuse, qui vont se rdre entre la souche du poil et la face interne de la capsule dont la se déchirée répond à l'extrémité supérieure de la tunique capsu- re, ayant devant elle le canal épidermique du cheveu. Le cheveu ; terne, il a perdu son brillant; les deux substances, corticale et dullaire, sont confondues sans qu'on puisse les distinguer l'une de utre. Dans d'autres cas, il n'existe plus que des débris de capsule. ; bulbe du poil, la souche, le prolongement radiculaire sont par- més de spores et de filaments tubuleux (Bazin, *Mémoire cité*). Ce it est important pour reconnaître dans le cours du traitement les ıeveux qui peuvent encore être malades. — Enfin, la croûte du

favus est à surface rugueuse, inégale, plus ou moins élevée au-dessus du niveau de la peau ; elle adhère fortement, et ce n'est qu'à l'aide de l'extrémité d'une spatule ou d'un couteau qu'on peut l'enlever. Si cette opération est faite avec soin, on voit au-dessous de la croûte le derme chevelu recouvert d'un épiderme lisse et très fin; sa couleur est rosée ; il n'y existe pas d'érosion ou de plaie ; or si le favus était de nature pustuleuse, ou s'il fournissait une sécrétion quelconque, la surface sécrétante serait plus ou moins érodée. Cette circonstance complète la série de faits que nous avons invoqués pour démontrer la nature du favus.

Maintenant, dans les variétés de *favus lupineux*, *scutulé*, *granulé*, et *écailleux*, il y a des différences qu'il est difficile de décrire autrement que par les caractères anatomo-pathologiques que nous avons donnés.

Le *favus scutulata* apparaît quelquefois sur le corps en même temps qu'au cuir chevelu. Il peut s'y montrer sur toutes les parties : le front, la figure, le cou et la poitrine en sont plus fréquemment le siége. Il y est ordinairement sous forme discrète : ainsi on trouve çà et là un, deux ou trois godets réunis. Ces godets prennent un accroissement très grand; ils conservent leur forme parfaitement ronde, à bords relevés en écuelle et à centre fortement déprimé. Leur développement est plus rapide que dans les autres variétés, et ce développement semble s'arrêter lorsqu'il est arrivé à un certain état d'accroissement.

Ce serait être trop absolu que d'avancer que le *favus scutulata* du corps affecte toujours cette forme discrète. J'ai vu plusieurs malades dont la presque totalité de la peau des membres en était couverte. Chez eux l'affection s'était montrée sous forme confluente. Tous les godets étaient réunis entre eux pour donner naissance à des plaques énormes. L'un de ces malades, âgé de trente-cinq ans, a succombé, dans mon service, aux suites d'une fièvre typhoïde contractée pendant son séjour à l'hôpital. Cet homme, atteint de favus depuis son très jeune âge, avait subi bon nombre de traitements. Il était arrivé de la province, amaigri par une irritation chronique des intestins, qui entraînait à sa suite des garde-robes sans cesse en diarrhée. Cet état était né sous l'influence des chagrins causés par une maladie

re laquelle l'art avait échoué, et à laquelle l'âge n'avait apporté ıne amélioration. Les membres décharnés avaient pour enve- ıe un favus qui en occupait toute la surface, et qui exhalait cette ır de souris que nous avons signalée. Cet homme se faisait hor- ·. Il était taciturne, fuyait le contact des autres malades, res- au lit le plus souvent et s'affaiblissait de jour en jour. Le séjour ıôpital, dans de pareilles conditions, devait lui être funeste. Il pris de fièvre typhoïde, et, chose remarquable, le *favus* se guérit ıplétement, ainsi que cela a lieu pour toutes les affections cuta- ı sécrétantes, lorsqu'une maladie aiguë vient à naître en affec- l'économie en général. Nouvelle preuve qu'il existe dans les adies cryptogamiques autre chose qu'un cryptogame. Nous es assez heureux pour arrêter les progrès de cette fièvre. Le ma- ı se nourrissait alors ; il se remettait peu à peu, imbu qu'il était la pensée qu'il allait être débarrassé de son favus général, que, ainsi que cela se passe habituellement, il vit reparaître sa ɜlle maladie. Cette atteinte portée à un espoir que nous n'avons pu heurter de front en présence d'un malade dont la santé était rement compromise, fit bientôt reparaître les accidents du côté ventre, et alors cet homme tomba dans un affaiblissement gradué ıt il ne put sortir. Il succomba. Ainsi il s'était opéré pour la ne ce qui se passe pour la gale et les acarus. Dira-t-on aussi r ce cas que le mycoderme sommeille, ainsi qu'on la prétendu r l'*acarus*, et si celui-ci vit d'une sorte de vie végétative, de lle vie les productions teigneuses vivent-elles durant ce sommeil disant léthargique? On se retranchera, il est vrai, sur ces deux ı toujours invoqués par les micrographes, à savoir, que le sol l'individu malade n'était plus propre à la germination des res ; et pour expliquer des récidives, qu'il était resté des spores ı surface de la peau qui ont germé aussitôt le retour à la santé ! Le favus squameux est beaucoup plus discret que le favus lupi- ıx. Le favus granulé est le plus confluent et celui qui suit la rche la plus rapide ; mais tous les trois n'attaquent que le cuir ıvelu, tandis que le *favus scutulata* peut affecter le corps.

ɜ favus n'est pas une de ces maladies qui se guérissent d'une nière spontanée, au moins c'est l'exception. Le plus souvent, il

persiste jusqu'à l'adolescence, et même jusqu'à trente et quelques années. Mais lorsque le sujet a contracté cette maladie pendant le jeune âge, on la voit décroître vers vingt ans et se guérir peu à peu, après avoir entraîné la perte presque totale des cheveux.

La teigne ne paraît pas nécessairement liée avec le tempérament et la constitution du sujet, en ce sens que tout individu peut la contracter ; mais quand elle se développe spontanément, c'est principalement chez des enfants lymphatiques où les affections cutanées sécrétantes de la tête sont communes. Cette dernière circonstance conduit le médecin à employer un traitement général en même temps qu'un traitement local pour combattre cette maladie, et les frères Mahon eux-mêmes, tout en employant leurs pansements répétés et faits avec soin, prescrivent l'usage des dépuratifs.

Des faits que nous avons exposés dans cet article sur la teigne nous croyons devoir tirer les corollaires suivants, comme préliminaires de l'exposition des diverses méthodes de traitement que nous allons faire connaître avec détails.

1° La teigne est une maladie tout à fait différente de la croûte de lait, de la teigne amiantacée, des variétés d'eczéma et d'impétigo de la tête, du *porrigo decalvans*, de l'herpès tonsurant et du psoriasis du cuir chevelu.

2° Cette maladie, dont la cause première nous est inconnue, a pour cachet essentiel le développement, autour du bulbe des poils, d'une production végétale qui s'étend au bulbe lui-même, l'envahit tout en le comprimant et en s'opposant à sa nutrition, puis le détruit, altère les cheveux et en amène ainsi la chute.

3° Elle est essentiellement contagieuse et se transmet au moyen d'une poussière organisée à l'instar de la graine des végétaux.

4° C'est une maladie de l'enfance et de l'adolescence.

5° Non-seulement elle peut se montrer à la tête, mais encore sur toute autre partie du corps, au moins pour une de ses variétés.

6° Elle ne fournit jamais aucun produit de sécrétion lorsqu'elle est abandonnée à elle-même et qu'elle n'est pas modifiée par des applications de pommades ou d'agents irritants.

7° Elle peut guérir spontanément, mais cette guérison ne s'obtient qu'à un âge déjà assez avancé de la vie. Quoique guérie, la m

se des traces de son existence par l'atrophie et la chute des

n, c'est une des affections cutanées les plus rebelles aux
ts.

ient. — La ténacité de cette affection a, de tout temps,
ır elle l'attention du médecin. Aussi signale-t-on, dès
la plus reculée, des moyens plus ou moins efficaces pour
ce but. L'énumération rapide que nous allons en faire
a preuve de la difficulté que l'on éprouve, dans bon
s cas, à guérir la teigne : car on peut dire que la presque
s agents connus a été tentée, et souvent en vain.

les essais nombreux, on est arrivé à ce résultat que la gué-
avus est d'autant plus prompte et plus assurée, que l'on
préalable la chute des cheveux. Aussi, pour atteindre ce
est arrêté à un moyen violent, la calotte, qui présente
d'arracher à la fois un grand nombre de cheveux, mais
'inconvénient grave de faire souffrir les enfants et de leur
les cris si violents que quelques-uns ne peuvent supporter
ode. MM. Mahon ont même cité un exemple de décès sur-
un enfant, le second jour de l'enlèvement de la calotte,
ite de la perturbation que l'avulsion avait portée sur tout
nerveux. L'avulsion des cheveux a donc de tout temps
isée par les médecins qui se sont occupés de la teigne.

calotte est encore employée aujourd'hui dans beaucoup
ements, contre la teigne ; non pas, il est vrai, par des mé-
ais par des religieuses, auxquelles on confie le soin de
die. Nous croyons donc utile d'en rappeler et la composi-
mploi méthodique.

ye dans une bassine 125 grammes de farine de seigle avec
le vinaigre blanc ; on agite continuellement le mélange
st sur le feu ; on y ajoute, aussitôt la cuisson de la farine,
nes de carbonate de cuivre en poudre ; on fait bouillir
t pendant une heure, après quoi on met 125 grammes de
e, 125 grammes de résine et 190 grammes de poix de
e. Lorsque le tout est mêlé et parfaitement fondu, on jette
plâtre 190 grammes d'éthiops antimonial en poudre fine ;

on agite le mélange jusqu'à ce qu'il ait pris une consistance convenable. C'est cet emplâtre que l'on étale sur une toile résistante, capable en un mot de supporter des tractions assez fortes.

Pour appliquer la calotte, on commence par couper les cheveux aussi près que possible de la peau, on ramollit les croûtes à l'aide de cataplasmes et on les fait tomber en les lavant avec de l'eau de savon, ce qui a lieu en trois ou quatre jours; alors on étale la toile emplastique sur la surface de la tête en prenant la précaution de couper l'emplâtre de sa circonférence à son centre pour pouvoir l'enlever par portions et aussi pour qu'il ne fasse pas de plicatures. Au quatrième ou au cinquième jour, on enlève brusquement chaque portion de l'emplâtre, et avec lui une certaine quantité de cheveux qui, en poussant, se sont enchâssés dans sa substance. Cet arrachement se fait à contre-poil, afin d'opérer une ablation plus efficace des cheveux. On applique un nouvel emplâtre que l'on enlève et que l'on réapplique tous les deux jours, en ayant soin de couper les cheveux restants lorsqu'ils ont poussé.

Ce traitement est ainsi continué pendant deux ou trois mois. Quelques enfants s'habituent peu à peu à ces tractions, qui deviennent en général de moins en moins douloureuses au fur et à mesure qu'une plus grande quantité de cheveux est arrachée; mais beaucoup d'entre eux ne peuvent pas supporter ces souffrances et abandonnent ce traitement.

Il est certain que cette méthode compte des succès assez nombreux, mais quel moyen ! aussi a-t-il été abandonné par les médecins. J'ai vu nombre d'enfants auxquels il avait été appliqué sans succès, et qui sont venus réclamer nos soins à l'hôpital Saint-Louis. Ces exemples se reproduisent journellement.

Cependant quelques praticiens adoptent aujourd'hui cette méthode que suit, par exemple, M. Baumès, de Lyon. Ce praticien a même préconisé un emplâtre moins agglutinatif que le précédent; causant, par conséquent, moins de douleurs, et propre d'ailleurs à conduire au même résultat. La formule de cet emplâtre et son mode d'emploi se trouvent dans l'ouvrage d'Alibert, et Desault en avait vanté les avantages dans ses leçons. Il consiste à faire dissoudre de la gomme ammoniaque dans du vinaigre, jusqu'à consis-

ance d'emplâtre ; on l'étend sur de la toile et on l'applique par bandelettes. Ces bandelettes sont successivement enlevées après un séjour variable depuis quelques jours jusqu'à quelques semaines.

J'ai essayé ce moyen à l'hôpital Saint-Louis et à la prison des Madelonnettes sur plusieurs teigneux et sans obtenir des succès plus nombreux que par des moyens plus simples et moins douloureux ; en sorte que, s'il est préférable à la calotte, en ce sens qu'il a moins d'inconvénients qu'elle, il en présente encore, et ses avantages ne les compensent pas.

Samuel Plumbe, en vue de l'épilation comme moyen de guérison, a proposé d'arracher les cheveux un à un ; on a reculé devant un moyen aussi long ; et c'est ici le lieu de nous demander si l'épilation est une condition indispensable du traitement de la teigne, et si seule elle suffit pour amener la guérison de cette maladie. A cet égard, on peut considérer l'épilation comme étant l'un des moyens les plus propres à opérer la guérison de la teigne ou au moins à en favoriser la guérison. Je dis favoriser, car on observe assez souvent de vieux teigneux chez lesquels la généralité des cheveux est tombée et où cependant il existe sur le cuir chevelu des plaques très larges de *favus*. On peut, d'une autre part, guérir la teigne sans amener l'épilation. Les frères Mahon, par exemple, n'épilent pas et leur poudre dite épilatoire ne fait pas tomber le bulbe des cheveux. Le point de vue réellement curatif qui doit diriger le médecin, c'est de recourir à un agent qui puisse désorganiser assez complétement la production végétale à son origine, sans attaquer les cheveux. L'avulsion préalable des cheveux favorise singulièrement cet effet, puisque la calotte seule guérit. Mais faisons remarquer à ce sujet que, dans l'emplâtre destiné à la préparation de la calotte, il entre une certaine proportion d'un sel cuivreux et d'un sel antimonial qui doivent agir, ainsi qu'on le verra plus loin, sur les productions faveuses.

« En juillet 1853 est entré au pavillon Saint-Matthieu, à l'hôpital Saint-Louis (service de M. Bazin), un paysan faisant métier dans son village de guérir la teigne, et probablement il la guérissait mieux et plus vite qu'on ne le fait dans les hôpitaux de Paris ; il prati-

quait surtout l'épilation avec une incroyable habileté. » Bazin, *Mémoire cité.*

Ce fut pour notre collègue l'origine d'un travail raisonné sur la teigne ; il se livra à des expériences microscopiques pour vérifier les faits déjà connus sur la nature végétale de la teigne, il rechercha quels étaient les agents chimiques les plus propres à attaquer le mycoderme, et, faisant précéder l'emploi de ces agents de l'épilation, comme l'avait proposé Samuel Plumbe. Il est parvenu à guérir la teigne en six semaines ou deux mois ; il hésitait d'abord à opérer l'avulsion des cheveux, dans la crainte qu'ils ne pussent repousser, mais contre son attente, il le [illegible] être plus forts et plus beaux qu'auparavant. Quant à l'épila[illegible] a pratique en enlevant deux à trois cheveux seulement à [illegible]s, [illegible] qui exige, dit-il, environ six heures pour épiler totalement un [illegible]te, et ce que l'on peut faire d'ailleurs en plusieurs séances.

On comprend tout de suite le tra[illegible] de patience qu'exige le préliminaire de cette méthode de trait[illegible]t, aussi trouvons-nous ce paragraphe dans l'avant-propo[illegible]noire cité : « d'autres, mieux intentionnés, répéteront nos e[illegible]s, je doute qu'ils réussissent. La patience leur fera défaut, et la moindre inobservation des règles thérapeutiques que nous avons posées sera suivie de déceptions. Il y aura des récidives, et ce qui aurait dû être mis sur le compte de l'opérateur, sera mis sur le compte du procédé. »

Je conçois la première idée de cette phrase, celle qui a trait à la patience nécessaire pour exécuter l'épilation ; je ne comprends pas la seconde. L'épilation est longue, mais simple, et un infirmier peut être dressé à la faire, c'est ce qui a eu lieu depuis dans chacun de nos services ; et une fois pratiquée, la méthode de traitement est plus simple encore, comme on le verra plus loin. Que signifie donc cet insuccès à craindre? pourquoi le procédé ne réussirait-il que dans les mains de M. Bazin ? Nous pensons qu'à cet égard il a trop préjugé du bon vouloir de ses confrères, tout disposés à accepter ce qu'il y a de bon dans une méthode de quelques source qu'elle vienne, et à plus forte raison lorsqu'elle a pour auteur un de nos collègues de l'hôpital Saint-Louis. Serait-ce à cause de son origine qui remonte à son malade, ce brave paysan guérissant la teigne par

'épilation? A cet égard, M. Bazin a eu raison de s'emparer de ce ait, et de démontrer par l'observation, la pratique et les recher-:hes microscopiques, comment il pouvait être utile. Toutefois, ce délai de six semaines à un mois nous paraît tout exceptionnel; ıous avons vu de ses malades qui n'avaient pu être guéris qu'après 3 mois et même près d'un an depuis le commencement du traite-nent externe dirigé par M. Bazin lui-même. Néanmoins, nous n'hé-ıitons pas à le dire, la méthode de M. Bazin est la meilleure et la plus sûre.

Il est une méthode qui compte des succès nombreux et dont l'ex-périence a sanctionné l'efficacité, c'est celle des frères Mahon; mais es moyens nous sont sinon inconnus, au moins assez incomplé-ement connus pour que l'on puisse la formuler d'une manière certaine.

Dans cette méthode de traitement, les frères Mahon emploient leux pommades et une poudre épilatoire. Les pommades sont à leux degrés différents de force. On pense généralement que les pommades et la poudre ont pour base du carbonate de potasse ou le soude, et l'on trouve dans plusieurs formulaires la recette de ces rois agents; mais nous doutons que ces formules soient parfaite-nent exactes.

Quoi qu'il en soit, ce sont les frères Mahon qui pansent eux-mêmes les enfants pendant un laps de temps assez long, et voici comment en général ils procèdent. Ils s'attachent d'abord à faire omber les croûtes à l'aide de cataplasmes et de lotions d'eau de savon, puis ils appliquent tous les deux jours sur la tête une pom-nade au premier degré de force. La tête est peignée les jours où la pommade n'est pas appliquée. Quinze jours écoulés, ils disséminent ı la surface du cuir chevelu quelques pincées de leur poudre lite épilatoire, tout en continuant l'emploi de la première pom-nade; après six semaines de traitement, ils arrivent à la pom-nade au deuxième degré de force, tout en poursuivant l'usage de a poudre.

La durée du traitement, auquel sont joints les soins de la propreté la plus minutieuse, varie entre six et dix-huit mois; le plus souvent, elle dépasse le premier terme, et parfois aussi le second. Ils pres-

crivent aussi pour quelques enfants l'usage de sirops dépuratifs, et parfois l'application d'un exutoire.

L'administration des hôpitaux de Paris confie à MM. Mahon le traitement d'une partie des teigneux qui ne sont pas admis à l'hôpital : M. Bazin dirige celui des autres malades qui n'entrent pas à l'hospice, le nombre en est considérable. Des médecins sont chargés de constater l'espèce de *favus* et l'état de l'enfant avant le traitement, ainsi que la guérison après le traitement. Pour notre compte, nous apportons le plus grand soin à cet examen, et nous avons constaté un grand nombre de guérisons opérées de cette manière.

Nous devons à la vérité de dire qu'il est des cas qui résistent à ces soins bien dirigés, qu'il en est d'autres où il y a récidive, mais ces cas sont l'exception. La méthode de M. Bazin est sans contredit supérieure à celle de MM. Mahon.

Il est peu de médecins qui, chargés d'un service de maladies cutanées, n'aient fait des essais dans le but de trouver un moyen propre à combattre la teigne avec efficacité : sous ce rapport, j'ai employé moi-même un grand nombre de médications.

Et d'abord, il faut établir une distinction entre les espèces de *favus*, ainsi que dans l'époque de leur développement. Le *favus scutulata*, celui qui affecte à la fois le cuir chevelu et la peau, soit de la face, soit des membres ou de toute autre partie du corps, est très facilement curable. Quand il est récent, il suffit de quelques bains, d'applications émollientes et de lotions sulfureuses employées à la fin du traitement, pour en opérer la guérison. Si quelques points résistent, on cautérise la surface malade avec un pinceau imprégné d'une solution de nitrate d'argent au dixième, et il est rare de ne pas voir céder le mal.

Cette espèce de *favus* est-elle ancienne, elle devient beaucoup plus rebelle. M. Bazin considère le *favus scutulata* comme plus rebelle que le *favus lupinosa;* nous ne saurions nous ranger à son opinion. Le *favus squameux* est plus difficile à guérir encore; et le plus tenace de tous, c'est le favus squameux. Voici au surplus les préceptes généraux que nous croyons devoir formuler relativement à la thérapeutique des *favus*.

Nous considérons cette maladie comme étant liée à la constitu-

ion du sujet. Tous ces enfants sont généralement lymphatiques; eur intelligence est obtuse, leur facultés morales en général peu léveloppées. Certes l'état d'isolement dans lequel ils se trouvent lacés, l'éloignement et l'espèce de répulsion qu'on leur témoigne, ntrent pour quelque chose dans cet état général d'apathie et d'inlolence qui fait le cachet de ces enfants; mais toujours est-il que e tempérament et la constitution qui leur sont propres, réunis à les conditions de misère et de malpropreté, en ont été en général e point de départ.

D'où la conséquence qu'il ne faut pas seulement voir dans la teigne une maladie locale, mais bien une forme morbide derrière laquelle se cachent des conditions de vitalité et d'organisation qu'il faut chercher à modifier avantageusement par les médications toniques, excitantes: soit que l'on ait recours au fer, soit que l'on ait recours au soufre sous des formes diverses, tant en boissons qu'en bains, moyens liés d'ailleurs à une alimentation substantielle. C'est là le point de départ de tout traitement.

Une seconde circonstance très importante, c'est que la teigne exige des soins de tous les jours; aussi les cheveux seront d'abord coupés aussi courts que possible. Des cataplasmes de farine de graine de lin seront appliqués tièdes pour faire tomber toutes les croûtes: ils seront mis la nuit; le jour, la tête sera graissée avec du saindoux très frais et mis en abondance. Le matin, des lotions d'eau de savon seront faites afin de tenir très propre le cuir chevelu.

Lorsque la peau sera parfaitement nette et qu'elle sera devenue lisse et au même niveau, on commencera le traitement: à cet effet, on étendra une couche d'huile de cade trois jours de suite sur toute les surfaces dont on veut avulser les cheveux. Il est constant que, comme l'a indiqué M. Bazin, cette huile prépare une avulsion plus facile et moins douloureuse des cheveux. On procédera à l'épilation, que l'on pratiquera en un seul jour ou en plusieurs fois; mais il faut, après l'avulsion, incomplète ou complète, faire humecter cinq ou six fois le jour la peau dépourvue de cheveux avec une solution de sublimé contenant 5 décigramme de sublimé pour 500 grammes d'eau, et ce pendant quatre à cinq jours. Ce temps écoulé, on arrive

à l'emploi de liniments ou de pommades matin et soir, et après un mois, lorsque les cheveux repoussent, on les avulse de nouveau, et l'on répète même plus tard cette opération, jusqu'à ce qu'ils repoussent forts, brillants, bien organisés, et non plus grisâtres, amaigris, ternes, comme ils étaient pendant la durée de l'affection. Quant à la pommade, les recherches microscopiques avaient conduit M. Bazin à formuler une pommade ayant pour base l'acétate de cuivre, 1 gramme pour 30 grammes. Il emploie maintenant une pommade au turbith minéral (s. deuto-sulfate de mercure) dans les mêmes proportions.

A l'égard du premier de ces agents, l'expérience et la pratique m'avaient conduit à son emploi, car j'avais reconnu depuis longtemps que la pommade qui guérissait le mieux la teigne était une pommade au carbonate de cuivre, que je formulais à raison de 1 à 2 grammes de carbonate pour 30 d'axonge.

J'ai guéri par ce moyen des favus fort anciens; j'ai pu l'employer comparativement à d'autres agents, et voici dans quelles circonstances. Le docteur Huet, alors médecin de la prison des Madelonnettes, vint me prier de voir seize enfants détenus, qui avaient séjourné durant des années dans diverses prisons, sur lesquels il avait mis en usage tous les traitements préconisés contre la teigne, et toujours sans succès. C'était en majeure partie des teignes squameuses, c'est-à-dire des plus rebelles. On n'avait pas négligé l'emploi du traitement dit des frères Mahon.

Ces seize enfants furent divisés en quatre catégories, et nous mîmes en regard quatre traitements différents. Une pommade au sulfhydrate de sulfure de chaux, 10 grammes pour 60 d'axonge, de la pommade au 60e de carbonate de cuivre, les bandelettes de gomme ammoniaque suivant le procédé de M. Evens (du Hanovre), et le liniment de Jadelot. A part la pommade au carbonate de cuivre, il fallut abandonner les autres traitements; les bandelettes d'emplâtre à la gomme ammoniaque étaient trop douloureuses dans leur avulsion, la pommade au sulfure de chaux et le liniment de Jadelot amenaient une irritation trop vive du cuir chevelu. De sorte que M. Huet s'en tint à celle au carbonate de cuivre, qui lui parut le mieux réussir. Malheureusement la majeure partie de ces enfants

fut transférée dans d'autres prisons ou bien ils terminèrent leur temps de détention, mais la guérison fut complète et ultérieurement bien constatée chez trois d'entre eux. Plusieurs autres quittèrent la prison sans qu'il y eût apparence de teigne, mais on n'a pu les revoir plusieurs mois après, afin de vérifier leur curation complète. Le traitement de ce groupe d'enfants donne une idée de l'efficacité des principaux agents qui ont été préconisés dans le traitement de la teigne.

L'expérimentation sur la tête des teigneux nous a donc conduit, comme on le voit, à l'emploi de l'agent qui modifie le plus la structure des sporules ou granules végétatives, c'est-à-dire une préparation cuivreuse, car M. Bazin, en opérant des réactions chimiques sous le microscope, a reconnu que le sublimé et l'acétate de cuivre étaient les deux agents modificateurs les plus puissants sous ce rapport.

L'épilation incomplète peut se pratiquer à l'aide du sulfhydrate de sulfure de chaux, proposé par MM. Bœttger et Martens. Au moyen de l'application d'une couche de quelques millimètres d'épaisseur, les cheveux sont coupés *à leur sortie du cuir chevelu* en quelques minutes, cinq à dix au plus, mais ils ne sont pas avulsés; en sorte que le favus qui tapisse le bulbe n'est pas attaqué. Les cheveux repoussent, et il faut renouveler l'opération quelques jours après; les autres dépilatoires ont le même inconvénient, et celui que nous indiquons, à part son odeur, est préférable. En résumé, depuis que j'ai expérimenté l'épilation dans le traitement de la teigne, je puis dire qu'elle est un moyen puissant d'abréger la durée du traitement de cette maladie, et que cette pratique de Samuel Plumbe, oubliée d'abord, renouvelée depuis par M. Bazin, est appelée à rendre de grands services dans cette affection.

HERPÈS TONSURANT, *teigne tondante* de Mahon, *teigne tonsurante* de M. Bazin.

J'ai décrit, page 274, cette maladie comme ne pouvant pas encore être complétement isolée de l'herpès. Il y a plus, les recherches microscopiques récentes tendraient à la rapprocher de cette affec-

tion plutôt qu'à l'en éloigner. D'une part, il est constant aujourd'hui que non-seulement l'herpès est contagieux, ainsi que Mahon et M. Cazenave l'ont démontré, en ce sens, que l'herpès tonsurant fait naître un herpès tonsurant sur la tête d'un autre enfant; mais encore il est établi aujourd'hui par les faits que M. Baeresprung a cités et par d'autres assez nombreux qui ont été recueillis depuis, que, ainsi que l'avait fait entrevoir M. Cazenave, mais sous un autre rapport, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, l'herpès tonsurant peut développer chez un autre individu, et sur des parties dépourvues de cheveux ou de poils, l'herpès circiné. Ainsi nous avons eu l'occasion de voir à notre consultation une femme qui nous présentait un enfant atteint d'herpès tonsurant à la tête, et ayant plusieurs plaques d'herpès circiné au cou; la maladie, à l'état d'herpès circiné avait été communiquée à son frère, âgé de quatre ans; cette jeune fille en avait trois. La mère l'avait contractée de ses enfants, mais à l'état d'herpès circiné : elle avait des plaques sur les bras. M. Baeresprung a dessiné des plaques d'herpès tonsurant de diverses grandeurs sur le cou du cuir chevelu d'un enfant, suivi du développement d'herpès circiné, et dont l'une d'elles occupait la partie la plus déclive du cuir chevelu et la partie la plus élevée du cou. M. Cazenave a cité des cas du même genre. Et comme M. Baeresprung a signalé dans l'herpès circiné l'existence du trichophyton, cryptogame de l'herpès tonsurant, il résulterait de l'ensemble de ces faits une analogie très complète entre ces deux maladies.

Cependant il nous faut appeler l'attention des médecins sur une différence capitale entre les deux affections au point de vue de la forme pathologique. Il est constant, et tous les auteurs sont d'accord à cet égard, qu'il n'y a pas d'herpès circiné sans l'existence d'un bourrelet circulaire à vésicules extrêmement ténues. Or l'observation apprend que dans la presque totalité, si ce n'est dans la totalité, des cas d'herpès tonsurant, le bourrelet vésiculeux manque. Aussi M. Bazin s'est demandé si l'herpès circiné ne précéderait pas le développement de l'herpès tonsurant. Nous ne pouvons admettre sans une observation ultérieure bien exacte cette supposition, qui nous paraît un peu établie pour le besoin de la cause. Nous n'avons

ımais observé de bourrelet dans l'herpès tonsurant; M. Bazin n'en pas vu non plus. Ce sont donc des recherches ultérieures à faire ıour bien préciser ce point de pathologie.

Bornons-nous donc à établir les propositions suivantes comme tant des faits acquis aujourd'hui, à savoir: que l'herpès tonsuant, contagieux de sa nature, développe sur la tête d'autres enants, et par contagion, des plaques d'herpès tonsurant; que sur les nfants qui en sont atteints, il peut développer ou il peut se développer des plaques d'herpès circiné sur le cou, les bras, la poitrine, ui coïncident avec l'herpès tonsurant; que l'herpès tonsurant peut aire naître de l'herpès circiné sur des parties autres que le cuir hevelu chez des enfants ou chez des adultes, et qu'alors ces sortes l'herpès circinés coïncident avec l'existence du même cryptogame ue celui qui existe sur les plaques d'herpès tonsurant, c'est-à-dire e trichophyton; ce qui n'empêche pas qu'il puisse exister des ıerpès circinés développés spontanément, et qui soient exempts de oute production végétale, contrairement aux opinions émises dernièrement par M. Baeresprung; qu'il est très douteux jusqu'alors ue l'herpès tonsurant soit précédé ou accompagné d'un bourrelet ésiculeux comme l'herpès circiné; enfin que l'herpès tonsurant est ıne maladie essentiellement parasitaire. M. Baeresprung a de plus ignalé l'existence d'un cryptogame dans l'herpès circiné.

Or le champignon qui coïncide avec lui, et que l'on désigne sous e nom de *trichophyton Malmsten*, ou trichophyton tonsurant, que ıous avons décrit dans les préliminaires des maladies parasitaires, age 510, prend naissance dans le bulbe des cheveux; mais il est robable que s'il s'est développé après, et par suite de la contagion, l doit naître et végéter sur le cheveu lui-même où il est déposé out d'abord, pour s'étendre au bulbe ensuite; qu'il pénètre dans es enveloppes du cheveu, végète dans son bulbe et dans le canal médullaire, et y trace des chapelets de spores tant au dedans u'au dehors. Je dis au dehors, car si l'on examine le cheveu maade au microscope et que l'on prenne surtout un des cheveux assés du centre de la plaque, on voit que toute sa surface est tracée le sinuosités linéaires avec ou sans spores, qui lui donnent l'aspect l'une écorce de chêne; c'est ce que représente la gravure que nous

dit dans nos préliminaires sur les parasites végétaux, l'enveloppe malade épidermique du cheveu, qui par l'arrachement s'est contractée et s'est relevée sur le cheveu même.

Tels sont les principaux phénomènes que nous avons observés. Ils nous paraissent suffisants pour édifier le médecin. Seulement, le caractère principal et essentiel du cryptogame, c'est la spore. Il faut trouver des spores pour affirmer l'existence du champignon, et ce ne sera pas une spore qui suffira pour le caractériser, ce sera toujours une agglomération de 10, 20, 100 spores qui établiront ce caractère.

A sa naissance, l'herpès tonsurant présente un certain état inflammatoire; il est accompagné d'un peu de rougeur et de démangeaison, mais cet état n'est que très passager. La plaque, de quelques millimètres d'abord, s'étend peu à peu en prenant une forme ovoïde pour gagner une surface qui se limite à 1, 3, 5 ou 6 centimètres de diamètre en général. Les plaques sont le plus souvent multiples. Elles arrivent en un mois ou six semaines à un état stationnaire, qui reste ainsi permanent pendant des mois entiers; la peau sans tuméfaction aucune et ne développant que quelques rares phénomènes de démangeaison; puis les plaques se débarrassent peu à peu de leur poussière grise; les cheveux repoussent, grêles d'abord, puis un peu moins friables, pour être remplacés par des cheveux plus forts, et se terminer par la guérison sans alopécie.

Le diagnostic de l'affection est très facile. La dénudation d'un ou plusieurs points de la tête sur une surface grisâtre ou légèrement squameuse couverte de cheveux de 3 à 4 millimètres, grisâtres eux-mêmes; la forme ovoïde de la plaque, l'aspect de tonsure qu'elle représente, forment autant de caractères, en dehors des notions microscopiques que l'on peut acquérir, qui en général sont inutiles, pour reconnaître la maladie.

J'ai indiqué, page 289, le traitement de l'herpès tonsurant; j'y ajouterai peu de chose, si ce n'est que l'onguent citrin, l'huile de cade, me paraissent préférables aux lotions de sublimé indiquées par M. Bazin, et qu'il y a avantage dans cette maladie à provoquer un autre mode de vitalité de tissu, en excitant, irritant la peau, de manière à l'enflammer à un faible degré, sauf à la traiter par les émol-

ıts ensuite. Toutes les préparations mercurielles étant parasiti-es, l'onguent citrin atteindra parfaitement le but.

PORRIGO DECALVANS, *teigne achromateuse* de M. Bazin.

Il faut clairement rattacher cette dénomination à une maladie de peau, qui a pour caractères : 1° d'amener immédiatement la chute s cheveux, de manière à en faire disparaître toute trace et à laisser ıe peau aussi lisse, aussi douce que la peau la plus fine ; 2° de pro-ıire au début une turgescence de la peau en vertu de laquelle elle rait comme légèrement œdématiée ; 3° d'amener dans les premiers mps de son développement une teinte rosée très légèrement flammatoire. *Premier phénomène.* C'est une chose remarquable ıe de voir tomber, d'une manière assez rapide, dans un ou plu-ɛurs points du cuir chevelu à la fois, la totalité des cheveux qui couvrent une surface donnée, et de trouver la peau absolument ènudée, lisse, sans pellicules, furfures, sécrétion, et à peine avec sentiment d'une légère démangeaison, ou plutôt d'une légère ıaleur ou tension. Cette épilation va en augmentant, en se multi-iant par plaques qui s'élargissent, se confondent bientôt au point amener des dénudations de 8, 10, 12 centimètres en surface, tou-urs arrondies ; et plus tard au point de produire la chute totale ɔn-seulement des cheveux, mais encore des sourcils, des cils et ɛs poils de tout le corps. Ce dernier cas est beaucoup plus rare, ıais nous en avions un exemple dans nos salles il y a quelques ınées. Aussi la plupart des auteurs ont-ils pris cette maladie pour *vitiligo.* Mais il existe à cet égard des différences très grandes ; le tiligo est une simple décoloration de la peau, capable, il est vrai, ıand il se montre à la tête, de faire blanchir les cheveux ou 'amener la *canitie*, mais le vitiligo n'amène que très secondaire-ıent la chute des cheveux et des poils. D'ailleurs, dans le vitiligo ı peau est décolorée sans être malade, en apparence au moins, et ous allons démontrer que dans le *porrigo decalvans* la peau est videmment malade. C'est d'ailleurs ce qui constitue le *second hénomène* sur lequel nous appelons l'attention. — Le cuir chevelu 'a pas, dans l'état normal et dans la généralité des cas, la couleur de

la peau du reste du corps. Il est ferme, dur, consistant, adhérent aux os par un tissu cellulaire très serré; sa couleur tire un peu sur le *gris*. Dans le *porrigo decalvans* la peau prend au début une teinte d'un blanc très légèrement rosé; si l'on compare alors sa couleur à la peau du reste du corps, au lieu de la comparer à celle du cuir chevelu avoisinant, on ne s'aperçoit pas du changement qui s'est opéré. Il y a plus, et c'est donner lieu au troisième phénomène qui est propre au porrigo récent, si l'on touche cette peau avec l'extrémité des doigts, au lieu d'avoir un tissu serré adhérent aux os, on a une sensation d'un tissu empâté, comme infiltré, comme œdémateux, qui est tellement prononcé que ce tissu cutané semble avoir dans quelques cas 12 à 15 millimètres d'épaisseur, y compris le tissu cellulaire, qui participe certainement à l'état de la peau. Ces divers phénomènes qui distinguent cette maladie de toute autre affection, ont pour la plupart été méconnus. Or, ils apparaissent tous les trois au début de l'affection, et ils persistent tant que la maladie fait des progrès. Ceux-ci sont tels que, dans certaines circonstances, il ne reste plus trace de cheveux sur la tête. Lorsque la maladie s'arrête, la peau commence à pâlir pour devenir ensuite d'un blanc mat; mais elle reste molle, empâtée, pendant longtemps encore; puis elle reprend de la consistance et s'accole aux os; enfin, lorsque la maladie commence à se guérir, la peau perd de sa pâleur en même temps qu'il y repousse un duvet, qui se transforme peu à peu en cheveux tout aussi consistants qu'auparavant. Mais, disons-le tout de suite, il faut du temps et beaucoup de temps. Il faut surtout prendre la maladie à son début, car lorsque plusieurs mois ou des années se sont écoulés depuis son invasion l'affection devient incurable, en ce sens que les cheveux ne repoussent jamais, quoi qu'on fasse. C'est pour ne pas avoir observé des porrigo récents que la plupart des auteurs, et même des modernes, ne parlent que de l'épilation produite par cette maladie, de la pâleur de la peau et de l'adhérence de celle-ci aux os.

Il y a donc, d'après cette description, une différence essentielle entre le *porrigo decalvans* et le *vitiligo:* dans cette dernière maladie, la peau a perdu sa couleur, mais elle est restée saine; dans le *porrigo decalvans*, la peau est malade, ainsi que le tissu cellulaire sous-

cutané, qui n'est affecté que d'une manière secondaire, il est vrai, par ce dernier. Le *porrigo decalvans* ne peut se montrer que là où il y a des cheveux et des poils ; le vitiligo se produit sur un point quelconque de la surface du corps. Quoi qu'il en soit, c'est une maladie fort curieuse et fort rebelle. Elle apparait par une petite plaque dénudée sur un point quelconque du cuir chevelu ou de la barbe, puis une deuxième, une troisième un peu plus loin, et ainsi de suite, en nombre indéterminé. Quelquefois cependant la maladie se borne à une ou deux plaques. Ce n'est pas là l'herpès tonsurant, car dans celui-ci il y a des traces de cheveux comme dans la tonsure, tandis que la peau est glabre dans le *porrigo decalvans*. Elle parcourt ses périodes d'accroissement pendant un mois environ, puis elle s'arrête et elle reste stationnaire pendant des mois entiers, et parfois elle passe à l'état d'incurabilité, n'amenant d'ailleurs pas de démangeaison, pas de sécrétion. M. Bazin a décrit une forme serpigineuse que je n'ai jamais vue. C'est surtout dans l'adolescence, et souvent même plus tard, qu'elle se montre. En dehors de ces caractères d'aspect, de forme et d'état morbide local, M. Gruby a signalé dans cette affection l'existence d'une production de nature végétale, c'est le *Microsporon Audouini*, dont nous avons exposé les caractères dans nos préliminaires sur les parasites végétaux. M. Bazin a décrit cette maladie comme une teigne. Il a décrit aussi, sous le nom de *teigne achromateuse*, deux faits qu'il a publiés en 1853 dans la *Gazette des hôpitaux*, et qui ne nous paraissent être autres que des porrigo decalvans. Mais il en admet une variété que nous devons signaler, et dans laquelle les plaques seraient accompagnées d'une dépression semblable à celle que produit le doigt sur une partie œdématiée. Nous croyons qu'il n'y a pas, en fait de teigne achromateuse, d'autre maladie que le porrigo decalvans, et nous pensons que dans l'espèce, c'était un porrigo ancien dont la peau était déprimée et à la période stationnaire.

Quelque soin que nous ayons mis à examiner les cheveux de deux porrigo decalvans, l'un ancien, en traitement depuis cinq à six mois dans le service de notre collègue M. Bazin ; l'autre, d'un mois de date, au plus, dans notre service, nous n'y avons reconnu que l'enroulement morbide épidermique, sur lequel nous avons appelé

l'attention dans nos préliminaires sur les parasites végétaux. M. Robin ayant examiné des cheveux pris à la limite de la partie dénudée, et à un demi-centimètre de la dénudation, nous a déclaré que ces cheveux étaient parfaitement exempts de champignons ; à cette époque de la maladie le champignon avait donc disparu sans aucun traitement.

Mais si nous n'avons pas trouvé de champignon, nous pouvons faire connaître une altération qui n'a pas encore été signalée par les auteurs ; elle consiste dans les faits suivants : 1° le bulbe du poil qui limite la plaque dénudée s'enlève le plus souvent sans ses membranes ; 2° le bulbe du cheveu ou du poil, au lieu d'être renflé comme de coutume, est atrophié très sensiblement, au point de former un très grand contraste avec l'état normal. Cette atrophie du bulbe doit évidemment jouer un rôle particulier dans la maladie ; et si elle en constituait le caractère principal, si elle était primitive, elle expliquerait parfaitement la chute des cheveux. Ceux-ci sont d'ailleurs légèrement décolorés à leur sortie de la peau, ce que nous avons observé chez un jeune homme qui était très brun ; les cheveux avaient une couleur fauve dans une étendue de 3 ou 4 millimètres. Enfin le canal central est surtout complétement effacé, même chez les jeunes enfants qui sont atteints de cette maladie. Ces divers phénomènes ne peuvent être aperçus qu'au microscope, sauf la décoloration partielle que je viens de signaler.

Envisagé au point de vue du pronostic, le *porrigo decalvans* est une maladie de peau, sinon grave, au moins compromettante pour les cheveux. On la considère, d'ailleurs, comme étant contagieuse, et, en effet, il n'est pas rare de la voir se propager d'enfant à enfant, ou d'enfants à adultes dans la même maison.

Traitement. — Lorsque le *porrigo decalvans* est lié à un tempérament lymphatique, à une constitution molle, il y a toujours grand avantage à prescrire un traitement antiscrofuleux. Mais cette maladie est souvent indépendante de toute lésion générale. Je me suis toujours bien trouvé, au début du traitement, de l'usage de bains de vapeurs tous les trois jours : je fais appliquer des cataplasmes de fécule de pomme de terre tous les soirs sur les surfaces malades, et un corps gras dans le jour. Je poursuis l'emploi de ces

moyens jusqu'à ce que l'état aigu soit arrêté et que la peau ait perdu en partie sa teinte rosée et son état semi-œdémateux ; alors je mets en usage les pommades résolutives au tannin, à l'oxyde de zinc, j'emploie l'huile de cade tous les deux jours, et même tous les jours ; je termine la maladie par la pommade au carbonate de cuivre et par des applications successives d'une solution de nitrate d'argent (voy. *Formulaire*). Ce qu'il faut surtout recommander, ce sont des soins de propreté très grands, des lotions savonneuses tous les jours dans la période de résolution. Ce n'est guère que dans l'espace de plusieurs mois que l'on peut espérer une guérison quand la maladie est ancienne, mais elle guérit en six semaines lorsqu'elle est récente. On entretient la poussée des cheveux par l'emploi de liqueurs alcooliques ou de pommades et de poudres toniques. M. Bazin propose, comme pour la teigne, l'épilation et les lotions de sublimé ; nous la concevons dans le but d'empêcher peut-être l'extension de la maladie, car pour la maladie elle-même il n'y existe pas vestige de duvet : il n'y a rien à épiler. Aussi dans les deux observations qu'il a publiées voit-on l'épilation jouer un rôle fort secondaire.

SYCOSIS, *mentagre*.

Nous avons peu de chose à dire du sycosis après la description que nous avons donnée de cette affection dans l'histoire des maladies pustuleuses (voy. page 362) ; ce n'est guère que sous le rapport microscopique que nous pouvons l'envisager ici. Nous rappellerons seulement que la dénomination de *sycosis* n'est applicable qu'à deux formes morbides qui affectent le menton ; nous rejetons la dénomination de *teigne mentagre*, parce qu'il existe bon nombre de sycosis sans production cryptogamique ; nous rejetons aussi la dénomination de *mentagre*, parce qu'elle comprend toutes les maladies du menton, l'eczéma, l'impétigo aussi bien que le sycosis, et qu'il est très important, pour ne pas avoir de confusion dans les maladies, de conserver la dénomination grecque qui indique une maladie spéciale. Ceci posé, si l'on se reporte à ce que nous avons dit en décrivant succinctement les principaux parasites végétaux, on verra

que les micrographes ne sont pas d'accord sur les champignons de ce qu'ils appellent la mentagre; que M. Bazin n'a trouvé dans le sycosis que le trichophyton, ainsi que nous; qu'il n'y a pas vu le microsporon *mentagrophyte*. Toutefois, comme M. Gruby nous a fait voir ce parasite végétal sur une préparation dont l'origine ne nous était pas connue, nous sommes loin de douter de son existence, mais nous ne saurions dire dans quelle espèce de *mentagre* ou de maladie du menton on la rencontre; M. Robin a fait plus, il a mis en doute son existence. On voit donc que sous tous ces rapports il y a, quant à présent, doute et incertitude, et qu'il faut de nouvelles observations pour faire connaître quelque chose de positif à cet égard. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que dans la généralité des cas d'impétigo sycosiforme, d'eczéma, d'impétigo, de sycosis tuberculeux ou pustuleux, il n'y a pas de champignon; que la chute des poils dans cette maladie est moins une conséquence du champignon parasitaire que de l'inflammation pustuleuse ou tuberculeuse de la peau, à laquelle vient se joindre l'inflammation du bulbe du poil; que dans les sycosis, l'épilation se fait naturellement, et qu'il n'est presque jamais, pour ne pas dire jamais, nécessaire de l'opérer artificiellement.

Je joins ici une observation d'impétigo sycosiforme où l'on verra le rôle insignifiant qu'a joué l'épilation, malgré ses nombreuses répétitions.

Impétigo sycosiforme. — Lèvre supérieure. — Nicot (Jean), vingt-huit ans, entré le 8 juin 1854 salle Saint-Louis, n° 6. Tempérament lymphatique sanguin. Chancre contracté au mois d'août 1850. Traité à l'hôpital de Lyon. Quatre bois sudorifiques, liqueur de Van Swieten. Sorti guéri fin septembre. En décembre, il contracte la gale; il en est guéri en quinze jours par un vieux médecin des environs de Lyon, qui le fait frotter avec du savon sulfo-alcalin. En janvier 1851, syphilide papuleuse : point de traitement. 15 janvier 1854, ulcérations syphilitiques de la verge. Traité à l'hôpital de Dijon, il prend des pilules de proto-iodure; bains de sublimé. Apparition de l'*impétigo sycosiforme;* cataplasmes de fécule, pommade soufrée. Il sort guéri le 15 avril 1851. Quinze jours après apparaissent des plaques muqueuses à l'anus : il reste neuf mois sans traitement. En février, il rentre à l'hôpital de Dijon : il prend pendant deux mois de la liqueur de Van Swieten; les plaques sont cautérisées au nitrate d'argent. Sort guéri en mai. En juillet 1852 il rentre à l'hôpital de Dijon pour son impétigo; cataplasmes, chicorée, pommade au calomel. En

septembre, il sort non guéri. Il rentre à l'hôpital de Lyon, reprend de la liqueur de Van-Swieten et tous les deux jours un verre d'eau de Sedlitz et une pilule d'aloès, des bains sulfureux, puis il se graisse successivement avec la pommade soufrée et ultérieurement à l'huile de cade. Ressort en mars 1853, non guéri. En février 1854, M. Ricord lui fait prendre des pilules de Plumer, bains de vapeur, cataplasmes de fécule, lotions de sublimé, puis teinture de Fowler. En juin 1854, il entre à Saint-Louis. Pustules ayant leur siége sous la cloison nasale, petites, acuminées, recouvertes par une croûte gris jaunâtre sale. La maladie date de trois ans. Quelques pustules se sont développées dans les narines et sont traversées par des poils. — Chaleur, douleur, démangeaison, coryza ancien et chronique. — Quelques pustules se sont développées plus loin; elles ont le caractère de celles de l'impétigo. Lèvre rouge, gonflée; sous la croûte se trouve une surface rouge mamelonnée. — Pour traitement: chicorée, pilules de sublimé, iodure de potassium, cataplasmes de fécule, poudre de calomélas, puis pommade au sulfate de fer. — Jusqu'au 22 septembre, amélioration sensible; diminution dans le nombre et le volume des pustules se rapprochant de celles de l'impétigo. — 8 octobre. Première épilation complète. — 12. Apparition de pustules nouvelles, mais fugaces. — 23. Épilation nouvelle. — 27. Apparition de deux pustules nouvelles et fugaces. — 17. Nouvelle épilation. — 3, 4, 5 novembre. Nouvelles pustules toujours de peu de durée. — 15. Deux pustules nouvelles près du bord libre de la lèvre supérieure droite. — 18, 24. Apparition d'une pustule. — 24 novembre au 16 décembre. La maladie, abandonnée à elle-même, sauf l'usage de la pommade, s'est reproduite principalement du côté droit; d'abord ce furent des pustules rares et fugaces, puis ultérieurement permanentes, surtout sous la cloison. — 16 décembre. Nouvelle épilation partielle. — 19. Les pustules reviennent avec abondance. — 21. Epilation totale de la moustache. Inutile de dire que les épilations étaient chaque fois suivies de lotions de sublimé et de l'emploi de la pommade au turbith minéral. — 26. Depuis l'épilation, tout a cédé et s'est complétement amendé. — 17 janvier. La rougeur n'a jamais disparu complétement, et depuis le 26 décembre, malgré un mieux soutenu, il est survenu quelques pustules beaucoup plus rares, il est vrai. Aujourd'hui, cautérisation avec la dissolution concentrée d'hydrochlorate d'or.

HERPÈS CIRCINÉ.

M. Baeresprung, dans un mémoire publié en 1855 à Berlin (*Annalen des Charité Krankenhauses*), a fait connaître dans l'herpès circiné annulaire ou à centre dégagé l'existence d'un champignon qui ne serait autre que le *trichophyton tonsurans*. Il a fait voir que l'herpès tonsurant pouvait le développer sur d'autres parties dé-

pourvues de poils, ce qui n'avait pas été aussi nettement indiqué par M. Casenave, et ce que nous avons constaté depuis de la manière la plus évidente. Nous en avons donné des preuves dans l'histoire pathologique que nous avons tracée (pages 269 et suivantes).

Nous nous sommes élevé dans cet article contre l'opinion qui attribuerait toute la maladie à l'existence du trichophyton, et nous avons combattu à cet égard l'opinion de notre collègue M. Bazin, qui prétend opérer la guérison des herpès de ce genre par l'épilation, quand il y a des poils, et les lotions de sublimé. Or, de son propre aveu, le cryptogame peut naître et mourir sur la peau, s'il ne trouve pas de poil pour végéter. Eh bien, il est un grand nombre de cas où après avoir détruit le parasite, ce qui revient au même que dans les circonstances où il meurt parce qu'il ne trouve pas, soi-disant, de poil pour végéter, la maladie n'en subsiste pas moins, et le fait suivant, dont j'ai tenu à donner l'observation avec détail, le prouve de la manière la plus évidente.

Quoi qu'il en soit, il n'en résulte pas moins des recherches de M. Baeresprung qu'il y a lieu, dans les cas où la maladie se montre et devient surtout rebelle au traitement ordinaire, de voir si les difficultés du traitement ne pourraient pas provenir du parasite végétal, et de le détruire par les pommades mercurielles, les lotions ou les bains de sublimé. (Voy. pour le trichophyton la page 510 et les planches de micrographie.) M. Baeresprung a de plus signalé dans l'herpès circiné inguinal un champignon particulier que nous avons eu occasion de voir.

Observation d'herpès persistant malgré la destruction du cryptogame. — M. X... est né de parents sains et très bien portants. A l'âge de dix-huit ans, survint au menton une éruption *boutonneuse*, qui dura trois mois, et se termina seule. De vingt à vingt et un ans, affection syphilitique. En 1824, écoulement. A partir de 1827, périostose du fémur avec inflammation; abcès. Séjour de trois ans au lit.

En 1831, apparition de quelques plaques morbides au cuir chevelu, si légères d'ailleurs qu'Alibert ne prescrivit aucun traitement.

1834, la cuisse redevient malade et conduit à un repos de cinq années : c'était à la suite de larges plaisirs de la chasse et d'une vie aristocratique en Angleterre. Douleurs nocturnes, insomnie. Guérison par les moxas de Larrey.

1838, séjour à Baréges; sortie d'une esquille à travers la plaie de la cuisse.

1839, mariage. Nouvelle saison à Baréges. Cinq mois après, réouverture du trajet fistuleux.

Depuis 1831, l'affection cutanée a toujours existé sur le cuir chevelu ; elle s'y est même généralisée. A plusieurs reprises, les aisselles ont été atteintes.

Appelé en février 1856. M. X... était depuis six mois à un traitement homœopathique, mais *auquel on avait ajouté en abondance de la pommade au goudron, très forte, et des bains alcalins*. Inutile de dire que M. X... avait consulté de nombreux médecins avant d'arriver à cette médecine.

Je trouvai M. X... dans un état moral assez grave pour l'avoir fait *réfléchir* sur le suicide. Il existait sur tout le corps, la poitrine et la partie supérieur du dos exceptées, des plaques nombreuses de psoriasis herpétiforme, herpès circiné squameux, représentant une série de cercles uniques ou confondus, qui laissaient des espaces à peau épaisse non dégagée, écailleuse, mais à bords plus épais, boursouflés, très arrêtés, les unes assez petites, les autres très larges (15 centimètres de diamètre), ayant d'ailleurs gagné le cou, le menton, le dos des mains, les pieds, mais siégeant surtout en dehors des membres et sur le dos de préférence aux parties antérieures.

Sur bon nombre de ces plaques existaient de grosses papules ressemblant à celles que j'ai signalées comme étant le résultat de l'emploi exagéré de pommades. On peut dire que le corps du malade représentait assez bien la peau d'un zèbre, tant les plaques de psoriasis herpétiforme étaient multipliées.

Je fis cesser toute pommade. Je prescrivis au malade des bains de vapeur tous les trois jours et le mis à l'usage de la solution de Fowler, et de celle du sirop d'iodure de fer à 2 grammes dans une tasse de tisane de pensée sauvage. Le traitement fut commencé le 18 février 1856. Quelques bains alcalins furent alternés avec les bains de vapeur ; au 4 avril, tout le centre des plaques était complétement dégagé ; il ne restait plus de ces plaques nombreuses que quelques légers segments de cercle ; la solution de Fowler avait donc amené une guérison presque complète.

Cependant, vers le 15 avril, reparurent, sous l'influence ou après l'usage des bains de vapeur, une série de grosses papules disposées symétriquement en dehors et à l'extérieur de quelques plaques, mais notamment sur le dos. En présence des antécédents du malade, je joins à la solution de Fowler l'usage d'un sirop dans lequel entrent l'iodure de potassium à 10 grammes pour 1000 grammes de sirop, et 15 centigrammes de bichlorure de mercure. M. X... étant fort et d'une excellente santé, d'un tempérament lymphatique sanguin, supporte ces médicaments sans en être incommodé. La solution de Fowler avait été donnée à 14 gouttes par jour, à partir du treizième jour du premier traitement. Je cautérise à la solution du nitrate d'argent au cinquième les portions restantes de bourrelet, qui diminuent peu à peu d'étendue. Les grosses papules disparaissent, et le 29 juillet la maladie est très voisine d'une guérison complète, sauf quelques portions de bourrelet de 3 à 6 centimètres d'étendue, qui sont toujours recouvertes de petites

écailles, lorsque l'on n'y applique aucun corps gras. Inutile d'ajouter que quelques interruptions de sept à huit jours de traitement ont eu lieu par des congestions cérébrales, qui ont nécessité une application de sangsues à l'anus.

En cet état, et en présence d'une guérison si certaine; devant un résultat remarquable de traitement, effet que nul n'avait jamais obtenu; eu égard surtout à une médication générale si prolongée, je fis suspendre la médication arsenicale pour ne m'occuper que de compléter la médication antisyphilitique, et j'envoyai M. X... aux eaux de Plombières, où il continua concurremment ce dernier traitement. Il y prit quarante bains, y but de l'eau, sans aucun bénéfice pour l'affection cutanée contre laquelle plusieurs saisons de Vichy et de Baréges avaient été sans effet. La maladie avait progressé, et quelques-unes de ces papules signalées auparavant s'étaient transformées en cercles herpétiques, et venaient s'ajouter à ce qui restait de la maladie ancienne.

Les choses en étaient à ce point, lorsque parut le mémoire de M. Baeresprung sur l'herpès circiné dans la *Gazette hebdomadaire*. Je m'empressai d'examiner au microscope les petites écailles qui recouvraient les segments de cercles qui étaient restés, et j'y constatai la présence du *trichophyton Malmsten*. Je n'hésitai pas à conseiller l'usage, en raison de la multiplicité des points affectés, d'onguent citrin étendu de son poids d'axonge; et en effet, dans l'espace de trois semaines, il était survenu une très grande amélioration, et même une disparition d'un grand nombre des plaques *récentes;* craignant une absorption mercurielle, j'avais fait remplacer l'onguent citrin par la pommade au turbith minéral; son emploi dura huit jours. Alors M. X..., se trouvant beaucoup mieux, se relâcha entièrement du traitement; c'était en septembre, et vers le 8 octobre une nouvelle poussée aiguë, inflammatoire, se déclara. Il reprit sans me consulter l'onguent citrin, qui en huit jours d'usage augmenta naturellement tous les cercles d'herpès. C'est alors qu'il fut mis aux émollients sous toutes les formes. Mais durant ces huit jours où la pommade avait été prodiguée, il survint un commencement d'inflammation des gencives avec déchaussement de quelques dents.

L'irritation de la peau calmée, et l'état général de santé étant d'ailleurs très bon, je fis prendre des bains de guano, 1 kilogramme par bain, et fis faire des lotions sur tous les bourrelets avec une dissolution de sublimé à 1 gramme pour 500 grammes d'eau. Quatre fois par jour un domestique intelligent promenait sur les bourrelets d'une centaine de plaques au moins, disséminées çà et là, une petite éponge imbibée de cette solution, qui séchait sur la peau. Il est résulté de ce moyen un effet particulier consistant : 1° en ce que les squames, au lieu d'être chagrinées, devinrent lamelleuses et prirent un autre aspect; 2° en ce que l'épaississement de la peau diminua. Mais soit que les soins fussent trop bien exécutés, soit que la lotion fût trop forte, la peau s'irrita légèrement; des onctions de saindoux ramenèrent la peau à l'amélioration obtenue; et quatre jours plus tard, c'est-à-dire le 24 novembre,

reprit les lotions de sublimé à 5 décigrammes pour 500 grammes d'eau, au millième.

Les lotions nouvelles ont été continuées pendant huit jours. Un repos de ıelques jours a eu lieu. Les productions épidermiques et quelques poils is aux mêmes places ont été vus au microscope parfaitement dépourvus : spores ; mais la maladie n'a pas changé pour cela d'aspect ; elle est restée ıtionnaire ; la peau même avait été un peu irritée : elle a été ramenée à cet at chronique par les émollients et le saindoux. Aujourd'hui, après quelques urs de l'usage de ces moyens, la maladie est dans le même état qu'auıravant !

PITYRIASIS VERSICOLOR.

Nous avons cru devoir décrire cette maladie à l'occasion des lections squameuses ; mais on a reconnu dans le pityriasis versiılor l'existence d'un cryptogame que nous n'avons encore pu bserver qu'une seule fois, quoique les furfurs de divers malades ıent été pris pour les soumettre à l'inspection microscopique. Ce égétal est le *microsporon furfur*, dont nous avons donné les caracres dans nos préliminaires sur les parasites végétaux. Il ne se ıontrerait d'ailleurs jamais sur les parties du corps à découert, la figure et les mains, mais bien sur la poitrine et le ventre. Mais alors il y aurait donc deux espèces de pityriasis, l'un avec hampignon, l'autre sans champignon, car il existe un pityriasis ès marqué et très difficilement curable du front et de la figure ; ous l'avons décrit. Comment admettre de pareilles conditions ?) lous nous sommes élevé contre deux prétentions des micrograhes, à savoir : qu'il suffit de détruire le champignon pour guérir : pityriasis, et que ce champignon est la cause de la matière coloante jaune verdâtre qui caractérise cette maladie. Nous n'avons onc rien à ajouter dans cet article ; nous nous bornons à renvoyer e lecteur à notre planche micrographique ainsi qu'à l'explication ui la concerne, dans laquelle on retrouvera le détail du dessin u'il représente, et que nous devons à l'obligeance de M. Ch. Robin.

PLIQUE, *trichoma*.

On a donné ce nom à une maladie des cheveux et des poils qui st endémique en Pologne, et qui s'y est montrée vers l'année 1285.

Cette affection, très commune à cette époque, est devenue de plus en plus rare; aujourd'hui elle n'affecte guère que les gens malheureux et malpropres.

Elle est précédée de prodromes ou symptômes généraux, qui consistent dans du malaise, de l'anorexie, de la fièvre, céphalalgie et douleurs du cuir chevelu, vertiges, envies invincibles de dormir, douleurs dans les orbites, ophthalmie, fièvre; puis se déclare alors une sécrétion gluante au cuir chevelu, qui se déclare plus tard aux cheveux mêmes; ceux-ci deviennent douloureux à un tel point, que le moindre mouvement qu'on leur imprime suffit pour causer de la douleur. Alors les cheveux peuvent se disposer de trois manières différentes : 1° en mèches de cheveux agglutinées et pendantes, plus ou moins longues et flexibles : c'est la plique mâle ou multiforme; 2° s'intriquer les uns dans les autres sans disposition spéciale : c'est la plique femelle ou vulgaire, plique en masse; 3° acquérir une croissance et un allongement tout à fait disproportionnés, au point de ressembler à une queue de cheval: c'est la *plique à queue.* Mais ce ne sont pas seulement les cheveux qui peuvent être atteints, les poils de la barbe, ceux des aisselles, du pubis, prennent quelquefois une croissance hors de toute proportion, puisque le professeur Kaltschmidt, à Iéna, conservait dans son cabinet une pièce anatomique représentant le pubis d'une femme dont les poils avaient pris un assez grand accroissement pour pouvoir faire le tour du corps. En même temps les ongles s'épaississent et noircissent.

La maladie dure ainsi plusieurs mois ou plusieurs années. Dans la généralité des cas, elle s'éteint peu à peu, et des cheveux à l'état normal remplacent la chevelure malade; c'est alors qu'il suffit de couper tous ceux qui sont atteints de la maladie, pour en être tout à fait débarrassé.

M. Guensburg (*Découverte d'un mycoderme qui paraît constituer la maladie connue sous le nom de plique.* — *Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris*, 1843, t. XVII, p. 250) a reconnu dans cette maladie un champignon, qui ne paraît autre que le *trichophyton tonsurant* de Gruby; mais M. Guensburg en avait donné les caractères une année auparavant : il l'a désigné sous le nom de *tri-*

chomaphyte. Nous en reprodnisons la description. Il a son siége dans la racine des cheveux : 1° entre les noyaux cellulaires du cylindre radiculaire du cheveu et la surface de ce cylindre; 2° entre la gaîne de la racine et ces noyaux de cellule ; 3° au centre du cylindre suivant son axe; 4° entre les cellules épithéliales qui forment la gaîne qui tapisse le cheveu. C'est ce que nous avons reproduit d'après les dessins consignés dans les *Archives de Johannes* Müller. (Voy. planche micrographique, PLIQUE.) Dans cette espèce, les fibres articulées sont très rares, étroites, et n'ont dans leur intérieur aucune trace d'espaces intercalaires. Les spores sont très nombreuses, rondes ou allongées, à surface lisse, et quelquefois articulées par des points qui paraissent ombiliqués. Le plus souvent ces cellules sont isolées, ou accumulées en gros groupes ; quelquefois elles sont suspendues à un *hypothallus* très finement fibreux. Elles ont de $0^{mm},002$ à $0^{mm},005$. Elles contiennent des granules moléculaires punctiformes. Quant aux cheveux, ils offrent en peu de temps : 1° un épaississement de la gaîne et de la caisse; 2° une réplétion et une dilatation fusiforme de l'axe du cylindre; 3° un écartement avec séparation l'une de l'autre des fibres irrégulières en lesquelles peut se partager le cheveu; 4° une simple fente des cheveux qui laisse les spores végéter au dehors, à la surface; 5° une séparation des fibres du cheveu, qui le hérissent comme les arêtes d'un épi; 6° une division des extrémités du cheveu en forme de pinceau ; 7° épaississement de l'enveloppe épithéliale du cheveu ; 8° étiolement de plusieurs cylindres du cheveu ; 9° adhérence l'une contre l'autre de touffes de cheveux et des nouvelles productions. (Ch. Robin, *Traité des parasites végétaux.*)

Quant à la matière agglutinative des cheveux, elle est composée : 1° d'un grand nombre de cellules épithéliales, grandes et à noyaux volumineux, et de petits globules granuleux, comme ceux de l'inflammation ; 2° de cheveux plus minces qu'à l'état normal, dont la gaîne est soulevée en quelques points par des spores ; 3° de quelques cellules d'épithélium de la matière sébacée ; des mycodermes, qui, naissant dans la racine des poils, restent collés à leur partie la plus voisine des bulbes, et le plus souvent sortent de la gaîne vers la base du cheveu ; une fois hors de la gaîne, ils se réunissent ordi-

preté. L'un d'eux, Avenzoar, reconnut le premier chez les galeux la présence d'un *insecte* très petit, dont il ne connut pas le rôle, et auquel il n'attribua aucune part dans la contagion de la maladie.

Comme la notion de cet insecte ne se rattachait à rien de bien intéressant, elle demeura oubliée jusqu'au XVIe siècle, époque où presque tous les auteurs en parlèrent comme d'un ciron qui se loge sous la peau. Hauptmann, le premier, donne une description assez nette, sinon parfaitement exacte, de cet insecte, qu'il compare à la mite du fromage.

Cestoni, en 1687, fait connaître plus explicitement encore l'insecte qui coexiste avec la gale, et rejetant toutes les théories humorales inventées pour rendre compte des phénomènes que présente la maladie, il conclut à un traitement exclusivement externe.

Cependant, avec Pinel s'inaugure le retour aux idées humorales de Galien. Pinel ne conteste pas l'existence de l'acarus, mais il ne lui fait jouer qu'un rôle fort secondaire : pour lui, l'acarus est seulement la cause du prurit qui accompagne l'éruption galeuse.

Alibert et Biett allèrent plus loin encore, et nièrent formellement l'existence de l'acarus. Pour eux, la gale est simplement une éruption à forme spéciale et transmissible par la contagion, transmissible même par cette voie des animaux à l'homme.

Il n'y avait donc plus que doute ou négation absolue au sujet de l'acarus, quand Galès, par une imposture qui n'a pas de nom, vint démontrer dans les vésicules de la gale l'insecte qu'on ne savait pas y trouver. Le prétendu acarus, ramené sur la scène, valut à son inventeur, de la part de l'Institut, une récompense honorable au lieu de la réprobation et du mépris qu'il méritait.

En effet, grâce aux investigations de M. Renucci, Italien d'origine, et qui, durant une consultation d'Alibert à l'hôpital Saint-Louis, fit connaître la manière d'extraire l'acarus des sillons, tandis qu'on le recherchait dans la vésicule, M. Raspail démontra que l'acarus de Galès n'était autre chose que la mite du fromage: il fit une étude fort étendue du véritable *acarus scabiei*, qu'il décrivit sous le nom de sarcopte de la gale; seulement l'histoire tracée par M. Raspail ressemble un peu à un poëme où l'imagi-

nation a étendu et embelli le champ de vision du micrographe. (Bourguignon.)

Renucci lui-même soutint en 1835 une thèse qui résume ce qui a été fait de meilleur jusqu'à cette époque.

M. Albin Gras, élève à l'hôpital Saint-Louis en 1834, s'occupe aussi peu que Renucci de l'histoire naturelle de l'acarus; mais, à l'exemple de ce dernier, il fixe l'attention sur l'existence des galeries sous-épidermiques, ou sillons, dans lesquels se loge constamment l'acarus. De plus, il précise le fait fréquent de l'isolement absolu des vésicules d'avec ces galeries.

C'est sans doute après avoir vérifié cette disposition incontestable que M. Rayer a classé la gale parmi les *inflammations vésiculeuses*, et que, tout en reconnaissant qu'elle est entièrement le fait de l'acarus, il ne considère les vésicules et les pustules qui se produisent constamment que comme une complication de la maladie; telle est encore l'opinion généralement acceptée.

En 1843, M. Bourguignon commença cette série de longues et patientes recherches qui aboutirent, sinon à des idées *absolument* nouvelles sur la nature et le traitement de la maladie, du moins à une connaissance plus complète des mœurs, de l'anatomie et de la multiplication de l'acarus.

A la même époque, un médecin de Vienne, M. Hébra, publiait dans les *Annales des maladies de la peau* un travail dont les conclusions sont que l'acarus est la seule cause de la gale, que les sillons sont indispensables pour la reconnaître, que les topiques insecticides suffisent pour la guérir, et que les prétendues métastases racontées par les anciens sont de pures chimères.

Enfin, un des points les plus importants de l'histoire naturelle de l'acarus, la distinction des sexes, qui avait jusqu'alors échappé à MM. Bourguignon et Hébra, ayant été mis en lumière au mois d'octobre 1852, par M. Lanquetin, externe de l'hôpital Saint-Louis, il ne reste presque rien à désirer dans l'étude de cet insecte.

Cette identification de l'acarus avec la maladie dans laquelle on le rencontre n'est cependant, il faut bien le reconnaître, qu'une pure induction de l'esprit; et comme il n'est aucune théorie en médecine qui ne retentisse plus ou moins directement dans la thérapeu-

tique, cette hypothèse-ci a conduit tout naturellement à la curation instantanée de la gale par un traitement insecticide purement local. Il y a quelques années, on avait suivi une marche tellement opposée à celle d'aujourd'hui, que l'on était arrivé à traiter la gale là où l'on croyait que siégeait seulement l'acarus, c'est-à-dire aux mains et aux poignets, et dès lors on limitait les frictions à ces parties. M. Bourguignon ayant reconnu que, si l'acarus se fixe de préférence dans l'intervalle et le long des doigts, cela ne l'empêche pas de parcourir toutes les régions de la peau, conduisit à apporter dans le traitement de la gale une modification essentielle recommandée par Helmerich en 1815, c'est-à-dire l'emploi des frictions générales, ce qui fut établi à l'hôpital Saint-Louis par mon honorable collègue, M. Bazin, qui, reprenant les prescriptions faites par le médecin hollandais, obtint comme lui la guérison en trois jours. Mais mon collègue, M. Hardy, entrant plus tard plus avant dans cette voie, chercha à décharger l'administration des hôpitaux de l'admission et du séjour des galeux à l'hôpital en les guérissant en deux heures.

L'expérience étant venue sanctionner ces résultats, M. Vleminkx en Belgique, réduisit le traitement à une demi-heure de durée; enfin, dans ces derniers temps, MM. Dusard et Pilon proposèrent de le ramener à cinq minutes.

Ce traitement énergique, en effet, détruit l'acarus en une seule séance; mais la mort de l'acarus est-elle la guérison complète?

A ces doctrines captivantes en apparence, j'oppose une opinion un peu différente, qui flatte moins les esprits avides de merveilleux, mais que je soutiens avec d'autant plus de ferveur depuis longtemps, qu'elle touche plus directement aux intérêts du malade.

Pour moi, au lieu de ne reconnaître dans la gale qu'un effet de la présence d'un insecte, je suis porté a croire qu'elle consiste, avant tout, dans *une éruption qui s'accompagne d'un produit particulier, l'acarus, agent d'ailleurs lui-même d'infection, et sans la destruction duquel il est impossible de guérir la gale.* Cet acarus est-il l'effet ou bien la cause de l'éruption? Je crois que, si le plus souvent il est la cause par le fait d'une transmission, il peut en être l'effet dans certains cas. Je suis ainsi conduit directement à une question que

M. Bourguignon n'a soulevée qu'incidemment : c'est celle de savoir si la gale peut être spontanée. Eh bien, pour moi, l'éruption de vésicules, de papules ou de pustules qui constituent la gale peut se développer sous la seule influence de la malpropreté, de la misère, des excès de la débauche, par exemple ; et l'acarus lui-même, au lieu d'en être la cause dans ce cas, n'en serait que le produit.

Expliquons-nous à cet égard.

Il est un fait constamment observé dans la gale, c'est l'éruption, quelle qu'en soit la forme. Cette éruption n'est pas en rapport avec le nombre des acarus, ni par sa forme, ni par son intensité. Ainsi, dans une gale pustuleuse, par exemple, le nombre des sillons, autrement dit des acarus, est presque en raison inverse du nombre et du volume des pustules. Si l'acarus est la cause de l'éruption pustuleuse, expliquez comment l'effet est d'autant plus intense que la cause est plus faible. Ainsi voilà une pauvre malade toute couverte de pustules volumineuses, et nous trouvons à peine quelques imperceptibles sillons pour nous assurer de la présence de l'acarus.

D'ailleurs, il résulte des observations les plus positives de M. Bourguignon lui-même que, lorsque l'acarus a été inoculé sur une peau parfaitement saine, une démangeaison générale vive et même diverses éruptions ont lieu avant que l'insecte ait eu le temps de se multiplier et sans qu'il ait changé de place. M. Bourguignon se demande en passant, et d'une façon incidente, si l'acarus ne serait pas porteur d'un venin qui, lancé dans la circulation, donnerait immédiatement lieu à une intoxication générale. J'avoue qu'une pareille hypothèse n'est pas dénuée de raison, et que si des tentatives d'inoculations avec des acarus broyés et introduits sous la peau n'ont pas réussi, on ne devrait pas désespérer si vite de voir triompher une opinion qui s'accorderait si bien avec les faits.

D'après les observations de M. Bourguignon et des partisans exclusifs de l'acarus, l'inoculation de la gale peut se faire par un acarus mâle, par un acarus femelle non fécondé, par un acarus femelle fécondé, ou enfin par un ou plusieurs mâles avec une ou plusieurs femelles. Dans les deux premiers cas, il se produit une fausse gale qu'il est difficile de reconnaître, puisque l'acarus vit là

seul, sans se multiplier. Combien de temps y vit-il, c'est ce qu'on ignore, et à sa mort cette gale devra se guérir spontanément, ce qui ne s'observe jamais pour la gale! Dans les deux autres, un mois se passe au moins avant que de nouveaux acarus soient éclos et se soient développés. Cependant tous les observateurs sont parfaitement d'accord pour reconnaître que peu de jours après l'inoculation, la maladie peut apparaître bien distinctement. D'où vient cette divergence, sinon de ce que M. Bourguignon et ceux qui émettent la même opinion se sont vus contraints de forcer les faits pour les soumettre à leur théorie, qui attribue à l'acarus dans l'évolution galeuse une importance exclusive qu'il n'a peut-être pas?

J'ai ajouté, comme conséquence de l'importance secondaire que j'attribue à la présence de l'acarus dans la gale, que cette maladie peut naître spontanément. Et comment pourrait-il en être autrement? Est-ce qu'il n'y a pas eu un *premier* galeux chez lequel il n'y avait pas eu de transmission; et si la gale s'est développée spontanément une première fois, n'a-t-elle pas pu se montrer une seconde, une troisième, une centième, etc.? Sur ce point, M. Bourguignon, fidèle à cette louable réserve qui le porte à n'avancer que ce qu'il a observé, semble ne pas se prononcer : « Qui soulèvera jamais le voile impénétrable qui cache la naissance pour ainsi dire spontanée des infiment petits? Est-il même donné à la nature humaine de jamais pénétrer ces mystérieuses créations? Nous ne savons. Quoi qu'il en soit de cette question, un fait est incontestable : c'est que, dans tous les temps et dans tous les lieux, la transmission d'un acarus paraît avoir été nécessaire pour que la contagion de la gale pût se produire.»

Nous louons une semblable réserve; mais elle ne nous dispense pas d'énoncer les considérations suivantes : M. Bourguignon nous apprend que l'insecte, unique cause de la gale, est constamment enterré sous l'épiderme, et que, s'il sort de sa retraite, ce n'est que le soir, ainsi que l'avait fait observer M. Albin Gras, lorsqu'il est poussé par l'instinct naturel de la réunion des sexes; si bien, ajoute M. Bourguignon, que bien qu'ayant été très souvent des journées entières en contact avec des galeux, jamais cependant je n'ai contracté la gale. Et quant aux faits de gale contractée par une poignée de mains, il les révoque fortement en doute, ne reconnaissant comme

circonstance propre à la contagion que le contact prolongé d'un individu sain avec un individu malade, pendant la nuit. Or les cas de gale contractée sans aucun contact avec un galeux, pendant la nuit, sont loin d'être rares.

A cet égard, M. le docteur Bidard, ancien interne de M. Hardy, qui, pour le concours des prix des hôpitaux de l'année 1852, a présenté un résumé du traitement des galeux pendant les sept premiers mois de l'année, donne la statistique suivante sur l'origine présumée de la gale chez les individus traités à l'hôpital : total général, 541 ; 433 hommes, 93 femmes. Contractée en couchant avec des camarades, 249 cas; au bal, 4; dans les ateliers, avec des outils, 3 ; en soignant un galeux, 1 ; en couchant sur des chiffons, 1; en portant des chaussures achetées au Temple, 1 ; en frictionnant des chiens, 1.

Ceci posé, nous admettons donc comme proposition formelle que, s'il est vrai que la gale soit une maladie accidentelle et développée, dans la grande généralité des cas, par contagion ou transmission, cette maladie peut aussi survenir *spontanément*. En effet, toute maladie contagieuse de sa nature a sa spontanéité chez l'homme ou chez les animaux, car il faut qu'elle ait eu une origine. Rien ne nous prouve que la gale ait été transmise des animaux à l'homme, comme la vaccine, par exemple. Si, d'après Alibert et Biett, beaucoup de personnes appelées à donner des soins à des animaux galeux qui avaient été amenés au Jardin des plantes ont été affectées de la gale; si cette transmission, que M. Bourguignon regardait il y a quatre ans comme impossible, est aujourd'hui démontrée possible par le même observateur, il faut néanmoins que cette maladie ai eu sa spontanéité chez les animaux où elle se montre.

Avant la découverte de l'acarus, la gale n'était-elle pas considérée comme une maladie spontanée, qu'elle naquît de la malpropreté ou de toute autre cause ? Aujourd'hui que l'existence de l'*acarus* est démontrée, on ne tient plus compte que de cet insecte, et l'on y rattache la maladie tout entière. On y est conduit par ce raisonnement d'apparence logique : *puisque l'on guérit la gale en détruisant l'acarus, puisque l'on ne peut même guérir la gale qu'à la condition de détruire l'acarus, c'est donc l'acarus qui est la cause de la gale*. Mais ne peut-on

pas répondre : 1° L'acarus est un produit morbide de la gale, comme le mycoderme est le produit morbide de la teigne, comme l'insecte de l'*acne punctata* est le produit morbide de cette maladie, comme le *pediculus* est le produit morbide du prurigo pédiculaire? La teigne est contagieuse par le mycoderme, non-seulement de l'enfant à l'enfant, mais de la tête de l'enfant à l'écorce de certains arbres; la maladie pédiculaire d'individu à individu. La teigne, l'*acne punctata* et la maladie pédiculaire en naissent-elles moins spontanément pour cela? Les moyens que nous employons pour détruire l'acarus ne sont-ils donc pas propres à guérir aussi les boutons de la gale?

Aujourd'hui que la micrographie des maladies de la peau a fait des progrès, nous pouvons aller chercher nos exemples de spontanéité un peu plus loin. Par exemple, dans l'herpès tonsurant le trichophyton prend naissance dans le bulbe des cheveux, au dire de tous les micrographes ; or si cette maladie s'est développée à la suite d'une contagion, comment concevoir que la spore, matière inerte jusqu'au moment où elle a été fécondée, ait pénétré, à travers le canal formé par les enveloppes du bulbe, jusqu'au bulbe du cheveu pour s'y introduire et y végéter? Cela est impossible. Il y a donc des champignons qui peuvent naître spontanément, et qui sont des produits morbides ; le microsporon *mentagrophytes* est dans le même cas.

Ainsi, établissons comme un raisonnement sain et juste, que la présence d'un insecte dans le bouton de la gale, non plus que la guérison de la gale en même temps, ou par la destruction de l'insecte, ne prouvent absolument rien contre la spontanéité du développement de la gale, et ne démontrent nullement la nécessité *absolue* de la transmission directe d'un individu à un autre; elles ne prouvent pas non plus que l'insecte soit la cause nécessaire de la gale, quoique dans la presque totalité des cas il la développe et la transmette d'individu à individu.

A l'appui de cette proposition, envisageons ce qui se passe, et lors de l'inoculation, et lors de l'incubation de cette maladie. On sait combien sont de nulle valeur les expériences de Galès quant à l'inoculation ; d'une autre part, je puis citer un fait négatif d'inoculation très concluant. M. Gruby, bien connu par ses beaux travaux

microscopiques, s'offrit un jour à moi pour recevoir des acarus; nous lui en avons placé trois sur le poignet de la main gauche; des verres de montre très petits avaient été choisis pour les contenir. Les deux verres furent mis sur le poignet au moyen de tour de bande convenablement disposés; le membre fut maintenu en repos. Il ne se manifesta aucun phénomène appréciable, malgré la conservation de l'appareil pendant huit jours. Je sais bien que ce fait est de sa nature purement négatif, mais il prouve au moins qu'il n'est pas aussi facile qu'on le pense d'inoculer la gale au moyen de l'acarus; car c'était un médecin instruit et désireux de s'instruire, qui se soumettait à cette expérience. Les acarus sortaient des galeries qui les contenaient; nous avions eu le soin de bien examiner s'ils se mouvaient parfaitement sur la pointe de l'épingle avec laquelle nous en avions fait l'extraction; c'est sur le poignet qu'ils avaient été placés, c'est-à-dire sur la partie où se développe primitivement la gale. Ainsi toutes les conditions les plus favorables à l'inoculation avaient été remplies. Je suis loin de nier pour cela la possibilité de l'inoculation par l'acarus; je l'admets, mais je dis qu'elle n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Il est vrai que, d'après M. Rayer et les observateurs modernes, les vésicules ou pustules de la gale ne sont que des produits accidentels de l'acarus; qu'un nombre considérable de sillons logeant des acarus préexistent aux boutons de gale.

Y a-t-il quelque chose de fixe dans l'époque du développement de la gale après la contagion? Rien de positif à cet égard. Ici trois jours d'incubation, là cinq, sept, douze, seize, vingt jours et même six semaines, suivant les divers auteurs; il faut donc admettre que chez certains individus l'acarus se promène à la surface du corps avant de pénétrer sous l'épiderme. En effet, les boutons de la gale ont un lieu d'élection qui est presque constamment le même pour les adultes, et qui diffère seulement pour les très jeunes enfants, d'après toutes les observations faites à cet égard. Ce lieu d'élection pour les adultes, ce sont les poignets, l'intervalle des doigts, la verge; plus tard le pli des bras, le ventre, le bout des seins chez les femmes, etc. Or, on gagne la gale par le contact soit des galeux, soit des vêtements ou de la literie dans lesquels

ont séjourné des galeux. Si la gale a été contractée par le contact d'un individu avec un autre, il faut admettre, ou que le contact a eu lieu directement de main à main, ou, si ce contact n'a eu lieu que par une autre partie du corps, si l'acarus est venu, par exemple, des fesses d'un individu à celles d'un autre individu, qu'il s'est promené ainsi sur la plus grande partie de la surface de la peau, et pendant huit à dix jours, c'est-à-dire jusqu'à l'époque du développement de la gale, pour venir se fixer définitivement aux poignets et entre les doigts et y développer l'éruption. Mais il y a plus, on admet qu'un acarus peut à lui seul développer la gale ; or, voyez la conséquence : il faut qu'il se fasse une ponte d'acarus avant que la gale se développe; que les larves aient pris leur accroissement; que les nouveaux acarus se rendent, par exemple, d'une main à l'autre main, afin que la gale se montre aux deux mains à la fois, car c'est là ce que l'on observe le plus communément! Ce mode d'incubation a quelque chose qu'il répugne d'admettre.

Je sais bien que les nouvelles observations de M. Bourguignon donnent, à cet égard, une grande élasticité pour des suppositions. Ainsi, suivant lui, il existe une période d'incubation et une période d'état. Tout acarus qui passe d'un individu à un autre s'enferme aussitôt sous l'épiderme; il y trace un sillon. Il ne peut pondre que du sixième au dixième jour; les œufs demandent huit à douze jours pour se développer et devenir acarus. Le malade a six à dix jours d'infection quand il présente un sillon; il en a trente quand il en offre plusieurs. Or, les malades ne se présenteraient le plus souvent aux médecins, pour réclamer leurs soins, que lorsque les acarus sont à la troisième génération, ce qui donne à peu près quarante à cinquante jours d'incubation. En opposition avec ces idées, nous lisons qu'il résulte des faits observés en 1852 dans le service de M. Hardy et par tous les observateurs précédents, que le terme moyen de l'apparition des sillons est de huit à dix jours après le contact contagieux. Ainsi elle a eu lieu, par exception, chez trois femmes, du deuxième au troisième jour ; chez un tailleur, le quatrième jour, et chez un élève en médecine qui avait extrait huit ou dix acarus d'un individu, il retirait dès le lendemain matin, développé sur lui-même, un acarus qui y était caché.

·une, ou jaune blanchâtre, très abondant : c'est la gale *pustu-*
Dans une troisième, que l'on pourrait, à juste raison, nommer
leuse, l'engorgement des boutons est nul ou presque nul ; une
ule remplie d'un liquide séreux s'élève à la surface de la peau,
e y acquiert un certain volume, le tout sans aucune apparence
mmatoire et avec l'état discret le plus complet de l'éruption
quelques cas. Voila trois sortes très distinctes de gale établies
lateman, et dont nous nous attachons à reproduire les diffé-
s dans nos leçons cliniques, parce que l'on ne saurait en nier
tence. Non pas que je prétende qu'on les retrouvera constam-
isolées et avec les caractères tranchés que nous venons de
assigner ; mais quel est la maladie cutanée qui ne présente pas
nomalies ?

a nous conduit à nous demander pourquoi cette forme dans
s, telle autre forme dans un autre, alors que la même cause,
secte, a développé le même mal. Dira-t-on que cela tient à
nisation de la peau, ou bien au tempérament et à la constitu-
de l'individu ? C'est réellement l'explication que j'en ai tou-
donnée, mais à la condition de considérer la gale comme une
ion générale, et non pas comme une complication d'une ma-
, qui ne consisterait que dans la présence d'un insecte sous
lerme, et qui se traduirait par du lichen, de l'eczéma, de l'ec-
a, etc. La gale pustuleuse s'observe en effet principalement
les sujets d'un tempérament lymphatico-sanguin ; la gale pa-
se chez les sujets éminemment nerveux. Quelques auteurs
ouvé plus commode, pour expliquer cette différence, de con-
er la gale pustuleuse comme le fait d'une gale ancienne, chez
lle le pus se forme sous l'influence de la perpétration du mal,
nier ainsi une forme créée avec beaucoup de raison par Bate-
C'est une erreur ; la gale pustuleuse, avec ses apparences
ides beaucoup plus prononcées, peut être de date tout aussi
te. C'est dès le début que le pus se forme. Il y a plus, elle est
guérison beaucoup plus facile et beaucoup plus courte, et
e communique pas aussi facilement la gale que la forme papu-
: tous les observateurs ont déclaré qu'ils avaient eu beaucoup
de peine à découvrir des acarus dans la gale pustuleuse que

Ruleuse compliquée d'ecthyma cachecticum et de prurigo. Abcès – Véron Marguerite, vingt-quatre ans, domestique rue Neuve-. 32, deuxième arrondissement; née à Frutin (Bas-Rhin); fille.— :s, tempérament lymphatique. Il existe deux ou trois plaques cachecticum à la partie antérieure des jambes, de l'ecthyma simple et aux avant-bras. Sur tout le corps des vésicules et des papules ues-unes sont du prurigo. Sillons de gale très apparents aux poi- re les doigts, on y trouve les acarus; état cachectique général. Dé- ns très vives. Tous ces accidents datent d'environ un mois.—28 fé- . A son entrée on lui prescrit: infusion de chicorée, sirop sulfureux, :rées par jour; bains amidonnés; amidon en poudre; trois portions. . Amélioration nulle; friction générale avec un onguent composé de chaux liquide, 50 grammes, axonge, 50 grammes : la friction ne de cuisson, elle a une odeur désagréable. — 10. Les démangeaisons étement disparu sur presque toute l'étendue du corps. On continue ption de l'entrée. — 12. Deuxième friction; il avait reparu quelques — 15. Encore des démangeaisons et des vésicules; troisième fric- ts cela les démangeaisons persistent et la gale paraît guérie, mais il le l'impétigo et de l'ecthyma par poussées à diverses reprises. — : a accouché il y a deux ans. Pendant treize mois les règles ont paraître. Alors elles sont venues très abondantes et la malade dit ne perte qui a duré six semaines. Depuis, les règles se sont régu- : paraissent toutes les trois semaines, abondantes. Elle avait beaucoup ı moment de l'accouchement, mais le quatorzième jour l'enfant La malade dit qu'alors le lait est remonté. Elle a eu du délire et une choïde, peut-être une péritonite, mais les renseignements sont in- Elle passa deux mois et demi à Cochin. Mais à peine sortie, elle dut . l'Hôtel-Dieu. Elle souffrait toujours du ventre, des membres, et e faiblesse extrême. Elle resta deux mois et demi à l'Hôtel-Dieu. es enflèrent et depuis ce temps la jambe droite enfle facilement. Il avoir un obstacle à la circulation. — Pendant tout ce temps le lait as et pendant huit mois il mouilla la chemise. Après sa sortie des la malade voulut le faire passer, mais rien ne fit. Il avait paru en :e et naturellement trois mois avant l'accouchement. — 15 avril. plaint de douleurs dans le sein gauche que l'on trouva tuméfié et Cataplasmes. — 28. Bientôt la suppuration parut et on ouvrit l'abcès très profond et occupait la partie supérieure de la glande dans son me. Le pus était fétide. — L'abcès se ferma en huit jours et il resta a induré qui tarda longtemps à se résoudre. On essaya encore alors nement de faire passer le lait. — 14 mai. Enfin aujourd'hui, jour de , quand on presse les seins il en sort du lait pur et très blanc ; les it de médiocre volume, non douloureux. — Il y a toujours des dé- sons à la peau et depuis son entrée il y a eu constamment des éruptions

diverses et successives. Il reste quelques papules de prurigo aux bras et de grosses pustules d'impétigo qui forment croûte sur la partie antérieure des jambes. Il y a également du prurigo et de l'intertigro aux parties génitales. Toujours des douleurs de tête violentes et des malaises généraux accompagnés de troubles gastriques. Beaucoup de flueurs blanches.

Faut-il nier d'une manière absolue ce que l'on désigne souvent sous le nom de dépôt de gale? Répugne-t-il donc tant d'admettre que, lorsqu'en trois ou quatre jours on a supprimé brusquement une suppuration générale, il puisse survenir un abcès? N'est-ce pas ce qui peut arriver tous les jours par suite de la suppression brusque de toute autre maladie cutanée sécrétante? Pourquoi donc nier dans un cas ce que l'on admet dans un autre? Là encore, il se passe pour la gale ce que l'on observe dans toutes les maladies à évolution spontanée et régulière.

J'ai vu un assez grand nombre d'exemples de ces abcès; il n'est pas d'année qu'il ne s'en présente des exemples dans mon service chez des individus soumis au traitement externe de l'hôpital Saint-Louis; tantôt ce sont des phlegmasies, tantôt des furoncles plus ou moins volumineux, etc. On dira que ce sont là des accidents dépendant de la prédisposition générale du sujet; mais pourquoi ne les observe-t-on pas dans d'autres maladies de la peau? pourquoi paraissent-ils propres à la gale?

Enfin, une objection très grave à faire aux partisans de l'acarus envisagé comme constituant toute la gale, c'est cette circonstance qu'il est connu de temps immémorial que la gale peut disparaître sans traitement sous l'influence d'une maladie générale, et reparaître à la convalescence de cette maladie; c'est-à-dire que tous ses phénomènes disparaissent, boutons, sillons et insectes, et qu'à la convalescence reparaissent ces *trois ordres* de phénomènes. Ainsi, pendant au moins six semaines que durera une fièvre typhoïde ou toute autre, le galeux n'aura plus aucun des phénomènes appréciables de la gale, et, lors de la convalescence, boutons, sillons et acarus se montreront de nouveau, et avec la même intensité. Que devient la gale? que deviennent les acarus pendant ce long espace de temps? et pourquoi reparaît-il des boutons avec eux, si les boutons ne sont qu'une complication lichénoïde, eczémateuse, ecthy-

mateuse, comme on le prétend? A cela on répond: *L'acarus sommeille; il se contente de vivre, maigrement sans doute, car sa fécondité en reçoit une vive atteinte, mais il continue de vivre.....* (Bourguignon.) Et M. Dumas, interrogé à cet effet, ne répugne pas à admettre cette explication.... Quoi! l'*acarus* est l'unique cause de la gale; il manifeste sa présence par des sillons dans lesquels on le retrouve très facilement : une maladie générale survient accidentellement; tout sillon, toute ponte d'œufs a disparu, quelques recherches que l'on fasse, et vous dites que l'*acarus* sommeille! Et si avec l'*acarus* vous supposiez comme cause un état inconnu qui manifeste sa présence par une éruption à la peau, ne vous expliqueriez-vous pas plus facilement ce phénomène? car, si dans la gale il ne suffit pas de détruire l'*acarus* pour en amener la guérison, s'il faut encore guérir les boutons, il y a autre chose que l'*acarus* dans la gale.

M. Bourguignon dans son Mémoire sur la gale, s'exprime ainsi :

« Chez deux galeux, atteints de fièvre typhoïde, les complications de la psore » se sont spontanément amendées, *les éruptions ont disparu*. L'acarus lui-» même a participé à ce mouvement rétrograde ; il se contentait de vivre, » maigrement sans doute, car sa fécondité paraissait avoir reçu une sérieuse » atteinte ; mais, fait important! il continuait à vivre : de telle sorte qu'au » retour de la santé, on le rencontrait parasite vivace, etc. »

Dans un rappport fait à la Société de médecine du département, à l'occasion du Mémoire de M. Bourguignon, M. Léveillé s'exprime ainsi, page 58 :

« L'un de nous, en 1819, pendant son internat à l'hôpital des Vénériens, a » observé un galeux chez qui survint un érysipèle phlegmoneux de la main. » La douleur remplaça immédiatement les démangeaisons. Deux foyers puru-» lents se formèrent et furent ouverts. *Pendant à peu près vingt jours* que » dura cet accident, le malade ne ressentit pas la moindre démangeaison. Cette » guérison locale de la gale n'était qu'apparente et momentanée : les acarus » se firent bientôt sentir aussi vivement qu'à l'autre main. »

Le fait suivant que je vais citer, ainsi qu'une observation fort curieuse que je rapporterai dans l'histoire de la phthiriase, ont été observés dans mon service.

Le nommé L..., menuisier, âgé de vingt-trois ans, était moins bien portant que de coutume, lorsque, le jeudi 25 mai, il se mit en route, à pied, du département des Ardennes pour Paris. Le village d'où il partit est

distant de Reims de 18 lieues. Il fit ce trajet en douze heures, en compagnie de deux de ses camarades (de une heure du matin à une heure après midi). Sur la route, à chaque bourg, il s'arrêtèrent pour boire une bouteille de vin (tantôt du rouge, tantôt du blanc) : à trois ils en burent sept. Le malade fait remarquer que depuis plusieurs mois il ne buvait que de la bière, et de plus, qu'il était déjà dans de mauvaises dispositions générales.

Arrivé à Reims, sa fatigue était extrême. Il ne put donc pas continuer son voyage à pied, comme c'était son intention, et il fut forcé de laisser partir seuls ses deux compagnons de voyage. A minuit, il monta dans la diligence de Paris, où il arriva le lendemain, à sept heures du soir. Le voyage en voiture fut très pénible pour lui. Son malaise était porté à l'excès. Il put à peine dormir deux heures, et sentit si peu le besoin de boire et de manger, qu'il ne prit absolument rien, ne descendit même pas de voiture durant la route, tant sa prostration, si je puis dire, était grande.

Arrivé à Paris, il mangea un peu, mais sans appétit, se coucha et s'endormit *sans s'être aperçu qu'il eût rien à la peau.* J'insiste sur tous ces détails, parce qu'ils me paraissent importants.

Le lendemain, 27 mai, à son réveil, une grande partie de la surface cutanée *était en feu* (c'est l'expression dont il se sert). Il ne pouvait résister au besoin de se gratter, et plus il se grattait, plus la cuisson était vive.

Les parties où la cuisson se faisait le plus vivement sentir étaient le ventre, le scrotum et surtout les plis des cuisses ; sur ces parties comme sur les faces internes des cuisses la rougeur était intense et *uniforme.*

Sur les membres supérieurs, au contraire, c'était une véritable *démangeaison* qu'il éprouvait, et au lieu d'une rougeur uniforme, on voyait *disséminés* çà et là de *tout petits boutons* sur leur différentes faces, ainsi que sur le dos des mains.

Un médecin qu'il vit dans l'après-midi du même jour, auquel il eut le tort de ne montrer que les avant-bras, lui assura *qu'il avait la gale*, et lui conseilla de se présenter à Saint-Louis, où il ne lui donna l'espoir d'être reçu que le jeudi suivant. Cette circonstance est assez importante en ce qu'elle prouve que ce médecin connaissait les usages de l'hôpital Saint-Louis, qu'il fréquentait cet hôpital, et que probablement il était plus exercé qu'un autre dans le diagnostic de la gale.

Ne voulant pas attendre si longtemps, le malade acheta chez un pharmacien de la *graisse pour la gale*, c'est-à-dire très évidemment une pommade irritante, probablement sulfureuse. Deux heures après en avoir *frictionné tout le corps* (et il ne la ménagea pas), il se trouva, comme il le dit, dans un *véritable enfer.* Une cuisson brûlante dévorait toute sa personne.

Il se mit alors au lit et passa la nuit dans une agitation difficile à décrire.

Le lendemain matin, dès qu'il fit jour il put apercevoir, sur le ventre et sur les membres, un grand nombre de cloches ou ampoules pleines d'eau,

qui se crevaient sous la simple pression du doigt et laissaient échapper leur contenu transparent et incolore.

Un second médecin, qui vint le visiter le lundi 29, affirma positivement qu'il n'avait pas la gale. Le mardi, il essaya vainement d'entrer à l'hôpital Saint-Louis; enfin, le mercredi 31, il y fut admis par moi.

1er juin. Toute la moitié inférieure du tronc et la face interne des cuisses présentent une surface rouge, humide, comme excoriée, comme dépouillée de son épiderme, qui se serait roulé çà et là sous la forme de petites pellicules cylindriques jaunâtres, molles et minces : pourtant, il est probable que ces pellicules sont plutôt formées par le produit concrété de l'exhalation morbide qui se fait en abondance sur toutes ces parties. A leur contact, la chemise est mouillée par une humeur qui répand une odeur fade et désagréable. Sur la moitié supérieure du tronc, la rougeur est bien moins vive, et la sécrétion est desséchée : le linge n'est plus taché au contact de ces parties, qui sont recouvertes d'un foule de petites lamelles minces, molles, jaunâtres ou blanchâtres, ayant aussi l'apparence épidermique.

Sur les différentes faces des membres, l'affection offre les mêmes caractères que sur la moitié supérieure du tronc ; mais, de plus, aux plis des coudes et des genoux se montrent des excoriations suintantes sous forme de sillons assez profonds, à bords épais, constitués par le produit de sécrétion transformé en croûtes jaunâtres molles et humides. Ces croûtes sont de véritables croûtes d'impétigo.

Sur le dos des mains et sur plusieurs points de la face externe des avant-bras on voit des vésicules, en partie séreuses, en partie lactescentes, en général confluentes, qui appartiennent à l'herpès phlycténoïde.

La peau de la face est saine ; le malade accuse une sensation brûlante sur toutes les parties malades et spécialement sur toute la moitié inférieure du tronc. La diaphorèse est abondante sur toutes les portions de peau restées saines ; en particulier, la face est couverte de sueur.

Le pouls est large et dur, mais point fréquent ; la soif du malade est vive, son appétit est nul. A la bouche, il perçoit une saveur amère et pâteuse à la fois, le matin en s'éveillant. Depuis plusieurs jours il n'est pas allé à la selle ; les nuits précédentes avaient été sans sommeil.

Je prescris au malade le repos au lit, une saignée du bras, la diète, de la limonade pour boisson, et enfin des bains amidonnés prolongés.

Au point de vue du diagnostic, je pensai qu'une éruption de nature inflammatoire, née sous l'influence des fatigues du voyage et du régime excitant suivi par le malade, déjà prédisposé par de mauvaises conditions générales, apparaissait lorsqu'il alla consulter le premier médecin ; que celui-ci, s'étant contenté d'un examen superficiel et incomplet, avait cru à l'existence de la gale, et qu'ainsi un traitement irritant, au lieu des émollients qu'on aurait dû mettre en usage, avait fait éclater une succession d'éruptions effervescentes dont nous voyions la continuation à l'entrée du malade dans nos salles.

Ces suppositions étaient en grande partie fondées; mais nous verrons par la suite que le diagnostic du premier médecin a été justifié par les événements.

Marche des éruptions. — Pendant les jours qui suivent l'entrée du malade, des éruptions inflammatoires aiguës continuèrent à se montrer successivement avec une variété étonnante. Ce fut à ce point qu'on peut presque dire que notre malade a tour à tour offert à l'observation toutes les formes élémentaires sur lesquelles sont fondées aujourd'hui les classifications cutanées, et dans chacune de ces formes plusieurs variétés.

Le traitement émollient fit bientôt tomber les démangeaisons, et le malade put alors goûter un peu de repos.

Le 4 juin, alors que la vaste rougeur sécrétante et brûlante de la moitié inférieure du tronc avait en grande partie disparu, on aperçut, sur toute l'étendue qu'elle avait occupée, une foule de petites pustules d'*impétigo* qui s'étaient formées pendant la nuit.

Le 7 juin, sur le dos des mains et particulièrement de la droite, on voyait de larges *bulles* remplies d'une sérosité citrine et transparente : c'était de *pemphigus*.

Entre ces bulles étaient nées quelques pustules discrètes, assez larges, reposant sur une base enflammée, et présentant un point brun à leur centre ombiliqué : c'était de l'*ecthyma*.

A côté de ces bulles et de ces pustules, toujours sur les membres supérieurs, une humeur concrétée, formant des croûtes jaunâtres et verdâtres, soulevées par une matière purulente analogue, présentait des traces d'impétigo qu'on trouvait les mêmes sur le ventre et les lombes, là où nous avions vu de toutes petites pustules naissantes, le 4 juin.

Ce même jour, 7 juin, sur la face, le cuir chevelu, le cou, la partie supérieure du tronc et les membres inférieurs, j'ai noté la présence d'une foule de petites lamelles d'apparence épidermique qui rappelaient celles de l'eczéma et du pityriasis versicolor.

Pendant ce temps le malade était soumis à un traitement émollient très bien observé, et était tenu au lit dans un très grand état de propreté.

Vers le 15 juin, commencèrent à apparaître des *furoncles*; il y eut même aux lombes et aux cuisses plusieurs *anthrax* pour lesquels l'incision cruciale fut nécessaire.

Quelques jours après on voyait des papules de *lichen* et de *prurigo* répandues sur les différentes faces des membres.

Enfin, le 24 ou le 25 juin, alors qu'il ne restait plus que quelques papules de prurigo sur les membres, le malade fit voir de petites vésicules incolores discrètes, acuminées, dans les interstices des doigts, sur le dos des mains et sur les faces antérieures des poignets; ces vésicules étaient accompagnées d'une démangeaison assez vive : elles appartenaient évidemment à la *gale*.

Je prescrivis l'usage de la pommade d'Helmerick et des bains sulfureux.

Quelques jours après, la peau du malade était complétement revenue à l'état normal, elle ne présentait pas le plus petit bouton ; la santé était excellente.

Je le gardai jusqu'au 12 juillet ; aucune nouvelle éruption n'avait reparu. Je pus donc croire que la guérison était définitive, et lui accordai son *exeat*.

Ce malade, comme le précédent, était placé dans mon service, sans rapport par conséquent avec des galeux. Toutefois, comme au moment où la gale s'est déclarée, il descendait au promenoir, et que les galeux ne sont séparés des autres malades que par une barrière à hauteur d'appui, nous avons dû le questionner sur ses rapports possibles avec cette sorte de malades. Il nous a déclaré n'en avoir eu qu'une seule fois, le temps seulement d'acheter un morceau de pain de l'un d'eux. Une porte est donc ouverte à l'hypothèse de la transmission de la gale par cette voie... Il n'a même pas touché la main du galeux, il a reçu le pain qu'il lui a acheté.

Pour nous, c'est un fait de gale disparue, pendant vingt-trois jours, disparition qui, du reste, a eu lieu dans les deux cas sous l'influence d'une affection générale de l'économie. L'observation que nous rapporterons avec détail en faisant l'histoire de la phthiriase donne un exemple de disparition de la gale pendant cinq semaines.

Nous allons à ce sujet rapporter sommairement une observation aussi curieuse qu'inexpliquée encore, recueillie par M. le professeur Boeck, médecin d'hôpital à Christiania, et qu'il a communiquée à M. Cazenave.

Chez une jeune fille âgée de quinze ans, très maigre, très pâle, non encore réglée, on a constaté à la paume des mains et dans l'intervalle des doigts, la présence de croûtes de 2 à 3 lignes d'épaisseur, d'une couleur blanche ou plutôt grise, adhérentes à la peau et formées d'une masse si compacte, qu'on peut y couper comme dans l'écorce des arbres. Les doigts sont fléchis et les tentatives qu'on fait pour les redresser lui causent des douleurs. Les ongles sont dégénérés, très épais et noueux. On trouve des croûtes analogues à la face dorsale des pieds, dont les ongles sont aussi altérés, aux coudes, aux fesses, à la partie postérieure des cuisses et sur le dos. Il y en a jusque dans le cuir chevelu, qui est très dégarni. Si l'on détache ces croûtes, la peau qu'elles recouvrent apparaît rouge, humide et un peu inégale. Toute la surface cutanée présente une rougeur érythémateuse ; aux jambes, on voit des taches non saillantes d'un brun rougeâtre ; à la face postérieure des bras, on rencontre plusieurs vésicules, enfin des pustules se montrent çà et là aux extrémités. La santé générale de la malade était évidemment altérée. Incertain de la nature du mal, M. Boeck a examiné les croûtes au microscope, et il a reconnu qu'elles étaient constituées par une masse compacte d'acarus, ou

entiers, ou brisés, d'œufs, d'excréments. Des expériences ont été faites sur des croûtes prises de tous les points du corps, et elles ont donné des résultats identiques, c'est-à-dire qu'on n'y a trouvé exclusivement ou que des acarus ou que des débris d'acarus.

Malgré les recherches les plus assidues, les plus attentives, M. Boeck n'a jamais pu trouver *un seul sarcopte vivant ni un seul sillon*. Cependant il n'hésita pas à diagnostiquer une nouvelle forme de gale. Si le diagnostic avait pu être douteux, il aurait été singulièrement facilité par les résultats rapides et multipliés de la propriété contagieuse de cette affection. En effet, pendant son séjour à l'hôpital, la petite malade communiqua la gale à un grand nombre de personnes, même parmi celles qui ne la touchaient pas habituellement.

La chute des croûtes fut suivie d'une amélioration sensible qui dura trois semaines environ ; puis une éruption de vésicules se manifesta sur tout le corps et même au visage ; elle était accompagnée d'un prurit très violent. Il fut impossible de trouver des sillons distincts ; mais on vit bientôt se former de nouvelles croûtes. En les examinant au microscope, M. Boeck distingua deux lamelles : l'une supérieure, de couleur claire, et consistant seulement en des cellules d'épithélium ; l'autre inférieure de couleur grisâtre, contenant des sarcoptes ; d'où M. Boeck conclut que les croûtes ont été formées sous l'épiderme. Pendant cette poussée, la santé de la malade s'altéra de nouveau ; elle eut de la fièvre. Traitée par les frictions partielles et successives avec l'onguent de Vienne, elle guérit enfin. Les cheveux ont repoussé, les ongles sont revenus à l'état normal ; mais surtout l'air d'hébétude remarquable chez cette jeune fille a complétement disparu.

M. Boech, en communiquant cette observation à M. Cazenave lui a envoyé des fragments de croûtes recueillis chez la malade. La coupure de ces croûtes est lisse, unie, dense comme celle d'une substance cornée ; si l'on en examine au microscope une parcelle délayée, on la trouve formée d'une multitude énorme d'acarus entiers ou de débris d'acarus, d'œufs, etc., sans aucun mélange appréciable d'une matière résultant de l'inflammation. M. Lanquetin a répété ces expériences et a obtenu les mêmes résultats, en constatant que ces sarcoptes sont bien ceux de la gale.

Cette observation, si remarquable, si importante et si concluante, ne vient-elle pas fort à propos confirmer jusqu'à l'évidence les doctrines que nous venons d'émettre ? La jeune fille se présente avec une forme spéciale de gale que l'on dirait aujourd'hui compliquée de *rupia*. Elle est singulièrement améliorée par le trai-

tement de la gale au point de recouvrer la santé, lorsqu'une nouvelle éruption vésiculeuse se fait à la peau. C'était une réapparition de la gale; on n'avait pas trouvé de sillons une première fois, on n'en découvre pas plus dans la seconde éruption, mais il se fait dans les deux cas pour l'acarus ce qui se passe dans la maladie pédiculaire générale et exagérée dont nous rapporterons un exemple en faisant l'histoire de la phthiriase, c'est-à-dire des espèces de poches renfermant des myriades d'acarus, à l'instar de ces poches décrites par les anciens pour la maladie pédiculaire.

Concluons des discussions dans lesquelles nous venons d'entrer :

1° *Que la gale peut être une maladie spontanée;*

2° *Que si l'acarus coïncide constamment avec le gale, la théorie de son existence peut tout aussi bien admettre l'insecte comme produit morbide que comme cause morbide et agent de transmission.*

Est-ce à dire pour cela que toutes les gales soient spontanées, et que l'acarus n'en soit pas le mode habituel de transmission? Évidemment ce serait tomber dans l'absurde. Si j'invoque le fait de spontanéité, ce n'est que pour en signaler la possibilité; car non-seulement l'acarus peut transmettre la gale, comme le pou, le prurigo pédiculaire, mais encore ce mode de transmission est infiniment le plus commun. Mais si l'acarus transmis d'un individu à un autre peut développer la gale, rien ne prouve que les produits de sécrétion de l'atmosphère du galeux, les vêtements imprégnés de cette atmosphère ou des produits de sécrétion de la gale ne puissent pas la faire naître.

La conséquence principale, au point de vue thérapeutique, que nous croyons devoir tirer de cette exposition de faits, c'est qu'il y a lieu, contrairement aux usages établis aujourd'hui, de traiter non pas seulement l'acarus, mais bien la gale tout entière; de la traiter comme toute autre éruption cutanée, c'est-à-dire d'après une thérapeutique d'ensemble, et non pas d'après une thérapeutique toute locale; et cela est si vrai que malgré la date assez récente du traitement de la gale en deux heures à l'hôpital Saint-Louis, mon honorable collègue, M. Hardy, qui est arrivé à limiter ainsi la durée du traitement, fait deux parts de galeux. La gale canine, ou lichénoïde, est traitée en deux heures; mais la gale pustuleuse,

dite ecthymatoïde, et la gale aqueuse, ou phlycténoïde, sont traitées pendant huit jours par les émollients, puis par des frictions douces. Ainsi, on est forcément arrivé à des préceptes que nous avons cherché à faire prévaloir il y a plusieurs années. (*Bulletin de thérapeutique*, t. XXXII, 1847.)

Il faut ajouter que définir la gale une maladie caractérisée par un seul phénomène, la présence de l'acarus à la surface de la peau, n'est pas absolument rationnel; il faut y ajouter le développement d'une éruption à forme papuleuse, vésiculeuse ou pustuleuse. Aussi l'individu qui n'aurait qu'un ou deux acarus avec un ou deux sillons sur la peau de tout le corps, serait considéré comme ayant la gale, d'après les idées du jour; pour moi, ce serait un individu qui aurait deux acarus, mais qui n'aurait pas la gale.

La gale est une éruption cutanée qui a pour caractères essentiels deux choses: 1° une éruption à la peau; 2° des *acarus* ou insectes spéciaux renfermés dans des sillons. Cette maladie a en effet son évolution, sa marche, ses lieux d'élection où existent des boutons, comme toute autre affection cutanée. De ce que l'on trouvera un pou sur le corps d'un individu, s'ensuit-il qu'il aura une maladie pédiculaire? Évidemment c'est confondre une partie avec le tout; car il suffit dans ces deux cas d'enlever l'insecte pour qu'il n'y ait pas maladie; tandis que si par des moyens convenables on parvenait à enlever tous les insectes de la gale et les œufs qu'ils auraient produits, il resterait encore à la peau l'éruption cutanée qu'il faudrait guérir, et qu'il faut d'autant plus guérir que c'est dans les boutons que se font sentir les démangeaisons aussi bien que dans les sillons. Ce n'est pas le long des doigts où règnent le plus de sillons que se grattent seulement les galeux, c'est aussi et peut-être plus à la racine des doigts et dans leur intervalle qu'ils opèrent leur grattage et qu'ils écorchent les boutons, qu'on y rencontre plus ou moins nombreux.

Cachet de l'éruption. — Elle affecte trois formes différentes: forme *papuleuse*, lichénoïde, dite canine; forme *pustuleuse*, ou ecthymatoïde; forme *vésiculeuse*, aqueuse ou herpétique. La forme la plus commune, c'est la forme lichénoïde. Elle est caractérisée par une papule dans le genre de celle du lichen, mais qui s'en distingue en ce

que le sommet de la papule est terminé par une petite vésicule remplie d'une sérosité citrine que l'on peut faire écouler en pressant entre l'extrémité des ongles le sommet de la papule, ou en excoriant le bouton. Dans la gale canine, quelle que soit la partie atteinte, ce sont des papules à sommet vésiculeux qui se montrent.

La gale pustuleuse, ou ecthymatoïde, a pour caractère l'apparition dans les mêmes parties de boutons purulents, plats, variant en largeur depuis un grain de chènevis jusqu'au diamètre d'une lentille, bouton formé dans ses neuf dixièmes d'une vésicule purulente qui s'ombilique vers le deuxième ou le troisième jour de son développement, c'est-à-dire qu'il se forme au centre de la pustule un petit point noir comme dans l'ecthyma. Mais dans la gale, la pustule n'a pas ordinairement de base inflammatoire aussi dessinée que dans l'ecthyma. Il n'y a pas non plus, comme dans cette maladie, une certaine uniformité de volume; les pustules de la gale sont très variables sous ce rapport: à côté d'une grosse pustule vont se trouver trois, quatre petites pustules, et faisant contraste avec la pustule principale. Chaque pustule dure huit à dix jours, se guérit et fait place à une autre, et ainsi de suite durant des mois entiers, et en offrant toujours les mêmes caractères. Quant à la gale dite aqueuse ou phlycténoïde, elle se dessine par le développement dans les mêmes points d'élevures qui se recouvrent aussitôt de vésicules très proéminentes, du volume d'un grain de millet ou de chènevis, et quelquefois même plus grosses. La sérosité y est limpide, très transparente, citrine; elle ne devient pas opaque, et cette forme de gale peut ainsi conserver ses caractères pendant toute sa durée.

On aurait tort de croire cependant que la forme éruptive soit si nettement tranchée chez les galeux. On peut trouver réunis chez le même individu, des papules, des vésicules, des pustules. Il est même assez peu commun que ce ne soit pas ainsi. Mais il est très commun de trouver chaque forme éruptive dessinée nettement, en ce sens que la masse des boutons a l'une des trois formes indiquées.

Nous ne faisons pas de chacune de ces formes trois gales de nature différente. Nous pensons que cette diversité de forme tient

à la différence de tempérament, la gale canine ou lichénoïde étant essentiellement liée au tempérament nerveux ; la forme pustuleuse au tempérament lymphatico-sanguin, et la forme aqueuse au tempérament lymphatique. Nos observations nous conduisent à considérer ces trois formes comme pouvant être essentiellement primitives. Plusieurs de nos confrères croient, au contraire, que la gale est dès l'abord toujours papuleuse, que ce n'est que par des causes accidentelles qu'elle devient aqueuse ou pustuleuse, et ils regardent par conséquent ces formes comme des complications ; nous ne saurions partager de pareilles idées. On va même plus loin aujourd'hui, et l'on considère l'éruption comme un épiphénomène, comme une addition de lichen, d'herpès, d'ecthyma ou d'eczéma aux divers sillons qui contiennent l'acarus et comme une sorte de complication de la gale. Ce sont là de ces idées que j'appelle exagérées et que rien ne justifie, si ce n'est une théorie, celle qui ne voit dans la gale qu'un insecte indépendant des désordres qui l'accompagnent.

Mais il y a plus, cette éruption a sa période d'évolution, son siége spécial ; elle se fait avec méthode, affectant régulièrement des parties similaires de chaque côté du corps, ne se montrant jamais sur certaines d'entre elles. En présence d'une telle régularité, comment ne pas voir là une sorte d'éruption du genre des éruptions exanthémateuses et que le hasard ne saurait faire naître? Comment ose-t-on donc la rattacher à la piqûre capricieuse d'un insecte !

Les premiers boutons qui se montrent se développent aux mains et aux pieds, dans l'intervalle des doigts, à leur origine et à leur jonction avec la face dorsale ; puis viennent les poignets, le pli des bras, le creux des aisselles, le jarret, le ventre, la verge chez l'homme, le bout des seins chez la femme, les fesses, la poitrine ; la figure est toujours respectée, ainsi que la partie externe des membres et le dos. On verra plus loin que l'acarus atteint d'autres parties où il se loge dans des sillons qu'il se creuse. Mais dans les gales qui durent depuis plusieurs mois, toutes les parties du corps peuvent être atteintes par l'éruption, sauf la figure qui est toujours respectée, à moins qu'il ne se montre, sous des conditions de malpropreté, du

lichen et du prurigo, ainsi qu'on l'observait chez cet homme des bois dont je retracerai l'observation dans l'histoire de la phthiriase et qui était infecté de toute manière. L'évolution de la gale a lieu de cette sorte pour l'âge de l'adolescence, mais chez les jeunes enfants, ce sont principalement les fesses qui sont atteintes. On a attribué cette circonstance à l'habitude des mères ou des nourrices de porter les enfants à nu sur leurs bras ; c'est là une erreur : l'éruption a lieu de la même manière à un âge un peu plus avancé et lorsque les enfants marchent seuls. C'est ce que l'on peut voir à l'hôpital des Enfants.

Peut-il exister une éruption sans sillons d'*acarus?* En thèse générale, l'un et l'autre coïncident entre eux. Il y a plus, les partisans des idées d'aujourd'hui diront qu'il est plus commun de rencontrer des galeux n'ayant que des sillons sans éruption, qu'une éruption sans sillons. Il y a deux ans, j'ai guéri un monsieur qui arrivait des Pyrénées et qui en voyage avait contracté la gale ; j'eus beaucoup de peine à découvrir un sillon à la verge, et cependant j'étais déjà fixé sur la nature de la maladie en raison de la forme même de l'éruption. Il y a sept ans environ un de mes collègues de l'hôpital m'appela en consultation, ainsi que M. Rayer, pour un magistrat qu'il avait guéri d'une éruption lichénoïde à deux reprises différentes, et qui avait vu récidiver sa maladie. A l'inspection de l'éruption, nous pensâmes que ce monsieur était affecté de la gale. Un traitement dans ce sens fut institué d'un commun accord entre nous tous ; or nous ne faisions pas reposer notre diagnostic sur la présence de sillons, mais sur celle de l'éruption. Ce n'est pas que je prétende qu'un pareil jugement soit aussi sûr que dans les cas où l'on extrait un *acarus* du sillon qui le renferme ; je veux seulement faire voir que cette éruption est souvent tellement prédominante et caractéristique qu'à sa vue seule on peut juger la maladie, lorsque l'on a quelque habitude de l'observer.

Si la gale de nos climats a eu diverses formes, toutes en général très mitigées, il n'en est pas de même de la gale des pays chauds, celle de l'Inde et de l'Afrique, par exemple. Bontius a décrit dans son ouvrage *De medica Indorum*, lib. III, cap. 17, cette maladie sous le nom d'*herpès* ou d'*impetigo indica*. Les Indiens lui donnent

le nom de *courap*, synonyme de *gale*. Il signale la difficulté que l'on a à la guérir. Bateman a eu l'occasion d'observer cette éruption chez des adultes et des enfants arrivant de l'Inde; l'éruption était très abondante, très étendue, elle gagnait même la figure; la peau, d'une couleur plus foncée et d'un aspect plus sale, était tapissée de taches impétigineuses considérables et de papules. Cette gale est très contagieuse et résiste à beaucoup de médicaments (Bateman, 251). J'ai été appelé à traiter plusieurs officiers d'Afrique atteints de cette maladie, qui se sont présentés à moi avec de grosses papules disséminées sur les membres, et qui donnaient lieu à des démangeaisons horribles.

Quant aux caractères distinctifs des diverses formes de boutons d'avec les autres maladies de la peau, il est facile de les établir. Le bouton papuleux de la gale a ses lieux d'élection, l'intervalle des doigts, les poignets, les plis des bras, les aisselles, se dessinant dans chacune de ces parties sans se joindre entre elles par une succession de boutons, comme dans le lichen diffus; le lichen est formé par des papules sans vésicules; la papule de la gale est toujours vésiculeuse et fournissant un suintement séreux que ne donne pas le lichen, à moins que, passé à l'état chronique et datant de plusieurs mois ou de plusieurs années, il soit devenu eczémateux. Quand le bouton de la gale est pustuleux, il a pris isolément tous les caractères de la pustule d'ecthyma, sans que, dans cette dernière affection, la pustule présente un engorgement inflammatoire beaucoup plus marqué que dans la gale où il n'existe presque pas; mais l'ecthyma n'a pas le siége des pustules de la gale, et puis il y a dans ces pustules galeuses une telle irrégularité de forme et de volume, qu'un peu d'habitude dirige facilement le praticien dans le diagnostic. Cependant on peut s'y tromper, si, dans quelques circonstances, on ne tient compte que de la pustule. Quant à la gale aqueuse ou phlycténoïde, il me paraît impossible de la confondre avec l'herpès phlycténoïde qui se montre ordinairement par groupes de vésicules sur des parties qui ne sont pas celles où siége l'éruption de la gale.

Avant d'aborder le second caractère de la gale, celui qui se déduit de la présence de l'*acarus*, je crois devoir parler des boutons de la

pseudo-gale. Cette affection n'a été signalée par personne, que je sache ; elle se montre souvent au printemps chez les personnes qui ont été atteintes de la gale, et font croire à ces gales mal guéries dont les malades se plaignent assez souvent. Cette éruption est toujours très discrète et consiste dans quelques rares petits boutons miliaires très durs au toucher, hérissant la peau, blancs, quoique ne contenant pas de pus, arrondis et très légèrement acuminés, terminés par une vésicule excessivement petite : ces petits boutons, par le grattage, deviennent le siége d'une cuisson vive et presque douloureuse. Ils affectent ordinairement le voisinage du poignet, sur les côtés du pouce et même auprès du dos du poignet. Ce n'est pas une éruption confluente, ce sont un ou deux boutons espacés placés à distance, mais très résistants sous le doigt. Si l'on ne gratte pas ce bouton, il s'éteint et il est rare qu'il en vienne plus d'un second ou d'un troisième ; mais les boutons se multiplient si les grattages des malades les irritent. Ce n'est toujours qu'aux mains qu'on les observe.

Deuxième caractère de la gale; acarus et sillons.— Entrevu mais non décrit par Aben-Zohar, médecin arabe, qui pratiquait en Espagne, l'insecte de la gale ne fut réellement connu qu'au XVIe siècle ; car il se trouve indiqué dans les ouvrages d'Ambroise Paré. Mouffet en a le premier donné une description assez exacte en indiquant les sillons qu'il creuse et la manière de l'en extraire ; et Hauptmann est néanmoins le premier dont les observations microscopiques aient fourni des indications un peu minutieuses sur sa situation et son organisation. En 1637, Cestoni, sous le pseudonyme de *Bonomo*, a réellement précisé son rôle physiologique et pathologique dans la gale. A partir de cette époque, l'histoire de l'*acarus* est essentiellement rattachée à celle de la gale. Mais peu à peu, dans les siècles suivants, l'acarus n'appelle plus l'attention des médecins et il finit par tomber dans l'oubli, à un tel point qu'à la doctrine de l'acarus comme cause essentielle de la gale, Hahnemann parvint à faire prévaloir les anciennes idées humorales sur cette maladie, en vertu desquelles la gale est considérée comme une éruption générale née d'une cause aussi générale qu'elle. On va jusqu'à perdre les moyens de retrouver l'*acarus*, et Alibert et Biett, tout en rappelant son exis-

tence, restent impuissants à en donner la preuve matérielle. Galès, pharmacien de l'hôpital Saint-Louis, prétend le retrouver, et, par une insigne imposture, montre à la commission de l'Institut nommée pour vérifier le fait, la mite du fromage. Les choses en restèrent à ce point jusqu'en 1834, où un étudiant corse, M. Renucci, assistant à la consultation d'Alibert, qui déclinait la possibilité où l'on était d'extraire l'*acarus*, s'offrit de faire en sa présence ce qu'il avait vu exécuter par les malheureux de son pays. M. Renucci enleva en effet en présence de ce médecin plusieurs *acarus*, et, à partir de ce moment, l'acarus fut étudié de nouveau, notamment par M. Raspail : la même année, en 1835, par M. Albin Gras, et plus tard par plusieurs dermatologistes français ou étrangers ; enfin, en 1852, M. Bourguignon a publié un traité entomologique et pathologique de la gale de l'homme, où il suit les diverses phases d'évolution et de reproduction de l'insecte.

Quant à l'*acarus* en lui-même, il offre les caractères suivants : Il est d'un volume tel qu'on le voit parfaitement à l'œil nu en le plaçant à l'extrémité d'une épingle ; là on l'aperçoit exécuter des mouvements qui ne laissent aucun doute sur son existence ; mais il arrive souvent qu'enlevé de l'extrémité du sillon en hiver, il est engourdi par le froid et ramassé, pelotonné et immobile ; il suffit de l'approcher un peu du feu pour lui voir exécuter des mouvements fort rapides d'ailleurs : aussi parcourt-il un espace assez étendu dans un temps très court sous le champ du microscope. Voici sa description sommaire : (voy. planche de microcraphie.)

Acarus. — Insecte d'un tiers de millimètre en longueur et d'un quart en largeur ; couleur blanchâtre rosée ; il a une face dorsale et une face ventrale ; la première plus ou moins arrondie, suivant que l'insecte est plus ou moins plein : la tête ou les organes de manducation occupe une extrémité du corps et l'ouverture anale l'autre ; les pattes sont au nombre de huit, quatre en avant et de chaque côté de la tête ; quatre en arrière. Toutes prennent naissance à la face ventrale. Les pattes antérieures sont terminées par un long tube armé d'une ventouse, et les postérieures par un long poil. Ces appendices sont les principaux organes de la progression.

L'enveloppe extérieure du corps est continue dans son ensemble. On ne trouve pas de thorax distinct de l'abdomen. Le corps n'est qu'une cavité où sont contenus les organes de la nutrition. Des appendices de diverses espèces

occupent la face dorsale; ils sont destinés à la progression en prenant point d'appui; ils sont durs, cornés, et sous de faibles grossissements ils représentent des poils. Cette face est sillonnée par des rides ou plicatures qui se distendent quand l'acarus se gorge de liquide. Derrière la naissance des pattes antérieures et au-devant de la pièce sternale se trouve une fente transversale par où s'opère la ponte; aussi cette fente manque-t-elle aux acarus femelles qui ne l'ont pas accomplie; cependant il y a encore doute à cet égard; car il existe à la région anale une ouverture qui en est voisine.

L'œuf est un corps ovoïde régulier ayant une extrémité un peu plus arrondie que l'autre. Ce n'est qu'après dix jours d'incubation que l'insecte est formé; le onzième jour l'insecte fait effort pour sortir de son enveloppe; l'œuf se fend transversalement ou longitudinalement pour lui donner passage. La larve ou insecte nouveau-né n'a que six pattes, et il jouit cependant de plus d'agilité que l'acarus à huit pattes. Ce n'est que huit ou dix jours après l'éclosion qu'il est pourvu de ses huit pattes. (Voir pour plus de détails l'excellent ouvrage de M. Bourguignon sur la gale, *Traité de la gale de l'homme*, 1852.)

Sillon de la gale. — On désigne ainsi des galeries ou canaux que se creuse l'*acarus* dans l'épaisseur des lames du derme, en soulevant les lames épidermiques les plus superficielles, à la manière de la marche d'une taupe dans la terre; ces acarus déposent leurs œufs dans ces galeries ou sillons. Chaque sillon a une longueur qui varie entre 2, 3 ou 5 millimètres; il est rare qu'ils affecteut une ligne droite; le plus souvent ils sont contournés et arqués et quelquefois disposés en S; la surface externe du sillon est garnie d'aspérités épidermiques et, suivant quelques observateurs, d'un ou deux points noirs qui indiquent la sortie passagère de l'acarus. Mais ce qui doit surtout fixer l'attention, c'est le point de départ du sillon et son extrémité terminale, ainsi que ce qu'il contient.

Les partisans des doctrines modernes sur la gale ne parlent que d'un seul mode de formation du sillon par une ouverture ou embrasure de l'épiderme sur un point quelconque des surfaces latérales des doigts, du poignet, de la verge, etc., lequel sillon se termine par un cul-de-sac faisant une petite saillie blanchâtre transparente; c'est à ce point transparent que réside l'acarus; et il suffit de déchirer avec une épingle la petite cuticule qui le recouvre pour le retirer avec la pointe de l'épingle. Il est bien vrai qu'à la verge, au bout des seins, à la face latérale des doigts, où les boutons de la gale sont très rares, on ne retrouve que des sillons de ce genre. En 1834,

M. Albin Gras décrivit les diverses variétés des sillons, il signala encore d'autres dispositions : 1° Au centre des vésicules un petit point d'où part jusqu'à la circonférence une ligne ombrée de noir et droite; à partir de cette ligne, la naissance d'un sillon du genre de ceux que nous venons de décrire, et à l'extrémité de ce sillon l'acarus. Cette disposition n'est pas très rare. Depuis, quelques observateurs et M. Piogey entre autres, ont signalé des papules à cheval sur un sillon ou un sillon dépassant la papule par ses deux extrémités. Cela se voit à la verge, par exemple; il admet même deux espèces de sillons sous ce rapport : une première espèce superposée à la vésicule ou sillons intra-épidermiques; la seconde surmontant une papule due à l'épanchement de la lymphe plastique dans le réseau du derme, devenant alors le siége d'élancements intolérables par suite de l'irritation incessante des papilles nerveuses; ces sillons sont alors sous-épidermiques. Ce qu'il est très commun de voir, ce sont des sillons isolés, sans vésicules ni papules, qui siégent le long des faces latérales des doigts, sur la verge et à l'extrémité du sein des femmes.

On peut déduire de la première disposition, celle où le sillon prend naissance à la vésicule, deux conséquences : ou que la naissance de la vésicule a été spontanée, qu'elle a engendré un acarus, lequel acarus occupait primitivement le centre de la vésicule, s'en est échappé par la ligne ombrée de la vésicule pour se creuser ensuite une galerie intra-épidermique, déposant d'ailleurs ses ovules dans le trajet du sillon, et cela est d'autant plus rationnel que l'acarus se trouve toujours à la partie la plus éloignée de la vésicule. Cette doctrine a été professée pendant longtemps; on a même décrit et compté les ovules qui se trouvaient dans la vésicule. Aujourd'hui, et d'après les nouvelles recherches microscopiques de M. Bourguignon, d'après surtout les idées professées depuis deux ou trois ans sur la nature de la gale, on raisonne ainsi qu'il suit : le bouton ou la vésicule de la gale est un accident; il est causé par la piqûre de l'acarus venu du dehors en s'introduisant dans la peau pour se creuser son sillon. Mais il y a une objection à faire à cette hypothèse, objection qui n'est pas sans valeur. Si c'est à la piqûre de l'insecte qu'il faut attribuer le développement des boutons, il semble

naturel que le nombre des boutons soit en général proportionné au nombre des insectes, de sorte que là où l'on trouve le plus d'acarus, on trouve aussi plus de boutons. Eh bien, c'est le contraire : les boutons sont rares aux mains et aux pieds, plus rares à la verge, nuls ou presque nuls aux mamelons chez les femmes, nuls ou tout à fait nuls au menton; or c'est dans ces parties que l'on trouve le plus d'insectes. Par contre, les boutons sont très nombreux sur le ventre, les fesses, les aisselles, les jarrets, et là on rencontre si peu d'acarus que tous les observateurs ont signalé ce fait. Ce qui rend bien mieux compte de ces faits, c'est d'admettre avec nous et avec tous les auteurs qui nous ont précédé, qu'il existe une éruption galeuse, régulière; ce qui est en rapport avec l'époque du développement de la gale après son incubation, la localisation régulière des boutons, les lieux d'élection qu'ils occupent, la simultanéité de leur développement dans les membres et sur les mêmes points à la fois; de supposer qu'il est certains boutons vésiculeux qui engendrent des *acarus*, comme dans la maladie pédiculaire où la génération des poux ne peut être contestée suivant nous; comme aussi dans le fait cité par M. Boeck, où la génération spontanée des *acarus* ne saurait être mise hors de doute. Quoi qu'il en soit, on voit qu'en présence de faits si divers et d'opinions si contestables, il y a lieu de ne pas adopter d'une manière absolue toutes les opinions émises depuis plusieurs années, et d'attendre que des recherches plus approfondies viennent donner aux praticiens une satisfaction complète à cet égard.

Bornons-nous donc à dire qu'il existe dans la gale deux espèces de sillons : les uns rattachés directement à la vésicule, les autres tout à fait indépendants des vésicules; les premiers ayant principalement leur siége dans les intervalles interdigitaux et aux poignets, les seconds sur les faces latérales des doigts, à la verge chez l'homme et aux mamelons chez la femme. On a cherché à expliquer cette différence de siége chez l'homme et chez la femme en disant que l'homme porte très fréquemment ses mains à la verge, et que les mains transmettent ainsi l'acarus à cette partie. Mais d'abord est-ce que les femmes portent fréquemment les mains à l'extrémité de leurs seins? Ensuite, il est constaté par M. Bouguignon que l'acarus

à la verge a précédé ou accompagné la présence d'un acarus sur la main. En vérité, s'il est bon d'expliquer, il faut le faire avec réserve, car les explications sont souvent peu fondées. Bornons-nous donc à enregistrer les faits.

Mais il est une circonstance que je ne peux passer sous silence, en présence de cette régularité et dans l'éruption de la gale et dans le développement des sillons dans des parties régulièrement atteintes par l'acarus: c'est celle de l'infection. Évidemment elle n'est pas toujours la même, elle n'a pas toujours lieu, comme on l'a vu par le relevé de M. le docteur Bidard, autrefois interne du service de M. Hardy, par les mêmes contacts, et il faut bien le dire, nous savions depuis longtemps qu'elle devait s'opérer par des contacts différents. Or, qu'un individu contracte la gale par les pieds, par une poignée de mains ou par une partie quelconque du corps, ce ne sera pas sur cette partie que l'on trouvera le plus d'*acarus*, on n'en trouvera même souvent pas, mais les boutons et les sillons se montreront avec la même régularité sur les divers points du corps où ils siégent ordinairement, quel que soit le point de départ de l'infection. Il faut donc admettre qu'un acarus déposé par exemple à la fesse d'un individu adulte s'éloigne bien vite de cette partie, parce qu'il ne doit pas l'attaquer ; s'il se trompe de route et qu'il gagne la face, arrière, la figure ne serait jamais atteinte, *si ce n'est depuis quelque temps où l'on trouve des acarus au menton, mais pas plus haut ;* puis il devra nécessairement se rendre à l'un des poignets ou aux doigts d'une main, pour y développer des boutons ou y tracer des sillons, et à peine a-t-il commencé son œuvre à une main qu'il lui faut bien vite gagner l'autre, en remontant vers l'épaule, traversant la poitrine et gagnant l'autre membre supérieur jusqu'à l'autre main, pour y développer les mêmes phénomènes, à moins que, servi par un heureux hasard, l'*acarus* ne saisisse le moment d'un contact des doigts pour faire une traversée bien plus directe et bien plus courte. Tout cela est pénible à écrire sérieusement, mais enfin il faut bien faire ressortir toutes ces invraisemblances.

Mais il y a mieux, depuis la découverte de l'acarus mâle par M. Lanquetin, élève externe de l'hôpital Saint-Louis, il arrive ceci:

l'acarus mâle ne peut tracer de sillon; qu'il se borne à se ca-
humblement sous une petite lame épidermique; qu'il est
leurs d'un volume beaucoup plus petit et ne reproduit rien,
qu'il ne fait que féconder la femelle; en sorte que vous pouvez
t-être avoir sur le corps, pendant une dizaine d'années, un ou
sieurs *acarus* mâles ou la gale mâle sans vous en apercevoir,
avoir de boutons, ou même le signe exclusivement distinctif de
ale, le sillon sans lequel, au dire des partisans des idées toutes
lernes, on ne peut pas affirmer qu'un individu soit atteint de la
! Vous en serez quitte pour vous gratter quelquefois lorsque
unique parasite changera de localité! On peut encore courir la
nce de ne gagner qu'un *acarus* femelle non fécondé, mais alors
dez-vous de vous approcher d'un mâle! Heureuses créations
dernes que ces gales de mâles ou de femelles non fécondées qui
sont pas des gales!

n résumé, on voit que les caractères de la gale se déduisent de
x circonstances principales: 1° l'éruption avec ses caractères de
tons de trois sortes différentes, et les lieux d'élection de leur dé-
oppement; 2° les sillons, à la condition que de l'une de leurs
rémités on retire l'acarus, car on pourrait prendre pour un sillon
petite excoriation linéaire de l'épiderme, par une épingle, une
uille, un coup d'ongle, ces sillons ayant comme les boutons leur
d'élection. Nous ajouterons que si, dans la généralité des cas,
st très facile de reconnaître la gale même en l'absence de consta-
ion d'*acarus*, c'est cependant une des maladies de la peau dont
diagnostic, dans certaines circonstances, peut offrir le plus de
ficultés. On ne saurait croire que d'erreurs ont été commises, et
personnes qui ont occasion de l'observer tous les jours peuvent
méprendre par défaut d'une attention suffisante. C'est qu'en
t, chez l'enfant, les boutons papulo-vésiculeux de la gale sont
iniment petits; que l'on peut prendre un lichen pour de la gale,
réciproquement; que dans un âge beaucoup plus jeune, lorsque
nfant est à la mamelle, le strophulus peut ressembler à la gale.
lichen et le strophulus affectent souvent les mains et les poi-
ets. Ce n'est qu'à l'aide du caractère vésiculeux des boutons et
l'existence des sillons que l'on apprécie par le secours d'une

loupe de trois à quatre grossissements, que l'on arrive à un diagnostic précis. Une circonstance importante à noter au point de vue du diagnostic de la gale chez les enfants, c'est l'existence de nombreux boutons de gale aux fesses, ce qui n'a pas lieu chez l'adulte.

Mais là où le diagnostic est beaucoup plus difficile, c'est le cas d'une gale papuleuse ancienne à laquelle viennent se joindre, sous l'influence des grattages réitérés, des éruptions accidentelles de lichen et de prurigo; alors l'éruption de la gale se confond avec elles, et la maladie perd le cachet d'ensemble qui lui est propre. L'existence bien avouée d'un sillon lève toute espèce de doutes à cet égard.

J'arrive maintenant aux données que nous a pu fournir la statistique au point de vue de la gale considérée comme antécédent des autres maladies de la peau. — *Eczéma*. Sur 469 malades inscrits, le chiffre de la gale, comme antécédent, s'élève à 205, c'est-à-dire à près de la moitié des individus dont nous possédons l'observation. — *Lichen*. Sur 103 exemples, la gale figure comme antécédent pour 36 cas. — *Psoriasis*. 59 sur 134 exemples recueillis. — *Impétigo*. C'est encore là une des affections cutanées où l'on trouve plus de cas de gale comme antécédent ; ainsi, la proportion est de 78 cas sur 142 impétigos, c'est-à-dire que plus des deux tiers des individus affectés d'impétigo dont nous avons recueilli les observations comptaient la gale dans leurs antécédents. — *Herpès*. 17 exemples, 10 cas de gale comme antécédent. — *Prurigo*. 16 antécédents sur 28. — *Rupia*. 12 fois sur 30 cas. — *Ecthyma*. 8 sur 12. — *Pityriasis*. 10 sur 17. — Enfin, sur 1,150 maladies de peau, quelle qu'en soit la nature, 449 malades comptaient la gale comme antécédent.

On voit par ces chiffres que les faits justifient, en apparence au moins, cette opinion des gens du monde, à savoir, qu'ils doivent à la gale contractée antérieurement la maladie cutanée dont ils ont été primitivement affectés.

Quant à la marche de l'affection elle est incessante, comme toutes les maladies avec productions végétales ou animales, ainsi la teigne, le prurigo pédiculaire. Aussi il est des contrées de l'Espagne et de la Corse où la gale est pour ainsi dire endémique. Les enfants

contractent la gale de leurs parents peu de temps après la naissance, et la conservent toute leur vie; le grattage devient une habitude, un besoin; et cette habitude est d'autant plus arrivée à l'état de nécessité qu'elle se reproduit à des heures plus ou moins fixes et journalières; c'est en effet au moment où se développe la chaleur du lit que la démangeaison se montre, démangeaison à laquelle cède d'autant mieux le malade qu'elle est accompagnée d'une sensation agréable, ce qui n'a pas lieu dans le lichen et le prurigo. Toute élévation dans la température du corps suffit pour la réveiller : ainsi l'exposition au soleil, au feu.

Le pronostic de la gale n'est jamais fâcheux, ce n'est qu'une maladie incommode ; mais lorsqu'elle est conservée pendant des mois et des années, elle devient une habitude et un besoin de grattage qui finit par être nécessaire à la santé de l'individu qui en est atteint, semblable en cela à toutes les affections de la peau avec démangeaison. Or, à l'égard de toutes ces maladies, on observe que leur brusque disparition par une cause quelconque, alors même qu'elles ne fournissent aucune sécrétion, comme le prurigo avec ou sans papules, la maladie pédiculaire, celle des poux devenue générale, est suivie d'accidents très graves en raison de l'âge, du développement de certains organes, de leur état de maladie et de la prédisposition du sujet. Chez l'enfant, la suppression des poux de la tête donne lieu à des fièvres graves dans lesquelles le cerveau est plus ou moins affecté ; à l'âge viril, c'est presque toujours la poitrine qui se prend avec des congestions pulmonaires moitié séreuses, moitié sanguines, qui menacent incessamment la vie des malades. Or, si ces accidents ont lieu par la suppression du prurigo *sans papules*, c'est-à-dire sans aucun phénomène morbide à la peau autre que la démangeaison, les mêmes accidents ne peuvent-ils pas se montrer dans les mêmes conditions à l'égard de la gale, et surtout à l'égard de la gale suppurante ? et dès lors est-il sage, est-il rationnel de guérir la gale *en deux heures, quelle que soit l'ancienneté de la maladie ?* N'y a-t-il pas lieu d'établir quelques réserves par rapport à certains cas particuliers de gale ? Voilà ce que nous ne cessons de répéter depuis les innovations introduites dans ce traitement ; on conçoit qu'ayant le plus souvent affaire à des sujets

jeunes, vigoureux, durs à la fatigue comme au mal, ces accidents n'aient pas souvent lieu, mais ils se produisent chez des individus dans des conditions opposées, dans l'enfance, dans l'âge viril et dans la vieillesse.

La gale, sous le rapport du pronostic, doit être envisagée à un autre point de vue. La statistique que nous avons donnée de la gale comme antécédent démontre, à n'en pas douter, qu'elle doit prédisposer aux affections cutanées qui sont accompagnées de démangeaisons. Il faut donc, sous ce rapport, guérir les galeux aussitôt que possible, pour qu'ils ne contractent pas l'habitude des grattages; mais il faut les guérir à l'aide de moyens incapables de faire naître de ces éruptions elles-mêmes auxquelles la gale prédispose. On fait aujourd'hui tout le contraire, et il est peu de galeux qui sortent de ces frictions sans présenter dès le jour suivant des papules de lichen que des bains peuvent faire disparaître, mais que les ouvriers, peu soigneux d'eux-mêmes, ne traitent pas.

Eh bien! je n'hésite pas à prédire que dans dix ou quinze ans on verra naître des affections cutanées chez bon nombre de ces individus mêmes que l'on guérit si rapidement aujourd'hui.

Thérapeutique. — Il y a peu de maladies pour lesquelles on ait proposé plus de moyens de guérison que pour la gale : c'est qu'en effet les acarus meurent facilement sous l'influence de médicaments astringents ou excitants, et que ces mêmes moyens guérissent aussi très rapidement l'éruption de la gale. Or, c'est encore une remarque à faire sur la nature des boutons de la gale : s'ils étaient purement et simplement des éruptions de lichen, d'eczéma ou d'ecthyma, venant, comme on le dit, compliquer la gale, comment guériraient-ils par des agents médicamenteux qui, lorsque ces maladies sont seules, ne font qu'exaspérer ces éruptions? C'est encore là une objection sérieuse à faire aux doctrines du jour. Voici, par exemple, un fait rapporté par M. Piogey, un des partisans de la doctrine. « Un malade du service de M. Bazin, chez lequel la gale était compliquée d'impétigo, d'ecthyma, de furoncles, d'angioleucite avec gonflement des ganglions axillaires et impossibilité de fléchir les doigts, fut traité par trois frictions générales *rudes*. Sous l'influence de cette médication, les ganglions axillaires étaient moins doulou-

reux ; le lendemain, l'angioleucite avait disparu ; les éruptions pustuleuses ont rapidement cessé. » Or, je le demande, M. Bazin eût-il employé des frictions rudes à la pommade d'Helmerich en présence de pareils désordres chez un individu qui n'aurait pas eu la gale ? On verra plus loin que notre collègue, M. Hardy, s'arrête toujours en présence des gales pustuleuses ou de celles qui, selon lui, sont compliquées d'ecthyma. Il y a donc véritablement quelque chose de spécial dans la nature des boutons de la gale, et il est vraiment pénible d'en être arrivé aujourd'hui à ce point de prouver la démonstration d'une vérité reconnue par tous les médecins qui nous ont précédés dans les siècles passés.

Plusieurs médecins ont examiné à l'aide du microscope combien de temps un *acarus* pouvait vivre dans un agent donné. Voici à quels résultats ils ont été conduits. Suivant M. Albin Gras, il vit dans l'eau 3 heures ; dans l'huile, 2 heures ; dans une solution d'extrait de Saturne, 1 heure ; dans de l'eau de chaux, 3/4 d'heure ; 20 minutes dans le vinaigre, l'alcool à 20 degrés, ou une solution de carbonate de soude ou de potasse ; 9 minutes dans le sulfure de potasse ; 7 minutes dans l'essence de térébenthine ; 4 à 6 minutes dans une solution concentrée d'iodure de potassium. Suivant M. Hébra, l'*acarus* vit 7 jours dans l'eau froide, 10 dans l'eau chaude ; il résiste plus ou moins longtemps à l'immersion dans le vinaigre, dans l'urine de cheval, dans l'eau de chaux et de savon ; il vit 2 à 4 jours sur un verre où l'on a étendu de l'onguent napolitain. Il est tué plus ou moins rapidement dans une solution de sel commun, de sublimé, d'arsenic, de sulfate de fer, de cuivre, de zinc, d'acétate de plomb, d'alun ; dans l'acide pyroligneux, dans les huiles essentielles, dans l'huile animale de Dippel, une solution de potasse, de goudron ou d'iodure de potassium.

J'ai fait aussi un grand nombre d'expériences du même genre ; elles m'ont conduit aux résultats suivants : L'*acarus* vit de 10 à 12 heures dans la graisse : cette expérience a été répétée deux fois. Des malades ont été traités par l'axonge seule ; la gale s'est momentanément arrêtée pour reparaître ensuite. L'acarus, plongé dans une décoction de staphysaigre, était encore vivant après 12 minutes. Il meurt en 8 minutes dans l'essence de térébenthine pure, et dans

un mélange d'une partie d'huile blanche et de trois parties d'huile de cade; en 5 minutes dans l'huile de cade pure; dans un temps variable entre 2 et 5 minutes, quand il est plongé dans une atmosphère où se volatilise soit de l'éther, soit du camphre. La mort arrive en 15 ou 20 secondes quand il est plongé dans la vapeur de chloroforme. Ces diverses expériences ont été faites pour chaque substance sur plusieurs acarus successivement mis en contact. Ainsi, parmi les substances sur lesquelles nous avons expérimenté, le chloroforme, l'éther et le camphre sont celles qui ont pour l'acarus les propriétés les plus délétères, mais ces agents agissent sur l'insecte, et il est très probable qu'ils n'agissent pas sur les œufs. Cet insecte présente des phénomènes particuliers quand il est plongé dans des liquides différents : ainsi, aussitôt mis dans l'huile de cade, il s'agite, paraît inquiet, étonné ; ses mouvements se ralentissent, les pattes postérieures deviennent immobiles; puis les pattes antéro-postérieures se roidissent, et enfin les pattes antérieures deviennent immobiles. Les pattes conservent la position allongée, les poils sont roides et parallèles aux pattes. Lorsque l'acarus est plongé dans la vapeur de chloroforme, les pattes postérieures se roidissent; les pattes situées à leur extrémité sont plus ou moins fixes; puis les pattes antérieures deviennent roides, les ventouses qu'elles offrent à leur extrémité se dilatent énormément, puis elles s'affaissent parallèlement aux pattes postérieures.

Nous ne prétendons pas exposer ici tous les moyens préconisés contre la gale et que Biett a expérimentés au nombre de quarante et un, moyens auxquels il faut ajouter bon nombre d'autres qui ont été essayés il y a quelques années par notre collègue, M. Cazenave, à l'hôpital Saint-Louis ; nous nous bornerons à en indiquer les principaux. Le soufre en fumigation, les bains sulfureux, les lotions au sulfure de potasse de Dupuytren, et celles modifiées par Alibert; le liniment de Jadelot ayant pour base la même substance; celui de Valentin, au sulfure de chaux; la pommade soufrée, la pommade d'Helmerich, la pommade sulfo-alcaline d'Alibert; les pommades ayant pour base une préparation mercurielle; la pommade citrine, au nitrate de mercure, la pommade de Werlhof au proto-chlorure de mercure; la solution au nitrate de mercure; la quintescence anti-

psorique de Mettemberg ; les pommades ou les décoctions de staphysaigre, d'ellébore, de ciguë, de tabac ; le chlorure de chaux ; les acides sulfurique et nitrique étendus d'eau, le sulfate de zinc, le sublimé en solution et en bains ; et il y a quelques années les diverses eaux distillées aromatiques, la dissolution d'iodure de potassium, l'huile de cade, etc.

Comme on le voit, ce ne sont pas les agents médicamenteux qui ont fait défaut, mais dans le traitement de la gale deux considérations doivent fixer le praticien : 1° le mode d'emploi ; 2° le moyen. Autrefois et jusque vers 1825, et peut-être plus tard encore, quel que fût l'agent que l'on employât, on en enduisait toute la surface du corps des pieds à la tête, et l'on opérait des frictions sur la peau de manière à faciliter l'action du remède mis en usage. C'est ainsi qu'agissait Dupuytren à l'Hôtel-Dieu, et Alibert à l'hôpital Saint-Louis. Peu à peu la force de la friction fut de plus en plus atténuée et réduite à une onction. D'un autre côté, et notamment à l'époque où M. Cazenave a été chargé du service des galeux à l'hôpital Saint-Louis, la friction fut de plus en plus restreinte aux parties qui paraissaient être le siége exclusif de l'acarus, c'est-à-dire aux mains et aux pieds, et l'on assurait guérir la gale par ces frictions bornées. C'est en cet état, c'est-à-dire vers 1850, que M. Bazin, entrant à l'hôpital Saint-Louis et succédant à M. Cazenave dans le service des galeux, conçut la pensée heureuse de revenir aux frictions générales ; c'était déjà un pas de fait pour assurer la guérison de la gale : on n'eût jamais dû s'en départir. Il eut de plus le mérite de faire suivre aux galeux le traitement qui avait été préconisé par Helmerich, et de l'adopter dans toute sa teneur, c'est-à-dire frictionner et nettoyer la peau dans un bain savonneux pour *déchirer* les *vésicules* de gale, et favoriser l'application de la pommade ; de faire ensuite avec la pommade préconisée par ce médecin trois frictions par jour deux jours de suite, avec 30 grammes de pommade pour chaque friction, et devant le feu en hiver ; puis de nettoyer la peau par un second bain savonneux, de sorte qu'en trois jours les malades furent guéris. Et comme précédemment la moyenne de séjour des galeux à l'hôpital était de dix à onze jours, ce fut pour l'administration un véritable service rendu. La pommade d'Helmerich,

qui depuis la connaissance de sa formule avait toujours été employée à l'hôpital Saint-Louis, était longtemps demeurée secrète. En février 1813, le docteur Burdin, de Paris, fit connaître sa composition et le mode de traitement du médecin hollandais (*Journal de médecine, chirurgie et pharmacie*, février); il alla plus loin, en avançant qu'en faisant en un jour quatre frictions précédées et suivies d'une *lotion* avec la solution de savon noir, on pouvait obtenir la guérison de la gale en vingt-quatre heures. Dix malades ayant été soumis à ce dernier traitement par M. Biett, on a dû y renoncer à cause des *éruptions consécutives déterminées par la violente irritation de la peau*. C'est qu'alors on ne disait pas qu'un malade était guéri de la gale, parce que tous les acarus étaient détruits, mais on le regardait comme guéri quand on le faisait sortir de l'hôpital avec une *peau saine et exempte de toute éruption*.

M. Hardy, succédant plus tard à M. Bazin dans le service des galeux, chercha à résoudre un autre problème. On a vu que M. Bazin avait réduit le séjour des malades à trois jours dans l'hôpital. M. Hardy réalisa d'abord ce qu'avait avancé M. Burdin : les malades entraient à l'hôpital et en sortaient le lendemain ; puis il est arrivé à les faire rester deux heures dans un cabinet spécial de frictions, sans compter comme malades à Saint-Louis ; en un mot, il amena l'administration à supprimer le service des galeux. Sa méthode est celle de M. Burdin, ou mieux d'Helmerich, exécutée en deux heures: 1° Friction générale de tout le corps d'une demi-heure de durée avec du *savon noir;* 2° nouvelle friction d'une demi-heure avec la pommade sulfo-alcaline d'Helmerich, composée de:

Axonge.	8 parties.
Soufre.	2 parties.
Sous-carbonate de potasse.	1 partie.

3° un bain alcalin immédiatement après.

On voit que dans ces diverses phases de traitement réduit à une période de deux heures, d'une part, on est revenu à la friction générale, d'une autre part, à son mode d'emploi doux ou rude, et en troisième lieu à la pommade d'Helmerich. Or, je crois devoir insister sur les avantages et les inconvénients de ces trois choses

qui doivent être prises en grande considération dans le traitement de la gale.

La friction limitée à une ou plusieurs parties du corps est *mauvaise*, parce que des acarus et des boutons peuvent être disséminés sur toutes les parties, et qu'il est important de les atteindre ; c'est là une des conditions les plus essentielles du traitement de la gale. Quant à l'intensité des frictions, depuis quatre ans on les prescrit très fortes, non pas pour détruire les vésicules des boutons, mais pour déchirer les sillons épidermiques et atteindre les acarus et leurs pontes disséminées dans le trajet des sillons. Cette friction forte a ses inconvénients ; elle excorie les boutons, elle les irrite, elle irrite la peau saine, et sans parler de ce que j'ai vu, elle fait naître, d'après Biett, des *éruptions secondaires*. Ce sont ces éruptions secondaires qui ont engagé ce médecin à les abandonner. Pour nous, qui n'avons pas dans notre service des galeux, ou qui n'en avons qu'autant que nous désirons en prendre, nous avons été à même d'observer assez souvent des éruptions secondaires provenant du traitement de la gale en deux heures. En voici un exemple que nous avons fait recueillir.

Gale guérie en un jour, et suivie d'une éruption de forme eczémateuse.— Lallement (Edmont-César), âgé de vingt et un ans, marié, est d'un aspect extérieur qui annonce la force et la santé. Sa peau blanche et fine, et un certain embonpoint dans les formes, indiqueraient un tempérament lymphatique. Il est employé comme garçon de magasin dans une imprimerie, où il a pour occupation de transporter des fardeaux de papier.

Comme antécédents pathologiques le malade se souvient, vers l'âge de huit ou neuf ans, d'avoir eu ce qu'il appelle des *gourmes*, des croûtes dans la tête. Ces croûtes n'avaient pas produit d'alopécie. Il n'a jamais eu ni ophthalmie, ni engorgements ganglionnaires, ni maladies de peau.

Après la guérison d'une amygdalite, il y a de cela près de deux mois, il est allé chez son oncle pour passer quelques jours à la campagne, et comme il a couché dans le lit d'un ouvrier de son oncle, il suppose trouver dans ce fait la cause de l'éruption qui s'est manifestée quelques jours après.

Pendant six semaines à partir de cette époque, il a gardé en effet une éruption caractérisée par des boutons disséminés sur la surface du corps, mais en très petite quantité, sauf au niveau des poignets et de l'intervalle des doigts où ils existaient en assez grand nombre. Ces boutons étaient, les uns transparents, les autres jaunâtres ; le malade dit que par la pression il en

faisait sortir des gouttelettes de liquide, quelques-unes limpides, d'autres opaques et jaunâtres. — Au bout de six semaines il s'est présenté à la consultation de M. Hardy, qui a diagnostiqué la gale et qui l'a soumis à son traitement. — Le malade, après une friction faite avec du savon noir, suivie immédiatement d'un bain simple qui a duré une demi-heure, a été soumis, après le bain et pendant un quart d'heure ou vingt minutes, à une friction générale avec la pommade sulfo-alcaline.

Renvoyé immédiatement, il est allé le lendemain prendre un bain simple. Cinq ou six jours plus tard, le malade s'apercevait qu'une éruption survenue subitement occupait ses deux avant-bras. En même temps des vésicules se formaient dans l'intervalle des doigts. — Examiné le 8 décembre, jour de l'entrée du malade dans la salle Saint-Louis, l'éruption, considérée quant à son siége et à son aspect, présente les caractères suivants :

La face interne des avant-bras étant presque intacte, leur face externe ou dorsale est recouverte, presque dans son entier et sans intervalle sain, de lamelles peu épaisses et un peu ridées, ressemblant à celles qui sont le résultat de la sécrétion eczémateuse, quand l'épiderme n'a pas été détaché. On n'y observe pas de suintement, il y a plutôt actuellement un certain état de sécheresse. Au niveau du poignet, c'est au contraire à la face antérieure qu'on trouve ces lamelles presque croûteuses, présentant du reste les mêmes caractères. La face dorsale des mains, au niveau de la région métacarpienne, est complétement intacte, mais les intervalles des doigts des deux mains, dans toute leur étendue et le bord cubital de la main droite, sont recouverts d'une exsudation séreuse abondante, et présentent une multitude de vésicules qui laissent suinter ce liquide.

M. Hardy, au contraire, considère ces éruptions comme étant très rares et cédant à quelques bains simples. Pour moi, et à l'instar de Biett, je m'en préoccupe beaucoup. Je dis qu'elles sont et doivent être plus fréquentes qu'on ne le pense; que les ouvriers y font peu attention, et que c'est créer une prédisposition fâcheuse à la peau pour l'avenir.

Ces frictions fortes ne conviennent pas d'ailleurs à tout le monde et à tous les âges. Voici une note textuelle que notre collègue M. Bouvier, de l'hôpital des Enfants, nous a remise et que nous croyons très important de reproduire: « J'ai tâché d'introduire à l'hôpital des Enfants le traitement de la gale en deux heures. J'ai été obligé d'y renoncer : 1° difficultés de faire pratiquer des frictions soit avec le savon, soit avec la pommade, d'une manière exacte, générale et assez rude, sur des enfants plus *sensibles* que les adultes, qui eux-

mêmes ressentent dans ce cas *des douleurs plus ou moins vives;* 2° récidives *observées assez souvent* sur des enfants traités ainsi, ou même frictionnés plusieurs fois (*toujours de la même manière*) et ramenés à l'hôpital par leurs parents; 3° *fréquence extrême* chez les enfants de pustules d'impétigo ou d'ecthyma, de vésicules d'eczéma avec *inflammation vive*, qui s'opposaient au traitement expéditif de Saint-Louis. Ce traitement ayant été quelquefois appliqué (et plus souvent par méprise des gens de service) dans des cas semblables, il en est résulté des maladies cutanées aiguës, de vives douleurs, de grandes excoriations, la fièvre, et le tout *a été fort long à guérir;* 4° enfin, dans quelques cas où cet état inflammatoire n'*existait pas avant le traitement*, *celui-ci l'a provoqué*, et les éruptions consécutives, sans être aussi graves que dans le cas précédent, ont été également longues à guérir. » Mais il y a plus, notre collègue Hardy, en médecin prudent, a abandonné son traitement en deux heures pour les gales pustuleuses. Il fait entrer les malades à l'hôpital, et il les traite pendant quatre ou cinq jours par les émollients avant d'employer les sulfureux.

Ainsi se trouve justifié, pour les enfants au moins, ce que nous disons depuis quelques années contre le traitement trop prompt et trop énergique de la gale. Je conçois que les administrateurs des hôpitaux aient un grand intérêt à adopter une pareille thérapeutique. Je comprends qu'il en soit ainsi pour les militaires, gens jeunes, vigoureux, bien portants; mais pour les femmes, pour les gens du monde, de structure plus irritable, c'est un traitement qu'il faut modifier.

Depuis la publication de la méthode employée par notre honorable collègue Hardy, les médecins des hôpitaux civils l'ont adoptée, et surtout les médecins du service militaire. En Belgique, M. Vleminckx a étendue cette méthode à toute l'armée et il déclare qu'il a éteint la gale dans l'armée belge. Nous exposerons plus loin son mode de traitement, un peu différent de celui de l'hôpital Saint-Louis. Mais nous établissons une grande différence entre la pratique civile et la pratique militaire, et nous avons publié dans la *Gazette médicale* (mars 1856) un article sur la thérapeutique de la gale, qui traduit toute notre pensée, et dont nous extrayons les passages sui-

vants comme formant le complément de la thérapeutique de la gale.

Et d'abord, *qu'est-ce que la gale?*

Aux yeux de la généralité des médecins que nous avons nommés, la gale ne consiste que dans la *présence de l'acarus sur le corps de l'homme*, de sorte que, comme le dit M. Vleminckx, si l'on connaissait d'une manière certaine tous les points où peuvent se loger les acarus sur le corps, il suffirait d'aller les y détruire *mécaniquement* pour guérir la gale.

Cela est très bien pour le médecin armé de son microscope, mais pour le malade et le commun des médecins, il y a deux choses dans la gale : l'*acarus*, et l'*éruption*. Lorsque l'on aura tué mécaniquement l'*acarus*, on n'aura pas tué l'éruption. Vous répliquerez que l'éruption se guérira toute seule ; je le veux bien dans certains cas, mais dans bien d'autres *non!* Vous dites à un soldat : Va-t'en, tu es guéri : *bene sit*. Mais l'homme du monde, le malade civil vous répond : Je ne suis pas guéri, puisque j'ai le corps couvert de boutons.

J'admets que vous vous débarrassiez du malade civil comme du soldat. En combien de temps toute éruption galeuse va-t-elle cesser? Est-ce dans les deux jours, ou dans les deux heures, ou dans les cinq minutes de votre traitement propre à guérir la gale? Non. Ce sera en six, huit ou dix jours, et quelquefois en trois semaines ou un mois, malgré les soins les plus éclairés et non pas en abandonnant le malade à lui-même. Aussi lorsque Biett, Alibert et d'autres ont fixé à huit ou neuf jours la moyenne de la guérison de la gale, ils comprenaient dans ce laps de temps la guérison de l'éruption ; et lorsque les galeux étaient admis à l'hôpital, ils n'en sortaient qu'avec une peau nette et sans boutons. Ceci demande quelques développements.

Aujourd'hui l'éruption galeuse, qui d'ailleurs est toujours l'éruption d'autrefois, n'a pas chez tous les individus le même caractère. Aussi les acaricideurs purs disent-ils qu'il n'y a pas d'éruption galeuse, mais que la gale, qui n'est autre chose que l'insecte lui-même, peut se compliquer d'éruption papuleuse ou vésiculeuse ou pustuleuse, c'est-à-dire de lichen, d'impétigo, d'ecthyma, d'eczéma, etc.

Pour le malade et *pour les médecins* qui appellent la présence de l'acarus sur le corps de l'homme une maladie, c'est-à-dire la gale, il y a deux choses : l'*insecte avec ses sillons*, l'*éruption* qu'il développe ou qui se développe. Je dis d'abord *pour le malade*, car tant que l'acarus existera seul, la gale n'existera pas pour le malade, et le malade ne viendra pas réclamer les soins du médecin. Il pourra éprouver quelques démangeaisons, mais elles seront passagères et insuffisantes pour appeler son attention.

Pour le médecin : à part quelques médecins spéciaux qui se sont attachés à l'étude de la gale par position ou par nécessité, ou qui en font l'objet de recherches, il n'y aura pas de gale pour la généralité d'entre eux.

D'où la conséquence, que pour l'ensemble des malades et des médecins, il n'y a pas de gale sans éruption dans *la pratique* de la médecine. Pour eux la maladie se compose de deux choses presque inséparables : l'insecte et l'éruption galeuse. Le malade n'est réellement guéri que lorsque la peau est nette et rendue à son état normal. Or quand on dit aujourd'hui qu'on l'on guérit la gale en deux heures, en une demi-heure, en cinq minutes, on peut traduire cette locution en ceci : que l'on détruit en deux heures, en une demi-heure, en cinq minutes, les insectes de la gale et les œufs qui les accompagnent, *rien de plus*, *rien de moins*. Or autrefois on disait qu'une friction opérée mettait le galeux à l'abri de toute infection. Helmerich prétendait guérir la gale en vingt-quatre heures. Tout cela revient au même, rien n'est changé depuis.

Ainsi la véritable méthode acaricide consiste dans la *friction générale*. Elle n'est pas de date récente : elle remonte à Helmerich. On s'en est éloigné *à tort*, on y est revenu *à raison ;* mais cette friction générale ne tue que l'insecte, elle ne guérit pas le bouton ou la complication galeuse, comme on voudra l'appeler. Mais comme aux yeux du malade il n'y a de guérison qu'à la condition que l'éruption de la gale a disparu et que la peau soit saine, je ne saurais dire que la gale est guérie en cinq minutes ou en une demi-heure.

L'objection à ce raisonnement est bien simple aux yeux des partisans de ce mode si court de traitement : Ne vous occupez pas de l'éruption, dira-t-on, elle guérira seule : *sublatâ causâ, tollitur effec-*

tus. Voilà justement où nous ne sommes plus d'accord, et ce que nous allons discuter tout à l'heure. Mais auparavant, voyons s'il ne reste rien à dire sur ce traitement en deux heures ou en une demi-heure.

Est-il applicable à toutes les formes de gale? Est-il applicable à tous les individus? Est-il applicable à tous les âges?

A ces trois questions, ma réponse est négative. Il est constant, et ce fait est adopté par tous les médecins, que, dans les cas où la gale est à forme pustuleuse, ou, si l'on veut, compliquée d'ecthyma ou d'impétigo, il faut, pendant quatre ou cinq jours, s'attacher à faire tomber l'irritation par des bains émollients, l'amidon à l'extérieur ou des onctions avec le saindoux. Il en est de même si la forme *vésiculeuse* est très dessinée (gale aqueuse); aussi ces sortes de malades sont-ils reçus à l'hôpital Saint-Louis comme par le passé, pour y être traités ultérieurement à l'aide d'une pommade d'Helmerich plus faible. Ils font ordinairement un séjour de huit, dix, ou douze jours à l'hôpital.

Ce traitement en deux heures n'est pas applicable à tous les individus, et c'est ici que j'aborde le second point de vue sous lequel je veux envisager la question. Remarquez que tous les médecins qui en préconisent les résultats, tous ceux qui viennent confirmer l'excellente réforme, il faut bien le dire, que notre honorable collègue M. Hardy a introduite à l'hôpital, sont en général des médecins militaires. Or le soldat et l'ouvrier constituent une catégorie d'individus d'une bonne organisation en général, habitués aux vêtements plus ou moins forts, rudes, ou à étoffes grossières, dont la peau, en un mot, par ses contacts habituels, est peu impressionnable, peu sensible. Aussi supporte-t-elle facilement ces frictions capables de déchirer un sillon, frictions au savon noir, puis de la pommade d'Helmerich, etc.

Il n'en est plus de même d'une personne du monde, ou d'une femme qui naît et qui vit dans une autre atmosphère. J'ai fait ressortir cette différence capitale, et j'ai prouvé, par le témoignage des médecins de la prison de Saint-Lazare, que, pour les filles publiques même, il avait fallu renoncer à ce traitement, à cause des éruptions secondaires qu'il développait.

Ce que je viens de dire se rattache à plus forte raison *à la question d'âge*. Chez les enfants et les jeunes gens, on surexcite la peau avec un pareil traitement, et l'on *a dû y renoncer à l'hôpital des Enfants*.

D'où la conséquence que le traitement en deux heures d'après les méthodes préconisées, et contre lesquelles personne ne réclame, doit subir des modifications en raison des trois circonstances que je signalais plus haut.

Dans la pratique civile, le médecin a donc deux choses à traiter : l'acarus et l'éruption galeuse.

J'ai eu l'occasion de signaler quelles pourraient être les conséquences ultérieures de cet abandon de l'éruption à elle-même. J'ai prouvé, par la statistique, combien était fréquente la gale comme antécédent des affections cutanées eczémateuse et lichénoïde ; et je me suis demandé si les frictions fortes, telles qu'elles ont été préconisées, ne seraient pas la source d'éruptions ultérieures ou cause prédisposante de maladie de la peau dont le malade pourrait difficilement se débarrasser. Il y a déjà quelques années que j'ai posé cette question. Le temps seul pourra la résoudre ; mais en présence de la ténacité que présentent les éruptions secondaires nées de frictions fortes, et dont les exemples ne sont pas rares dans notre service à Saint-Louis, où nous ne recevons que des galeux *traités en deux heures* et atteints de ces sortes d'éruptions, je me demande si, partant de ce fait, il n'y a pas un grave inconvénient à abandonner à elle-même l'éruption galeuse après une première friction, et s'il n'est pas beaucoup plus rationnel de ne quitter un galeux qu'alors que la peau est rentrée dans l'état naturel. Je crois que tous les praticiens sages partageront ma manière de voir à ce sujet. D'où je conclus que guérir la gale en deux heures, en une demi-heure ou cinq minutes, ce n'est avoir *fait que la moitié du chemin*.

J'arrive maintenant à la partie qui a trait aux moyens mis en usage. On sait qu'à cet égard les agents propres à opérer la guérison de la gale sont tellement variés et tellement nombreux, qu'on serait tenté de dire qu'il est peu d'agents médicamenteux un peu actifs par leur nature qui ne puissent opérer cette guérison. Le temps a consacré l'usage des sulfureux, et la généralité des praticiens s'y

arrête encore aujourd'hui. Parmi les composés de ce genre, la pommade d'Helmerich, à formule moins énergique que celle donnée par son auteur, est encore préférée aux autres préparations, parce qu'elle est d'un emploi plus sûr.

Elle est cependant irritante de sa nature, en raison de la base alcaline qui en fait partie, la potasse. En effet, et nous avons eu le soin d'appeler l'attention des praticiens sur ce point, le sulfure à base de potasse est plus irritant que le sulfure à base de soude, et celui-ci beaucoup plus irritant que le sulfure à base de chaux. Aussi M. Vleminckx a-t-il fait faire un véritable progrès à la thérapeutique de la gale en remplaçant le sulfure de potasse par le sulfure de chaux, qui doit donner lieu bien moins fréquemment à des éruptions secondaires. L'agent est d'ailleurs à l'état liquide; il a son action plus directe sur la peau, et sur l'acarus par conséquent.

Toutefois, je doute que, s'il est sans inconvénient pour le soldat et l'ouvrier, il puisse en être de même pour les femmes et les individus d'un âge peu avancé de la vie. Leur peau, fine et impressionnable, en recevra une influence irritante plus ou moins marquée. Mais comme le sulfure préparé d'après la formule qui a été donnée par M. Vleminckx peut être étendu d'eau ou mêlé à un corps gras à l'instar du sulfure de potasse, c'est à cet agent que nous sommes porté à donner la préférence.

Dans la pommade d'Helmerich, il n'y a que peu ou point de sulfure formé. Le mélange de la fleur de soufre et du carbonate de potasse se fait à froid dans l'axonge, de sorte que le sel de potasse agit avec toute son énergie. La lotion de Dupuytren (sulfure de potasse) a été généralement reconnue comme étant trop irritante; il y a donc lieu de lui préférer le sulfure de chaux. Il ne faut d'ailleurs que 70 à 100 grammes de ce sulfure pour la friction de tout le corps. Je l'ai expérimenté sur des galeux chargés d'éruption, et je n'ai pas sensiblement augmenté les boutons coïncidant, quoiqu'ils fussent moitié aqueux, moitié purulents.

Afin d'atténuer les effets du sulfure calcaire sur la peau, j'ai fait faire plusieurs mélanges atténuants. Le sulfure de chaux s'associe en toute proportion avec la glycérine, et cette dernière substance l'enveloppe suffisamment pour le préserver pendant un certain

temps d'une décomposition notable; c'est une préparation fort commode, l'odeur exceptée. L'axonge s'y unit facilement dans la proportion de 30 grammes de sulfure pour 50 d'axonge; mais aussitôt que l'on a dépassé cette proportion, ce n'est plus qu'avec une peine extrême, et en ajoutant le sulfure goutte à goutte, que l'on parvient à solidifier le liquide. On peut aller ainsi jusqu'à parties égales de l'un et de l'autre; mais il est difficile d'aller au delà.

Afin de faciliter le mélange, j'ai fait ajouter 4 grammes de chaux délitée au mélange de 50 grammes de sulfure et de 50 grammes d'axonge, mais je n'ai rien obtenu. Quoi qu'il en soit, ce mélange est d'une action douce et efficace. Je l'ai employé dans des gales pustuleuses compliquées même de rupia, ainsi que dans des gales vésiculeuses, et je n'en ai retiré aucun effet irritant. Mais il ne faut s'adresser qu'au sulfure de chaux préparé d'après la méthode de M. Vleminckx, et non pas au sulfhydrate de sulfure de chaux, qu est un *épilatoire* un peu irritant de la peau. Nous donnerons plusi loin la formule de la préparation de ce sulfure.

On pourrait donc, en raison des âges, ajouter le sulfure de chaux soit à de la glycérine, soit à de l'axonge, en le dosant ainsi qu'il suit, pour guérir la gale sans surexciter la peau.

Ainsi, pour les individus habitués par leur position et leur état à des contacts qui rendent la peau peu excitable, se servir sans crainte de sulfure de chaux pur; pour les hommes du monde en général, faire un mélange à parties égales de glycérine ou de graisse avec le sulfure de chaux; employer pour les femmes un tiers de sulfure contre deux tiers d'excipient graisseux, et ramener le mélange au quart pour les enfants.

J'attache une grande importance aux sulfures, parce qu'ils ont certainement une action plus sûre que tous les mélanges de soufre; ce qu'il faut éviter, c'est qu'ils ne soient pas irritants pour la peau.

Toutefois, il ne faut pas se dissimuler qu'ils ont, par l'odeur qu'ils répandent, un inconvénient très grave; mais du moment que l'on entre dans la voie des sulfureux, c'est du moins au plus. Un grand avantage des sulfures, c'est de pouvoir faire laver immédiatement le malade après une demi-heure de contact avec ces préparations.

La généralité des individus qui veulent tenir caché le traitement de la gale pourront se rendre dans un établissement de bains, ou trouver pendant une heure un local dans lequel ils exerceront leur friction et leur lavage. J'insiste sur ce fait, parce que ce sont deux conditions très importantes : 1° celle d'agir avec un agent essentiellement toxique pour l'acarus, de manière à le détruire dans un court espace de temps ; 2° de se servir d'un toxique qui n'irrite pas la peau de manière à ne pas surexciter les boutons de la gale, et surtout à ne pas faire naître d'éruption secondaire.

Voici la formule du sulfure de chaux telle que cette matière est préparée en Belgique ; les proportions restent les mêmes, les chiffres seuls sont ramenés à des unités décimales.

℞	Fleurs de soufre.	20 grammes.
	Chaux vive	10 grammes.
	Eau	155 grammes.

Portez à l'ébullition en opérant constamment le mélange, et faites bouillir jusqu'à ce que la combinaison soit parfaite. Passez à l'étamine. On obtient environ 100 grammes de liquide, qui sont plus que suffisants pour opérer la solution la plus complète et la plus étendue de tout le corps.

Après les sulfures alcalins, vient la pommade d'Helmerich. Sa composition est la suivante :

Fleur de soufre.	20 grammes.
Carbonate de potasse.	10 grammes.
Axonge	80 grammes.

ou, d'après Helmerich :

Axonge.	32 grammes.
Fleur de soufre	8 grammes.
Carbonate de potasse.	4 grammes.

Ainsi formulée, cette pommade est essentiellement irritante pour la peau ; on y a même renoncé à l'hôpital Saint-Louis, et l'on a réduit de moitié la fleur de soufre et le carbonate de potasse.

Cependant, malgré cette atténuation, elle excite encore assez la

peau pour faire naître des éruptions secondaires, malgré des frictions modérément fortes. Comme je le disais tout à l'heure, cet effet tient au carbonate de potasse qu'elle renferme, et qui s'y trouve à l'état presque libre. Aussi je ne prescris jamais de pommade d'Helmerich sans remplacer ce sel par le carbonate de soude, qui est beaucoup moins actif.

Au point de vue de la gale, quels sont les éléments actifs de cette pommade, puisque le soufre et le sel de potasse ne s'y trouvent pas à l'état de combinaison. Je crois que le soufre est réellement l'élément toxique de l'acarus; que le carbonate de potasse peut aussi exercer une action, mais cette action est probablement mixte : irritante pour l'acarus et dissolvante de l'épiderme des sillons. Sous ce double rapport, on comprendrait l'efficacité constante de cette pommade dans le traitement de la gale. D'ailleurs, il faut bien le dire, si le soufre n'y est pas à l'état de sulfure, il est là dans une sorte de combinaison toute particulière, en vertu de laquelle le soufre perd sa couleur jaune-serin pour prendre une nuance jaune rougeâtre bien moins prononcée.

Quel peut être l'avantage de la friction au savon noir qui précède à l'hôpital Saint-Louis l'emploi de la pommade d'Helmerich, et qui est aussi employée dans le traitement belge? Le savon noir est à base de potasse; il est très caustique; il a pour but de nettoyer la peau, surtout chez les ouvriers; il agit aussi sur l'épiderme des sillons; il le ramollit et le prépare à se laisser pénétrer par la substance toxique pour l'insecte.

Il serait pourtant possible qu'il fît plus. Le docteur Debout nous disait, il y a quelque temps, qu'ayant été chargé d'un service militaire de galeux, il avait trois fois contracté la gale, et que pour la guérir il ne s'était jamais servi que de frictions savonneuses.

Nous pensons qu'à l'aide des lotions au sulfure de chaux, les lotions, et surtout les frictions savonneuses, peuvent être supprimées dans la généralité des cas où la peau est propre, et que toujours un bain alcalin d'une demi-heure de temps suffirait pour les remplacer; c'est d'ailleurs ce qui se fait en Belgique.

Le docteur Bourguignon a donné deux nouvelles formules pour le traitement de la gale. Dans l'une, il s'agit d'une préparation dans

laquelle la glycérine remplace l'axonge de la pommade d'Helmerich. Elle est ainsi formulée :

Gomme adragante.	1 gramme.
Sous-carbonate de potasse.	50 grammes.
Soufre.	100 grammes.
Essences de lavande, de citron, de navette, de girofle, de canelle, de chaque. . . .	1 gramme.
Glycérine.	200 grammes.

pour une friction.

Il formule son traitement comme il suit : un bain savonneux, une friction le soir ; un bain simple le lendemain matin, une seconde friction le soir; un troisième bain le lendemain matin.

Faisons d'abord remarquer que dans cette glycérine d'Helmerich la dose du sel de potasse constitue le quart de la préparation, ce qui double l'alcalinité de la liqueur. Puis quel est l'avantage de ces additions d'essences? est-ce pour masquer l'odeur de la pommade? Mais si elle ne sent plus le soufre, elle sentira bien fort les essences.

Quant à la seconde formule, les essences sont en proportion quatre fois plus grande; il est vrai qu'il n'y entre plus de carbonate de potasse, mais simplement du soufre. Cette dose d'essence est-elle basée sur les expériences que notre collègue, M. Cazenave, a faites des eaux distillées dans le traitement de la gale? Cela est probable. Mais j'avouerai que les guérisons dans ce cas ont été souvent incertaines. La seconde formule donnée par M. Bourguignon réussira donc à cause du soufre qu'elle renferme, puisque la pommade soufrée guérit parfaitement la gale ; mais elle sera si aromatique, qu'elle incommodera les femmes un peu nerveuses et les enfants. Voici quelle est cette seconde formule :

Jaunes d'œufs.	n° 2
Essence de lavande.	5 grammes.
— de citron.	5
— de navette.	5
— de girofle.	4
— de cannelle.	2
Gomme adragante.	2
Soufre bien broyé.	100
Glycérine.	200
	350 grammes.

Que dirai-je du traitement tout récent de MM. Duzard et Pillon? On place le malade sur un tabouret assez élevé pour qu'il se trouve plus haut que l'opérateur. On enveloppe la tête d'un vaste cornet de papier évasé par le haut, de manière que le malade ne soit pas incommodé par l'odeur de l'agent thérapeutique, et qu'il respire un air un peu pur. On promène sur toute la surface de la peau un pinceau de blaireau ou de charpie humecté de liquide, et l'opération est terminée en cinq minutes. Seulement il faut que le malade soit placé dans un espace bien ventilé. Après trente-six heures écoulées, un bain simple. Quant au liquide, il se compose de 12 grammes de chlorure de soufre dissous dans 100 grammes de sulfure de carbone. Tout ce que l'on peut dire de cette médication, c'est qu'elle constitue le traitement d'été de la gale, car il serait difficile de remplir ces conditions en hiver. On le conçoit d'ailleurs parfaitement en présence de l'odeur infecte qu'exhalent les substances employées.

Après avoir passé en revue, et apprécié à ce que nous croyons être leur juste valeur, les méthodes et les agents employés ou préconisés aujourd'hui dans le traitement de la gale, nous serions incomplet si nous ne formulions pas une thérapeutique d'ensemble telle que nous la concevons.

1° La peau doit être propre pour se trouver dans les conditions les plus favorables à l'application d'un topique; un bain avec 500 grammes de savon blanc remplit parfaitement ce but. C'est assez dire que tout autre savon peut être mis en usage soit dans le bain, soit à l'état de lotion pour nettoyer la peau.

2° Trois conditions doivent diriger le médecin dans le mode de traitement et dans le choix du moyen : l'état social de l'individu, son âge, la forme de la gale. L'homme de la campagne, le soldat, l'ouvrier, supporteront sans inconvénients le sulfure de chaux pur; il suffira de l'étendre sur la peau, principalement dans les parties où siége le plus souvent l'acarus, les mains et les pieds, la partie interne des membres, le ventre, la verge chez l'homme, le voisinage des mamelles et le mamelon chez la femme, *sans négliger toutefois le reste de la surface du corps, la figure exceptée.*

Mais il ne faut jamais employer de frictions très fortes. Ces frictions ont été recommandées dans le but de déchirer les sillons pour

mettre à nu la ponte des *acarus*. Ce sont ces frictions qui sont l'origine de toutes les éruptions secondaires quelquefois si rebelles, et nous ne saurions trop nous élever contre cet usage.

Quelle nécessité y a-t-il d'ailleurs de guérir la gale en une seule friction? Je la comprendais pour le soldat et l'ouvrier, je la comprends moins pour toute autre classe de la société. D'ailleurs la lotion aqueuse de sulfure de chaux pénètre facilement l'épiderme, et elle ne nécessite pas ces déchirures de sillon, après un bain savonneux préparatoire à la lotion. Les agents excipients graisseux imprègnent moins bien la peau, mais ils ont l'avantage de moins irriter.

C'est ainsi que la condition sociale de l'individu, en autorisant sans aucun inconvénient une seconde friction, vient naturellement apporter un changement dans les prescriptions du médecin. Quoi qu'il arrive, après une seule friction, le sujet galeux ne peut pas transmettre la gale; tous les acarus libres sont tués; la ponte des œufs et leur éclosion sont assez modifiées pour être retardées.

Chez la femme, et à plus forte raison chez l'enfant, le choix du moyen est très important; les doses des agents doivent être réduites à moitié ou au quart: l'effet en sera le même, et la peau ne deviendra pas le siége d'éruptions secondaires.

Quant à la forme de la gale, ou ce que l'on veut appeler aujourd'hui la complication de la gale, il y a à cet égard, comme je l'ai décrit trois états de boutons, généralement très distincts, et qui se montrent sur les individus en raison de leur tempérament et de l'ancienneté de la maladie; de là ces dénominations de gales papuleuse, aqueuse ou vésiculeuse et de gale pustuleuse. Ces formes sont généralement assez dessinées pour que l'on puisse prévoir la nature de l'éruption secondaire qui se manifeste à la peau après une friction trop forte: du lichen par centaines de papules dans la première espèce, un état eczémateux dans la seconde, des furoncles ou des abcès dans la troisième.

C'est la gale papuleuse qui supporte la médication la plus active; après elle, la gale aqueuse, et ensuite la gale purulente. A l'égard de celle-ci, il est toujours sage de calmer l'irritation de la peau au préalable, et ce pendant deux ou trois jours, à l'aide de bains émol-

lients et d'onctions avec le saindoux. Ce sera placer tout d'abord l'individu qui en est atteint dans des conditions de transmission à peu près nulles, car les corps gras seuls font périr les acarus, ainsi que je m'en suis assuré, mais ils n'atteignent pas leur ponte. D'ailleurs, dans la forme pustuleuse de la gale, il y a beaucoup moins d'acarus que dans les autres, et partant moins de danger de transmission.

C'est assez dire que l'agent insecticide que l'on emploiera vers le troisième jour doit être extrêmement doux, et qu'il faudra recourir plusieurs jours de suite à son emploi, plutôt que faire courir au malade le risque de voir surgir une série de furoncles ou tout autre accident secondaire.

3° Une fois l'insecte et sa ponte détruits, la gale n'est pas guérie; elle ne l'est qu'à la condition que la peau est exempte de toute espèce d'éruption, et qu'elle est rentrée dans son état naturel. Les bains répétés tous les jours, bains simples, bains émollients; les applications de saindoux ou de cold-cream tous les soirs sur la surface de la peau, principalement où existe l'éruption; l'absence de tout grattage, de tout vêtement de laine, voilà les moyens qui conduiront à la guérison. Quelque bien entendus que soient les soins, il faudra toujours huit à dix jours pour obtenir ce résultat; et à nos yeux le médecin est blâmable au point de vue de l'avenir, qui nous est encore inconnu, de ne pas parfaire la guérison de la gale, en présence de cette maladie qui se chiffre pour une proportion si considérable, comme antécédent, principalement dans les affections eczémateuses et lichénoïdes.

Reste la question de vêtements. Il est toujours sage d'en changer entièrement, et de faire passer au soufre ou à l'étuve ceux que le malade portait.

L'étuve suffisamment chauffée suffit à faire périr l'acarus; elle offre l'avantage de n'exercer aucune action décolorante des vêtements.

En résumé, nous n'avons pas eu en vue de critiquer aucun des progrès que l'on a fait subir au traitement de la gale, mais au milieu de la multiplicité des moyens et des méthodes, il était peut-être nécessaire de poser quelques préceptes de thérapeutique; c'est ce que nous avons cherché à faire dans cette note.

Maladie pédiculaire, *phthiriasie.*

On donne cette dénomination à une affection de la peau, qui, en dehors des phénomènes morbides cutanés, donne lieu à la production de trois insectes différents : le *pediculus capitis*, le *pediculus corporis*, et le *pediculus pubis*. Les deux premiers sont généralement désignés sous le nom de poux de la tête et du corps ; le dernier, sous le nom vulgaire de *morpion*. Ces trois insectes sont considérés par de Geer, Linné, et d'autres naturalistes, comme n'étant que des variétés du même genre. Mais si l'on a égard à la forme de chacun d'eux, et notamment à celle du *pediculus pubis*, à son siége tout spécial et toujours constant, à sa situation à la base de chaque poil, dont il ne s'éloigne jamais, au mode de piqûre et de sensation douloureuse qu'il produit, on est porté à en faire une catégorie à part ; ajoutons qu'il est loin de pulluler à l'instar des poux, et de donner naissance aux sécrétions morbides que les poux déterminent. Nous donnerons donc une description à part de l'affection à laquelle se rattache le *pediculus pubis*, et nous réserverons la dénomination de maladie pédiculaire pour l'affection dans laquelle il se produit des poux, soit sur la tête, soit sur le corps.

Quant aux caractères communs à ces insectes, ce sont les suivants : Insectes aptères, à corps aplati avec enveloppe coriace, diaphane à son centre ; tête distincte, ovale ou triangulaire, avec petit mamelon charnu renfermant un petit suçoir ; deux antennes, deux petits yeux ronds ; corselets, presque carrés ; six pattes grosses et d'une égale longueur. Ils sont ovipares, leurs œufs portent le nom de *lentes ;* les mâles ont le bout de l'abdomen arrondi, tandis qu'il est échancré chez les femelles, qui n'ont pas d'aiguillon.

Ceci posé, je crois que les auteurs modernes ont fait trop bon marché de la maladie qui nous occupe, tandis que les anciens y attachaient une importance un peu trop grande peut-être.

Il est peu d'affections qui, au point de vue des soins à donner à

l'enfance, intéressent plus le médecin. Quoique beaucoup plus commune chez l'enfant, elle peut se rencontrer assez fréquemment dans tous les âges de la vie ; mais alors, tantôt elle affecte le cuir chevelu, tantôt le corps.

Elle ne paraît pas naître des mêmes causes, suivant qu'elle siége sur ces diverses parties. Dans l'enfance, quelle que soit la propreté dont les enfants sont entourés, il n'est pas rare de voir surgir tout à coup, durant la convalescence d'une maladie ou après quelques prodromes de malaise, d'inappétence, de lassitude générale, une quantité considérable de poux à la tête.

Si, au contraire, c'est la surface du corps qui est le siége de la maladie, alors la malpropreté, la misère avec toutes ses conséquences, l'ont presque toujours déterminée.

Certes, cette maladie peut se transmettre d'un enfant à un autre enfant, et même quelques dermatologistes très recommandables la considèrent comme ayant toujours cette origine. Telle n'est pas notre manière de voir, et sans repousser cette transmission qui doit avoir lieu dans beaucoup de cas, nous considérons la maladie pédiculaire de l'enfance comme pouvant être très fréquemment spontanée dans des conditions données de tempérament, de constitution et de vie sociale de l'enfant.

Cette spontanéité, nous l'admettons aussi à l'égard de l'adulte et du vieillard, par cette coïncidence, signalée d'ailleurs par tout le monde, de la maladie pédiculaire avec la malpropreté et la misère. En cela, nous partageons la manière de voir des auteurs les plus anciens, et les idées plus récemment émises à ce sujet par Moronval, autrefois médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Il est peu d'insectes qui pullulent avec une aussi grande rapidité et en aussi grand nombre. L'observation que nous rapporterons ci-après, est une preuve évidente de ces deux conditions de développement, en même temps qu'elle démontre la possibilité d'une spontanéité d'origine dans les conditions que nous avons signalées plus haut.

Tous les dermatologistes ont insisté sur cette génération si considérable de poux à la surface de la peau dans quelques cas. Il en est qui ont été plus loin, et qui ont admis la production de ces insectes

dans l'épaisseur de ce tissu sous forme de poches ou tumeurs qui se crèvent et mettent en dehors une véritable fourmilière d'insectes. Lieutaud va plus loin encore, et cite les cas d'autopsies qui ont démontré non-seulement l'existence de ces poches sous le cuir chevelu, mais encore sous les membranes du cerveau et dans la propre substance de cet organe ; en sorte que les poux pourraient s'introduire plus loin que le *pulex penetrans*, qui se loge constamment dans l'épaisseur de la peau, et qui est pourvu d'organes propres à opérer cette pénétration. Presque tous les auteurs modernes nient ou mettent en doute l'existence de ces poches, et nous ne saurions aller aussi loin que Lieutaud à cet égard ; mais nous avons été à même d'observer ces sortes de productions exceptionnelles, nous avons vu ces tumeurs remplies de myriades de poux : nous nous en expliquons difficilement la formation, nous en admettons cependant l'existence sans rien préciser sur leur siége. Se sécrète-t-il une humeur qui se concrète pour former les parois d'une sorte d'enveloppe? La ponte des lentes est-elle sous-épidermique? C'est ce que nous ne saurions déterminer ; mais quant aux tumeurs pédiculaires, nous les avons vues.

Rust rapporte qu'il fut appelé en consultation auprès d'un enfant mâle, âgé de treize ans, qui portait sur la tête une très grosse tumeur pour laquelle un grand nombre de remèdes avaient été inutilement employés. Cette tumeur, peu élevée, mollasse, sans fluctuation, n'offrait aucune trace d'inflammation. Le malade, qui était dans un état cachectique, se plaignait seulement d'une démangeaison insupportable dans l'intérieur de la tumeur. On y pratiqua une incision : il en sortit une immense quantité de petits poux blancs ; elle ne contenait rien autre chose, et le malade guérit rapidement. G. Heberden, d'après Ed. Wilmot, a cité un cas semblable. Bernard Vallentin rapporte l'histoire d'un homme qui, des faits que nous avons cités, avait des démangeaisons insupportables sur la peau, et dont tout le corps était couvert de petits tubercules analogues. Ces petites tumeurs furent incisées : il n'en sortit ni sérosité, ni sang, ni pus ; mais elles contenaient une si grande quantité de poux de diverses grosseurs, que le malade faillit en mourir de frayeur. Eh bien, c'est en présence de tels faits que l'on

a mis en doute la spontanéité des poux. Ainsi, M. Rayer se demande si ces tumeurs n'étaient pas formées par des follicules cutanés, dilatés, dans lesquels des *pediculi* auraient pénétré et se seraient reproduits ?

Tout le monde rattache à la malpropreté et à la misère le développement des poux; personne ne peut nier leur manifestation spontanée chez certains enfants, ou chez des jeunes gens et même des adultes, durant le cours des maladies graves, et alors même que ces enfants sont entourés des plus grands soins de propreté : il y a donc là une cause toute spéciale qui nous est inconnue, et qui donne lieu à cette fécondation spontanée; car ces enfants, comme ces adultes, ne sont pas en contact avec d'autres enfants qui soient atteints de maladie pédiculaire.

Mais il y a plus, ce n'est pas seulement pour la tête que j'admets la spontanéité de cette maladie, je dis qu'elle a lieu aussi pour le corps. J'ai eu l'occasion de recueillir à cet égard un grand nombre de faits. Malheureusement ils ne se rattachent pas à des individus sur la propreté et les contacts desquels j'aie toujours pu compter ; mais j'en ai vu surtout que je ne puis pas considérer comme étant dans les mêmes conditions. Il s'agit, par exemple, d'un homme de trente-sept ans, marié, ayant plusieurs enfants, vivant et couchant constamment avec sa femme, et qui, pour la troisième fois, était atteint d'une maladie pédiculaire du corps. Son père, chose remarquable, avait comme lui été assez souvent sujet à la même affection; le développement de celle-ci était précédé de malaise général, de lassitude, d'anorexie, à la suite desquels se montrait une démangeaison à la peau avec un picotement, et en quelques jours des poux en proportion assez notable se manifestaient. D'ailleurs pourquoi ce qui se produit à la tête chez l'enfant dans le jeune âge ne se produirait-il pas sur le corps ?

Nous avons donné des soins à une dame qui habitait un château, et qui couchait dans une alcôve à deux lits : son mari occupait le second lit. Deux ou trois fois par an, quelque soin qu'elle prît d'elle-même, malgré des soins hebdomadaires, elle était prise de la maladie du corps, que son mari ne contractait pas. Elle avait porté les précautions assez loin pour faire changer à chaque atteinte

de poux, non-seulement ses draps et ses couvertures, mais encore ses matelas.

Voici deux observations du même genre.

Maladie pédiculaire spontanée. — Madame veuve Thénard, trente-sept ans. Tempérament lymphatique sanguin, santé débile, maladies et incommodités fréquentes. Rien de notable du côté des organes génitaux ; l'estomac est capricieux ; les digestions sont lentes et capricieuses ; la langue est fendillée. La malade est mal nourrie et loge dans un appartement humide et peu aéré.

Au printemps, elle était sujette à des boutons et à des démangeaisons ; cette année les boutons furent plus nombreux. Il y a trois mois parut une éruption de papules causant des démangeaisons vives sur la partie supérieure du dos, sur les épaules, la partie supérieure de la poitrine, dans les aisselles. Quelques jours après, parurent des poux en petite quantité, qui ne gagnaient jamais le cuir chevelu ni le pubis et la partie inférieure du corps. La malade les détruisait, et tous les jours en tuait quatre ou cinq qui semblaient sortir à la peau ; mais leur apparition ne cessait pas. L'éruption revêtit les caractères du lichen mêlé au prurigo. La tête est saine, sans croûtes ni parasites. La malade ne peut indiquer aucun mode de contagion ; elle n'a fréquenté personne qui fût infecté, etc. Bien plus, elle couche avec sa fille, âgée de dix-huit ans ; cette jeune fille a trouvé sur son corps quelques poux, qui ne se sont pas reproduits, qui ne lui ont pas causé de démangeaisons et qui n'ont amené aucune éruption, aucune papule. — Prescription. Chicorée, bains sulfureux. 27 mars. La malade se représente à la consultation ; les poux n'ont pas complétement disparu, mais personne n'a été infecté par son contact.

Maladie pédiculaire. — Moquet Benoist, quarante-trois ans, courtier de commerce, rue du Cloître-Notre-Dame, 10, neuvième arrondissement, né à Viviers, Aisne ; veuf. —Tempérament sanguin. Bonne santé habituelle. Il y a vingt-trois ou vingt-quatre ans il eut des chancres et un écoulement. — Il y a un an, à la suite de fatigues et de contrariétés, il eut une éruption de prurigo et de lichen accompagnée de poux. Il fut traité à Saint-Louis chez M. Cazenave par des bains alcalins et des pilules d'aconit et de taraxacum. Il sortit guéri au bout d'un mois. — Cette année, les poux reparurent en même temps que des papules de lichen et de prurigo. Comme l'année dernière, il ne peut indiquer aucune source de contagion, si ce n'est un chien qui couche habituellement sur son lit. Il n'a communiqué les parasites à personne quoiqu'il ait eu des rapports intimes avec plusieurs individus. Les poux n'ont gagné ni la tête, ni la barbe, ni le pubis. Ils n'étaient pas en grande quantité, il semblait au malade qu'ils sortaient de la peau. Du reste il se tient propre, change de linge deux ou trois fois par semaine, et prend fréquemment des bains. — 20 mars 1856. L'éruption et les démangeaisons occupent le ventre, les jambes, les épaules et surtout la partie interne des cuisses. Elle affecte la

forme du lichen mêlé au prurigo. — Prescription. Bains sulfureux; sirop sulfureux; pommade soufrée à un gramme pour trente. — 12 avril. Il existe encore quelques traces de lichen et de prurigo aux cuisses et au ventre. Les démangeaisons ont diminué. Les poux ont disparu dès la deuxième semaine du séjour. — 15. Exeat; guéri.

Nous le répétons donc, la maladie pédiculaire, soit de la tête, soit du corps, peut être spontanée. Je sais que les entomologistes ne sauraient admettre une pareille manière de voir; mais il faut se rendre à l'évidence des faits, malgré les théories et les observations que l'on peut puiser dans une étude approfondie de l'histoire naturelle.

La maladie est le plus souvent fort discrète, et c'est surtout le cas où elle a été contractée d'enfant à enfant ou d'adulte à adulte; car alors elle ne présente pas les mêmes phénomènes. Ainsi lorsqu'un enfant se coiffe d'un bonnet qui contient un ou plusieurs poux, ceux-ci s'attachent aux cheveux; ils donnent lieu à des pontes successives, et les poux se disséminent peu à peu à toute la surface de la peau, en y déterminant des démangeaisons, à la suite desquelles surviennent de légères érosions, par suite de grattages. L'enfant n'en est pas autrement incommodé; la peau n'en est pas autrement malade. Lorsque, au contraire, l'affection naît spontanément, il se montre des démangeaisons d'abord; puis la peau sécrète bientôt une humeur très visqueuse qui agglutine tous les cheveux, les rend collants, plastiques, humides à un tel point que, à la première vue, on reconnaît la maladie pédiculaire de la tête. Chose remarquable, il y a toujours une seule portion de cuir chevelu qui est affectée, à moins que la date du mal ne soit ancienne. Les poux se répandent bien sur la totalité des cheveux, mais le foyer du mal, qui est unique ou multiple, est très nettement circonscrit. Il en résulte des mèches plus ou moins considérables de cheveux agglutinés d'une part; d'une autre part, les poux, en se disséminant et en abandonnant le foyer d'origine, déposent, au fur et à mesure du trajet qu'ils parcourent, des lentes sur les cheveux, en sorte que ces derniers sont recouverts sur leur longueur de petits points grisâtres, arrondis, qui bientôt deviendront des insectes. La peau elle-même est excoriée, suintante, croûteuse; le derme est à

nu, et, dans quelques cas même, il y existe des ulcérations grisâtres de mauvais caractère.

La maladie est très fréquemment bornée à la tête. Willan prétend même qu'elle ne s'étend jamais au delà; c'est une erreur. Cependant, il faut le dire, ce n'est pas ce qui a lieu le plus généralement.

Il est rare que la production des poux à la surface du corps se borne à causer des démangeaisons et des excoriations par suite du grattage; elle y fait naître encore des papules, dont le malade arrache le sommet: de là la forme morbide désignée sous le nom de *prurigo pédiculaire*. Est-ce une variété du prurigo dans laquelle les poux ne seraient que secondaires, ou au contraire une forme inhérente à la présence des poux? C'est une question que plusieurs auteurs n'ont pas hésité à résoudre dans le premier sens; mais, pour nous, nous croyons que le prurigo, lorsqu'il se montre à la peau avec les caractères qui lui sont propres, est primitif; que les poux n'ont été que secondaires et gagnés d'individu à individu par accident. De sorte que dans le prurigo pédiculaire (voy. cet article) il y a deux choses: les papules de prurigo avec leurs caractères distinctifs et leur siége, tandis que dans la maladie pédiculaire proprement dite, on ne voit que des excorations de peau sécrétant de la sérosité et ne donnant pas de sang, et çà et là des papules fournissant la même sécrétion: ce n'est plus d'ailleurs le même siége, la maladie pédiculaire existe tant en avant qu'en arrière, et le prurigo n'affecte que les parties postérieures. C'est là ce qui nous a fait mettre en doute l'existence du prurigo pédiculaire, que nous regardons plutôt comme un prurigo avec complication de poux contractés en couchant avec un individu qui en était plus ou moins couvert, ou dans des draps qui en contenaient dans leurs plicatures; car les poux se logent ordinairement dans les vêtements.

Le *pediculus pubis* se distingue nettement par sa forme des deux autres insectes; il a pour cachet aussi d'adhérer fortement à la peau, de s'y implanter à la base des poils, et de ne dépasser les limites des parties génitales que pour se porter à la base des poils qui peuvent se trouver disséminés à la surface du corps.

Abandonnée à elle-même, la maladie pédiculaire de la tête est,

pour l'enfant et pour l'adulte même, une source puissance d'incommodités ; elle surexcite le système nerveux, elle amène l'insomnie, l'agitation, bientôt l'inappétence et l'amaigrissement ; de sorte que si l'on continuait à respecter les poux, l'enfant pourrait tomber dans une sorte de marasme.

Mais cette affection peut, dans certaines maladies graves, être considérée comme une solution critique très avantageuse de la maladie. Il faut donc savoir la respecter jusqu'au point de ne pas nuire à l'enfant. En se reportant à l'observation à laquelle nous avons fait allusion déjà deux fois, on comprendra dans quel état doit être un individu atteint d'une maladie pédiculaire générale ; et l'on expliquerait, jusqu'à un certain point, comment Hérode, Sylla, Ennius, Philippe II roi d'Espagne, ont pu succomber à cette maladie portée à un tel degré.

Ces détails une fois établis, abordons la thérapeutique de cette maladie pédiculaire. En général, rien n'est plus facile que de couper court à cette affection. Mille moyens l'enrayent et la guérissent: aussi importe-t-il moins au médecin de connaître ces moyens que de savoir juger s'il y a ou non opportunité à enrayer le mal. Nous allons nous attacher à poser d'abord ces principes en isolant chacune de ces affections, puisqu'elles se rattachent réellement à des âges différents.

Depuis longtemps on avait signalé le danger qu'il y avait à supprimer la maladie pédiculaire chez l'enfant. C'est avec surprise que l'on trouve cette assertion mise en doute par quelques auteurs modernes fort recommandables d'ailleurs. Pour nous nous avons vu la mort survenir chez deux enfants, et cela dans l'espace de six à huit jours, pour avoir coupé les cheveux d'enfants atteints de maladie pédiculaire. Nous avons même vu des maladies graves surgir de cette même circonstance chez l'adulte. — On sait combien, dans les hôpitaux, les religieuses sont esclaves des soins de propreté ; lorsqu'elles reçoivent dans les salles des malades atteints de cette affection, elles s'empressent de s'opposer à la transmission en entourant le malade de tous les soins possibles de propreté. Le médecin prescrit-il la section d'une portion des cheveux, elles s'empressent, dans leur inexpérience, de faire couper ras la totalité. Dès

lors, cessation de la démangeaison, suppression de la sécrétion abondante qui en est une conséquence, refroidissement de la tête, répercussion de la maladie du cuir chevelu, et développement d'une affection cérébrale grave chez l'enfant, ou d'un état morbide général avec symptômes graves, sans qu'on puisse, dans quelques cas, préciser la nature de l'organe affecté pour l'adulte. Ce n'est qu'à force de rubéfiants ou de larges vésicants que l'on parvient à enrayer les accidents ; heureux encore lorsqu'on réussit.

Ce ne saurait donc être un fait douteux que les conséquences fâcheuses qui peuvent surgir de cette suppression. En thèse générale, s'il ne faut pas favoriser la formation des poux chez l'enfant, et encore est-il beaucoup de circonstances où cette production constitue la crise heureuse d'une maladie, au moins faut-il la respecter à son début et pendant une certaine période de temps. La seule condition qui exige impérieusement de faire cesser la maladie, c'est le cas où l'enfant en souffre réellement et où sa santé tend à en être altérée.

Alors on fait peigner peu à peu la tête de l'enfant ; on fait brosser les cheveux pour en détacher le plus de lentes possible. On peut même faire couper la sixième ou la cinquième partie de leur longueur, et répéter cette opération tous les deux ou trois jours, en prenant le soin de faire couvrir la tête dans la proportion où ces sections en enlèvent le vêtement naturel. La section des cheveux est le moyen le plus puissant pour arrêter l'affection pédiculaire, parce que, avec les cheveux, elle enlève la production ultérieure des insectes : mais c'est celui dont l'emploi est le plus difficile et le plus dangereux. Aussi, chez les jeunes enfants, faut-il lui préférer les soins ordinaires de propreté. Du moment que l'on diminue les poux, de quelque manière que ce soit, on est sûr de diminuer la maladie et les accidents qu'elle développe. Il ne me paraît pas nécessaire d'y ajouter d'autres agents, que je vais d'ailleurs faire connaître, à l'égard des adultes.

Pour ceux-ci, il est rare que l'affection ne se soit pas développée avec rapidité et avec énergie. La chevelure est presque toujours abondante ; les cheveux sont agglutinés et intriqués les uns dans les autres. Chercher à les isoler serait un essai inutile, la section

seule fait justice de cette difficulté ; c'est encore avec les mêmes précautions qu'il faut y arriver. Il faut de plus administrer des bains excitants, c'est-à-dire des bains sulfureux un peu forts et même des bains de vapeur, afin de porter une excitation vive sur la généralité de la surface de la peau. — Un peu plus tard on fait étendre de l'axonge, du saindoux ou de l'huile sur la tête : ce moyen seul suffit pour tuer les poux vivants. — On lave la tête tous les jours avec de l'eau alcaline contenant 10 grammes de carbonate de soude pour 500 grammes d'eau. — Enfin on arrive à l'emploi d'une pommade alcaline composée d'axonge, 30 grammes, et carbonate de potasse, 2 grammes. Les bains sulfureux doivent être employés même au delà du temps que dure l'affection.

C'est en changeant fréquemment le linge des malades atteints de prurigo pédiculaire, ou en leur faisant prendre d'une manière soutenue des bains alcalins ou savonneux, que l'on fait céder cette affection. Il n'est pas nécessaire d'employer des pommades. Mais il ne faut pas perdre de vue que la maladie a été engendrée non-seulement par la malpropreté, mais encore par la misère et les privations qu'elle entraîne à sa suite. Il y a donc lieu de fortifier le malade, et par un bon régime alimentaire, et par une sage administration de toniques à l'intérieur, car on a presque toujours affaire à des vieillards.

Nous avons peu de chose à dire de la maladie pédiculaire du pubis. Tout le monde sait sa marche : elle est ordinairement bornée aux parties génitales, mais elle peut s'étendre à tout le corps. Chose remarquable, c'est sa forme immédiate qui fait que des malades attendent souvent fort tard pour se faire traiter ; notamment les personnes d'une vie régulière, et qui couchent par hasard dans un lit d'auberge, y contractent cette affection. Chacun sait qu'il suffit de quelques frictions d'onguent mercuriel simple et de bains d'eau pour l'arrêter immédiatement et la guérir. Dans le cas où l'on ne voudrait pas se servir de cet onguent, pour des motifs puisés dans des conditions de position sociale, on pourrait avoir recours à l'onguent citrin ou à des bains de sublimé.

Dans ces trois formes pédiculaires, nous ne saurions trop recom-

mander de faire changer les vêtements des malades, ou au moins de les faire nettoyer, lessiver et passer au soufre.

Je terminerai l'histoire de la phthiriase par une observation fort remarquable que j'ai citée plusieurs fois dans cet article.

B..., âgé de trente-huit ans, né de parents misérables, a joui d'une excellente santé jusqu'en 1842, où il fut pris de douleurs rhumatismales de peu de durée. Peu de temps après, quoique père de huit enfants, il se livre à la vie la plus dérégléé, passant les nuits dans les bois voisins du village qu'il habitait, vivant de pain noir et de légumes crus qu'il pouvait dérober, ayant d'ailleurs des rapports avec toutes les ouvrières d'une blanchisserie voisine, alors qu'elles le suivaient de gré ou de force. — Écoulement uréthral et chancre. Peu après, développement de petits boutons pleins d'eau entre les doigts, se multipliant d'une manière successive aux poignets, au pli des membres et causant de la démangeaison : c'était la gale. Entré à l'hôpital de Bernay. Le médecin s'occupe d'abord du traitement de la blennorrhagie et des chancres. Un jour, après avoir pris une potion nouvelle que le malade a considérée comme étant plus énergique que de coutume, l'écoulement diminua tout à coup, ainsi que le gonflement du prépuce; mais en même temps il fut pris d'un malaise général avec céphalalgie intense... ; puis, tout son corps devint le siége d'une démangeaison beaucoup plus vive que celle de la gale, et, dans l'espace de vingt-quatre heures, il aperçut à la peau des milliers de poux. Il n'en avait jamais eu auparavant. En vingt-quatre heures aussi *disparurent tous les boutons de gale.* Telle était alors son affreuse position qu'il se grattait jusqu'à s'excorier la peau; et, au lieu de sang, c'était une matière roussâtre et infecte qui s'écoulait. Cette matière, en se concrétant, donnait naissance à des croûtes hideuses. Sa chemise, imprégnée de l'humeur qui s'échappait, aurait pu, dit-il, tenir droit comme un pieu, après avoir été séchée. Les poux pullulant d'une manière effrayante, et la peau devenant de plus en plus malade, le médecin de Bernay l'engagea à se rendre à Paris pour être traité à l'hôpital Saint-Louis. Il y arriva après vingt jours de marche, mendiant de ferme en ferme la nourriture et le coucher.

Le 2 janvier 1843, je le reçus dans mon service.

Il était à peine dans son lit, que déjà draps, rideaux, meubles voisins, étaient envahis par des milliers de poux ; il fallut l'isoler, l'entourer d'alèses que l'on étendit sur le sol, et les renouveler souvent.

Ses cheveux, longs et touffus, étaient agglutinés entre eux par une matière collante et humide qui suintait de sa tête. Sur les mèches de ses cheveux agglutinés et dans leurs intervalles, on découvrait des fourmilières d'insectes dans un mouvement continuel. La face antérieure de son cou présentait une large excoriation rouge, sécrétante, infecte et brûlante. Derrière chacune de

ses oreilles, dans les plis des ailes du nez, dans celui qui sépare le menton de la lèvre inférieure, suintait avec cuisson une humeur collante et d'une odeur repoussante. Les sourcils étaient tombés ; à leur place un produit furfuracé grisâtre garnissait l'arcade orbitaire. Les bords libres des paupières étaient très rouges, chroniquement enflammés et presque entièrement dépouillés de leurs cils.

Il faut avoir vu cette hideuse figure aux yeux chassieux et enfoncés dans les orbites, aux pommettes saillantes, aux joues creuses, incessamment parcourue par des milliers de poux, et surmontée de la coiffure animée et mouvante que j'ai décrite, pour s'en faire une idée exacte.

Le sujet était dévoré par une faim vorace ; mais il n'avait pu jusqu'ici que très difficilement la satisfaire, et de plus il était absolument privé de sommeil. Ainsi s'explique sa maigreur.

L'aspect du reste de son corps n'était pas moins remarquable.

Sur les différentes faces du tronc et des membres étaient disséminées de nombreuses plaques élevées au-dessus du niveau des intervalles de peau restée saine. Ces plaques, de formes irrégulières, de dimensions très variables (de 2 à 6 ou 7 centimètres de diamètre), étaient isolées ou se touchaient et se confondaient par leurs bords. Elles étaient brunâtres ou violacées, ridées, rugueuses et recouvertes d'un produit squameux peu abondant. Leur ensemble si considérable donnait une apparence zébrée ou tigrée à la surface du corps du malade. De distance en distance on voyait de petites élevures rosées ou plutôt d'une teinte spéciale, sous forme de petits boutons isolés ou plus ou moins rapprochés, présentant à leur sommet et à leur circonférence de petites lamelles épidermiques.

Sur ces plaques et dans leurs intervalles, des insectes parasites circulaient en foule. Je n'ai pas vu que les poux qui se promenaient sur le tronc fussent différents de ceux qui fourmillaient sur le cuir chevelu.

Mais ce que j'oubliais de mentionner, ce sont d'autres plaques humides et croûteuses (véritables tumeurs), entremêlées aux précédentes, sur toute la surface du corps, en nombre considérable, et qui constituaient de *véritables nids à poux*. C'étaient ces plaques qui fournissaient l'humeur sanieuse et infecte qui empesait la chemise du malade au point, comme il le disait énergiquement, qu'elle aurait pu se tenir droit comme un pieu.

Je me gardai bien de débarrasser rapidement cet homme des innombrables poux qui le dévoraient ; je permis cependant, dès les premiers jours, qu'on lui donnât quelques bains alcalins, et peu à peu, mais *peu à peu* seulement, qu'on coupât les cheveux : d'abord le quart de leur longueur, puis la moitié, puis les trois quarts, puis presque ras.

Lorsque les cheveux furent en grande partie coupés, on put voir, sur différents points du cuir chevelu, mais principalement à la région occipitale, de petites tumeurs arrondies, sortes de végétations qui servaient comme de centres, de quartiers généraux aux légions pouilleuses qui habitaient la tête.

Quand le nombre des poux fut considérablement diminué par ces très simples, on s'occupa de leur destruction définitive ; mais on y céda lentement et par portions. La pommade employée à cet eff d'abord de l'axonge fraîche. Puis on la rendit alcaline, et elle fut composée ainsi qu'il suit : axonge, 30 grammes; carbonate de p 2 grammes ; plus tard encore on porta la dose de carbonate de pot 4 grammes.

Les excoriations étaient pansées simplement ; le malade commença à goûter un peu de repos ; son appétit continuait à être bon.

A mesure que les poux étaient détruits, les végétations du cuir chevel faisaient, le suintement des excoriations diminuait. On ne négligea p dériver sur le tube digestif par des purgatifs, et en même temps on fit quer une saignée pour dissiper une congestion encéphalique qui me Ainsi s'améliorait chaque jour l'état du malade ; mais en même temps s pétit diminuait. Ce ne fut que dans le commencement de février que l tion pédiculaire fut entièrement enrayée.

A peine avait-elle disparu, qu'on vit de grosses pustules *apparaît un prurit considérable, entre les doigts, sur le dos des mains, et s faces antérieures des poignets, ainsi que des boutons vésiculeux au p bras, aux jarrets, sur le ventre. Il n'y avait pas de doute que ce ne fû gale* pustuleuse. *La pommade d'Helmerich, aidée de bains sulfureux, justice au bout de quelques jours.*

Durant le traitement de cette gale secondaire, le malade fut pris d leurs rhumatismales semblables à celles qu'il avait éprouvées au comm ment de 1841, et probablement cette fois par suite de refroidissem sortir des bains sulfureux ; elles ne furent pas très vives, mais résis avec opiniâtreté aux bains de vapeur dirigés contre elles.

Cependant les plaques squameuses de la peau, que nous reconnûmes pour être de nature syphilitique, n'étaient modifiées qu'en ce sens q étaient maintenant dépouillées de leurs squames.

Vers le milieu de mars, d'autres symptômes secondaires de vérole, l accompagnés de symptômes tertiaires, éclatèrent avec une extrême vio

Les tibias, en particulier, devinrent le siége de douleurs intolérables vives, du reste, le jour que la nuit. On sentait ces os très notablement irrégulièrement gonflés sous les doigts qui les exploraient.

Des pustules plates furent constatées au pourtour de l'anus, et bient magnifique végétation, d'aspect granuleux et humide, se développ le sillon mento-labial.

On commença alors le traitement antisyphilitique. Il y avait à peine ques jours qu'il était commencé, que, sur les faces antérieures et la de chaque jambe, on vit une tache ecchymotique noirâtre apparaître et ment s'étendre, pour recouvrir enfin presque toute la hauteur des deux ja En même temps les gencives se ramollissaient, les dents s'ébranlaien

leurs alvéoles, et une odeur infecte s'échappait de la cavité buccale. Il n'avait pas encore été administré de mercure.

Un scorbut des plus graves était donc venu compliquer l'état morbide déjà si complexe de notre malheureux patient.

Des citrons à sucer, les ferrugineux, les toniques, le vin de Collioure, arrêtèrent et guérirent cette affection.

Alors un traitement antisyphilitique put être entrepris, il avait pour base le mercure et l'iodure de potassium.

Il serait trop long de décrire toutes les phases décroissantes par lesquelles ont passés les différents symptômes de tous ces états morbides qui se confondaient. Ainsi, pour le scorbut, les différentes teintes des vastes ecchymoses développées aux jambes, l'état de plus en plus ferme des gencives, etc. ; pour la vérole, l'affaissement progressif des syphilides dont la teinte s'est peu à peu modifiée, l'affaissement aussi, puis la disparition des végétations contre lesquelles, outre le traitement général, on employa des applications mercurielles locales.

Sans doute, la marche vers la guérison a été lente, puisque ce n'est que le 24 juillet que le malade a quitté l'hôpital, et qu'il en est sorti encore peu robuste ; mais il était parfaitement guéri de toutes ces affections successives.

Je passe ici beaucoup de détails sur le malade, que j'appelais l'*homme des bois*, ainsi que tous les divers traitements qu'il a subis. Cette observation, si intéressante sous tant de rapports, a été relatée dans son ensemble dans la thèse de l'un de mes élèves les plus distingués, M. le docteur Faget. Je ferai remarquer, en terminant, que ce malade est constamment resté couché et isolé des autres, qu'il n'a marché que durant la dernière quinzaine de son séjour à l'hôpital, et qu'il était placé dans mon service, où il n'existe jamais de galeux.

Acné punctata. — Nous avons décrit cette maladie en faisant l'histoire de l'acné ; nous ne la rappelons ici que parce qu'on y a découvert la présence d'un insecte qui a de l'analogie avec celui de la gale. (Voy. Acné.)

NEUVIÈME GROUPE.

Maladies scrofuleuses de la peau.

Ce groupe ne comprend que deux maladies, le *lupus* et la *scrofule de la peau*, que nous appelons *scrofulide*. Inutile de justifier ce rapprochement, qui a sa source dans les analogies morbides de ces

diverses affections. Toutefois nous devons expliquer notre pensée par rapport à ce que nous entendons par scrofule et *scrofulide* de la peau. Par la dénomination de scrofules de la peau nous comprenons toutes les formes morbides cutanées de nature essentiellement scrofuleuse. Ainsi un eczéma peut exister comme maladie indépendante du tempérament et de la constitution ; il surviendra, par exemple, à un âge où ces deux espèces de causes n'exercent plus leur influence. Mais si au contraire il se manifeste dans la jeunesse, qu'il affecte certaines parties du corps, notamment le cuir chevelu et les oreilles et qu'il est une physionomie spéciale, il est alors essentiellement scrofuleux et l'on ne peut le guérir qu'à la condition de modifier la constitution. Ce que je dis de l'eczéma, je puis le dire de plusieurs autres maladies, comme l'impétigo, l'eczéma impétigineux, l'herpès, etc., qui constituent réellement autant de scrofules de la peau de formes variées ; c'est à ces formes que nous consacrerons quelques détails d'ensemble, surtout à l'égard de la thérapeutique qu'elles réclament, et sans prétendre décrire pour cela la scrofule proprement dite, dont l'histoire comporte un autre ordre de phénomènes et donnerait lieu à un traité spécial. Quant aux scrofulides, ce sont des états moitié scrofuleux, moitié syphilitiques, le plus souvent héréditaires, et qui ont un cachet tout particulier que nous chercherons à rendre.

LUPUS.

Tuberculeux. Agissant en profondeur : *Térébrant.* Agissant en surface : *Serpigineux* ou *herpétiforme.*	Ulcéreux ou *exedens.* Agissant en profondeur : *Térébrant.* *Vorax.* Agissant en surface : *Serpigineux* ou *herpétiforme.*

Le lupus a été improprement rangé dans les maladies tuberculeuses par Bateman, et décrit dans cette catégorie par presque tous les autres dermatologistes qui l'ont suivi. Si cette classification est assez juste en ce qui concerne une de ses formes, elle ne l'est pas à l'égard de l'autre.

Le lupus est une affection scrofuleuse de la peau qui s'y manifeste par un engorgement très lent de ce tissu, amenant dans beaucoup

de cas un accroissement notable de la partie affectée au point d'en doubler et d'en tripler le volume, et ayant pour résultat final, à la guérison, l'atrophie ou la destruction plus ou moins étendue de la partie affectée. Cet engorgement affecte quelquefois la forme de tubercules, mais le plus souvent ce n'est qu'un épaississement inflammatoire chronique de la peau avec ou sans ulcérations. En effet, le mot de tubercule fait naître la pensée du développement de petites tumeurs inflammatoires variables en volume, depuis un gros pois jusqu'à une noisette et plus. Or ce phénomène n'est bien appréciable que dans certains lupus du corps et des membres, car là où siége ordinairement le lupus, c'est-à-dire à la figure, l'état tuberculeux proprement dit est beaucoup moins commun. J'insiste sur cette circonstance, parce que le praticien serait souvent induit en erreur en fait de diagnostic, s'il attachait trop d'importance à cet état tuberculeux, qui est loin d'être constant.

Le mot *lupus* (loup) est une ancienne dénomination véritablement insignifiante, mais qu'il faut conserver pour l'usage. Quelle analogie y a-t-il en effet entre la figure d'une personne atteinte de lupus et celle d'un loup !

Nous adoptons d'ailleurs pour les variétés de cette maladie des divisions qui nous paraissent plus rationnelles que celles qui ont été préconisées jusqu'à ce jour. Nous nommons *lupus tuberculeux*, tout lupus avec induration rouge obscur du tissu de la peau, mais sans ulcération. Nous appelons, avec les auteurs qui nous ont précédé, *lupus exedens* (rongeant), tout lupus avec engorgement, avec induration de la peau, qui offre elle-même *une surface ulcérée*. Puis prenant en considération la marche de la maladie dans ces deux espèces, marche d'ailleurs toujours uniforme, toujours la même, nous disons que l'une et l'autre détruisent les parties, soit en profondeur, soit en surface, car il ne faut pas perdre de vue que c'est là le but final du *lupus*, c'est son caractère essentiel. Quoique à son début il amène une hypertrophie, à sa fin, c'est-à-dire à sa guérison, il a produit, soit une destruction, soit une atrophie de la partie affectée. J'établis donc deux sous-divisions dans chaque espèce, que je distingue en *lupus térébrant* ou détruisant et atrophiant en profondeur, et en *lupus serpigineux* ou *herpétiforme*, c'est-à-dire

détruisant ou atrophiant en surface. Toutefois j'ai besoin de justifier cette expression *herpétiforme*. J'ai observé que lorsqu'un lupus gagnait en surface, c'était toujours au moyen de sa circonférence plus malade que son centre, et toujours aussi par un bourrelet plus ou moins marqué; de sorte qu'il n'est pas très commun de voir le centre de l'affection se cicatriser, lorsque la circonférence seule reste malade, ou de voir guérir la totalité, quand par des cautérisations opérées sur le bourrelet de la circonférence on modifie seulement la vitalité de tissu de ce bourrelet, par où se propage la maladie. Il y a donc analogie frappante entre le lupus et l'herpès sous ce rapport. Il est maintenant une forme de lupus très rare que nous avons dû cependant spécifier : c'est le *lupus vorax*, ainsi dénommé à cause de la rapidité avec laquelle il détruit les parties en profondeur.

Certaines considérations générales peuvent se rapporter à l'une et à l'autre affection, nous allons les faire connaître avant de décrire les espèces. Le lupus est une des scrofules de la peau. Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il doive toujours exister sur des sujets scrofuleux. A cet égard, on peut établir une distinction assez tranchée. Tous les *lupus exedens* affectent ordinairement des individus qui portent les attributs du tempérament lymphatique, et qui ont encore, ou qui ont eu des ganglions engorgés au cou, des sécrétions du cuir chevelu plus ou moins abondantes et de longue durée, ou des ophthalmies scrofuleuses. La peau est blanche, épaisse; les cheveux sont blonds; la physionomie est peu mobile; les allures générales dénotent de l'indolence et de l'apathie. Il n'en est pas de même du lupus dit *tuberculeux*. Il apparaît sur des enfants qui ont les dehors d'une bonne et forte constitution; traits accentués, mais gros; cheveux et sourcils foncés; peau assez brune. Mais interrogez ces enfants, et ils vous diront qu'ils ont eu dans le très jeune âge quelques glandes au cou ou quelque sécrétion lymphatique.

Il y a plus, il existe sous ce rapport une nuance entre le *lupus tuberculeux térébrant* et le lupus tuberculeux herpétiforme ou attaquant en surface Le *lupus térébrant* peut siéger sur des sujets qui ont tous les attributs de la force, de la vigueur et de la santé; tandis que le *lupus tuberculeux en surface* se relie toujours aux

attributs d'une constitution plus ou moins molle, plus ou moins lymphatique.

Pris en général, le lupus est une maladie de l'adolescence, affectant à peu près également les deux sexes, mais étant un peu plus commune chez la femme que chez l'homme. Sur 47 lupus, on en compte 25 chez la femme et 22 chez l'homme. C'est de quinze à trente-cinq ans qu'il est le plus fréquent; 36 cas sur 44 sont dans cette catégorie. Mais c'est surtout de quinze à vingt-cinq ans qu'il se développe, puisque dans cette période de la vie il y en a 24 cas sur 44. Chose remarquable, le lupus est peut-être plus commun à la campagne qu'à la ville, et cette observation a été très judicieusement faite par M. Rayer. D'après notre statistique, les enfants qui travaillent les tissus en général, filatures, tissage, etc., y seraient plus disposés que d'autres. 28 fois sur 45 on le voit lié au tempérament lymphatique; 12 fois au tempérament lymphatique sanguin; 4 fois au tempérament sanguin, et 1 fois au tempérament sanguin nerveux. Cet ordre de chiffres mérite de fixer toute l'attention du praticien sous un double rapport. D'abord il vient nettement à l'appui de nos idées sur la liaison de certaines formes morbides cutanées avec tel ou tel tempérament; ensuite il doit faire comprendre au praticien que c'est là une maladie générale de l'économie, qu'il ne suffit pas de traiter extérieurement, et qui exige au contraire une médication générale soutenue et prolongée. Sur 27 cas, la constitution est notée 21 fois comme étant excellente. En fait de maladies antérieures, elles n'ont été désignées que pour 11 cas, et dans ces 11 exemples les gourmes, ophthalmies ou glandes, figurent pour le chiffre 9. La statistique donne une preuve de la lenteur de la marche de cette affection : sur 42 lupus on en trouve 7 ayant un an de date; 28 plus d'un an, et 7 plus de dix ans. Il paraît naître plus fréquemment en hiver que dans toute autre saison. Enfin, par rapport aux parties affectées, il est curieux de connaître des chiffres exacts. Face, 41 fois sur 44; nez seul, 16 fois; nez et autres parties de la figure, 26 fois; lèvres, 4 fois; bras, mains et jambes, 3 fois; cou, avant-bras et pied, 2 fois; poitrine, dos et cuisses, 1 fois. C'est donc là essentiellement une maladie de la figure : 41 fois sur 44 celle-ci est atteinte; ce qui n'exclut pas la possibilité de siége sur

d'autres parties, car le lupus est assez fréquemment multiple : on peut trouver deux, trois, cinq plaques de *lupus* sur le même individu, ce qui donne la clef des chiffres que nous indiquons en détail par rapport au chiffre d'ensemble. Enfin faisons remarquer que 26 fois sur 44 le nez est atteint, ce qui explique pourquoi toutes les planches de maladies de la peau représentent le lupus comme siégeant plus particulièrement sur cette partie. Ces préliminaires nous permettent d'entrer maintenant dans l'histoire de chaque espèce.

Le *lupus tuberculeux térébrant* a son siége le plus commun au sommet et sur les ailes du nez, mais plutôt au sommet, ce qui n'exclut pas qu'il puisse se montrer aussi sur d'autres points de la figure ou de la surface du corps. Il apparaît au sommet du nez par un épaississement un peu diffus de la peau avec légère induration du tissu cellulaire sous-cutané et rougeur sombre. La partie malade est quelquefois lisse, uniforme, luisante; dans quelques cas il se forme une petite croûte de très peu d'étendue, assez épaisse, grisâtre, sèche, adhérente, et qui ne fera que très peu de progrès ultérieurement. Dans d'autres circonstances cet engorgement est surmonté à sa surface de petites saillies dépassant son niveau et qui constituent des tubercules; d'ailleurs aucune sensation douloureuse. La maladie persiste dans le point où elle s'est montrée avec accroissement du volume de cette partie, et dans quelques cas rares avec une certaine atrophie ou perte de substance, pour ainsi dire, quoiqu'il n'y ait pas d'ulcération. L'hypertrophie est beaucoup plus commune que l'atrophie ; aussi voit-on souvent le lupus tuberculeux doubler et tripler le volume du nez ou de la partie affectée.

Une fois développé sur un point, le lupus tuberculeux térébrant fait des progrès excessivement lents et tels, que quelquefois les malades ne réclament les soins du médecin qu'après un ou deux ans de son point de départ; mais il gagne toujours en profondeur, envahissant peu à peu les parties plus profondes, jusqu'à atteindre pour le nez, par exemple, les ailes et la cloison du nez. Quelquefois l'affection, quoique partie de l'extrémité du nez, ne gagne que le côté gauche ou le côté droit; enfin elle s'arrête ordinairement à la jonction des ailes du nez et des joues, ou un peu au delà, en enva-

hissant sur ces parties, mais alors elle a tout attaqué. Ce n'est pas la peau seulement qui a été affectée, c'est aussi le tissu cellulaire sous-cutané, les cartilages, la membrane muqueuse, qui participent de la tuberculisation ou de l'engorgement.

Ce qu'il faut bien dire, c'est que cette inflammation lente qu'on appelle lupus, que l'on désigne par une tuberculisation, ce qui n'est réellement qu'une *fiction de forme*, est une maladie qui, sans ulcérer, sans faire sécréter, dans cette espèce au moins, change entièrement la nature des tissus qu'elle affecte, modifie leur organisation, et les transforme en une matière plus ou moins homogène qui n'est pas celle de l'inflammation ordinaire, et qui n'est pas non plus la matière tuberculeuse proprement dite. C'est donc un mode inflammatoire chronique tout spécial.

C'est cette espèce de lupus qui se rencontre sur des sujets d'une excellente constitution en apparence et qui n'ont pas pour la plupart les attributs du tempérament lymphatique. La maladie dure ainsi des années, sept, dix, douze, quinze ans. Née de quinze à vingt-cinq ans, liée quelquefois au tempérament lymphatique, elle reçoit, dans certains cas, de l'influence de l'âge, chose remarquable, une modification importante, et en vertu de laquelle elle se guérit quelquefois spontanément, ou au moins s'arrête pour ne plus faire de progrès, ce qui dépend, suivant nous, de ce que l'âge et les habitudes de la vie modifient singulièrement le tempérament et la constitution, et qu'il agit à l'instar des médications que nous employons dans ce but. Elle ne porte d'ailleurs aucune atteinte à la santé générale.

Le lupus tuberculeux térébrant est assez rare ailleurs qu'au nez et au voisinage des yeux et de la bouche. Lorsque cette forme morbide a son siége sur le corps, elle y fait aussi des progrès très lents; elle y occupe peu d'étendue, et toute sa surface y reste malade uniformément. L'état tuberculeux y est mieux dessiné.

Lupus tuberculeux serpigineux. — Cette forme est beaucoup plus commune. Contrairement à l'espèce précédente, elle affecte au moins aussi souvent les membres et le corps que la figure. Elle a un cachet tout particulier, en ce sens d'abord que la forme tuberculeuse est beaucoup mieux prononcée; que lorsqu'elle a atteint

cuir chevelu. La maladie se montre aux mêmes lieux d'élection que le *lupus tuberculeux*, mais elle affecte plus souvent que lui d'autres parties du corps et même de la figure, le siége presque exclusif du premier étant au nez. Le lupus ulcéreux ne naît pas le plus souvent, comme le disent les auteurs, par des petits tubercules qui s'ulcèrent bientôt, mais par une rougeur et un engorgement de la peau, qui passent assez rapidement à l'état de suppuration et d'ulcération. Le pus fourni par ces ulcères est très concrescible; il se transforme rapidement en une croûte d'un gris jaunâtre, sale, qui tombe de temps en temps et à des distances assez éloignées pour être remplacées aussitôt par d'autres. Sous ces croûtes, les ulcérations rongent et détruisent peu à peu les parties, soit en profondeur (lupus ulcéreux térébrant), soit en surface (lupus ulcéreux serpigineux).

Le *lupus ulcéreux térébrant* affecte surtout le nez et le voisinage des ouvertures naturelles de la figure. Quand il siége au nez, qu'il attaque de son extrémité à sa base, il est très fréquemment précédé, et de fort longue date, par des croûtes de muco-pus concret qui se produisent dans l'une ou dans l'autre narine, et souvent dans toutes les deux à la fois. Ce lupus détruit plus vite les parties et fait des progrès plus rapides que le lupus tuberculeux. Il naît aussi à un âge plus tendre, et il n'est pas rare de le voir se montrer vers dix à onze ans, et quelquefois même plus tôt. D'ailleurs, contrairement à ce qui se passe pour le lupus tuberculeux, c'est moins l'engorgement et l'épaississement de la peau qui frappe tout d'abord les yeux, que la saillie de la croûte qui marque l'ulcération qu'elle recouvre. Nous avons reproduit dans nos planches deux lupus du nez, tous les deux térébrants, l'un tuberculeux, l'autre ulcéreux, et le contraste entre ces deux maladies est très frappant, quoique de date aussi ancienne. Ce lupus se modifie, comme le précédent, avec l'âge, mais il est rare qu'il arrive à une guérison spontanée. Presque toujours les progrès incessants du mal, le jeune âge auquel il s'est développé, l'aspect hideux que donne à la figure une pareille maladie, engagent les parents à invoquer de bonne heure les secours de l'art; mais on guérit plus difficilement cette affection, qui ne se termine jamais sans laisser une perte de substance plus ou moins grande.

Le *lupus ulcéreux serpigineux* (*lupus exedens*) est une maladie bien autrement fâcheuse; si elle ne détruit pas en profondeur, elle modifie en surface. Elle se développe, comme la précédente, par un état inflammatoire de la peau avec pustules ou tubercules pustuleux qui s'ulcèrent très rapidement, et gagnent plus rapidement encore une étendue plus ou moins considérable de la figure, envahissant ainsi peu à peu et avec les années, lorsque l'affection n'a pas été arrêtée, soit la moitié de la figure, soit même la totalité, y compris les oreilles, le front, le menton et une partie du cou; or, comme dans le lupus tuberculeux qui agit en surface, la maladie développée sur un point s'élargit bientôt, en même temps que son centre se cicatrise. Alors deux phénomènes ont lieu sur lesquels nous appelons l'attention. La partie centrale représente une peau qui a été atteinte par une brûlure au deuxième ou au troisième degré, mais au lieu d'être déprimée, enfoncée, tendue, comme s'il y avait eu perte de substance, dans ce lupus dit *exedens* la peau est boursouflée, plus volumineuse qu'avant d'avoir été atteinte; elle est en même temps empâtée, moitié molle, moitié engorgée, de sorte qu'à la guérison il reste un accroissement de volume très notable au lieu d'une atrophie comme dans le lupus tuberculeux. La circonférence de cette partie guérie est bordée par une ulcération circulaire d'inégale dimension, se recouvrant de croûtes jaunâtres, grisâtres ou sanieuses, et marchant toujours en envahissant peu à peu la peau saine. Les ouvertures naturelles reçoivent de ces ulcères des modifications très graves : ici les lèvres de la bouche sont en partie détruites; là elles ont échappé à la destruction et elles sont devenues épaisses et boursouflées; les paupières ont été peu à peu et progressivement détruites inférieurement; l'œil a été à découvert, et le contact de l'air a enflammé d'une manière chronique la conjonctive oculaire, qui reste dans un état permanent de rougeur. Mais plus tard un état aigu des conjonctives s'est montré; il en est résulté bientôt une sorte d'ophthalmie purulente; la cornée est devenue opaque, la conjonctive et la cornée se sont encore ulcérées dans quelques points, et la vision en a été altérée à un tel degré que l'œil ne perçoit plus la lumière que dans certaines directions, ou ne la perçoit plus du tout. Les paupières ont été rongées inégale-

ment; des points se sont cicatrisés, d'autres ont été détruits; des brides se sont formées; des adhérences ont eu lieu entre certains points des paupières et de l'œil; plus tard encore, les deux yeux ont été envahis par des ophthalmies successives; la vue s'est entièrement perdue.

J'ai eu sous les yeux, il y a quelques années, l'exemple le plus épouvantable des suites d'un lupus de ce genre chez une dame du Midi, qui était arrivée à l'âge de cinquante-huit ans avec cette affreuse maladie, qui remontait à son enfance, et dont personne n'avait pu la guérir. Elle s'était livrée aux soins d'Alibert, de Biett et de tous les grands chirurgiens de cette époque. Elle était à Paris depuis deux ans entre les mains de nos collègues de l'hôpital Saint-Louis. Elle avait d'ailleurs été victime du charlatanisme, comme toutes les personnes incurables. Appelé en consultation en désespoir de cause, j'ai vu, je l'avouerai, la figure la plus hideuse que l'on puisse concevoir : c'était une physionomie réellement effrayante. Que l'on se représente une femme obligée de se séquestrer dans un couvent; enfermée dans une chambre dont elle n'est pas sortie depuis deux ans; conservant d'ailleurs le ton et les manières de la noblesse à laquelle elle appartenait; cachée constamment par un voile épais pour se dérober à tous les regards; et après avoir raconté toutes les phases de sa cruelle maladie, découvrant une figure semblable à un spectre hideux, dont la peau rougeâtre, boursouflée çà et là, couturée partout depuis la racine des cheveux jusqu'à la poitrine, laisse voir en définitive une figure plate, ratatinée, dont les lèvres sont en parties détruites, le nez n'existant plus, les paupières des deux yeux difformes et désorganisées, les yeux rouge d'écrevisse, à conjonctives injectées, à cornées déformées et opaques, le front et les oreilles participant à cet état; un ensemble, en un mot, qui m'a produit une sorte de sensation de répulsion, je dirais presque de frayeur, moi qui ai tous les jours ces physionomies de lupus sous les yeux. Inutile d'ajouter qu'en présence d'une incurabilité si notoire, je me suis empressé de la faire retourner dans son pays, sous prétexte des mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles elle se trouvait placée à Paris.

Heureusement ce n'est là qu'une exception, un cas extrême; mais

il faut le dire, les désordres de cette forme de lupus sont généralement beaucoup plus grands que dans les deux espèces précédentes. Ainsi il n'est pas rare de voir toute la surface de la poitrine envahie par un lupus serpigineux : j'en ai en ce moment encore un exemple sous les yeux ; de même aussi pour les membres, pour le dos. Il en résulte des déformations, des changements d'aspect repoussants qui infligent au malade une sorte de stigmate de répulsion pour lui-même, et à plus forte raison pour les autres. Encore n'est-ce que demi-mal quand le lupus affecte exceptionnellement des parties ordinairement cachées.

En définitive, on peut dire que cette forme de lupus est beaucoup plus pénible que les autres, car elle laisse toujours une certaine hypertrophie des parties avec cicatrices difformes dans une grande étendue; tandis que le lupus tuberculeux donne lieu à de l'atrophie dans une partie plus limitée, et qu'il entraîne moins de difformité. Ajoutons qu'il est des cas qui semblent tenir le milieu entre ces deux formes très tranchées.

Il est une variété de lupus que l'on a nommée *lupus vorax*, et qui constitue une espèce particulière, fort rare d'ailleurs. Elle ronge et détruit en quinze jours ou trois semaines la partie qu'elle affecte. C'est ordinairement au nez qu'elle se montre, et dans ce laps de temps toute l'étendue du nez est détruite par cette maladie. Mais, je le répète, ce cas est excessivement rare; le cachet de l'affection dont nous venons de tracer l'histoire est, au contraire, la lenteur dans les progrès du mal.

Le lupus peut affecter des formes composées et s'allier à l'herpès et au psoriasis pour donner naissance à un herpès lupiforme et au lupus psoriasiforme. J'ai eu dans mes salles un malade qui portait à la jonction du pouce à la main un herpès lupiforme formant une plaque de 2 centimètres en tous sens, épaisse de 3 à 4 millimètres et recouverte d'une matière semblable à de la craie dense. Je joins ici une observation recueillie par M. le docteur Ripolle, mon ancien interne, et qui présente les caractères d'un psoriasis lupiforme. C'est qu'il n'y a pas d'affection de peau qui ne puisse s'allier à une autre forme morbide.

Lupus psoriasiforme. — Lieusy (Matthieu), soixante-quatre ans, cordonnier, entré le 22 novembre 1848; ni son père ni sa mère n'ont jamais eu de maladie de la peau : ils sont morts de vieillesse. Lui-même, d'un tempérament sanguin, n'a jamais fait de maladie sérieuse; jamais il n'a eu aucune affection syphilitique, si ce n'est une blennorrhagie, il y a une vingtaine d'années, et qui n'a eu qu'un mois de durée. Il a été militaire pendant dix-huit ans; pendant ce temps il a été soumis à de très mauvaises conditions hygiéniques, notamment pendant un voyage qu'il fit, étant prisonnier, des grandes Indes en Angleterre. La traversée dura environ trois mois, et pendant tout ce temps il fut placé à fond de cale ; celle-ci se trouvait très humide, parce que le navire faisait eau; il n'avait d'ailleurs pour nourriture que de très mauvaises salaisons. En arrivant en Angleterre (1807), il s'aperçut pour la première fois d'une éruption qui avait son siége à la face externe des deux jambes. Il survint d'abord un bouton, comme la tête d'une épingle, qui prit du volume et procura une vive démangeaison ; le malade l'arracha en se grattant; bientôt il s'aperçut qu'il survenait sur chaque jambe une plaque rouge saillante, s'étendant chaque jour et couverte de squames. Au bout de dix ans, la plaque avait un diamètre de 8 à 9 centimètres sur la jambe gauche, de 5 à 6 centimètres sur la jambe droite : elles n'ont pas augmenté depuis. En quittant le service (1820), il reprit son état de cordonnier ; il put alors se placer dans des conditions hygiéniques meilleures; il se livrait cependant de temps en temps à quelques excès de boisson. Il y a une quinzaine d'années, il s'établit, et occupa alors une boutique très humide. Cependant, pendant dix à douze ans, il ne survint aucun accident à la peau; seulement quelques douleurs rhumatismales assez vives et persistantes qui le tourmentent encore aujourd'hui. Il y a deux ans, sans cause prochaine appréciable, autre qu'une forte charge qu'il porta sur son dos, il vit survenir au milieu du dos un bouton qui jeta un peu, et procura un peu de démangeaison; le malade se gratta et arracha le bouton : bientôt, comme à la jambe, la maladie fit des progrès, mais ici avec un caractère particulier. Le mal avait débuté au milieu du dos, en suivant une ligne verticale correspondant à la colonne vertébrale ; il s'étendit en courbes à peu près concentriques, limitées par un bourrelet externe inégal, couvert de squames, le centre se guérissant. De cette sorte, le mal a pris une étendue de 2 décimètres et demi environ en hauteur et 1 décimètre environ en largeur. Il y a trois mois, une plaque nouvelle apparut sur le bras gauche, au pli du coude. Cette fois, tout à coup et en peu de temps, le malade a vu survenir une petite couronne de tubercules, recouverts de squames de forme elliptique, allongée transversalement et ne procurant aucune démangeaison. Il a consulté un médecin qui lui a conseillé l'usage d'une pommade dans laquelle il y avait du camphre, et des pilules dont il ignore la composition. Voyant que ce traitement ne procure pas de soulagement, il entre à l'hôpital.

État actuel. — Il présente : 1° Sur la face externe de la jambe gauche une

plaque de 1 décimètre environ de diamètre, faisant peu de saillie au-dessus du niveau de la peau recouverte de squames brisées et brillantes, de peu d'étendue. Si l'on détache quelqu'une de ces squames, on voit au-dessous le derme rouge brun, luisant, d'un aspect nacré. Cette plaque, qui présente d'assez vives démangeaisons, ne diffère en rien d'une plaque ordinaire de psoriasis. 2° Sur le milieu de la face externe de la jambe droite, une plaque de 5 à 6 centimètres environ de diamètre, présentant absolument les mêmes caractères que la précédente. 3° Au pli du coude du bras gauche existe une petite ellipse de tubercules faisant des saillies inégales, recouverts çà et là de quelques squames, d'une coloration d'un rouge brun violacé. L'espace embrassé dans cette ellipse est parfaitement sain. Il n'y a ici aucune démangeaison ; ici on ne retrouve du psoriasis que les squames ; les tubercules, leur couleur, leur disposition, sont suffisants pour caractériser un lupus lenticulaire. 4° Dans le dos, vers la fin de la région dorsale et dans la région lombaire, on voit une plaque de tubercules d'une étendue de 2 décimètres et demi environ en hauteur et de 1 en largeur. Cette plaque, qui est dirigée verticalement suivant son plus grand diamètre, est semée de tubercules recouverts de squames. La circonférence est limitée par des courbes irrégulières, hérissées de tubercules recouverts de squames formant bourrelet extérieur comme au bras ; mais ici le centre n'est pas sain, et l'on voit çà et là des tubercules disséminés présentant les caractères communs déjà énoncés ; çà et là on voit de petites plaques blanches qui sont les cicatrices de tubercules guéris. Il n'y a ici non plus aucune démangeaison, à moins que le malade n'ait subi dans ce lieu une friction assez forte. Du reste, le malade, à part les douleurs rhumatismales, est bien portant, toutes ses fonctions s'accomplissent normalement.

Au niveau des coudes, la peau est farineuse, comme ichthyosée. Rien de semblable ne s'observe aux genoux.

Il est important de s'arrêter sur le diagnostic du lupus, non pas tant en raison des variétés que nous avons décrites et que nous croyons avoir spécifiées, qu'à cause des maladies qui peuvent avoir quelque analogie avec lui. Tout lupus a pour cachet essentiel, qu'il soit sans ulcération ou avec ulcération, l'induration, l'épaississement de la peau avec rougeur sombre obscure, et sans que le tissu paraisse bien modifié dans son organisation. En cas d'ulcération, c'est en dehors et au delà que se trouve ce tissu hypertrophié ; les ulcérations ne sont jamais apparentes, à moins qu'on n'ait fait tomber les croûtes ; elles en sont presque toujours recouvertes. La croûte elle-même est plus ou moins saillante, bombée, jaunâtre

u grisâtre. Enfin le siége du lupus, quelle qu'en soit la forme, st à la figure principalement. Il suit de là que c'est surtout en re-ard des maladies de la face qu'il faut placer cette maladie dans étude de son diagnostic. Quand la forme tuberculeuse est dessinée, n ne peut la comparer qu'à des tubercules syphilitiques; mais ans le lupus tuberculeux il n'y a ordinairement qu'un seul point e la figure qui soit atteint, tandis que dans la syphilide tuberqu-use les tubercules sont disséminés çà et là au voisinage et à 'angle des ouvertures naturelles. Ils sont généralement espacés les ns des autres, ou s'ils sont disposés par groupes, chaque tuber-cule y est parfaitement distinct; c'est le contraire pour le lupus, où l y a confluence et confusion des tubercules, puisque nous avons lit que Bateman avait à tort rangé cette maladie au nombre des tubercules, et que le plus souvent la forme même des engorgements n'en donnait qu'une idée imparfaite; ajoutons que la couleur des tubercules est toujours sombre, cuivrée, ce qui n'existe pas dans le lupus, et que, dans ce dernier cas enfin, il n'existe pas le plus souvent d'antécédents syphilitiques. Au surplus, la forme du lupus tuberculeux en surface est serpigineuse.

On peut confondre le lupus *ulcéreux exedens*, en raison des croûtes qui le recouvrent, avec le rupia. C'est même la seule maladie qui puisse faire poser un point d'interrogation à ce sujet. Mais d'abord le rupia affecte très rarement la face. En second lieu, il se rencontre très rarement à l'âge auquel se développe le lupus, c'est-à-dire de quinze à vingt-cinq ans. Il est au contraire propre au vieillard et à l'âge adulte, époque de la vie où ne se développent guère de lupus ; les croûtes du rupia ont une teinte gris sale toute particulière que l'on ne rencontre pas dans le lupus ; elles ne reposent pas sur un engorgement de la peau ; elles n'affectent guère l'extrémité du nez, l'angle des yeux, le lobule des oreilles, comme cette maladie.

En dehors de cette affection, je n'en vois pas d'autres qui soient comparables au lupus. Ce n'est ni l'acné, ni l'impétigo, ni le sycosis du menton. Quant au *noli me tangere* et à l'*impetigo rodens* ulcéreux du nez, il y a entre ces maladies et le lupus une différence extrême ; ces deux affections amènent, tout en progressant, l'atro-

phie et l'amincissement des tissus, qu'ils soient ou non avec ulcération ; c'est le contraire dans les lupus.

Mais le lupus serpigineux *exedens* peut, lorsqu'il siége sur le corps, être assimilé à une syphilide ulcéreuse ; il peut lui-même être syphilitique : là est véritablement la difficulté de diagnostic ; ce n'est que la grande habitude de voir ces diverses maladies qui puisse fournir les moyens de les distinguer.

Le pronostic d'un lupus est toujours fâcheux, non pas au point de vue de la santé générale, mais sous le rapport des conséquences et des résultats de la maladie. D'abord, elle entraîne un traitement long, une médication générale de plusieurs mois et quelquefois de plusieurs années ; dans l'hypothèse du traitement le plus favorable, elle laisse des déformations ou destructions de parties que l'on ne peut réparer qu'en les remplaçant artificiellement ; elle transforme la peau en un tissu nouveau de l'aspect le plus désagréable. Mais elle ne compromet pas la vie, car les personnes qui sont atteintes de lupus parcourent une carrière moyenne aussi longue que les autres hommes, à moins que cette maladie ne devienne la source d'un chagrin violent qui mine peu à peu la vie. Toutefois, par un bienfait de la nature, les individus qui en sont atteints sont généralement apathiques, insouciants d'eux-mêmes, et tiennent peu de compte de leur infirmité. Je dois cependant dire que j'ai vu naître deux cancers suivis rapidement de la mort sur des lupus *exedens* guéris depuis longtemps. Ce n'est là que l'exception ; ces deux personnes avaient dépassé l'âge de cinquante ans.

Traitement. — J'aborde maintenant la partie thérapeutique de cette maladie.

Pour arriver à connaître la médication qui est le plus généralement applicable à une maladie, il faut un ensemble de circonstances favorables et un emploi méthodique surtout des moyens dont on se sert. Ce qui importe, pour conduire à un résultat un peu probant, c'est, d'une part, que la maladie à formes plus ou moins analogues naisse à peu près dans les mêmes conditions et chez des sujets organisés de la même manière. Sous ces divers rapports, il est peu de maladies qui, plus que le *lupus*, se présentent aux médecins avec cet ensemble de circonstances ; il faut, en outre, soumettre

exclusivement les malades à la même médication, d'une part en administrant les agents médicamenteux à l'intérieur, à l'exclusion de toute application externe, et *vice versâ;* puis réunir plus tard les deux ordres de moyens. C'est dans de semblables conditions que je me suis placé depuis bon nombre d'années pour apprécier la valeur de chaque médication, et c'est ainsi que je suis arrivé à pouvoir fournir, je crois, quelques données utiles sur le sujet qui nous occupe.

De même qu'à une époque déjà assez éloignée, le soufre a été considéré comme l'antidote, la panacée des dartres et des affections de nature scrofuleuse; de même, et à une époque plus rapprochée, l'iode a été préconisé pour détruire les maladies scrofuleuses, sous quelque forme qu'elles se présentent. On sait quelle valeur l'un de nos anciens collègues de l'hôpital Saiut-Louis, Lugol, a attachée aux préparations iodées. Administrées d'abord à l'état d'iode libre, c'est-à-dire en solution dans l'eau à l'aide d'un peu de sel marin, ou en teinture, on n'a pas tardé à s'apercevoir que dans cet état l'iode portait souvent une influence fâcheuse sur l'estomac. Il faisait perdre l'appétit, amenait un état pâteux de la bouche, de la soif et des douleurs gastriques ou gastralgiques plus ou moins marquées. C'est alors que, par les progrès de la chimie, on a cherché à substituer à l'iode libre des combinaisons d'iode, et l'on a pensé que ces préparations salines, données à l'intérieur, à doses plus fortes, remplissaient à peu près le même objet et procuraient autant d'avantages sans causer les mêmes accidents. On a été beaucoup plus loin, et nous ne craignons pas de dire que l'on a exagéré les doses d'iodure de potassium en les portant au delà de l'action médicamenteuse de ce sel, notamment quand il s'est agi de combattre des accidents syphilitiques; alors se sont renouvelés les phénomènes qui s'étaient montrés lors de l'administration de l'iode à l'état libre, c'est-à-dire les irritations gastriques et des douleurs gastralgiques assez intenses pour inspirer aux malades l'*horreur* de l'iodure de potassium : et en employant cette expression, je n'exagère pas.

Les préparations iodées à l'intérieur ne guérissent pas les *lupus* lorsqu'elles sont administrées seules. Elles améliorent la constitu-

tion en général, tant qu'elles sont données de manière à ne pas fatiguer l'estomac. Elles doivent augmenter l'appétit, fortifier les organes, et aussitôt qu'elles amènent quelque trouble dans la digestion, c'est qu'elles sont données à doses trop élevées, ou que l'espèce employée, iode, iodure de potassium, ou même la forme en solution aqueuse, alcoolique, sirupeuse ou autre, ne convient pas à la sensibilité de la membrane muqueuse gastrique ou intestinale.

Les préparations iodées employées à l'extérieur ne guérissent pas les *lupus;* elles en modifient quelquefois la surface sécrétante et en arrêtent les progrès. Ici, par préparations iodées d'une application externe, j'entends, d'une part en première ligne, les solutions d'iode rubéfiant et d'iode caustique de Lugol, ou des solutions un peu moins fortes : ce sont elles que je regarde comme les plus efficaces. Je place en seconde ligne les pommades ayant pour éléments l'iodure de potassium et l'iode libre, et en troisième ligne celles dans lesquelles entre l'iodure de potassium seul. Mais à ces pommades il faut ajouter celles qui ont pour base l'iodure de plomb et les iodures de mercure. Ces dernières sont beaucoup plus actives ; elles modifient les surfaces, en changent le mode morbide, et deviennent par cela même quelquefois très irritantes.

Il est rare que l'on puisse employer longtemps les pommades qui ont pour base les iodures de mercure.

On obtient des résultats plus avantageux en combinant les préparations d'iode à l'intérieur avec les mêmes préparations à l'extérieur ; mais, en résumé, j'ai acquis la conviction qu'il est des moyens beaucoup plus efficaces, et qu'avec les préparations d'iode on arrivera rarement à la guérison d'un lupus un peu avancé.

Voici cependant comment le traitement par les préparations iodées doit être mis en pratique. Le lupus ne se développe guère avant l'âge de quinze à dix-huit ans. Les doses que je vais indiquer seront donc en rapport avec cet âge.

1° On prescrit le matin et le soir, dans une tasse de tisane amère, soit la teinture, soit le sirop, soit la solution aqueuse d'iode, de manière à commencer par un seizième de grain, ou 4 milligrammes, et l'on en porte successivement la dose à un quart ou 12 milligrammes ; au delà on court le risque d'exciter l'estomac.

Pour l'iodure de potassium, on débute par 15 à 20 centigrammes, et l'on élève la dose jusqu'à 1 gramme par jour. On administre en même temps soit des bains iodés, soit des bains sulfureux. Quant au lupus lui-même, on emploie une pommade iodée, légère au début, dont on fait enduire matin et soir la partie malade, et l'on arrive successivement à des pommades plus fortes; en même temps on promène tous les quatre ou cinq jours un pinceau imbibé d'iode rubéfiant sur la partie malade, et l'on n'applique pas de pommade ce jour-là. Plus tard, on arrive à l'iode caustique. On joint à cette médication, qui peut d'ailleurs varier en raison de l'âge du sujet et du temps depuis lequel la maladie est en traitement, un régime alimentaire substantiel, de l'exercice et une habitation saine dans un lieu élevé et exposé au midi.

Après la médication iodée se présente celle qui a pour base les ferrugineux. Celle-ci est tout interne; elle exige une médication qui est variable, mais toujours résolutive. Voici comment je la prescrit : Le matin et le soir, dans une tisane amère ou astringente, une cuillerée à bouche du sirop suivant, selon la formule que j'en ai donnée :

Limaille de fer	40 centigrammes.
Iode.	1 gramme 70 centigr.
Eau.	8 grammes.

Combinez à froid en triturant le fer et l'iode dans un mortier et en ajoutant l'eau goutte à goutte; si la limaille de fer n'est pas oxydée, la combinaison est immédiate. Mêlez alors à

Sirop de sucre.	500 grammes.

On obtient un sirop à peine coloré ayant une petite odeur d'iode qui se trouve à l'état libre.

Ce sirop favorise singulièrement le retour de la menstruation ou il l'entretient, et à ce point de vue il me paraît préférable à tout autre; néanmoins on peut administrer tout autre sirop, qui contiendrait soit du lactate, soit du sulfate de fer à la dose de 2 grammes par 500 grammes de sirop.

Je donne en même temps de trois à six pilules ferrugineuses par jour, et enfin de l'eau ferrée aux repas au lieu d'eau ordinaire.

Je fais prendre tous les deux jours un bain salé à raison de 2 kilogrammes de sel gris par bain, et à l'extérieur les applications de pommades astringentes.

C'est en maintenant mes malades à un pareil régime que j'ai vu survenir une amélioration notable dans la constitution et la santé générale; mais peu d'effet au point de vue de la guérison du *lupus*.

Je ne saurais donc regarder les préparations ferrugineuses que comme des modificateurs avantageux du tempérament et de la constitution.

La médication sulfureuse ne donne pas de meilleurs résultats.

C'est après avoir été bien fixé sur ces diverses préparations, employées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que, tout en mettant en usage des moyens internes propres à améliorer l'état général des malades, j'ai cherché à appliquer à l'extérieur des agents plus ou moins actifs et propres à modifier la surface morbide. Je me suis d'abord adressé aux caustiques plus énergiques que les préparations iodées, ou les pommades qui ont pour base les iodures de mercure ou même l'oxyde rouge de mercure. Je me suis adressé au caustique de Canquoin (chlorure de zinc associé à la farine); je l'ai choisi parce qu'il offre l'avantage de former une eschare sèche et de laisser une cicatrice très nette après la chute de l'eschare. Je déclare qu'en thèse générale, ce caustique m'a rendu de grands services lorsque j'ai agi sur des *lupus tuberculeux*, soit sans ulcérations, soit avec ulcérations; j'ai guéri de cette manière plusieurs malades pour lesquels les médications internes avaient été sans succès, mais dont la constitution avait été pourtant améliorée. Le *lupus tuberculeux herpétiforme* rentre, sous le rapport de l'emploi de ce moyen, dans les conditions favorables que j'ai signalées pour le lupus tuberculeux; mais le caustique de Canquoin, ou tout autre, n'est pas aussi avantageux quand il s'agit d'un *lupus herpétiforme exedens*, soit que les ulcérations soit légères, peu étendues, soit même qu'il n'y ait que des ulcérations accidentelles sur les bourrelets. Il suffit que le bourrelet donne de temps en temps des petites vésicules ou pustules suppurantes, pour que le caustique de Canquoin ne produise pas des effets aussi avantageux; il y a plus, il est quelquefois nuisible, en ce sens qu'autour de l'eschare il se fait une sécrétion purulente

qui amène la chute prématurée de celle-ci, et alors une ulcération existe sous l'eschare au lieu d'une cicatrice. Quelquefois même cette ulcération est assez longue à guérir. Ainsi avantages à retirer de l'emploi de ce caustique pour certaines formes de lupus, inconvénients qui tendent à en faire rejeter l'emploi dans d'autres.

Voici d'ailleurs comment on procède. On prend un chlorure de zinc solide, on l'expose à l'air dans un flacon débouché pendant plusieurs jours, suivant l'humidité de l'atmosphère; mais dans tous les cas jusqu'à ce qu'il tombe en *deliquium*, c'est-à-dire qu'il se liquéfie. Si on le mêlait à de l'eau, on n'obtiendrait pas un caustique aussi puissant. Alors on y ajoute de la farine de blé que l'on mêle exactement au liquide pour en faire une pâte épaisse, mais assez molle pour être étendue en couche très mince sur la partie malade. Si la pâte est bien faite, elle doit prendre, aussitôt son application, un aspect liquide, mouillé, quoique en l'employant elle n'ait pas cet aspect. Il faut qu'elle adhère à toute la surface malade, et, pour obtenir ce résultat, il est convenable de faire appliquer un cataplasme la veille du jour où elle doit être mise sur les parties ulcérées qui sont recouvertes de croûtes. On laisse la pâte à nu sans la couvrir; au bout de peu de temps elle agit comme caustique en même temps qu'elle se dessèche, s'affermit et durcit.

Il en résulte pour la partie malade une inflammation plus ou moins vive avec tuméfaction des parties voisines, gonflement, notable et quelquefois même porté assez loin pour effrayer un peu le malade; mais dans l'espace de deux à trois heures toute douleur a disparu, le gonflement seul persiste et ne se dissipe que dans les vingt-quatre heures. Le malade doit éviter tout attouchement, tout contact; l'eschare doit être abandonnée à elle-même jusqu'à sa chute, qui a lieu du douzième au dix-huitième jour. Pas de cataplasme, pas de lotions pour la provoquer; aucun topique, en un mot, ne doit être mis en usage. La croûte tombant, reste une cicatrice peu apparente.

Si, contrairement à ce qui a lieu habituellement, il se forme de la suppuration autour de la croûte, celle-ci tombe plus tôt; il reste une plaie qui se cicatrise facilement et dont on hâte la cicatrisation à l'aide du cérat créosoté (voy. *Formulaire*).

Dans tous les cas, il ne se produit jamais assez de pus sous la croûte pour que celle-ci forme poche ou développe à la matière purulente: toujours la suppuration est à la circonférence, soulève les bords de l'escharе et s'écoule facilement.

Certes on peut remplacer le caustique de Canquoin par celui de Vienne; mais je préfère ces deux caustiques à ceux dans lesquels il entre de l'arsenic, comme le caustique de frère Côme, ou la poudre de Dupuytren. (Voy. *Formulaire*, CAUSTIQUES.)

Je les préfère au nitrate d'argent, qui n'agit pas assez profondément, à moins qu'on ne l'applique à l'état pulvérulent; à la potasse, qui donne toujours des eschares liquides ou molles; au beurre d'antimoine, qui est dans le même cas, et au nitrate acide de mercure.

J'arrive maintenant à un moyen que j'ai expérimenté en grand et dans les mêmes circonstances : je veux parler de l'huile de cade.

Ce moyen a ses limites comme tous les autres. Il est cependant utile dans le lupus, et je vais faire connaître comment je l'ai employé et quels effets j'en ai obtenus.

Tous les deux jours, et même tous les jours, je promenais à la surface des parties malades, et ce dans toutes les formes de lupus, un pinceau imbibé d'huile de cade, et je faisais ensuite essuyer les surfaces touchées avec un pinceau sec de charpie, de manière qu'il reste le moins possible d'huile. C'était le meilleur mode à suivre, car j'avais depuis longtemps observé que si l'on applique une couche épaisse ou plus ou moins abondante d'huile sur une surface malade, on l'irrite au lieu d'obtenir le bénéfice d'une résolution.

Ce moyen, employé pendant trois mois consécutifs sur vingt-six malades des deux sexes et de divers âges, n'a pas amené de guérison; mais, en thèse générale, il a notablement amélioré le mal, soit qu'il s'agisse de lupus non ulcéreux, soit qu'il s'agisse de lupus ulcéreux. Il est cependant, à cet égard, des différences à établir. L'huile de cade nous a paru avoir plus d'action lorsqu'elle est appliquée sur des surfaces non ulcérées que sur des surfaces ulcérées. C'est un bon modificateur des formes herpétiques de lupus; aussi, dans le résumé thérapeutique qui va suivre, je n'hésiterai pas à en conseiller l'emploi comme adjuvant sur lequel on peut compter.

Enfin il est un moyen dont je ne parle qu'en dernier, parce que,

d'une part, c'est le dernier que j'aie expérimenté, et que, d'une autre part, c'est le plus efficace de tous. Il s'agit de l'*huile de foie de morue*. On sait que cette huile a été préconisée en Allemagne contre la scrofule. Les liaisons qui existent entre les *lupus* et la constitution lymphatique me faisaient une obligation de mettre ce moyen en usage ; j'ai suivi pour lui la marche que j'avais adoptée pour les autres moyens administrés à l'intérieur, c'est-à-dire que je l'ai employé seul, indépendamment de tout moyen externe, sauf des bains généraux.

Aujourd'hui je n'hésite pas à déclarer que c'est de tous le plus efficace ; je vais plus loin, et j'avance qu'administré seul, il guérit. Cette assertion est tellement vraie, qu'à partir du moment où ce moyen a été mis en usage pour quelques-uns de nos malades, les autres m'ont successivement prié de le leur faire prendre. Mais il existe dans le commerce deux sortes d'huiles de foie de morue, l'huile blanche et l'huile brune. On attribue généralement moins d'efficacité à l'huile blanche qu'à l'huile brune ; et en effet, la première a moins d'odeur de poisson en même temps qu'elle est moins colorée. C'est l'huile brune que j'ai toujours employée.

On la prescrit par cuillerée à café et par cuillerée à bouche jusqu'à six à dix cuillerées, maximum par jour en général. J'ai été, ainsi qu'Emery, beaucoup plus loin : chez les enfants, j'en ai fait prendre jusqu'à douze et seize cuillerées par jour. On sera tout d'abord effrayé de la quantité d'huile que les malades doivent prendre pour arriver à une guérison, quand d'une part on songera à l'odeur repoussante de ce médicament, et lorsque j'ajouterai que pour une cure complète il faut quelquefois faire usage du remède durant trois à six mois et quelquefois plus : tout dépend de la date du *lupus*. Mais si l'on réfléchit que c'est le seul moyen qui ait guéri sans le secours d'aucun autre ; que pendant dix ans j'ai suivi pas à pas les effets des diverses médications préconisées pour combattre cette maladie, et qu'aujourd'hui j'emploie l'huile de foie de morue d'une manière générale de préférence à tout autre moyen, le médecin insistera sur son usage, et saura donner à ses malades tout le courage qu'il leur faut pour avaler le matin et le soir un très grand verre d'huile.

Après avoir étudié durant des années et avec le plus grand soin l'action de chaque médication isolément, nous sommes arrivé à réunir les divers moyens qui nous ont paru avoir une influence spéciale sur l'économie en général, et sur le lupus en particulier. Aujourd'hui notre méthode de traitement *composé* est assez consacrée par l'expérience, pour l'employer dans la généralité des cas.

Nous posons d'abord en principe que le lupus n'est jamais une maladie isolée et indépendante; qu'elle se rallie toujours plus ou moins à la constitution; qu'avant d'agir directement sur le lupus, il faut modifier celle-ci par un traitement général. Ce n'est qu'au moment où la médication générale n'exerce plus d'influence sur le lupus, qu'il faut lui venir en aide par l'emploi d'agents externes appropriés à l'espèce de lupus et au genre d'altération qui a résisté. Cette marche est aujourd'hui invariable pour nous, elle présente le grand avantage de connaître par les progrès du traitement ce qu'il y a lieu d'attendre des modificateurs généraux; elle donne toute sécurité pour la guérison du lupus et contre le retour de la maladie. Ainsi, traitement interne tout d'abord; traitement externe, accessoire et secondaire.

Médication interne.—Elle est basée sur l'influence qu'exercent sur l'économie l'*huile de foie de morue*, le *fer*, l'*iode*, l'*iodure de potassium* et les *amers*, soit en tisane, soit en vin. Cette association est une conséquence logique de l'action isolée de chacune de ces substances. Je prescris donc au malade un mélange : 1° d'huile de foie de morue brune ; 2° de sirop composé dans lequel entre l'iodure de fer, un excès d'iode, l'iódure de potassium (voy. *Formulaire*); 3° de vin de gentiane: le tout battu ensemble, et immédiatement après une tasse de tisane de feuilles de noyer ou de houblon. Je commence par une cuillerée à bouche matin et soir de chacun de ces médicaments; j'augmente seulement la dose d'huile tous les trois jours, de manière à arriver, suivant les circonstances de prédominance de symptômes scrofuleux, à huit à dix cuillerées d'huile au plus. Souvent je m'arrête à six ou huit, moitié le matin, moitié le soir; la dose du sirop et celle du vin restant toujours la même. Je continue à ces doses ces médicaments durant plusieurs mois; dans les deux premiers mois je ne fais aucune application externe,

je me borne à l'usage de bains sulfureux ; une bonne alimentation, de l'exercice, de la gymnastique, s'il est possible, et un travail manuel qui développe la force suivant les positions sociales.

Si durant cet espace de temps l'affection a fait des progrès sensibles vers la guérison, je continue le traitement sans rien employer à l'extérieur. Il arrive alors un moment où l'affection est stationnaire, et où la médication interne ne produit aucune amélioration ; c'est celui que je choisis pour agir à l'extérieur. Si le lupus est tuberculeux, je n'hésite pas à cautériser les tubercules restants et qui ne se résolvent pas, à l'aide du caustique de Canquoin ; ou bien je fais précéder ce caustique de l'application de l'huile de cade tous les jours, ou d'une solution caustique tous les deux jours, ou de l'huile de foie de morue matin et soir. Si le lupus est *exedens*, j'attaque les ulcérations à l'aide d'une suspension d'iodure rouge de mercure dans la gomme adrangante (voy. *Formulaire*), ou au moyen de pansements à l'aide du cérat créosoté, de l'onguent mercuriel simple, etc. C'est en agissant ainsi, d'une manière progressive, que j'obtiens une guérison d'autant plus prompte que la médication interne a eu plus d'action. Je puis assurer qu'à l'aide de cette médication composée interne et externe, j'abrége au moins de moitié le temps autrefois consacré à obtenir les mêmes résultats.

Un fait très important, et sur lequel j'appelle toute l'attention, c'est le développement très commun d'érysipèles chez les individus affectés de lupus. Lorsqu'ils se montrent dans le cours du traitement, c'est la circonstance la plus favorable à la guérison ; ils ont ordinairement peu d'intensité, et se terminent à l'aide d'un émétocathartique ; ils modifient si avantageusement la vitalité des tissus, que si l'on pouvait les faire naître accidentellement, on diminuerait de beaucoup la durée du traitement.

A quels caractères reconnaît-on que s'opère la guérison du lupus ? — A cet égard il faut établir une distinction entre le lupus tuberculeux et le lupus ulcéreux. Dans le lupus tuberculeux on voit peu à peu les indurations diminuer de volume, la peau devenir souple ; les ouvertures naturelles, telles que celles des narines, de la bouche, des yeux, se rétrécir, et dans quelques cas, à un tel point, que l'ou-

verture des narines a complétement disparu. De là la nécessité de les entretenir en y maintenant tous les jours de petits tampons de charpie ou de l'éponge préparée. J'ai plusieurs fois été obligé de prier mes collègues en chirurgie, de l'hôpital Saint-Louis, de remédier par une opération à la gêne qui résulte du rétrécissement de ces ouvertures, et c'est dans le lupus tuberculeux qu'il est plus prononcé. En même temps tous les tissus s'atrophient, se dépriment, tout en reprenant leur consistance première. C'est là un des caractères les plus propres à faire reconnaître qu'une guérison est assurée.

Il n'en est pas de même dans le lupus *exedens*. Après la guérison il peut y avoir une diminution d'ensemble dans la physionomie *empâtée* de l'enfant, mais la peau présente comme toujours un état couturé, plus ou moins épaissi, qui ne se perd que par les progrès de l'âge et dans l'espace de longues années.

En définitive, c'est là une des maladies qui exigent le plus de persévérance de la part du médecin. Médication intelligente, observation de l'hygiène dans tous les actes de la vie, ce sont là les bases essentielles du traitement; c'est la marche qui conduit à des guérisons qu'il est si long et si difficile d'obtenir.

Scrofules de la peau, *scrofulo-syphilides*.

Nous désignons sous cette dénomination, non-seulement les formes scrofuleuses des affections cutanées, mais encore des états morbides de la peau que l'on n'a pas décrits, ou que l'on a confondus jusqu'alors avec la scrofule proprement dite, et qui en doivent être distingués par la cause qui, suivant nous, les a primitivement fait naître. Cette cause, nous la regardons comme étant complexe; elle est à la fois scrofuleuse et syphilitique; c'est une transformation *par hérédité* de la syphilis en la scrofule et à laquelle la syphilis ne reste pas étrangère, de sorte que si elle n'est pas combattue on ne détruit pas la maladie. On sait qu'à cet égard plusieurs praticiens pensent que la syphilis constitutionnelle est l'origine de la scrofule et qu'elle se transforme en cette maladie. Nous ne sommes pas aussi explicite à cet égard, mais nous admettons que des parents qui ont eu des accidents syphilitiques, dont ils n'ont jamais été parfaitement

guéris, au moins quant à la cause première, peuvent transmettre à leurs enfants, d'une part cette cause, ce virus plus ou moins modifié, et si le tempérament de l'enfant le dispose à la scrofule, il en résulte une maladie de forme composée dérivant de la scrofule et de la syphilis, que nous appelons *scrofulo-syphilide*. Alors apparaissent chez ces enfants, non pas la maladie scrofuleuse avec ses formes simples, puis composées, mais d'une évolution régulière, mais bien des accidents qui ont à la fois un cachet de la scrofule et un cachet de la syphilis, sans que ni l'une ni l'autre soient nettement dessinées au point de pouvoir dire : c'est de la scrofule, ou c'est de la syphilis. Je donne à ces diverses formes d'accidents composées le nom de *scrofulo-syphilides de la peau*, et je les signale dans cet ouvrage comme ne rentrant pas complétement dans l'histoire de l'une ou de l'autre de ces affections.

Le peu de mots que nous venons de tracer suffisent pour faire sentir combien il nous sera difficile de dépeindre quelques-unes de ces affections. C'est plutôt par les différences qui peuvent exister entre les phénomènes de l'évolution ordinaire de la scrofule, quant à l'aspect, au siége surtout, aux résultats pathologiques qu'ils amènent, que l'on peut établir les nuances sur lesquelles nous appelons toute l'attention des praticiens. La scrofule se montre dans le bas âge par le développement de ganglions au cou et des abcès; le cou, la figure et le cuir chevelu sont le siége ordinaire de ces formes scrofuleuses auxquelles il faut ajouter les tumeurs blanches, la coxalgie et le mal de Pott. Il existe enfin, comme dernier accident de la scrofule, un état des os qui se manifeste par leur gonflement, leur carie et leur nécrose. Je ne nie pas que ces derniers accidents ne puissent être dépendants d'une manière absolue de la scrofule, mais je crois que bon nombre de cas doivent être rattachés à deux causes : la scrofule et la syphilis.

Or, les scrofules de la peau dont je veux parler dans cet article ont quelque chose de tout à fait anormal à cette marche ; on n'y trouve pas cette succession de phénomènes que je viens de signaler. Si cette affection naît à la tête, elle se montrera au cuir chevelu par des tumeurs beaucoup plus dures que les tumeurs gommeuses ; ces tumeurs seront multiples, indolentes, finiront par s'abcéder ou don-

ner naissance à des abcès fistuleux au fond desquels on sent un os nécrosé. C'est ainsi que j'ai vu une jeune fille de dix-huit ans, vierge de tout rapport avec des hommes, et qui portait sur le cuir chevelu quatre tumeurs de ce genre depuis plusieurs années. Elle n'avait pas les apparences très franches du tempérament lymphatique, mais elle avait été réglée fort tard; elle était indolente, inactive, avait eu quelques légers ganglions engorgés au cou. Ces tumeurs s'abcédèrent dans plusieurs points, et dans des opérations successives on enleva des portions nécrosées de la table interne des os du crâne. Cette malade était entrée dans divers services chirurgicaux où elle avait subi plusieurs extractions d'os, dont l'une d'elles avait mis à nu les membranes du cerveau; nous lui fîmes subir un traitement mixte. M. Nélaton dut lui enlever encore des portions d'os nécrosées; mais nous ne pûmes pas la guérir complétement.

Nous avons eu dans nos salles un jeune garçon de dix-sept ans, qui a une maladie analogue à la figure. Il a toute la physionomie d'un scrofuleux, et cependant il n'a jamais eu d'abcès au cou; mais son nez est devenu malade sans être atteint d'un lupus. Il s'y est formé une ulcération qui a marché lentement, mais qui a peu à peu détruit toutes les parties molles du nez, peau, membrane muqueuse et cartilages. Plusieurs ophthalmies scrofuleuses se sont déclarées, à la suite desquelles il existe une opacité complète de la cornée de l'œil droit.

Nous avons donné des soins à un enfant de quatorze ans, qui portait à quelques centimètres au-dessous de l'aine gauche et en dedans de la cuisse plusieurs tumeurs du volume d'une noisette à une noix, tumeurs qui ne se sont jamais abcédées, qui avaient pris une marche sans cesse croissante, et qui se sont terminées par résolution en laissant un tissu plus ou moins analogue à une cicatrice; mais ces tumeurs n'ont cédé qu'au traitement mixte dont nous parlerons plus loin, c'est-à-dire ayant pour éléments les antiscrofuleux et les antisyphilitiques. Cet enfant était lymphatique, mais il n'avait pas eu de ganglions engorgés au cou; et les tumeurs, quoique se présentant sous la forme d'engorgements ou espèces de gros tubercules indolents, n'étaient nullement des lupus: il y avait là un

aspect tout à fait anormal qui ne dessinait pas une affection purement scrofuleuse.

J'ai soigné un garçon de dix-neuf ans qui affirme n'avoir jamais eu de maladie vénérienne, et qui depuis un an a le nez plus volumineux que de coutume, avec tissu semi-engorgé, sans rougeur luisante comme dans le lupus ; le nez a conservé sa forme, mais le tissu libre qui limite les deux narines s'est excorié, puis ulcéré, puis frangé et découpé. Un traitement mixte de trois mois l'avait guéri ; il voulut le discontinuer et sortir de l'hôpital, il a été obligé d'y rentrer pour compléter sa guérison.

J'ai vu bon nombre de cas analogues chez des enfants jusqu'à l'âge de quatorze, seize ou dix-huit ans, plus fréquemment à la figure et au cuir chevelu, assez souvent sur la longueur des membres et à leur partie interne principalement, et j'ai toujours considéré ces divers états comme n'étant autres qu'une transformation du virus syphilitique des parents en syphilide scrofuleuse ou en scrofule syphilitique. Ce sont des faits qui méritent d'être étudiés, dont les auteurs n'ont pas encore tenu compte et qu'il est impossible de bien décrire encore peut-être.

Mais ce ne sont pas seulement des phénomènes spéciaux qui caractérisent cette forme particulière de scrofule de la peau, toutes les maladies sécrétantes peuvent être de nature scrofuleuse. J'ai fait faire le dessin de l'affection rare d'un jeune homme de quinze à dix-sept ans, qui était atteint d'un rupia circiné herpétiforme qui occupait le pied, la jambe, le genou et la cuisse gauche. J'ai décrit cette maladie dont j'ai vu d'autres exemples, sans qu'il y ait eu lieu de les rattacher à la même cause, sous le nom de *rupia herpétiforme*, *herpès rupiforme* (voy. Rupia) ; mais j'ai regardé ce cas particulier comme une affection syphilitique héréditaire, parce que les écailles de rupia étaient toutes proéminentes comme dans le rupia syphilitique ; qu'il en avait tous les caractères, et qu'un traitement pareil dans cette direction a opéré la guérison complète, sans que nous ayons été obligé de rien appliquer à l'extérieur.

Il existait de plus un gonflement du tibia avec douleurs nocturnes, qui ne pouvait être que scrofuleux, s'il n'était pas syphilitique ; et il n'était pas scrofuleux, car la constitution et le tempérament de

l'enfant étaient essentiellement nerveux. C'était donc là un principe syphilitique héréditaire qui s'était dessiné sous une autre forme, celle du rupia, à cause de la misère de l'enfant, et qui ne s'était pas montré à l'état de scrofule syphilitique, parce que le tempérament ne prêtait pas à cette forme morbide. Cet enfant était né de père et de mère inconnus ; il avait été élevé aux Enfants-Trouvés. On conçoit dès lors, par cet exemple, que si un enfant hérite de la syphilis de ses parents, et que cet enfant ait une prédominance lymphatique dans sa constitution, la syphilide puisse se déclarer à un âge donné sous la forme de scrofules cutanées qui diffèrent de l'affection scrofuleuse elle-même.

L'*eczéma*, l'*eczéma impétigineux* et l'*impétigo* peuvent constituer à bon droit des scrofules de la peau. Ainsi les deux premières maladies ont leur siége aux oreilles et au cuir chevelu dans la généralité des cas de ce genre : or ce n'est en général qu'à un âge avancé que l'eczéma siége sur ces parties. Ils entraînent un épaississement et un empâtement considérable de la peau ; ils donnent lieu à une sécrétion abondante ; la durée de ces maladies est fort longue, et elles ne peuvent être guéries qu'en modifiant complétement le tempérament et la constitution. Quant à l'impétigo scrofuleux, c'est surtout à la figure, au cou et sur le devant de la poitrine qu'il se montre.

Ces dernières formes morbides ne sont pour ainsi dire que des maladies de peau ordinaires, se reliant plus directement au tempérament de l'enfant. Il n'en est pas de même des précédentes, sur lesquelles j'avais appelé l'attention dans la première édition de cet ouvrage ; elles réclament un traitement tout spécial. Je vais aujourd'hui chercher à retracer leurs caractères généraux. Depuis la première édition de cet ouvrage, j'ai fait recueillir les observations de plusieurs de ces malades, que j'ai même fait photographier. Je donnerai ci-après ces observations, qui peindront peut-être mieux que je ne le pourrais faire ces formes de maladies. Le siége de ces accidents est souvent à la figure, mais il peut se rencontrer au cou, à la poitrine, sur le dos, sur les membres ; à la figure, elles affectent souvent le nez. Bon nombre de ces maladies ont été décrites sous le nom de *lupus* ; mais elles s'en distinguent : 1° en ce que le

pus tuberculeux amène toujours une hypertrophie du bout du z ou du nez tout entier; or dans la scrofulo-syphilide l'hypertro-ie est beaucoup moins prononcée. Dans le lupus la peau est lisse, olacée, unie. Dans la maladie qui nous occupe, elle est le plus uvent légèrement ou quelquefois très rugueuse. Dans le lupus, le out du nez est surtout et d'abord affecté; dans la scrofulo-syphi-le, ce sont surtout les ailes, et sur les deux il y en a souvent une e respectée. Dans le lupus, il n'y a pas d'ulcération apparente; ns la maladie que nous signalons, les bords des ailes du nez ou e la partie hypertrophiée sont découpés dans une certaine étendue a côté des narines, la membrane muqueuse n'est pas généraleent épaissie et malade, comme dans le lupus. Si l'on met à nu alcération grisâtre que l'on observe, à l'aide de cataplasmes et e lotions, on voit que la surface est parsemée de petites saillies ui lui donnent un aspect fraisé, et que les bords de l'ulcère sont illés plus ou moins à pic.

La maladie existe-t-elle à la figure, on aura une série de gros tbercules reposant sur un épaississement de la peau, avec ou sans lcération, de manière à rapprocher cela d'un lupus; ces phénoènes existeront au voisinage du nez, du menton, des sourcils, ou ur le côté des joues.

Je viens de guérir un enfant de huit ans qui portait ainsi des ypertrophies de tissu énormes sur l'un des sourcils, sur l'angle auche de la mâchoire, sur le moignon de l'épaule gauche, à la artie interne et supérieure de la cuisse droite. Ce n'étaient pas de mples lupus, car cet enfant étant né dans les colonies, on l'avait nsidéré comme atteint de la lèpre. Plusieurs médecins dermalogistes l'avaient traité en vain par l'huile de foie de morue, iodure de potassium et d'autres médicaments employés isolément; a médication mixte en a fait justice. M. le docteur Depaul-Ader l'avait présenté cette jeune malade, sa cliente. Comme les parents aient des colonies, on avait pris cette affection pour la lèpre.

Quand la maladie paraît au cou ou à la poitrine, elle peut y lecter la forme de plaques de rupia, qui sont, comme tous les ccidents syphilitiques, disposées en lignes courbes; mais la croûte n est sèche, et si on la fait tomber, au lieu d'une ulcération ou

simple ou creuse, comme dans la syphilide, on a de nombreuses petites ulcérations reposant sur un tissu bombé, saillant, dur, empâté, comme dans la scrofule. Il n'est pas rare de voir le bout d'un sein atteint dans ce cas. En un mot, il y a là quelque chose de mixte qui dérive de la scrofule et de la syphilis, et dont la lecture des observations suivantes donnera une meilleure idée que toutes nos descriptions.

Lupus syphilitique du nez. Photographié. — Bateman (Marie), trente-cinq ans, couturière, rue Godot-de-Mauroy, 39, premier arrondissement, née à Dunkerque (Nord); mariée à Petit (Adolphe). — Tempérament sanguin lymphatique. Bonne santé habituelle; n'a eu ni gourmes, ni ganglions engorgés dans sa jeunesse. Les parents, les frères et les sœurs se portent bien. La malade est bien réglée.—Mariée à vingt-trois ans, elle s'aperçut bientôt d'un écoulement verdâtre qui la rendit assez malade et que lui communiqua son mari. Il dura neuf mois et laissa à sa suite des flueurs blanches habituelles. Depuis elle a eu des enfants dont deux se portent bien. Elle a fait une fausse couche par accident. Elle demeure à Paris depuis deux ans et peu de temps après son arrivée elle eut un érysipèle qui occupa la main et le bras gauche. On appliqua du collodion. Bientôt l'érysipèle reparut à la face et laissa sur le lobule du nez un petit bouton. Il y a de cela huit mois. — Ce bouton devint pustuleux, il s'ouvrit et laissa échapper du pus. D'autres se formèrent bientôt sur les ailes du nez; et sur la joue, au-dessus du sillon naso-labial, parut un tubercule dans l'épaisseur de la peau. Pendant ce temps le nez se tuméfiait, rougissait et la rougeur s'étendait aux environs. — 10 avril 1856. A l'entrée de la malade on constate que le nez a un volume double du volume normal, il est tuméfié dans toute son étendue. Sa couleur est d'un rouge brun foncé, ne se fondant pas avec la couleur de la peau voisine. Cette rougeur occupe non-seulement le nez sur toute sa surface, mais encore la partie médiane de la lèvre supérieure, la sous-cloison, et au côté gauche du nez une large plaque de forme trapézoïde depuis la paupière inférieure jusqu'au sillon naso-labial. Toutes ces surfaces sont épaissies, saillantes au-dessus de la peau saine voisine par des bords irréguliers comme festonnés, rugueuses, comme hypertrophiées, ce qui se voit très bien au niveau du bord libre des ailes du nez. Elles présentent un état mamelonné rudimentaire, des cicatrices et des petites ulcérations. La peau, en même temps qu'elle est épaissie, est aussi plus rude qu'à l'état normal et le doigt rencontre çà et là quelques petits tubercules dont le sommet est rugueux. Des tubercules un peu plus gros, ulcérés ou non, siégent également sur les bords des surfaces malades et dispersés sur le nez. Toute la surface rouge est couverte de squames minces et de croûtes jaunâtres ou blanchâtres plus ou moins sèches et adhérentes. Il y a maintenant plus d'exhalation de liquide, mais il a été très abondant, séro-purulent, et les

croûtes étaient alors plus épaisses, elles tombaient et étaient remplacées rapidement. La muqueuse n'est pas malade et n'a jamais été atteinte. — Toutes les parties malades n'ont jamais causé de douleurs, de démangeaisons, ni de chaleurs; B.... a toujours mouché beaucoup. Maintenant la sécrétion de la pituitaire a encore augmenté et est devenue plus épaisse. La gorge a toujours été saine. Maux de tête fréquents. — Prescription: salsepareille, sirop sudorifique; huile de foie de morue; vin de gentiane; sirop composé. — 15 mai. Le nez a repris son volume normal ou à peu près. Les mamelons sont moins volumineux. On ne sent plus de tubercules dans la peau. Les surfaces sont toujours rouge sombre, mais elles ne sécrètent plus et il n'y a presque plus de croûtes. La peau est encore un peu épaissie, mais cependant elle ne fait presque plus de saillie au-dessus des parties saines. C'est surtout à la lèvre supérieure que l'amélioration est notable. Là, ainsi que sur la joue, la rougeur disparaît lorsqu'on presse avec le doigt. — 4 juin. L'amélioration continue. La surface du nez et de la partie malade de la joue prennent tous les jours un aspect plus lisse et plus normal. Les tubercules ou mamelons ont presque disparu. Croûtes et suintement nuls. La rougeur de la lèvre supérieure a disparu. L'intérieur du nez a toujours des croûtes; injections chlorurées au vingtième. — 29 juin. Les progrès de la guérison sont manifestes. Nez à peine plus volumineux qu'auparavant, rougeur diminuée. A la place des mamelons existent de légères cicatrices du volume d'une tête d'épingle; les bords des ailes du nez, non plus que la cloison, n'ont subi *la moindre perte de substance.*

Affection syphilitique du nez. Photographié. — Poulain (Madeleine), vingt-six ans, rue de Grenelle, 148, dixième arrondissement, née à Chailly-lès-Sunery (Moselle); fille. — Tempérament lymphatique bilieux. La malade n'indique aucun antécédent syphilitique chez ses parents et ses frères ou sœurs. Elle assure n'avoir eu jamais de maladies vénériennes et même n'avoir jamais eu de rapports sexuels. Ses règles sont peu abondantes et irrégulières, difficiles. Du reste, santé générale bonne; elle a eu des glandes au cou dans sa jeunesse; intelligence obscure et bornée. — Il y a deux ans, elle s'aperçut qu'à l'intérieur du nez, qui jusqu'alors était parfaitement sain, poussait un petit bouton du volume d'une tête d'épingle. Il était situé sur l'aile du nez à droite, plus haut que le bord libre, mais cependant à portée du doigt, car il occasionnait des démangeaisons, et la malade grattait et le faisait saigner. Il n'a pas fourni de pus, mais presqu'en même temps que parut ce bouton, le bord libre de la narine droite suppura. Peu après le bouton guérit. La rougeur et la sécrétion du pus s'étendirent alors du bord libre à la peau du nez, dans une largeur d'environ deux ou trois centimètres à droite et à gauche, jusqu'à la moitié de la circonférence de la narine. Trois mois après le début de la maladie, P..... vint à Saint-Louis, chez M. Devergie, pour se faire soigner. Au bout de trois mois de traitement, elle sortit. Son nez était revenu à son volume normal, il

ne suppurait plus, mais était encore rouge (le traitement se composait d'huile de foie de morue, vin de gentiane, sirop d'iodure de fer et bains sulfureux). — Cet état de santé dura un an. Après ce temps la maladie recommença par le bord libre de l'aile du nez à droite et s'étendit, mais plus loin que la première fois. Le nez reprit un volume considérable. Elle rentra à l'hôpital. — 27 mars 1856. A son entrée, on constate une augmentation considérable du volume du nez, il a doublé de volume, il est rouge, élargi, couvert de croûtes et de boutons et une plaque malade comme la peau du nez couvre une partie de la joue à droite. Sur le nez l'affection occupe le bord libre de la narine droite, de la cloison et d'un quart du bord libre de la narine gauche. Sur le dos du nez existe une zone malade de trois centimètres de hauteur et qui monte de la partie gauche à la partie droite où elle atteint presque l'angle de l'œil, occupant ainsi l'aile du nez de ce côté. Sur la joue l'affection occupe un parallélogramme dont une base a l'étendue de la maladie sur l'aile du nez et l'autre une ligne d'environ trois centimètres. Toutes ces surfaces sont recouvertes de croûtes jaunâtres, peu épaisses, de pustules grosses, indurées à leur base, ressemblant à des tubercules situés dans la partie superficielle de la peau et se distinguant des tubercules de lupus franc par leur volume et la sensation qu'ils donnent au doigt. Leur sommet est recouvert d'une croûte plus dure que celle qui occupe les intervalles; elle est noirâtre, adhérente, ressemblant au sommet des tubercules de la syphilide cornée. Quelques-uns des boutons ne sont pas pustuleux mais simplement papuleux, et ont dans le sommet dur des premiers. La saillie de tous ces boutons est peu considérable. Leur volume varie de celui d'une tête d'épingle à celui d'une lentille. Entre ces boutons existent les croûtes molles, jaunâtres, dont nous avons parlé et enfin un fond rouge sombre d'une couleur très foncée, assez nettement limité au nez, mais se continuant peu à peu sur la joue avec la coloration de la pommette. Ce fond est suintant, mais d'une façon presqu'insensible, lisse, exhalant une odeur désagréable, ne présentant pas d'injection en vaisseaux distincts, mais des fentes ou gerçures au bord libre de la narine droite; là la sécrétion du pus séreux est manifeste. L'intérieur de la narine droite est tapissé de croûtes dans l'étendue de deux centimètres. La gauche est saine. Toutes ces parties sont le siége de picotements qui augmentent à l'air et deviennent assez désagréables. — Prescription : Huile de foie de morue, de 20 à 30 grammes; vin de gentiane, 45 grammes; sirop composé, 45 grammes (iodure de fer, de potassium, iode, bichlorure d'hydrargyre, solution de Fowler); salsepareille avec sirop sudorifique pour tisane; quatre portions. — 15 avril. La rougeur a un peu diminué. Le volume du nez est moins considérable. Même traitement.—5 mai. La rougeur s'efface de plus en plus: du rouge foncé, elle a passé au rose en quelques endroits, et même au rose très tendre sur la joue, dans le sillon qui la sépare du nez. La limite entre la peau saine et la peau malade est moins tranchée. Il ne reste plus de véritables pustules, mais des boutons papuleux. Plusieurs se sont aplatis et quelques-uns ont

perdu leur sommet corné. Les surfaces malades sont à peine suintantes, moins tendues, moins dures. Le volume du nez a diminué sensiblement, quoique l'aile droite soit toujours épaissie comparativement à l'aile gauche. Plus de picotements; santé générale bonne. — 10 juin. Plus de suintement, ni de croûtes. Les papules qui ont succédé aux pustules s'affaissent et ont toutes perdu leur sommet corné. Les surfaces malades ne sont plus tendues, luisantes, mais ont peu de rougeur. Légères cicatricules sur la place qu'occupaient les pustules. Pas de perte de substance aux bords des ailes du nez ou à la cloison, mais l'aile droite est plus relevée et non parallèle à la gauche, ce qui peut tenir à la tension résultant de l'hypertrophie qui subsiste. — La malade est légèrement indisposée, fièvre, abattement, etc.; diète, suspension du traitement. — 21 juin. Santé générale bonne; reprise du traitement. — 8 juillet. L'amélioration continue ses progrès. Rougeur et gonflement presque nuls. Fin juillet, guérison.

Scrofule syphilitique de la peau. — Pagot (Catherine), soixante-cinq ans (Aube), entrée le 11 février 1854, morte le 11 avril 1854, à la suite d'une pneumonie terminée par suppuration. — La malade, d'un tempérament lymphatique, a perdu il y a vingt-cinq ans. — Elle a toujours été bien portante, n'a jamais eu aucune maladie antérieure. — La maladie qu'elle porte occupe l'extrémité nasale, les deux narines et se prolonge un peu sur la joue droite. — Voici l'aspect que la malade présente à son entrée à l'hôpital : une croûte épaisse, rugueuse, irrégulière à sa surface, à bords légèrement contournés vers la peau, arrondis, recouvre une altération de même étendue et qu'elle nous cache. En dehors de cette croûte se voient des tissus ayant l'aspect ramolli dans une étendue de 3 millimètres, à couleur rouge sombre, peu sensibles et n'offrant point une hypertrophie notable. Cette lésion et les croûtes qui la recouvrent en forme de couvercle occupent le nez, le bord libre des narines et la joue droite. En un point du nez la croûte soulevée et cassée laisse voir dans un espace fort rétréci un bord dentelé qui lui sert de limite et un fond gris mamelonné; enfin, en dehors de la commissure buccale se voit une croûte de même aspect, grande en tout comme une pièce de 20 centimes fortement adhérente et nummulaire. — Il y a huit ans que la malade porte cette affection; elle ne se rappelle point avoir eu ni affection scrofuleuse ou syphilitique et ne peut dire si elle en a vu quelques traces chez ses parents. Le début en a été marqué par une série de petits boutons que la malade compare aux pustules de la variole, qui ont percé sans donner presque de pus, puis se sont ulcérés, ont donné lieu à une sécrétion sanieuse roussâtre, et enfin à des croûtes qui à plusieurs reprises sont tombées. Deux ans après l'invasion de la maladie, les ulcérations ont été cautérisées avec un fer rouge, puis pansées avec une pommade dont la malade ne peut dire le nom, mais qui était jaune et cuisait. Une année plus tard, elle a été cautérisée avec de l'acide azotique. A cette époque, de nouvelles ulcérations sont survenues au cou, aux lèvres, et se sont

cicatrisées. Enfin, à Troyes, elle a encore été cautérisée à l'acide acétique; mais jamais de traitement interne. — Entrée à Saint-Louis le 11 février, la malade fut soumise au traitement suivant : Huile de foie de morue, vin de gentiane, sirop composé. Du 11 février au 11 mars, point de changement bien notable, couleur moins obscure, affaissement léger des tissus, les croûtes commencent à se détacher. — Du 11-26 mars, chute de la croûte qui recouvre la joue, qui laisse voir un espace rouge lie de vin clair, recouvert par un épiderme mince qui paraît presque transparent et sous lequel les tissus semblent encore ramollis. — Le 5 mars, la malade est prise de frissons, de pneumonie. — Le 11, elle est morte d'une pneumonie terminée par suppuration; pendant ces quelques jours la coloration avait complétement disparu, la peau même semblait déprimée en cet endroit. Le même phénomène s'était produit pour le nez, et la croûte qui le recouvrait était peu adhérente.

Scrofule syphilitique héréditaire ayant son siége à l'extrémité du nez et autour des narines. — Le nommé Helluin (Félix), vingt-deux ans, serrurier, entré le 5 janvier 1854, à l'hôpital Saint-Louis, n° 70 salle Saint-Louis. Le sujet porte l'affection dont il est atteint depuis dix-huit mois ; elle consiste en une dégénérescence de nature scrofuleuse occupant l'extrémité nasale : le tissu est rouge violacé, ramolli, et s'ulcère au niveau du bord tranchant des narines. Ces ulcérations forment une espèce de feston dont les bords sont taillés à pic et se recouvent de croûtes jaunâtres. Le traitement antérieur, qu'il avait subi et qui est le même que celui d'à présent, avait amélioré son état. Sorti trop tôt, il y a deux mois, les mêmes accidents se sont manifestés de nouveau. Le malade a tout l'aspect des scrofuleux : peau blanche et blafarde ; blépharo-conjonctivite chronique ; santé d'une apparence chétive. Le malade n'a jamais eu de maladies vénériennes, mais sa mère en a eu ; de ses deux sœurs, une seule a eu quelques manifestations scrofuleuses ; du reste, le malade n'a eu, dans son enfance, qu'une impétigo du cuir chevelu. Depuis quelque temps, il commence à perdre ses cheveux ; les désordres dont le nez du malade est le siége sont peu douloureux, et aux environs on ne trouve point d'engorgement ganglionnaire. (Huile de foie de morue ; vin de gentiane ; sirop composé ; bains sulfureux.) De jour en jour la coloration a diminué ; les tissus se sont affaiblis et les bords, aujourd'hui cicatrisés, sont minces et presque tranchants. 26 mars, décoloration successive des tissus, amincissement, encore une légère ulcération à gauche. Sorti guéri le 6 avril 1854.

Scrofule syphilitique héréditaire. — Nez. — Pannetur (Léonard), vingt-cinq ans, journalier (Nièvre). Entré, le 2 mars 1854, à l'hôpital Saint-Louis, n° 80 salle Saint-Louis, le malade, d'un tempérament lymphatique, scrofuleux, porte son mal depuis dix ans. Il lui est survenu à la suite d'une chute, qui a déterminé une plaie profonde dont on voit encore la trace sur la partie latérale droite du nez. Le malade a eu des manifestations scrofuleuses, gan-

as, abcès, et il lui reste encore autour du cou quelques ganglions formant chapelet peu saillant. Point d'antécédents syphilitiques chez le malade it l'intelligence est bien obtuse, et ne peut rendre compte de l'état de santé de maladie de ses parents ; le malade a eu la gale il y a trois ans et l'année nière, et enfin un érysipèle au mois de février 1854. Le nez est aplati à sa tie moyenne, globuleux et élargi vers son extrémité; sa coloration est d'un ge tendre et la consistance de la peau un peu moins molle que dans le us ordinaire; les os paraissent augmentés de volume, et une ulcération, a profondément creusé l'aile droite du nez et un peu moins l'aile iche, règne sur tout le bord libre, et occupe environ cinq millimètres hauteur la muqueuse nasale. Du reste des croûtes légères, jaunâtres, la ouvrent, et parfois, les mucosités que le malade rend acquièrent une ur fort désagréable. La sécrétion qui se forme à la surface de l'ulcération sanieuse et jaunâtre. Depuis que ce malade a mal au nez l'œil droit est le iége d'une ophthalmie chronique scrofuleuse. Jamais dans les parties ma- es le sujet n'a éprouvé de sensations, jamais de chaleur, jamais de dou- rs ; ce n'est que depuis peu qu'il sent un peu de céphalalgie et des pico- ments dans le cuir chevelu. Depuis deux mois, il s'est formé à la joue droite tubercule peu coloré au centre, dur, insensible, du volume d'un gros s, entouré d'une auréole rouge sombre semblable pour sa coloration à celle bosses voisines malades, que le malade a traversé il y a quelque temps c une épingle. Ce tubercule occupe l'épaisseur de la peau seulement. 25 mars. Depuis son entrée, point de changement notable encore. Seule- nt il y a une coloration un peu moins foncée des tissus malades. Il a été mis au traitement suivant : huile de foie de morue ; sirop composé ; vin gentiane. — 26 mars-22 mai. Un peu de diminution dans le volume des ties molles, qui sont un peu moins ramollies, un peu moins colorées à la iphérie. Touché tous les trois jours avec la solution d'azotate d'argent au ième. — Depuis le 22 mai jusqu'au mois de décembre, le malade n'a plus d'autre traitement que son huile de foie de morue ; vin de gentiane ; sirop mposé. Son état est bien meilleur. Les tissus sont moins gros ; la colo- ion lie de vin, moins sombre, n'occupe plus que l'extrémité nasale. Enfin malade a acquis un certain degré d'embonpoint ; cependant le tubercule la face persiste encore.

Scrofules syphilitiques (juillet 1856). — *Forme spéciale.* — Mlle ***, m'a été adressée par le docteur Cornet, de Gray, est atteinte, depuis 1850, me affection toute spéciale. Elle a vu se développer, d'abord vers le haut la cuisse, des rougeurs avec indurations globuleuses, arrondies, dont la au s'est recouverte de squames très larges et très discrètes, paraissant for- es par une seule lamelle épidermique, à bords légèrement détachés, sans e la lamelle se sépare de la peau. La rougeur était d'ailleurs plutôt rose que n rouge sombre. Les plaques s'élargissaient peu à peu ; le tissu sous-cutané

s'endurcissait; les vaisseaux lymphatiques s'engorgeaient; quelques ganglions s'indoraient. Tout d'abord, il s'est montré une de ces plaques qui a eu des périodes d'accroissement et de décroissement dans un laps de temps très long, sans amener aucune perturbation dans la santé générale. Mais avant la guérison de la première plaque, il s'en est manifesté une seconde au-dessus, et ainsi de suite en longeant toute la partie interne du mollet, de manière à s'étendre aujourd'hui au cou-de-pied. Chaque plaque, en se guérissant, a sans avoir été accompagnée de pus, de sécrétion, ou de croûte, laissé un tissu analogue à une cicatrice, et une peau blanche décolorée, parfaitement au toucher, à forme ronde et d'une étendue de 5 à 7 centimètres. Dans les plaques guéries, le trajet des vaisseaux lymphatiques est resté engorgé, parsemé de petits ganglions indurés. Mais la maladie n'a jamais marché; elle a toujours descendu; de sorte que le pli de l'aine est parfaitement lisse et exempt de tout ganglion. — Aujourd'hui, 18 juillet, la maladie, à l'état aigu en ce qui est visible, consiste dans une surface de peau, rouge de huitre de 5 à 6 centimètres de largeur, qui soit de huit travers de doigt au-dessus du genou pour gagner le cou-de-pied, où elle s'arrête. Elle est là sous la forme d'une rougeur rosée, avec des apparences de squames de 2 à 6 centimètres de hauteur sur 2 à 3 de largeur, à bords légèrement décollés, longeant toute la face interne du tibia. La peau sur l'os est très saillante et comme parcheminée, l'os lui-même est malade en ce sens que la surface qui, ordinairement est en dos d'âne, ou plate, est creuse à l'instar d'une gouttière visible à l'œil, et par conséquent très appréciable au toucher; la peau, dans tous les points malades, n'a pas perdu de sa sensibilité. La marche amène un peu de fatigue, mais Mlle *** fait cependant encore de longues courses sans être incommodée. — D'ailleurs, aucun antécédent d'accident scrofuleux dans l'enfance. Constitution forte, mais lymphatique; excellente santé; menstruation régulière. Elle a été formée à quinze ans, ce qui n'a amené aucun changement dans l'état de la maladie. — Traitement composé.

Rupia scrofuleux et syphilitique de la poitrine. Photographié. — Mlle (Laurentine), dix-sept ans, couturière, rue Amelot, 54, huitième arrondissement, née à Argenton (Indre); fille. — Tempérament lymphatique. Les parents jouissent d'une bonne santé. Ses frères ou sœurs ont eu des glandes au cou et des abcès scrofuleux, mais ils sont guéris. La scrofule est commune dans le pays qu'elle habitait. — R.... n'est pas encore réglée, elle a eu des fleurs blanches il y a environ un mois, mais elles ont duré quelques jours seulement et ont disparu sans laisser de traces. Il n'y a pas eu de rapports sexuels, pas d'affections syphilitiques, l'hymen existe, la gorge est saine. Il y a environ dix ans, parurent sur le cou des glandes qui d'abord dures devinrent bientôt fluctuantes et furent ouvertes par un médecin. La suppuration ne tarit pas et il se forma des ulcérations recouvertes de croûtes. Ces ulcérations s'établirent au cou il y a sept ou huit ans. Il y a trois ans, c'est-

en avant son arrivée à Paris, des tumeurs apparurent sur la partie ıre de la poitrine, s'abcédèrent et s'ouvrirent spontanément. Elles ıt lieu à des ulcérations recouvertes de croûtes semblables à celles Enfin, il y a trois mois, à la suite d'un coup, le sein droit devint eux, et après des abcès superficiels, il se forma les mêmes ulcéra- out cela n'influait en rien sur la santé générale. — 19 mars 1853. A ée, on constate que la partie antérieure du cou, de la poitrine et le it sont le siége d'ulcérations recouvertes de croûtes d'un jaune noi- paisses, adhérentes. Au pourtour existe un cercle inflammatoire d'un ıtense dont le tissu est épaissi, dur, comme cela a lieu dans les engor- ı scrofuleux. Ces croûtes, éloignées de 5 à 6 centimètres les unes des présentent une disposition générale en arcs de cercle constitués chacun ls ou quatre de ces croûtes. Entre les plaques du cou on remarque des s anciennes, froncées et qui sont des traces de scrofules guéries. Les pla- ûteuses rappellent par leur aspect les croûtes de rupia, mais elles n'ont précédées de la lésion qui caractérise cette maladie. Voici du reste avec détails la position de ces plaques et leur aspect. — Les plaques du cou ou ıxillaires occupent, la première l'angle de la mâchoire à droite, la deu- ı moitié de l'espace qui sépare le menton de l'angle de la mâchoire à la troisième occupe la partie médiane d'une ligne qui unirait l'angle âchoire et le niveau de la clavicule à gauche. — Des cicatrices blanches, ères, déprimées, unissent ces deux dernières plaques et se prolongent l'oreille et au bord antérieur du trapèze à gauche. Les plaques ster- rment un arc de cercle ouvert en haut. Les deux plaques supérieures it les extrémités internes des clavicules, l'inférieure le sternum un peu ıs de son extrémité supérieure. — Les plaques du sein peuvent aussi tachées au même système de courbes; elles occupent l'une la partie ıre, une autre la partie médiane, deux la partie inférieure, la dernière : externe au niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral. — ces plaques sont constituées par une surface dont le milieu est une on recouverte d'une croûte et les bords par un cercle rouge et ıatoire. Les croûtes sont épaisses, noirâtres, brunâtres et jaunâtres, ıentes, dures, adhérentes, inégales. L'ulcération est peu profonde, une sérosité purulente abondante qui sort au pourtour des croûtes et rète en partie pour les former. La couleur de la plaie est grisâtre, il ıas de véritables bourgeons charnus. Chacune des ulcérations est e, comme nous l'avons déjà dit, par un cercle rouge sombre dont la ıacée diminue à mesure qu'on s'éloigne de la croûte. — Quelques-unes ûtes, entre autres celle de la partie médiane du sternum, reposent sur tie tuméfiée, légèrement fluctuante; il paraît que cet état était commun les plaques au début. Enfin dans la paroi pectorale de l'aisselle droite, lepuis un mois une tumeur ganglionnaire fluctuante que la malade : aux tumeurs de début des plaques que nous voyons. — Les plaques sont

le siége de démangeaisons assez vives, et les tumeurs, avant leur ulcération, causent des élancements et des douleurs diverses fort désagréables. La forme du sein a été profondément modifiée; il est ratatiné, diminué, le mamelon a disparu. L'autre sein au contraire est volumineux. — Prescription : Doubles; huile de foie de morue, de 20 à 80 grammes; vin de gentiane, de 20 à 40 grammes; sirop composé, 45 grammes (iodure de fer, de potassium, bichlorure de mercure, solution de Fowler); quatre portions.—15 avril. Quelques étouffements et maux de tête, qui semblent indiquer l'approche de la menstruation. Les plaques sont à peu près dans le même état que lors de l'entrée, il n'y en a pas de nouvelles. La petite tumeur de la partie supérieure du sternum a un peu augmenté; celle de l'aisselle, après avoir augmenté, semble diminuer. Quelques croûtes sont tombées par accident et se reproduisent avec rapidité. La surface des ulcérations est plus rouge, plus saignante, composée de bourgeons charnus et plus élevée au-dessus de la surface de la peau saine. La coloration de la circonférence n'a pas éprouvé de grands changements. — Depuis l'entrée de la malade, il s'est formé à la jambe droite, vers la partie inférieure et postérieure, une petite eschare au milieu d'une partie enflammée et cela consécutivement à un coup que la malade se serait donné peu de jours avant son entrée. Aujourd'hui la partie inférieure des deux jambes présente en outre de l'érythème noueux à un degré très marqué. Son existence remonte à trois semaines environ. — Prescription : Même médication; quelques cataplasmes sur la jambe et sur le sein malade, mais ils sont mal supportés. — 5 mai. Le cercle rouge qui environne les croûtes a généralement diminué d'intensité et de largeur. Les croûtes du sein se sèchent et ont meilleur aspect; celles du sternum sont toujours soulevées par une suppuration sanieuse abondante. — 28. On fait tomber une des croûtes du cou avec un cataplasme; pansement avec le cérat créosoté. — 3 juin. La cicatrisation commence sur l'ulcération pansée à plat. Les autres croûtes l'amincissent et il y a moins de suppuration. L'état général est meilleur. — 18. On a fait tomber toutes les croûtes du cou, et déjà la première est cicatrisée grâce au cérat créosoté et à de légères cautérisations avec l'azotate d'argent. — 8 juillet. La guérison est opérée.

Efficacité des traitements composés. — M. X..... a eu une première gonorrhée il y a ....., qui a durée six mois, puis trois autres de trois à quatre mois de durée. — La deuxième, il y a quinze à dix-huit mois. — Jamais de traitement antisyphilitique pour les guérir. — Resté douze ans sans aucun indice vénérien. — Marié depuis treize à quatorze ans. — Il y a cinq ans, fissure à l'anus, sans cause appréciable. — A la même époque, apparition d'une roséole syphilitique. — Tisane de Feltz et pilules de proto-iodure. — M. X..... a pris ces pilules pendant trois mois, puis l'iodure de potassium. — Neuf ou dix mois après le développement de la roséole, M. Cazenave

voie le malade aux eaux de Kreuznach. Il y avait alors quelques taches à pommette gauche, au sourcil et au front. Elles disparurent par les eaux. — uxième et troisième années, à Kreuznach, et pendant ces deux ans, usage vingt-cinq à trente bouteilles de rob Boyveau-Laffecteur. — Il y a deux ans, veloppement de quelques tubercules au menton. — Il y a quatorze mois, la joue droite et au dos. — Il y a un an, M. Menière attaque ces tubercules r la cautérisation au deuto-nitrate, acide de mercure. Quarante-cinq à cinante cautérisations. Les tubercules avaient en partie disparu au menton et la partie inférieure de la plaque de la joue droite. — Il y a quatre mois demi, je suis appelé à voir le malade avec M. Hervez de Chegoin, son édecin ordinaire. — M. X..... est un homme très impressionnable, d'un mpérament lymphathique, nerveux. Il est désespéré de son état, au int que lui viennent quelquefois des pensées de suicide. Allié à une femme armante, père de quatre enfants, à la tête d'une grande maison commerale, possesseur d'une grande fortune, il a tout pour être heureux, et dans s conditions, il pleure de désespoir en présence d'une maladie rebelle à des aitements de cinq ans de durée. — Voici son état : Sur le dos, au niveau de ngle inférieur de l'omoplate, existe une surface de 5 centimètres de long r 2 de large, de forme ovalaire, épaissie, rougeâtre, indurée, à tissu lardacé, sur laquelle se trouvent deux points ulcérés elliptiques, d'un 1/2 à 1 centiètre de large, ayant un mauvais aspect. — Sur la joue droite, au voisinage de ile du nez, mais tout à fait indépendants de cet organe, six à sept tubercules oupés, dont deux d'entre eux sont recouverts de croûtes et donnent un léger intement. Ces tubercules figurent une plaque ovalaire un peu ellipsoïde; s sont indolents, mais durs, rouge-violacés, lisses et coniques; sur le devant u menton, dans la barbe, une série de tubercules analogues, coupés çà et là r des cicatrices provenant de cautérisations assez profondes. Ici, comme à peau du dos, quelques croûtes d'un jaune grisâtre et de mauvais aspect. - La gorge est sans ulcération, mais légèrement rougeâtre; les cheveux ne nt pas tombés; pas de douleurs nocturnes. — L'ensemble de ces tubercules nonce, par leur aspect, la physionomie à la fois scrofuleuse et vénérienne. . X..... avait eu des glandes au cou étant jeune. — Je n'hésitai pas à iagnostiquer la nature syphilitique et proposai le traitement composé de : isane sudorifique, huile de foie de morue, eau ferrée aux repas, sirops d'iodure e fer, de potassium, de mercure, d'arsenic; un bain sulfo-salin par semaine. ien à l'extérieur. — Après deux mois, ce qui était ulcéré était cicatrisé, y avait affaissement très notable des tubercules. — A trois mois, il ne resit de la plaque de la joue que quelques petites productions circulaires de eu d'importance. — A quatre mois, tout avait disparu. — J'envoie M. X..... Bagnères-de-Luchon pour contrôler sa guérison tout en continuant son traiement. — Celui-ci n'a jamais été interrompu, M. X..... a même engraissé, t il a continué son travail d'affaires, très occupé depuis sept heures du atin jusqu'à six du soir, ne prenant que deux heures pour se promener après

le déjeûner et après le dîner. — Revenu de Bagnères, la guérison s'est entièrement soutenue depuis quinze mois.

Ce traitement a pour but d'atteindre, et la syphilis, et la scrofule à la fois. Nous prescrivons aux enfants qui en sont atteints, d'une part l'huile de foie de morue associée au vin de gentiane, d'une autre part un sirop dans lequel entrent pour 500 grammes, 2 grammes d'iodure de fer, 6 à 8 grammes d'iodure de potassium, 1 décigramme de bichlorure de mercure et 1 gramme 5 décigrammes de solution de Fowler. L'huile de foie de morue n'est d'ailleurs portée qu'à la dose de trois à quatre cuillerées au plus par jour. Le sirop est donné d'abord par dose d'une demi-cuillerée matin et soir, et plus tard à celle d'une cuillerée à bouche : je varie la dose suivant l'âge ; j'ajoute à ce traitement la tisane de noyer ou celle de houblon.

Les idées que nous venons d'émettre ne semblent-elles pas expliquer les succès que l'on a obtenus de l'usage des mercuriaux dans le traitement de la scrofule ? Pour moi toutes les fois que celle-ci est arrivée à produire des gonflements, des caries ou des nécroses des os, je n'hésite pas à prescrire ces préparations. Les malades supportent d'ailleurs très bien cette médication si complexe. Je puis affirmer que plus j'entre dans cette voie, plus mes convictions deviennent fortes et ma confiance entière. Les Anglais nous ont d'ailleurs devancé. Chose importante à signaler, c'est que bon nombre de ces malades peuvent suivre ce traitement sans entrer à l'hôpital, en leur procurant les médicaments et tout en se livrant d'une manière modérée, soit à leur éducation, soit à leur état.

DIXIÈME GROUPE.

Syphilides.

J'aborde un sujet qui tous les jours se présente aux méditations du médecin, en raison des exemples si nombreux que l'on observe

dans la pratique. Je veux parler des accidents secondaires de la syphilis qui ont leur siége à la peau et que l'on a désignés sous le nom de *syphilides*. Ces maladies sont tellement communes qu'elles se trouvent constamment en plus grand nombre peut-être à l'hôpital Saint-Louis, tant chez l'homme que chez la femme, que dans deux hôpitaux consacrés exclusivement au traitement de la syphilis où les accidents primitifs sont au contraire beaucoup plus multipliés.

Tout en ne voulant pas embrasser ici l'histoire de cette dernière maladie, je ne puis cependant pas isoler les syphilides de quelques considérations préliminaires qui s'y rattachent et qui s'y lient assez intimement, pour diriger le praticien dans le diagnostic et le traitement de ces affections.

Établissons d'abord que l'on doit désigner sous le nom de *syphilide* tout phénomène morbide de la peau qui a pour point de départ un symptôme primitif de la syphilis ; cet état morbide ne saurait être complétement guéri que par les traitements généraux que l'on dirige ordinairement en vue de la maladie vénérienne.

Mais en présence des opinions aujourd'hui si divergentes sur les symptômes primitifs que l'on doit qualifier de syphilitiques, c'est-à-dire des phénomènes morbides qui ont pour cause l'*inconnu* que l'on est convenu de qualifier par les mots *virus vénérien*, il faut dire notre pensée à cet égard, en raison des convictions que nous avons pu acquérir par l'expérience et l'observation des faits.

D'une opinion exagérée par les anciens. et qui consistait à considérer comme phénomènes morbides syphilitiques tout état maladif des parties génitales qui pouvait être une conséquence du coït ou même des *circonstances du coït*, on a passé à l'opinion opposée, c'est-à-dire à ne plus considérer comme vénérien qu'un *seul symptôme*, *le chancre* et même à la condition que ce chancre reproduira un autre chancre, au moyen de l'inoculation ; de sorte qu'il n'a pas suffi de réduire à un seul phénomène morbide les symptômes primitifs : les caractères physiques de ce symptôme ont été considérés comme de nulle valeur, et l'inoculation suivie de la reproduction identique du chancre en est devenue la seule démonstration : telles sont les opinions que M. Ricord a professées dans ces dernières an-

nées avec beaucoup de talent. Ses doctrines ont fait école et bon nombre de jeunes médecins portent dans leur pratique ces idées que je regarde comme tout aussi funestes que l'ont été les idées exclusives de Broussais, idées rendues plus exclusives encore par les élèves qui les ont adoptées et le plus souvent exagérées.

Il nous faut donc chercher à démontrer : 1° qu'il existe d'autres symptômes primitifs de la maladie vénérienne ; 2° que l'inoculation du chancre ne prouve rien au delà de ce fait, quand elle réussit, que le chancre était de nature vénérienne ; et quand elle ne réussit pas, qu'on ne peut pas tirer cette induction que le symptôme n'était pas syphilitique.

Et d'abord quel est le praticien de quelques années qui n'a pas vu de symptômes secondaires de la syphilis se produire consécutivement à une blennorrhagie ? Cette cause est si fréquente que pour nous, nous ne chercherons pas à en donner la preuve. Mais, dit-on selon la doctrine actuelle, la blennorrhagie qui est suivie de phénomènes secondaires, soit à la peau, soit aux membranes muqueuses, était primitivement une blennorrhagie avec chancre dans l'intérieur de l'urèthre, lequel chancre n'avait pas pu être constaté. Ainsi, déjà on avoue que la blennorrhagie peut être la source d'accidents secondaires, sauf à supposer un phénomène dont l'existence ne peut jamais être constatée ; on fait par conséquent une supposition toute gratuite. C'est évidemment un moyen de ne pas ruiner une doctrine par sa base : aussi est-ce encore de cette manière que l'on explique les cas où l'inoculation du pus blennorrhagique ou muco-pus vient à reproduire un chancre. D'où, au point de vue pratique en dehors de toute doctrine exclusive, il faut tirer cette conséquence que la blennorrhagie comme le chancre peut être un antécédent de syphilis. Il faut convenir que cette épithète *larvé* appliquée soit au chancre, soit aux autres maladies, a été fort heureusement inventée !

Mais la syphilis peut se manifester primitivement par d'autres phénomènes ; le bubon d'emblée, les pustules muqueuses ou pustules plates, les fissures de l'anus, du sein et des lèvres, les ulcérations au sein et à l'angle de la bouche, etc., sont autant de symptômes qui peuvent s'observer primitivement et qui résultent de

ıfection par contact, car je ne saurais considérer ces phénomènes
nme secondaires, ils sont tout aussi primitifs que le chancre. Il y
ılus, tout individu porteur de l'un de ces phénomènes morbides
ıt communiquer par le contact la maladie vénérienne à une autre
rsonne, et par conséquent aussi ces phénomènes sont vénériens;
peuvent donc être, comme le chancre, la source de syphilides.
Telle est au moins l'opinion que nous professons à cet égard.
ıus admettons que e chancre n'est pas le seul symptôme capable
donner lieu à l'infection ; que l'infection a des bases beaucoup
ıs larges; qu'elle peut se faire par certains points de la peau;
r le tissu intermédiaire à la peau et aux membranes muqueuses;
r les membranes muqueuses; par le corps muqueux de la peau
la peau dépourvue de son épiderme dans les cas d'excoriation, et
fin par les plaies.

L'infection peut se faire par certains points de la peau, je veux
rler du pourtour de l'anus et notamment des mamelons. Qui n'a
des pustules plates se développer au pourtour de l'anus à la
ite de l'acte de la pédérastie, chez des enfants où la disproportion
ıge n'avait pas pu permettre l'introduction du membre viril? —
ı été chargé pendant longtemps de la visite des nourrices à la di-
:tion des nourrices des hôpitaux et j'ai souvent observé des fa-
lles entières, femme, mari et enfants, tous affectés de symptômes
philitiques principalement extérieurs par suite d'une infection par
ccions dépendantes d'un enfant né avec la maladie vénérienne.
s ulcérations s'étaient primitivement montrées aux seins de la
urrice, celle-ci avait peu à peu offert des phénomènes consécutifs
a gorge et aux parties génitales, elle avait infecté son mari; plus
d les enfants de la nourrice étaient tombés malades en se servant
s verres qui servaient au père et à la mère, car les commissures
s lèvres étaient le siége de fissures, d'ulcérations ou de tubercules
ıts. Qui ne sait que l'infection vénérienne a souvent eu lieu par
s baisers? Lagneau rapporte même l'exemple d'une personne qui
rtait une ulcération au nombril, laquelle ulcération provenait du
pôt de sperme dans ce cul-de-sac. Je crains, il est vrai, que les
:constances de ce fait aient été mal rapportées par les malades,
ıis, quant aux autres, ils ont été reproduits par beaucoup d'au-

teurs. Ainsi, d'une part, le chancre n'est pas le seul symptôme vénérien capable de communiquer la maladie vénérienne; d'une autre part, les modes d'infection sont divers et toute sécrétion purulente ou muqueuse, infectée, est capable de transmettre la syphilis sur le tissu intermédiaire à la peau, aux membranes muqueuses et à ces membranes elles-mêmes. Et comment pourrait-il en être autrement lorsque la mère transmet par le sang à son enfant l'infection dont elle est atteinte?

A plus forte raison, cette infection doit-elle s'entendre de la peau excoriée ou des plaies. On sait, en effet, que l'absorption s'opère beaucoup plus rapidement par les surfaces cutanées dépourvues d'épiderme que par la peau. Il en est de même des plaies sur lesquelles les matières vénéneuses insolubles sont absorbées; à plus forte raison un virus, du genre du virus vénérien. Au surplus, ces doctrines que j'ai consignées dans la première édition de cet ouvrage ont reçu en grande partie une sorte de sanction dans la discussion qui a eu lieu à ce sujet à l'Académie de médecine en 1855.

J'aborde maintenant le second point que je voulais traiter dans cet article, celui de prouver que l'inoculation ne démontre rien d'absolu par rapport à la nature du chancre, et que par conséquent, au point de vue pratique, cette opération, immorale de sa nature, ne doit jamais être employée. Mieux vaut cent fois supposer l'hypothèse d'une forme morbide syphilitique et soumettre un malade à un traitement inutile pendant un temps donné d'essai, que de produire par l'inoculation des surfaces malades nouvelles que l'on ne cicatrise pas toujours à volonté, et qui, dans certains cas, se perpétuent et contribuent à augmenter l'infection générale, sans tenir compte de l'influence qu'elles exercent sur le moral des malades.

Et d'abord ou l'inoculation réussit, ou elle ne réussit pas; c'est-à-dire, qu'elle reproduit un chancre en tout semblable à celui qui a fourni le pus, ou elle n'en donne pas un semblable, mais seulement elle développe une inflammation du genre de celle que produit l'inoculation d'une matière morbide étrangère à la syphilis, un bouton ou même une pustule, qui, chez des sujets d'un tempérament lymphatique et d'une mauvaise constitution, tendent

devenir plaie suppurante; ou enfin l'inoculation ne développe ien.

Dans le premier cas, on a la preuve que le chancre était syphili-ique. Mais est-ce que, dans la grande généralité des cas, le prati-ien un peu exercé a besoin d'inoculer le pus d'un chancre pour econnaître qu'il est vénérien? D'ailleurs, à quoi le reconnaît-il, si e n'est aux caractères du chancre même dont il a inoculé le pus?)r, si ces caractères l'ont conduit à une vérification qui ne lui etrace aucun nouveau phénomène, pourquoi la pratiquer?

Dans le second cas, il peut y avoir doute sur la nature du chan-re dont on a inoculé le pus, car il a fait naître une pustule et par-ois une ulcération, mais sans caractères syphilitiques bien tranchés. t alors l'inoculation n'a servi à rien.

Dans le troisième, où l'inoculation n'a eu aucune suite, où elle n'a léveloppé aucun phénomène morbide, quelle preuve en déduire? lien, suivant nous. En effet, quand on inocule le virus vaccin, st-ce que la pustule vaccinale se montre nécessairement? L'opé-ation n'a-t-elle pas pu être mal faite? Ne voit-on pas des per-onnes rebelles à deux, quatre, six vaccinations, présenter une uperbe pustule à la septième? Ce qui a lieu pour le vaccin peut lonc avoir lieu pour le virus syphilitique, et par conséquent e résultat négatif d'une inoculation vénérienne ne prouve rien l'une manière absolue, au moins quant à la nature du chancre. Mais il y a plus, M. Ricord admet que le pus du chancre ne repro-luit pas le chancre dans toutes les phases de sa durée; il y a un ertain moment qu'il faut choisir, une certaine date d'invasion dont l faut tenir compte, pour que l'inoculation réussisse. Cette date t ces caractères que doit avoir le chancre, on ne les spécifie pas. Mais ce chancre, quelle que soit la date de son invasion, infectera out individu et transmettra néanmoins la vérole! Ainsi voilà un roduit morbide, vénérien, qui ne peut se reproduire qu'à un cer-ain temps de son existence, et qui cependant est la source d'une infection à quelque époque que ce soit!

Évidemment l'inoculation doit être rejetée comme moyen de reconnaître les caractères d'un chancre ou de toute ulcération dou-teuse, parce que l'opération elle-même ne donne de résultats cer-

tains que dans quelques cas, et des résultats toujours incertains dans tous les autres.

J'ai voulu démontrer : 1° que plusieurs des symptômes primitifs pouvaient développer consécutivement des syphilides, et que le chancre n'était pas le seul symptôme qui fût dans ce cas ; 2° que l'inoculation était tout à fait incertaine dans ses résultats pour reconnaître la nature syphilitique d'une sécrétion morbide primitive. Je vais maintenant rechercher s'il est possible de préciser une époque à laquelle un symptôme primitif ne saurait plus développer d'accidents secondaires.

Doit-il, en d'autres termes, s'écouler deux, quatre ou dix ans, pour être à l'abri de l'apparition de syphilides lorsqu'un individu a été affecté d'un chancre, d'une blennorrhagie, ou de tout autre accident primitif ? Je déclare que la question est tout à fait insoluble et qu'il est impossible de préciser une date un peu certaine à cet égard. Ainsi une personne a eu une blennorrhagie ; vingt ans se sont écoulés ; une blessure est accidentellement faite, un état morbide général se déclare, la santé se rétablit, mais la blessure se cicatrise difficilement ; peu à peu elle prend les caractères d'une ulcération syphilitique, ses bords s'arrondissent, se relèvent, s'excavent, le pus sécrété est de mauvaise nature et un traitement antisyphilitique seul peut guérir cette affection. Sous l'influence de la même cause, une personne est prise de fièvre générale, une éruption s'opère à la peau, elle a d'abord les caractères d'une affection aiguë, puis cette affection persiste au delà du terme ordinaire, prend une forme chronique et revêt les caractères des syphilides. Tout cela se passe après cinq, dix, vingt ou trente ans d'une blennorrhagie. Mais, dira-t-on, il faut supposer que le virus vénérien a séjourné dans l'économie sans y manifester sa présence pendant de longues années, puis, que par une cause accidentelle il manifeste sa présence? On fera à cet égard toutes les suppositions possibles ; peu m'importe ; mais c'est un fait si journalier, si commun pour les personnes qui traitent les maladies de la peau, qu'il n'est pour elles l'objet d'aucun doute. — Ainsi, en résumé, non-seulement plusieurs symptômes primitifs peuvent développer des phénomènes cutanés secondaires, mais encore leur influence peut se faire sentir à une époque très éloignée

de leur invasion, lorsque ces symptômes n'ont pas été primitivement traités convenablement. Aussi, toutes les fois qu'une personne atteinte de blennorrhagie vient réclamer mes soins, je me borne à traiter la maladie par des antiphlogistiques et des révulsifs balsamiques, si cette personne ne doit pas se marier et si elle peut être exposée à contracter une maladie nouvelle. Je n'hésite pas, au contraire, à prescrire un traitement antisyphilitique, lorsque cette personne doit contracter un mariage.

Disons cependant qu'il est très commun de voir se développer les syphilides dans les six premiers mois qui suivent la manifestation des accidents primitifs, c'est la règle la plus générale ainsi que l'a fait remarquer M. Ricord ; il n'y a rien de plus.

Syphilides. — Ces préliminaires établis, abordons nettement l'histoire succincte des syphilides. On désigne sous ce nom toute éruption, papule, tubercule ou ulcération de la peau, qui a pour cause l'inconnu que l'on appelle *virus vénérien*. Mais les maladies de la peau sont très variées et, chose remarquable, la plupart des formes morbides de la peau peuvent se montrer sous la forme de syphilides, depuis l'efflorescence cutanée jusqu'à l'ulcération la plus profonde. Aussi Biett a-t-il fait autant de classes de syphilides qu'il y a de classes de maladies cutanées. Ainsi, dans la classe des exanthèmes on trouve la roséole et l'érythème syphilitiques ; dans les maladies vésiculeuses, les syphilides varicelleuse, herpétique et eczémateuse ; dans les dermatoses bulleuses, le pemphigus et le rupia syphilitiques; dans les pustuleuses, l'ecthyma, l'acné et l'impétigo. Il existe deux formes d'affection papuleuse vénérienne, le lichen simple et le lichen pustulo-papuleux.

Les syphilides squameuses sont assez communes et correspondent aux variétés de psoriasis et de lèpre. Quant à la classe des maladies tuberculeuses de la peau, elles comprennent un grand nombre de syphilides sous forme de tubercules non ulcérés ou ulcérés, en groupe ou disséminés, de sorte, qu'ainsi que nous le disions, les formes de syphilides correspondent aux diverses formes anatomo-pathologiques des maladies de la peau, et sont presque aussi variées qu'elles.

Chacune de ces formes vénériennes a deux ordres de caractères :

des caractères communs et des caractères propres. Pour le praticien, ce qu'il est bien important de connaître, ce sont les caractères communs, car qu'une syphilide soit eczémateuse, papuleuse ou ulcéreuse, cela importe beaucoup moins que de savoir que l'on a affaire à une syphilide; puisque, à part des variétés dans la marche, la durée de la maladie, quelques modifications dans le traitement, la base de la thérapeutique est la même. Les auteurs ne se sont pas assez attachés à bien faire connaître ces caractères communs : c'est un tort, car c'est par eux que notre attention est appelée et que nous portons un diagnostic sur la maladie. Nous allons essayer de les peindre et de les reproduire d'une manière circonstanciée, afin de remplir ce vide.

Ces caractères sont au nombre de trois : ils se déduisent 1° du siége de l'affection cutanée ; 2° de la coloration de la maladie ; 3° de la disposition que l'éruption cutanée a prise sur la surface de la peau.

Siége de l'éruption. — Chose remarquable, quoique les syphilides puissent se montrer à toute la surface de la peau, elles ne se développent le plus souvent qu'à certains points de cette surface et toujours sur les mêmes. On conçoit tout d'abord l'importance de ce siége pour le diagnostic; aussi faut-il l'avoir toujours présent à la pensée, c'est un des signes les plus concluants. Voici quels sont ces lieux d'élection, dans l'ordre de leur fréquence : Pourtour des ailes du nez et des angles de la bouche; racine des cheveux sur le front et à la partie postérieure du cou ; angle interne des yeux, centre de la poitrine partie, interne des membres, voisinage des aisselles et des aines. Je répète que toute la surface de la peau peut être envahie, mais, quatre-vingts fois sur cent, la maladie sera limitée aux parties que je viens d'indiquer, et de toutes ces parties, c'est à la figure que se montrent principalement les syphilides.

Voici au surplus quelques données statistiques qui ont trait au sujet qui nous occupe. Sur 121 cas on trouve la face atteinte 64 fois, le cou 43, la poitrine 47, le ventre 41, les bras, les cuisses, les avant-bras et les jambes 50, le cuir chevelu 40 fois, les mains 29, les pieds 19 ; ce qui tient à ce que les syphilides sont presque toujours générales. Elles se développent de 25 à 35 ans, 45 fois ; 33 fois de 15 à 25 ; 29 fois de 35 à 45 ; 7 fois de 45 à 55, et 5 fois

5 et au delà. C'est en été et en hiver qu'elles se montrent le
s communément : 36 en été, 21 en hiver, 8 au printemps et 19 en
tomne.

Forme. — Une éruption syphilitique n'est que bien rarement
itée à une seule papule ou pustule ou tubercule. Quel que soit
peu d'étendue de l'affection, la forme morbide élémentaire se
ète plus ou moins. Chose remarquable, c'est dans un ordre, un
angement symétrique que les produits morbides se disposent, et
st cette disposition qui constitue le second caractère essentiel des
hilides.

Il est d'observation que, dans tous ces cas, que ce soient des pa-
les, des pustules, des plaques squameuses, elles sont toujours
angées de manière à représenter des lignes courbes elliptiques.
s lignes auront des proportions relatives au volume des parties
la maladie se développe; elles seront très petites quand elles
conscriront les ailes du nez, l'angle de l'œil, un des angles de la
uche; elles seront très étendues et les productions morbides très
acées quand elles viendront à se montrer au voisinage des
selles ou des aines, et plus étendues encore si elles se montrent
milieu du tronc. Mais dans tous les cas, la disposition elliptique
le cachet de la cause morbide; elle a une très grande valeur
nme moyen de diagnostic.

Je ne saurais toutefois avancer qu'on ne puisse pas trouver d'ana-
ie à cette forme dans quelques affections de la peau qui ne re-
naissent pas pour cause la syphilis; mais alors cette analogie
st qu'une exception, elle ne s'observe que dans quelques pso-
sis invétérés très étendus, par exemple, dans lesquels il y a une
luence de plaques squameuses. C'est surtout dans le psoriasis
ttata général que l'on remarque cette analogie; mais je le répète,
st l'exception. On ne saurait donc apporter trop d'attention à ce
actère qui vient se joindre au premier pour dénoter la cause
nérienne de l'affection; les simples taches érythémateuses de la
au, quoique d'une étendue assez notable, ne font pas exception à
te règle.

Coloration. — Le troisième caractère que nous assignons aux
philides, c'est la coloration. On sait quelle importance la géné-

ralité des auteurs ont attachée à la teinte cuivrée des productions morbides syphilitiques. Pour moi, c'est un caractère d'une valeur bien moindre que les deux précédents. Et d'abord quelle est cette teinte? Ce n'est d'ailleurs celle ni du cuivre jaune, ni du cuivre rouge ; en sorte que l'expression de teinte cuivrée ne saurait rendre cette coloration. On peut dire qu'en fait de syphilides, il s'agit d'une teinte particulière, d'un mélange de jaune, de rouge et de brun, couleur fauve, que l'on ne peut pas spécifier et que l'habitude seule de voir des phénomènes syphilitiques apprend à connaître. Faisons d'ailleurs observer que ce caractère manque pour certaines formes morbides, des pustules, des ulcérations, des plaques de rupia ; c'est donc avec raison que, prenant en considération ces dernières circonstances, je n'ai assigné que le troisième rang à ce phénomène comme moyen de diagnostic.

Mais en groupant les trois caractères que je viens d'indiquer, il est rare que l'on ne soit pas conduit à se demander si l'on n'a pas affaire à une syphilide, et dès lors si l'on ne doit pas questionner le malade sur ses antécédents. Il est vrai que chez les femmes on obtient rarement des aveux, mais je n'hésite jamais, malgré la négation, à prescrire un traitement antisyphilitique, lorsque je réunis l'ensemble de phénomènes sur lesquels je viens de fixer l'attention.

J'ai établi les caractères généraux à l'aide desquels on pouvait reconnaître l'existence d'une éruption syphilitique de la peau, de manière à fixer l'attention du praticien sur l'aspect commun qui caractérise les éruptions cutanées de cette nature. S'il est vrai qu'il n'y ait pas d'exception à ces caractères généraux, il est vrai aussi que chaque forme morbide de syphilide présente des différences dans l'invasion, la marche et l'aspect spécial qui leur est propre. Je vais m'attacher à peindre ces nuances.

J'ai dit que les diverses formes de syphilides pouvaient être rattachées aux diverses classes de maladies cutanées, et non-seulement elles peuvent être rattachées à ces classes, mais encore à la plus grande partie des espèces. Abordons d'abord la catégorie des syphilides exanthémateuses.

Syphilides exanthémateuses. — On en admet deux formes : la ro-

séole et l'érythème papuleux syphilitiques. Elles se distinguent entre elles : 1° *Par le mode d'invasion :* la roséole syphilitique, comme la roséole simple, est presque toujours précédée des symptômes ou prodromes qui accompagnent la roséole ordinaire. Ainsi, lassitude générale, anorexie, malaise, souvent mal à la gorge ; puis tout à coup éruption à la peau dans les vingt-quatre heures, de taches de largeur diverse, depuis une pièce de cinquante centimes et au-dessous, avec rougeur assez claire, disparaissant sous la pression du doigt. L'érythème syphilitique est, au contraire, rarement précédé de symptômes précurseurs; il apparaît plus lentement sans malaise, et d'une manière lente et successive.

2° *Par le siége :* c'est surtout au cou, à la racine des cheveux, au-devant de la poitrine, au voisinage des aines et des aisselles, que se montre la roséole ; l'érythème se manifeste plutôt sur les membres et à leur partie interne.

3° *Par l'aspect spécial à l'éruption :* dans la roséole, les taches ne présentent pas d'élévation sensible au-dessus du niveau de la peau. Dans l'érythème, cette élévation est plus ou moins marquée; aussi a-t-on désigné cette forme sous le nom d'*érythème papuleux*.

4° *Par la marche et la terminaison :* la roséole syphilitique est persistante; la coloration, rosée d'abord, se fonce peu à peu, tout en perdant de l'intensité de sa coloration, et il arrive un moment où les taches semblent disparaître tout à fait, surtout si la température de l'atmosphère est très élevée; mais au moindre refroidissement du corps, qui amène la pâleur générale de la peau, on voit s'établir un contraste entre la nuance propre à la peau et la coloration ombrée des taches. L'érythème papuleux syphilitique disparaît quelquefois spontanément et d'une manière lente, en se déprimant peu à peu, gagnant le niveau de la peau, et y laissant une coloration à peine sensible; aussi ces éruptions font-elles naître dans ce cas beaucoup de doute dans l'esprit du médecin. Mais peu à peu la coloration reprend le dessus, et sa persistance ne permet plus alors de doute sur la nature de la maladie.

Quant à la résolution de ces deux maladies d'une manière spontanée, elle est rare, en ce sens que la disparition complète ait lieu sans le secours d'aucune médication ; mais lorsqu'elle arrive, c'est

pour se montrer plus tard sous la même forme ou sous une forme nouvelle. C'est, du reste, ce qui a lieu à l'égard de toutes les syphilides.

Syphilides varicelleuses. — Il est une variété de syphilides que quelques auteurs modernes ont placée au nombre des syphilides vésiculeuses et qui, suivant moi, doit faire partie des syphilides exanthémateuses; je veux parler de la varicelle syphilitique. En effet, cette éruption est évidemment un exanthème. D'ailleurs, elle n'est pas seulement vésiculeuse; elle est encore pustuleuse, puisque, dans la grande généralité des boutons, la liqueur séreuse d'abord se transforme bientôt en pus. — Quoi qu'il en soit, disons que, précédée de prodromes à l'instar de la varicelle, mais cependant généralement moins prononcés, la maladie apparaît à la peau sous forme d'une éruption plus lente à se développer et moins confluente; que, d'ailleurs, les boutons, au lieu d'apparaître simultanément, semblent se succéder à intervalles assez rapprochés, mais cependant de manière à dépasser de beaucoup la somme de temps nécessaire pour l'évolution de la varicelle; ce n'est plus en vingt-quatre heures ou quarante-huit heures que l'éruption est achevée, c'est durant huit, dix, quinze jours que l'éruption s'accroît; de sorte que, dans certains cas, elle devient presque confluente dans l'espace de trois semaines à un mois. Quant aux boutons, ils apparaissent avec des élevures au centre desquelles se développent des vésicules semblables, pour le volume, à celles de la variole; mais tandis que dans celle-ci l'éruption est entourée d'une auréole d'un rose tendre sous forme d'efflorescence, cette teinte acquiert en peu de temps dans la varicelle syphilitique la couleur sombre et brunâtre que nous avons décrite. En même temps, la sérosité se résorbe plus lentement ou se change en une liqueur d'aspect sanieux, pour se dessécher et former une croûte brunâtre, lente à se détacher, et laissant un engorgement coloré en brun, qui conserve la largeur de la pustule qui s'était primitivement développée.

Syphilides vésiculeuses. — Il en existe deux espèces : l'eczéma et l'herpès syphilitiques; l'eczéma se présente avec ses deux variétés : l'eczéma simple et l'eczéma impétigineux. Mais il est rare que la syphilide soit *primitivement* eczémateuse; il est beaucoup plus fré-

quent de voir un eczéma prendre les caractères syphilitiques, par suite d'une infection contractée pendant le temps où un individu était affecté d'eczéma ou d'un antécédent plus ou moins éloigné, et j'en ai en ce moment deux exemples sous les yeux ; je ne nie pas pour cela la possibilité d'un eczéma syphilitique spontané, mais je n'en ai vu que très rarement. Je viens de donner des soins à deux dames qui en offraient un exemple. J'ajouterai que je ne trouve pas dans les observations rapportées par les auteurs le cachet d'une syphilide eczémateuse spontanée.

On a, du reste, assigné à cette forme morbide les caractères ordinaires de l'eczéma, sauf la coloration sombre des syphilides et l'absence presque complète des démangeaisons. On ajoute que les plaques ou les groupes sont irréguliers et peu étendus. Mais le siége de l'eczéma autour des ouvertures naturelles, et principalement à la figure et a la racine des cheveux sur le cou, constitue un troisième caractère très important, auquel il faut joindre l'état rubané des plaques eczémateuses.

Il n'en est pas de même de l'herpès. Cette forme de syphilide est assez commune ; elle comporte les variétés d'herpès circiné ou nummulaire. Rien ne répond à l'herpès phlycténoïde non plus qu'à l'herpès zoster ou zona. Dans la variété d'herpès syphilitique, il n'y a rien d'aigu ; on n'aperçoit pas de vésicules. C'est la forme, la couleur et le siége qui établissent l'analogie entre l'herpès circiné simple et la syphilide herpétique. Mais cette forme est tellement tranchée qu'on ne saurait mettre en doute l'existence de cette espèce de syphilide. Voici d'ailleurs quels en sont les caractères.

La maladie apparaît sous forme de petites taches qui s'élargissent rapidement et se transforment en rougeurs circinées, mais le plus souvent à cercles incomplets avec sur-élévation au-dessus du niveau de la peau ; et tandis que dans l'herpès les vésicules sont manifestes, là elles sont souvent inappréciables, n'amènent pas de démangeaisons sensibles et prennent rapidement la couleur des syphilides. Ces herpès syphilitiques se présentent ou sous la forme discrète, ou sous la forme confluente. Dans le premier cas, les plaques arrondies ou les cercles imparfaits occupent les lieux d'élec-

tion que nous avons spécifiés; dans le second, ils sont souvent disséminés à presque toute la surface du tronc, au cou et sur le front, près de la racine des cheveux. Il est alors très curieux de voir la peau du corps zébrée de ces plaques. Leur persistance, leur couleur sombre, l'absence de démangeaison, le siége et l'aspect constituent les caractères qui peuvent servir à faire reconnaître cette affection, qui persiste pour s'atténuer pendant certaines saisons, ou sous l'influence de quelques médications externes, mais pour reparaître un peu plus tard.

Herpès syphilitique. — J..... (Augustine), vingt-neuf ans, passementière, boulevard de Belleville, 12, à Belleville, née à la Ferté-Gaucher (Seine et Marne), mariée à G..... (Louis). — La malade ne donne aucun renseignement sur ses parents. Sa santé habituelle est bonne; tempérament sanguin bilieux. Les règles sont normales, abondantes, précédées et suivies d'un flux blanc qui tache habituellement le linge en jaune. Rien qui puisse mettre sur la voie d'une infection syphilitique. Gorge saine. La malade, mariée depuis trois ans, a eu une fausse couche à six mois, il y a deux ans et demi; depuis elle ne s'est pas trouvée enceinte. Les fonctions digestives s'accomplissent avec régularité. — Il y a un an et demi, un petit bouton parut à la commissure droite des lèvres; la malade le gratta, l'écorcha, et peu à peu le mal s'étendit et occupa l'étendue d'une pièce de un franc à la commissure et à la partie droite de la lèvre inférieure. Pour se guérir, elle se mit entre les mains d'un médecin qui fit des applications de miel rosat et cautérisa avec une solution d'azotate d'argent. Il n'y eut pas grande amélioration, cependant au commencement de l'été dernier la maladie disparut complétement. Elle recommença au début de l'hiver, et s'agrandit très rapidement de manière à occuper tout l'espace que nous voyons envahi actuellement. — 24 janvier 1856. A l'entrée de la malade à l'hôpital, on constate que toute la lèvre supérieure et une plaque à la commissure droite offrent une couleur rouge qui semble mélangée d'un peu de jaune. Sur ce fond apparaissent des vésicules très petites, réunies en groupes et constituant des segments de cercle ou d'anneaux par leur réunion. La plaque de la commissure représente un cercle complet. A la lèvre supérieure, les portions d'anneaux empiètent les unes sur les autres comme les rides à la surface de l'eau quand on y a jeté des pierres. Les lignes de vésicules se continuent sur la portion muqueuse des lèvres, mais ne dépassent pas l'endroit où les deux lèvres viennent à se rencontrer. Des poils follets assez abondants existent sur la lèvre supérieure, ils ne sont jamais tombés. Pas de démangeaison, ni cuisson, ni chaleur. — Prescription : Chicorée; bains sulfureux. — 6 février. Aucun changement notable, ni en bien, ni en mal. — Tisane sudorifique; iodure de potassium 0,50; deux pilules sublimé

à 6 milligrammes ; pommade soufrée ; bains sulfureux. — 21 février. La lèvre supérieure est moins raide qu'il y a un mois et la malade peut lui faire exécuter tous les mouvements avec facilité, tandis qu'auparavant ils étaient un peu gênés. La rougeur est moins vive, surtout à la partie gauche de la lèvre supérieure. Les groupes disparaissent et s'éteignent; il devient plus facile de saisir la disposition circulaire, excepté à la commissure gauche. Toute la surface est recouverte de petites furfures ténues et adhérentes. Les vésicules ont disparu, elles sont remplacées par des surfaces un peu élevées, plus rouges que le fond général et autour desquelles adhèrent les furfures. — La santé générale est bonne. La malade désire continuer son traitement chez elle. On lui accorde son exeat. — 13 mars. J... revient à la consultation. La rougeur paraît avoir augmenté. Cependant les surfaces malades sont moins élevées au-dessus de la peau saine, mais elles semblent s'être élargies plutôt que rétrécies. Jusqu'alors elle n'a subi que peu de modifications de la part du traitement (usage des sulfureux). — 22 mai. Amélioration très sensible. Continuation du traitement jusqu'à la guérison, obtenue après deux mois et demi.

Syphilides bulleuses. — Là, nous retrouvons le pemphigus et le rupia syphilitiques ; mais le pemphigus est d'observation récente. Il a été principalement décrit par Krauss, en 1834, et plus tard M. Paul Dubois a appelé l'attention sur cette forme de syphilide. On ne l'observe que chez les nouveau-nés. Il siége seulement aux mains, et plus souvent encore à la plante des pieds. L'enfant, au sortir du sein de la mère, présente deux ou trois bulles à la paume des mains ou à la plante des pieds. Ces bulles sont larges comme un haricot et quelquefois plus ; elles renferment une sérosité citrine d'abord, qui devient ichoreuse ensuite ; elles se crèvent, se dessèchent et forment une croûte superficielle noirâtre, qui persiste avec ulcération sous la croûte, et qu'un traitement antisyphilitique peut guérir. Chez l'adulte, on n'a pas encore observé de pemphigus syphilitique.

Le rupia est, au contraire, très commun ; mais principalement à un âge assez avancé de la vie, quoiqu'on puisse aussi l'observer dans la jeunesse.

On admet généralement deux formes de rupia syphilitique, mais on peut en établir quatre espèces. — Première espèce : c'est la plus connue et la plus caractérisée. Elle apparaît sous forme de petites bulles confluentes formant bientôt une bulle unique, qui se remplit d'une sérosité ichoreuse et semi-purulente. Cette sérosité se con-

crète ; une croûte se forme, se dessèche de plus en plus, prend un aspect grisâtre et adhère à la partie sous-jacente. Peu à peu elle fait saillie à son centre, en même temps qu'elle s'élargit successivement par la circonférence, comme si de nouvelles bulles s'étaient formées sous la première croûte, et se fussent desséchées pour étendre par une lanière uniforme la croûte première ; de sorte qu'après un certain temps on dirait des croûtes sèches superposées, de plus bombées au centre, et figurant parfaitement une valve d'écaille d'huître.

Si l'on fait tomber cette croûte au moyen d'un cataplasme, on voit un ulcère sanieux de la largeur de la croûte. Ses bords sont plus ou moins taillés à pic, et le pus qui s'en échappe est ichoreux et fétide. Ainsi dénudé, il est très sensible et douloureux pour le malade. L'élargissement de ces croûtes n'a lieu d'ailleurs que d'une manière très lente, très graduée, et les points du corps sur lesquels elles se montrent peuvent être très nombreux ; elles persistent et se multiplient par le temps, et peu à peu elles conduisent le malade au tombeau, par les sécrétions qu'elles entraînent, l'odeur fétide qu'elles répandent, et la cachexie qui résulte de cet état.

La seconde forme de rupia est tout opposée. Comme dans la précédente, des bulles se développent et se transforment en croûtes ; mais en croûtes très minces, noirâtres, et d'aspect sanguinolent. C'est qu'en effet, dans cette variété, la moindre pression exercée sur les croûtes, la moindre excoriation amène une écoulement de sang qui, parfois, est assez considérable pour affaiblir notablement le malade ; et comme ces écoulements ds sang se répètent assez fréquemment, ces malades deviennent bientôt anémiques, pâles, décolorés et blafards. Les croûtes peuvent se montrer sur toute la surface du corps à la fois ; mais, en général, elles se développent d'une manière discrète. Cette variété de rupia est très grave, attendu qu'elle est accompagnée d'une altération du sang. Ce liquide, dans cette maladie, a une fluidité tout à fait anormale : aussi est-ce l'une des formes les plus graves de rupia syphilitique.

Dans la troisième espèce de rupia, les croûtes qui se montrent surtout à la figure, au cou, représentent des champignons noirâtres plus ou moins saillants et dont quelques-uns paraissent comme

diculés ou rétrécis à leur origine. Mêmes ulcères d'ailleurs, mais aucoup moins larges. La croûte noirâtre fournit à sa base de la ppuration ichoreuse et noirâtre; et quant aux ulcérations, elles rent l'aspect des ulcères vénériens.

Enfin, la quatrième espèce présente ces caractères particuliers : qu'elle semble subir ces évolutions d'accroissement dans le même int ou dans deux ou trois points seulement de l'économie; qu'elle s'accroît de plus en plus sur les mêmes parties sans se produire et se répéter ailleurs; 3° qu'elle repose souvent sur une ostose; 4° que la croûte, irrégulière dans sa forme, est composée une sécrétion plus purulente, toujours un peu élevée au-dessus niveau de la peau et fournissant souvent du pus.

Telles sont les quatre variétés de rupia que j'admets. J'ajouterai à part la dernière que je viens de décrire, toutes sont plus ou ins liées à un état cachectique de l'économie, de sorte qu'elles lament des modifications en ce sens dans le traitement. Ce sont les syphilides les plus graves, celles qui résistent souvent à plurs médications antisyphilitiques et qui exigent parfois six, huit dix mois de traitement. Elles sont d'ailleurs souvent liées à des ostoses, des caries, des nécroses, et par conséquent nous appelons plus tard toute l'attention du praticien sur les médications i leur sont spécialement applicables.

Syphilides papuleuses. — Il en est deux variétés : l'une peut corspondre au lichen *simplex*, par le volume de ses papules et par siége ; l'autre au prurigo par son siége seulement. Dans la prière variété, il se développe à la partie interne des membres, sur cou, sur la figure, sur le devant de la poitrine, une série de pes papules coniques, dures au toucher, acuminées, d'un rouge lacé dès l'abord, mais sans démangeaison notable, ce qui n'a nais lieu avec le lichen, à moins qu'il ne soit aigu et dans le ment de son éruption. Ces papules, qui se caractérisent par leur leur sombre, se disposent pour la plupart en lignes elliptiques s dessinées. L'éruption syphilitique se montre quelquefois en gt-quatre heures dans tous les points qu'elle doit occuper ; mais, e fois développée, elle persiste là sans changer d'aspect pendant usieurs septénaires. Seulement, quelques-unes des papules se re-

couvrent d'une petite pellicule, qui, adhérente au centre, est détachée et libre à la circonférence. En voici un exemple :

Syphilide papuleuse. — Acné chronique simple. — B..... (Marie), blanchisseuse, demeurant rue de Vendôme, 75, 6e arrondissement, née à Paris, entrée le 12 février 1856. Cette fille, née de parents sur lesquels on n'a point de renseignements fâcheux et qui n'ont point eu de maladies de peau, est d'une bonne santé habituelle, d'un tempérament sanguin. Ses frères se portent bien; elle a toujours été réglée régulièrement et abondamment. — La peau de la face est grasse, huileuse; depuis l'enfance elle est le siége de pustules d'acné en petit nombre; mais il y a un an cette maladie prit de l'extension, et le front, le nez, les joues, le menton se couvrirent d'acné pustuleux à pustules de divers volumes, séparés par des intervalles rosés. Sur ces parties existent des cicatricules blanchâtres caractéristiques d'un acné déjà ancien. Le lendemain du jour de l'an de cette année, il lui survint à la lèvre supérieure un bouton qu'elle écorcha, qui grossit, s'étendit en surface de façon qu'il comprit l'étendue d'une pièce de vingt centimes sur le bord libre; au niveau de la partie médiane elle n'a pas remarqué d'engorgement bien notable des ganglions sous-maxillaires. Quinze jours après l'apparition de ce bouton, qui donnait peu de liquide mais qui avait amené un gonflement considérable de la lèvre, il fut cautérisé deux fois avec l'azotate d'argent. — Vers le premier février apparurent aux parties génitales, sur la partie muqueuse des grandes lèvres, deux pustules qui occasionnèrent des démangeaisons considérables. Elles disparurent au bout de dix jours sans avoir causé d'engorgement à l'aine. La malade assure n'avoir jamais eu d'écoulement vaginal, ou de flueurs blanches considérables.—Dans le temps où ces accidents apparaissaient, B.... souffrit de la gorge plus que d'habitude. Elle était en effet sujette à des gonflements des amygdales et on lui en avait enlevé une à l'âge de dix ans. Des coryzas fréquents l'avaient également tourmentée. Depuis le mois de janvier elle a le nez habituellement bouché et la respiration en est gênée.—Vers le premier février elle s'aperçut que des boutons apparaissaient dans le dos d'abord, puis sur diverses parties du corps, ils n'étaient le siége d'aucune démangeaison ; elle se détermina alors à entrer à l'hôpital. — On constate outre l'acné que nous avons noté et dont la marche n'a pas été modifiée, que la lèvre supérieure supporte une croûte noire considérable reposant sur un fond un peu induré. Du sang suinte par suite des explorations. Les pustules des parties génitales ont presqu'entièrement disparu. Les piliers du voile du palais et les amygdales sont le siége d'ulcérations irrégulières à fond grisâtre. — Sur le dos, la poitrine, le ventre, les bras et la partie supérieure des cuisses, existent de nombreuses papules rouge-brun, peu saillantes, sans induration ni démangeaisons, recouvertes à leur sommet qui est aplati de légères furfures blanches. On peut saisir en certains endroits des dispositions en arc de cercle produites par l'arrangement de trois ou quatre papules. Les plus volumineuses

ent le dos et le ventre. La partie interne des membres supérieurs en nte un grand nombre, la partie externe très peu ; sur les cuisses, c'est le aire. Elles diminuent de nombre à mesure que l'on se rapproche des es et cessent presque entièrement au niveau des genoux. — Prescription. pareille, sudorifique ; iodure de potassium 0,50 ; 2 pil. Dupuytren ; tions. — 4 mars. La croûte de la lèvre supérieure est tombée depuis peu, serve à sa place une ulcération grisâtre qui se rétrécit et saigne quand esse la lèvre. L'induration a presque entièrement disparu. Les règles pas cessé d'apparaître en même quantité qu'auparavant. La plupart des les ont disparu. Quelques-unes subsistent encore, dans le dos, sur la ine, le ventre, les fesses et la partie supérieure et externe des cuisses. este elles ne sont presque plus saillantes. La rougeur est infiniment dre et au doigt on ne les distingue guère qu'à une légère rugosité pro- par les furfurs. L'acné n'a subi aucun changement, il y a toujours rition successive de pustules et formation de points nombreux d'*acne tata*. Bains simples, pommade au sulfate de fer. — 27 mars. Les papules omplétement disparu. La lèvre est très nette, sans induration. La malade de l'hôpital. — 10 avril. B.... se présente à la consultation ; l'acné est ours le même, les papules ont reparu, mais moins rouges quoique pres- aussi abondantes que lors de la première éruption. Elles ont les mêmes ctères. La malade, qui avait un peu négligé son traitement, est arrivée à prendre exactement.

ans la variété de syphilide papuleuse qui correspond au pru-, l'éruption siége en dehors des membres et sur le dos, les ules sont beaucoup plus grosses que dans la forme précédente, s sont aussi moins acuminées et moins confluentes. Du reste, ne persistance et absence de démangeaison, en même temps lles ont une teinte cuivrée ou sombre beaucoup plus prononencore.

yphilides pustuleuses. — Une première variété correspond à é. Comme l'acné elle se montre par tout le corps, mais princiment à la poitrine, au dos, au visage ; comme lui elle a une che successive, de sorte qu'un bouton apparaît alors qu'un aust sur le point de se cicatriser ; comme lui, c'est d'abord une e de grosse papule ; au sommet de cette papule se forme peu à un petit point blanchâtre de suppuration qui se termine de x manières : ou la suppuration se résorbe en quarante-huit heu- ou elle se fait jour au dehors pour laisser une cicatrice qui se it très rapidement ; dès lors les phénomènes de suppuration

apparaissent et disparaissent très rapidement, tandis que les phénomènes d'induration de la pustule paraissent lentement et persistent longtemps : il résulte de là que la maladie est souvent prise pour une affection papuleuse. Enfin, pour compléter l'analogie ou plutôt la correspondance intime qui existe entre cette syphilide et l'acné, c'est que, comme dans cette dernière maladie, les boutons dont le pus s'échappe laissent une cicatrice *indélébile*. J'insiste sur ces rapprochements, parce qu'ils n'ont été faits par personne, et je nomme cette maladie *acné syphilitique*.

Vient ensuite l'éruption qui correspond à la maladie désignée sous le nom d'*impétigo*. On en peut trouver deux variétés, l'une correspondant plus ou moins imparfaitement à l'impétigo *sparsa* ou disséminé, l'autre tout à fait analogue à l'impétigo *figurata* ou confluent. J'avoue qu'il y a presque identité entre cette seconde espèce de syphilide et l'impétigo ; qu'il n'y a, au contraire, que des analogies assez éloignées entre la première et l'impétigo *sparsa*. En effet, la syphilide impétigineuse disséminée a plus de rapports avec la variole qu'avec l'impétigo. Les pustules sont beaucoup plus larges ; elles ont beaucoup plus d'engorgement à la base que dans l'impétigo où la vésicule purulente forme ordinairement les cinq sixièmes au moins de la pustule. Comme dans la varicelle, le début de l'affection est souvent précédé de symptômes généraux.

Dans la seconde variété d'impétigo syphilitique, dont personne ne peut contester l'existence, la maladie apparaît ordinairement sur un point assez limité et dans une superficie de quelques centimètres, formée de pustules confluentes qui donnent une sécrétion plus ou moins rapprochée de l'aspect du miel concret. Mais ce qui distingue l'impétigo syphilitique de l'impétigo ordinaire, c'est que cette croûte repose toujours sur une base plus ou moins engorgée, à teinte cuivreuse très prononcée, dont la forme tend à la ligne courbe, et qui est située au pourtour des ouvertures naturelles. Enfin, il est rare que l'impétigo syphilitique ne soit pas lié à quelque gonflement d'os, quelque carie ou ulcération ayant son siége dans les fosses nasales ou dans la gorge.

On trouve en troisième lieu une espèce de syphilide pustuleuse qui correspond à l'ecthyma syphilitique, maladie beaucoup plus

commune chez les enfants au voisinage de la naissance ou en bas âge, que chez les adultes ; on peut même dire qu'elle est rare chez l'adulte et très fréquente chez les nouveau-nés. Il est peu de médecins qui n'aient eu occasion d'observer cette affection. Elle apparaît un mois ou six semaines après la naissance, par une série de taches rouges placées aux fesses; au centre de ces taches s'élèvent de petites pustules à larges vésicules qui se remplissent rapidement de pus et qui en s'ouvrant laissent à nu une surface ulcérée superficiellement. Puis, çà et là sur les cuisses et les jambes, à la plante des pieds, à la paume des mains, se montrent des pustules nouvelles. Quelquefois un certain nombre se guérit pour faire place à d'autres, mais dans les points qui ont été malades, il reste une tache d'un rouge cuivré qui ne disparaît pas, qui indique tous les points qui ont été le siége du mal. Cette forme de syphilide est très insidieuse et j'ai souvent été consulté par des confrères sur l'étiologie du mal. D'ailleurs, les parents sont peu portés à faire connaître leurs antécédents, surtout lorsqu'il s'agit des parents du côté maternel.

Ainsi, comme on le voit, on retrouve encore dans la classe des affections pustuleuses les variétés de syphilides correspondant aux variétés de maladies cutanées.

Syphilides squameuses. Le psoriasis et la lèpre syphilitique sont généralement plus rares que les autres formes, en ce sens qu'elles occupent une aussi grande étendue et qu'elles s'observent avec des plaques malades aussi larges. Ces syphilides ont de plus leur cachet particulier, qui se déduit des trois caractères communs sur lesquels j'ai appelé l'attention dans mon article précédent. Ainsi, les affections squameuses ont généralement leur siége en dehors des membres et à la partie postérieure du tronc, si la maladie est générale ; et, si elle est locale, elle est toujours très circonscrite ; tels sont les psoriasis palmaire, plantaire et celui de la tête. La syphilide squameuse occupe moins la partie externe des membres que leur partie interne. — En second lieu, jamais les plaques de syphilide squameuse ne sont d'une grande largeur ; quand elles atteignent la dimension d'une pièce de cinquante centimes ou d'un franc, ce sont de larges plaques. Troisièmement, la couleur de la peau est d'un rouge beaucoup plus sombre. Quatrièmement,

les squames sont peu abondantes ; elles ne sont pas nacrées comme dans le psoriasis et la lèpre, elles sont plus ternes et ont une couleur et un aspect qui virent vers la couleur et l'aspect de la corne. Cinquièmement, quelle que soit l'étendue des plaques, elles sont toujours disposées en lignes elliptiques. Sixièmement, le développement du psoriasis se fait en général sur plusieurs points à la fois qui *sont toujours les mêmes ;* mais tandis que les autres formes de syphilides, la roséole exceptée, sont très communes à la figure, celle-ci l'est beaucoup moins; elle siége principalement sur les membres à l'instar du psoriasis. Il a donc ses lieux d'élection, ce qui ne s'observe pas pour la syphilide squameuse.

Il résulte de la réunion de toutes ces circonstances une sorte de cachet général pour le praticien, cachet qui éveille son attention et la dirige tout naturellement sur la cause première du mal. Il en est de même pour le *lepra vulgaris ;* toutefois, je n'hésite pas à déclarer que le diagnostic est beaucoup plus difficile dans ce cas. En effet, la lèpre n'a pas, comme le psoriasis, son point de départ aux coudes et aux genoux. Dans la lèpre franche, au début, c'est sur le dos et sur les côtés du tronc qu'elle se montre. Ajouterai-je que, dans quelques lèpres déjà anciennes, aux caractères ordinaires de cette maladie vient se joindre un des caractères généraux des syphilides, je veux parler de la disposition en lignes elliptiques. J'avoue que, dans un certain nombre de cas, j'ai souvent suspendu mon jugement à cet égard et que parfois je suis resté dans le doute.

Syphilide squameuse. — Gallie (Rosalie), âgée de vingt-sept ans, blanchisseuse, entre le 29 mars 1855 à l'hôpital Saint-Louis, service de M. Devergie, pour y être traitée d'une affection psoriasiforme datant d'un mois environ. Rien dans les antécédents de la malade qui puisse éclaircir le diagnostic. — Rosalie s'est toujours bien portée ; son hygiène est bonne. Pas un membre de la famille n'est affecté de maladie de ce genre. Elle a eu trois grossesses. Avortement à la seconde ; à la troisième, accouchement à huit mois, le 7 février 1855. L'enfant paraît bien portant, et ne présente rien de particulier à la peau. Il meurt quinze jours plus tard. Le 19 février, douze jours après ce dernier accouchement, la malade est prise de symptômes généraux, tels que malaise, inappétence, céphalalgie, mouvement fébrile. Éruption papuleuse qui acquiert, au bout de trois jours, son summum de développe-

: se montre successivement à la tête, au cou, sur le tronc et les
En même temps, apparition au pourtour de la bouche et du nez
: de pustules qui ne tardent pas à donner lieu, par leur rupture, à
on de croûtes jaunâtres. A en croire la malade, l'éruption a d'abord
ement papuleuse, et ce n'est que huit jours plus tard que les pa-
pris un aspect squameux. Rosalie nie toute espèce d'accidents syphi-
— Pas de traitement jusqu'au moment de son entrée à l'hôpital, le
1855. Examinée dans son ensemble, l'éruption se montre à nous
e de papules plus ou moins larges, plus ou moins saillantes, de cou-
, et couronnées de squames blanchâtres. Nous retrouvons en un
es éléments du psoriasis, à part cet état papuleux qui souvent, même
arqué par l'affaissement ou l'élargissement de certaines papules. —
a est générale. Comme caractère dominant, nous signalerons la dis-
e certaines papules en une ligne courbe elliptique. L'éruption pré-
outre un cachet particulier suivant qu'on l'examine dans telle ou
on. — Au cuir chevelu, et principalement à la partie médiane, ce
laques presque toutes confondues, et recouvertes de squames plus
que partout ailleurs. Les cheveux sont comme saupoudrés de cette
épidermique. A la face, les petites plaques squameuses sont groupées
s ouvertures naturelles, au pourtour des yeux, du nez, aux commis-
ales, à la base de la lèvre inférieure. On trouve de plus, dans cette
égion, des croûtes impétigineuses assez minces, d'un jaune sale, repo-
ne base légèrement engorgée. Sur les membres, l'éruption est exclu-
bornée aux plicatures. Rien à signaler du côté de l'extension. Quant
tères que présentent les squames, tantôt ce sont de petites pellicules
s au centre et libres à leur circonférence, tantôt de petits bourrelets
ques limitant la base de la papule et laissant le sommet découvert.
e se plaint depuis son entrée de mal à la gorge. A l'examen on ne
'une légère ulcération de l'amygdale gauche, l'autre est un peu
le ; M. Devergie diagnostique une syphilide squameuse. Il prend
: de son diagnostic : 1° cette disposition des papules en une légère
liptique, disposition que l'on ne rencontre pas dans le psoriasis de
spécifique ; 2° leur siége à la face ; 3° leur tendance à se montrer
our des ouvertures naturelles ; 4° leur confluence ; 5° leur présence
ures des membres ; 6° le peu de densité des squames, leur couleur
: mat et corné, leur mode d'insertion. Traitement : tisane sudorifique,
potassium, 0,5 ; deux pilules de sublimé à 6 milligr. ; bains sulfureux.
urs plus tard, le diagnostic se trouve doublement confirmé : 1° par
me de la malade, qui nous raconte qu'au troisième mois de sa gros-
t jours après un dernier coït, elle a vu apparaître un écoulement
ssez abondant. De plus, l'éruption a été précédée et suivie pendant
emps de douleurs névralgiques siégeant dans la région temporale ;
s modifications que le traitement antisyphilitique a produites dans

l'état général de l'éruption. Les papules affaissées ont pris à leur base une couleur cuivrée caractéristique. — 12 mai 1855. Aujourd'hui l'état papuleux a complétement disparu et ne laisse pour toute trace que des macules cuivrées. Le cuir chevelu est à peu près sain, à part sa teinte violacée. Il n'existe presque plus de sécrétion épidermique. Quelques papules à la région frontale, et à la commissure labiale gauche l'impétigo a laissé des traces noirâtres et comme ecchymotiques. — Il nous reste à signaler une nouvelle poussée de papules, datant de huit jours, sur les parties latérales du pli du bras. — 14 juin. Les papules se sont affaissées, et il ne reste plus que des macules. La malade quitte l'hôpital et continue son traitement chez elle.

Psoriasis syphilitique. — Hédieu Jeanne, vingt-neuf ans, cuisinière, rue Saint-Maur, 150, sixième arrondissement; née à Bunbronde, Puy-de-Dôme, fille. — Tempérament sanguin-bilieux; cheveux noirs; a été réglée à quinze ans. Depuis ce temps les menstrues ont toujours paru régulièrement. Petite vérole à six ans, fièvre typhoïde à vingt-huit ans. Ses parents, ses frères ou sœurs n'ont jamais eu de maladies de peau et se portent bien. Elle habite Paris depuis neuf mois. Aucun renseignement qui puisse mettre sur la voie d'une infection syphilitique. La gorge est saine, ainsi que les parties génitales. Flueurs blanches de temps en temps, ne tachant pas le linge en jaune ou en vert. — Il y a quatre mois une petite plaque de psoriasis apparut sur chacun des genoux. Peu à peu elle s'étendit et d'autres se montrèrent aux bras et aux jambes, mais en petit nombre; cet état dura environ deux mois. Alors eut lieu l'apparition de toutes les plaques que nous voyons maintenant. Elles débutaient par un bouton gros comme une tête d'épingle qui s'accroissait avec rapidité. Depuis d'autres petits points ont paru, mais ils n'ont pas acquis de développement. La malade en a remarqué qui sont stationnaires depuis quinze jours et plus. Elle n'a pas quitté son travail parce qu'elle ne pouvait plus s'y livrer, mais sur les avis d'un médecin qui l'a traitée quelque temps par des bains sulfureux, des lotions avec la décoction de feuilles de noyer et des tisanes. — 14 février 1856. On constate à son entrée un psoriasis discret, mais présentant quelques particularités. Les plaques siégent sur les membres inférieurs, sur le pubis, sur le ventre, mais en petit nombre; quelques-unes existent sur le dos, enfin sur les bras. Elles existent sur les membres du côté de la flexion et de l'extension, à la partie interne, comme à la partie externe, mais un peu plus nombreuses à la partie externe. La peau restée saine aux coudes est rude. Les plaques sont généralement arrondies, du volume d'une pièce de cinquante centimes à celui d'une pièce de cinq francs ou davantage. Quelques-unes n'ont plus la forme arrondie, mais on voit manifestement qu'elles résultent de la fusion de deux ou trois plaques voisines. Entre ces plaques existent des points écailleux gros comme une tête d'épingle et irrégulièrement disséminés. Il n'en est pas de même des plaques que l'on peut presque toutes rattacher à des systèmes de courbes à rayon variable.

Cette disposition arquée est remarquable sur les bras, sur les jambes et les cuisses, et est encore facile à apercevoir pour les plaques réunies. Au niveau des plaques la peau perd subitement sa couleur et son aspect normal. Elle devient d'un rouge foncé vif, ridée et couverte de squames épaisses, d'aspect plus corné que nacré. Elles sont jaunâtres, opaques, assez adhérentes, mais faciles à soulever avec l'ongle sans produire de douleur et sans laisser apercevoir d'érosion ou d'ulcérations. Jamais les plaques n'ont exhalé de liquide. Elles ne sont pas le siége de démangeaisons, excepté celles du pubis qui sont confluentes, mais la malade ressent souvent dans toutes une sorte de chaleur. La peau est légèrement épaissie à leur niveau. Le doigt apprécie facilement leur relief. Les écailles se reproduisent en deux ou trois jours et sur les plaques réunies indiquent pendant environ dix jours la trace des plaques primitives par leurs rayons. Aux genoux les squames sont très épaisses, fendillées et l'on n'y trouve pas la forme arrondie que nous avons signalée ailleurs. On remarque sur le sujet, sur le dos de la main gauche, quelques traces de brûlures datant de trois semaines, qui se sont couvertes de squames et ressemblent à des plaques de psoriasis primitif, mais à fond moins rouge. — Prescription. Tisane sudorifique ; iodure de potassium 0,50 ; deux pilules sublimé 0,006 ; trois portions. — 14 mars. La couleur a diminué d'intensité, pas de nouvelles plaques. Celles des genoux occasionnent de la souffrance en se fendillant. — 13 avril. La couleur est maintenant rose pâle. Les squames se reproduisent en petite quantité et lentement. Le centre de la plupart des plaques est sain et la peau y a repris son aspect normal. Les plaques sont peu élevées au-dessus de la peau environnante et elles ne signalent plus leur présence que par une sorte de liséré circulaire. Huile de cade pure sur les liserés squameux. — 3 mai. Les derniers points squameux ont disparu. On peut encore deviner la place qu'occupaient quelques-unes des plaques psoriasiques à la teinte légèrement rose qu'elles présentent, mais beaucoup ont complétement disparu sans passer par la couleur bistre ou brunâtre qui suit le traitement arsenical. La peau a partout repris sa souplesse et son épaisseur normales. Exeat.

Il n'en est pas de même des syphilides locales qui correspondent aux psoriasis locaux ; ici, dans le siége, soit à la main, soit à la plante des pieds, soit ailleurs, il y a des dispositions toutes paticulières de plaques qui contrastent avec l'état normal du psoriasis circonscrit : elles ont une tendance à l'état corné qui met sur la voie d'un diagnostic exact. J'en dirai autant de la syphilide squameuse de la figure ; à part la racine des cheveux, le psoriasis est si rare à la face, que tout d'abord le soupçon d'une syphilide squameuse naît dans l'esprit du médecin. C'est donc, en résumé, un examen d'ensemble qu'il faut faire pour arriver à porter un diagnostic certain.

Syphilides chromateuses. — Les taches syphilitiques ne sont pas rares ; elles répondent aux pityriasis *versicolor* et *nigra*. C'est encore là une variété de syphilides qui présente assez fréquemment des difficultés de diagnostic. Ici il faut appeler à son aide plusieurs circonstances dont je vais faire mention. Le pityriasis est souvent lié à une peau brune, à un tempérament plus ou moins bilieux ; la syphilide chromateuse affecte tous les individus indépendamment de ces deux conditions. L'évolution des taches de pityriasis se fait d'une manière lente, graduée, elle emploie beaucoup de temps pour se multiplier et s'étendre ; dans la syphilide chromateuse ou *pityriasis versicolor* et [illegible] ues, l'éruption des taches est rapide et tout d[illegible] nt en général dans les points qu'elles doiven[illegible] tyriasis ordinaire, ces taches, quand elles surviennent vite, sont accompagnées de démangeaison ; le malade est porté à opérer des grattages, et, quand ils ont lieu, la surface tachée se recouvre [illegible] une poussière farineuse adhérente à la surface malade. [illegible] emblable dans la syphilide chromateuse : la tache se n[illegible] démangeaison, elle ne se couvre pas de pellicules. Quant au siége des taches, il est souvent le même dans les deux cas ; mais ce qui facilite surtout le diagnostic, c'est la circonstance de pityriasis à la figure, car dans ce cas les taches occupent le pourtour des ouvertures naturelles.

Faut-il rapporter au *pityriasis nigra* syphilitique la lèpre noire de Willan ? Biett était tout à fait de cet avis, et j'avoue que je le partage, car il est constant que la coloration des taches est beaucoup plus foncée dans le pityriasis syphilitique que dans le pityriasis ordinaire.

Syphilides tuberculeuses. — Il me faut encore parler des syphilides tuberculeuses qui sont si communes. J'insiste sur les moyens de diagnostic, parce que c'est là l'élément et le point de départ du traitement, et malgré le soin que je cherche à apporter dans ces descriptions, je crains bien d'être encore tout à fait insuffisant. Il est des faits que l'on ne peut pas peindre, ou pour lesquels il faut un talent de description qu'il n'est pas donné à tout le monde de posséder.

Cette forme de syphilide est très grave sous un autre point de

vue : c'est qu'elle affecte le plus souvent le visage et le voisinage des ouvertures naturelles, en sorte que, même après la guérison, elle laisse des traces indélébiles de son passage. Au surplus, les détails dans lesquels nous allons entrer feront mieux connaître les conséquences de cette maladie.

Disons tout d'abord que s'il y a lieu de la comparer à une autre affection non syphilitique, c'est avec le *lupus* qu'elle a le plus d'analogie, et cette analogie est telle que l'on confond souvent ces deux maladies entre elles, surtout quand elles ont leur siége sur le tronc. Or dans la classe des maladies tuberculeuses on comprend encore la mentagre. Celle-ci peut être syphilitique comme toutes les autres maladies cutanées, ainsi que nous en citons un exemple ; mais la syphilide tuberculeuse est quelque chose de tout spécial. Voici toutefois une observation de mentagre syphilitique spéciale.

Mentagre syphilitique. — Depuis un an qu'il a sa maladie, X..., conducteur de voitures de remises au voisinage de MM. Ricord, Natalis Guillot, Tardieu, a pu les consulter sur son affection ; mais on n'a pas reconnu la physionomie de cette mentagre. — Série de tubercules sur les deux joues, la lèvre, le menton ; mais je fus frappé de la disposition elliptique de ces tubercules. Pommades, cataplasmes, bains, douches de vapeur, rien n'avait fait. — Traitement : tisane sudorifique ; sirop d'iodure de fer, d'iodure de potassium, de bichlorure. — Après un mois, 29 juillet, les trois quarts de l'affection sont guéris sans aucune application extérieure. Ce traitement a été continué pendant trois mois. Ainsi s'il y a eu dans cette mentagre un cryptogame, le traitement spécifique l'a entièrement détruit par sa seule influence de l'intérieur à l'extérieur. La guérison du malade a été parfaite dans le laps de temps indiqué.

Quoi qu'il en soit, les syphilides tuberculeuses présentent plusieurs formes. Il en est deux principales : la forme tuberculeuse sans ulcération et la forme ulcéreuse. Dans la première, la maladie parcourt toutes ses périodes sans donner lieu à aucun produit morbide, si ce n'est quelques squames ; dans la seconde, au contraire, le tubercule s'excorie à son centre, s'ulcère, et cette ulcération fournit une sanie purulente qui découle continuellement de la plaie, ou donne lieu à une sécrétion morbide, sanieuse et purulente, mais qui se concrète sous forme de croûtes. Dans le premier cas, il en résulte des ulcé-

rations *térébrantes* ou perforantes, et dans la seconde des ulcérations serpigineuses. (Voy. planche 5, syphilides.)

Quoi qu'il en soit de ces divisions, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, toujours est-il que la marche de l'affection est bien différente. Néanmoins, dans ces diverses formes, c'est l'engorgement qui fait le cachet du mal et qui en établit la distinction. Or l'engorgement se montre toujours primitivement sous la forme d'un bouton induré plus ou moins large, isolé, ou suivi de l'éruption d'un ou de plusieurs autres boutons auxquels on donne le nom de *tubercules*.

Dans l'hypothèse où la forme tul[illegible]culeuse n'est pas ulcéreuse, rarement il existe un tubercule i[illegible] Le plus souvent plusieurs tubercules se développent soit succes[illegible]vement, soit en même temps, et ils se disposent alors sous la forme [illegible]lliptique, comme dans toutes les syphilides.

On a cherché à établir des variétés par rapport au volume de ces tubercules, les uns se rapproc[illegible] de celui d'un pois, les autres de celui d'une noi[illegible] [illegible]lume importe peu et ne nous paraît pas suffis[illegible] [illegible] des variétés ; ce sont tout au plus des nuances de volume, sans intérêt d'ailleurs au point de vue pratique.

Ces divers tubercules sont d'un rouge brun, leur couleur ne varie pas ; ils siégent au pourtour du nez, de la bouche et des yeux, ou bien ils se montrent sur le dos et sur le devant de la poitrine ; ils persistent là d'une manière indolente pendant des mois entiers sans faire de progrès sensible ; ils se recouvrent seulement de quelques squames ou écailles fort adhérentes d'ailleurs, qui paraissent ne pas se renouveler ou dont la chute est très lente : de sorte que des malades gardent quelquefois cette affection pendant des mois et même plus d'une année sans que la maladie ait fait des progrès très rapides, soit en surface, soit en épaisseur.

Comme le voisinage du nez et le nez lui-même sont fort souvent affectés, on est porté à rapporter le mal à une cause scrofuleuse. C'est l'idée de *lupus* qui frappe tout d'abord dans quelques cas, parce que les soupçons de syphilis ne naissent presque toujours qu'en dernier.

Dans la forme tuberculeuse et ulcéreuse à la fois, il y a lieu

l'établir une grande différence entre les variétés de tubercules rébrants ou perforants et les tubercules serpigineux. Parlons l'abord des premiers.

C'est la variété la plus terrible par les désordres qu'elle cause; lle se montre : le plus souvent sur le nez ou sur la lèvre supéieure ou dans le voisinage de l'un et de l'autre, quelquefois sur le ront ; elle apparaît par une élévation arrondie plus ou moins large, t au centre de laquelle se manifestent une on plusieurs vésicules u pustules qui se crèvent et sont la source d'une ulcération. Cette lcération fait des progrès, s'élargit et gagne de la profondeur ; elle étruit les parties molles, s'étend aux os et en détermine la carie. lors on voit, soit une aile du nez, soit l'extrémité de cet organe, éformée, diminuée de volume par la perte de substance. Peu à eu le mal fait des progrès en profondeur, la carie s'étend à la cloion du nez, aux cornets, à la voûte palatine ; elle établit bientôt ne communication entre les fosses nasales par une perforation de ı voûte palatine, postérieure à la perforation de la cloison du nez. n un mot, tous les ravages que les affections cancéreuses peuvent roduire.

Dans la syphilide tuberculeuse et ulcéreuse, mais serpigineuse, e n'est plus ordinairement le même siége. C'est presque toujours ar des parties saillantes, arrondies, pourvues de graisse, que la aladie se développe : ainsi, les deux joues, le front, le menon, le dos ou les lombes, le devant de la poitrine et notamment es seins. La forme tuberculeuse se montre d'abord, puis l'ulcéraon survient et s'étend en ellipse toujours en s'agrandissant, et a laissant naître parfois à son centre des cicatrices comme dans le upus qui ronge en surface. Cette circonstance rend le diagnostic ès difficile dans ses sortes de cas ; et souvent on a vu des médeins prendre pour syphilides ce qui n'était qu'un *lupus* et *vice versâ*.

Quelle influence les syphilides exercent-elles sur la constitution et r le moral des individus, et quelle en peut être l'issue lorsqu'elles nt abandonnées à elles-mêmes? Cette question est importante au oint de vue des conséquences des syphilides. Bon nombre de ces ffections peuvent disparaître sans traitement, mais elles laissent lors presque toujours des taches ou une coloration plus ou moins

foncée de la peau, telle, en un mot, que cette enveloppe ne reprend pas sa blancheur primitive ; c'est ce qui a lieu pour les syphilides exanthémateuses et eczémateuses. Les syphilides papuleuses qui disparaissent après un traitement antisyphilitique, laissent souvent des taches à la place occupée par les papules, à plus forte raison quand la syphilide disparaît spontanément, ce qui n'a guère lieu que par suite d'un état morbide général, une fièvre grave ou toute maladie de ce genre.

Le rupia syphilitique et les syphilides tuberculeuses ne guérissent jamais spontanément. La première de ces affections exerce sur l'économie deux sortes d'in[illegible] une s'exerce sur le physique et l'autre sur le moral ; ta[illegible] seconde ne s'exerce que sur le moral. Tous les individus [illegible]e *rupia* plus ou moins général tombent, après un certai[illegible] temps, dans un état de faiblesse et de prostration marq[illegible] n'est cependant pas l'abondance de la suppuration [illegible]e résultat, car dans le plus grand nombre de cas la s[illegible] est assez peu considérable pour se concréter et se fo[illegible] er[illegible]ailles. Faut-il admettre qu'il existait chez l'individu affecté une prédisposition au rupia qui a fait que la syphilide venant à surgir à la peau, elle s'est montrée sous cette forme ? J'avoue que je ne saurais expliquer autrement ce qui fait que chez tel sujet la syphilide est papuleuse, tuberculeuse chez un autre, pustuleuse chez un troisième, et que sous ce rapport toutes les conditions de développement auxquelles sont soumises les maladies de la peau doivent aussi exercer leur influence, lorsque doit apparaître une syphilide. Toujours est-il que l'on peut regarder comme constant le dépérissement rapide des individus affectés de *rupia* syphilitique, si l'on ne porte pas remède à cette affection.

Quant à l'influence morale, elle est généralement très puissante ; la surface de la peau a pris un aspect tellement hideux, qu'il faut une abnégation de soi-même qui se rapproche de l'incurie ou de l'abrutissement pour ne pas souffrir moralement plus encore que physiquement.

Ces deux sortes d'influence ne se font pas sentir au même degré pour les syphilides tuberculeuses. D'abord elles sont en général

très limitées, très circonscrites. Ensuite, elles affectent de préférence des sujets d'un tempérament lymphatique, et par conséquent plus phlegmatiques et plus insouciants; ensuite elles ne donnent que peu ou point de suppuration. Mais d'un autre côté, elles siégent principalement à la figure; elles changent profondément la physionomie; elles vouent sous ce rapport à une séquestration complète l'individu qui en est atteint; et l'on conçoit combien chez la femme, par exemple, c'est une cause de chagrin.

J'ai insisté sur ces diverses circonstances parce que le médecin, dans le traitement de ces affections, doit les prendre en considération, d'une part pour proportionner la dose et le choix de ses médicaments à l'état du malade, d'une autre part pour l'hygiène à faire observer durant un traitement si long.

Enfin, pour compléter ce qui concerne les syphilides au point de vue du diagnostic et de la marche de la maladie, nous rappellerons que conjointement avec elles se montrent souvent un ou plusieurs des quatre phénomènes suivants : 1° des douleurs nocturnes; 2° la chute des cheveux; 3° une certaine coloration toute particulière du voile du palais et des amygdales; 4° un engorgement des ganglions de la région postérieure du cou près la racine des cheveux. Quant aux douleurs nocturnes, je ne m'y arrêterai pas, j'énoncerai seulement ce fait que, si elles accompagnent le plus souvent les exostoses, elles peuvent se montrer indépendamment de cette maladie des os.

La chute des cheveux a cela de remarquable qu'elle s'opère sans douleurs, sans démangeaison, sans pellicules; elle survient peu à peu et ne fait que s'accroître. Tous les matins en se peignant, même au démêloir, des cheveux tombent; ils s'enlèvent même en passant la main dans la chevelure. C'est là un phénomène très communément observé chez les personnes atteintes de syphilides.

L'état de la gorge est tout particulier; il semble que l'extrémité de la luette et le bord libre des piliers du voile du palais soient le point de départ d'une rougeur sombre qui va en s'irradiant sur les parties latérales, de sorte qu'il en résulte une arcade d'un rouge brunâtre, persistante, sensible à l'œil à tous les moments de la journée, n'incommodant pas le malade, n'amenant pas de difficultés

dans la déglutition et ne produisant, en fait de sensation, que le sentiment d'une sécheresse plus ou moins grande.

M. Ricord a fortement insisté dans ces derniers temps sur l'engorgement de quelques ganglions en haut et en arrière du cou. J'y attache, pour mon compte, peu d'importance, parce que j'ai trop souvent observé ce phénomène chez des individus qui n'étaient pas syphilisés.

Ces divers caractères, existant isolément ou dans leur ensemble, contribuent puissamment, dans quelques cas douteux, à fixer l'opinion du médecin sur la nature du mal.

Enfin, il me reste à dire quelques mots sur l'issue et les conséquences des syphilides avant d'en aborder la thérapeutique. Il est constant qu'aujourd'hui on ne voit plus de désordres graves aussi fréquemment qu'on l'observait autrefois, et par ce mot je n'entends pas une époque bien éloignée de nous, je veux parler de trente à quarante ans au plus. Alors il n'était pas rare de rencontrer dans les salles exclusivement destinées au traitement des maladies vénériennes bon nombre de malades chez lesquels on retrouvait tubercules, ulcérations, exostoses nombreuses, caries, nécroses, phénomènes qui siégeaient plus particulièrement à la face, mais que l'on voyait aussi très souvent sur les membres. La plupart de ces malades périssaient au bout de quelques années dans un état d'amaigrissement, de faiblesse et d'épuisement, parce qu'il arrivait une époque où, après des traitements répétés, l'estomac et les intestins ne remplissaient plus leurs fonctions; c'est encore la fin de quelques malades affectés de syphilides graves, et notamment de *rupia* ou de tubercules ulcérés avec nécroses sur une certaine étendue du corps. Il arrive chez quelques-uns de ces malades, qui ont ordinairement subi de nombreux traitements, soit au mercure, soit à l'iodure de potassium, mais principalement au mercure, il arrive, dis-je, un épuisement général en vertu duquel aucun médicament ne peut plus être supporté, si surtout ces médicaments sont donnés à doses qui ne sont pas assez fractionnées, et alors surviennent l'anorexie, la diarrhée, qui conduisent peu à peu le malade au tombeau.

Si les exemples de résultats aussi fâcheux sont aujourd'hui très

res, cela tient, je crois, à deux causes : c'est que le mercure est ministré moins souvent, et que surtout il est donné à dose beaucup moins élevée. J'aurai cependant à signaler dans le cours de thérapeutique un abus du même genre, qui semble renaître avec mploi d'un nouveau composé mercuriel, mais je ne veux pas ticiper à cet égard. A ces deux causes, il faut joindre une hygiène ujourd'hui mieux appropriée aux traitements mercuriels. On peut suite considérer les doctrines de Broussais comme ayant conduit s médecins de notre époque à une thérapeutique plus rationnelle s affections syphilitiques.

Thérapeutique. — Nous abordons actuellement la partie la plus nportante de l'histoire des syphilides, c'est la thérapeutique. Elle ige quelques développements. Nous ne croyons pas devoir nous nner à retracer la méthode ou les moyens que nous mettons le us souvent en usage dans le traitement des syphilides ; il faut que généralité des moyens conseillés jusqu'à ce jour soit de notre rt l'objet d'un contrôle qui justifie notre méthode thérapeutique. ous ferons donc une revue des principaux d'entre eux en leur signant une valeur donnée, puis nous indiquerons ceux auxquels ous donnons la préférence, avec les modifications que nous leur isons subir dans les applications journalières de notre pratique.

Toutes les fois qu'il s'agit de thérapeutique en fait de maladie philitique, le premier médicament qui se présente à la pensée, st le mercure. Mais ce médicament peut être employé sous des rmes bien différentes, et d'ailleurs il est rejeté par un certain nombre de praticiens, lorsqu'il s'agit d'accidents tertiaires et même accidents secondaires de la syphilis. Pour nous, nous déclarons ut d'abord que loin de le répudier dans ces sortes de cas, nous mployons presque constamment, à moins qu'il ne nous soit démontré que le malade en a usé pendant un temps suffisant et à des ses telles, qu'il ne serait plus rationnel de le mettre en usage. est assez dire qu'il forme la base de tous les traitements que nous isons suivre à nos malades lorsqu'il s'agit de combattre des philides.

Or on peut avoir mal usé du mercure de beaucoup de manières. ussi un malade s'est adressé à une mauvaise préparation, dont les

effets sont incertains; il en a pris tout à coup une dose élevée : des accidents de salivation sont survenus; on a interrompu le traitement. On y est revenu plus tard ; mais plus tard aussi la salivation se reproduisant, on a abandonné le mercure, se fondant sur ce principe combattu d'ailleurs par Cullerier oncle, que la salivation est l'indice de la saturation mercurielle; que c'est elle qu'il faut atteindre pour obtenir une guérison, principe qui était en faveur parmi les médecins des siècles précédents.

C'est là, pour dire tout de suite notre manière de voir, une idée tout à fait fausse : suivant nous. la salivation ne prouve pas la saturation mercurielle; c'est un phénomène local résultant de l'influence particulière que ce métal exerce sur les organes salivaires. Il est en effet démontré aujourd'hui que la salive de ces sortes de malades ne contient pas de mercure, et que ces expériences, qui tendaient à constater sa présence dans ce liquide, sont fausses dans leurs résultats; que les malades ne blanchissent pas les pièces d'or parfaitement décapées que l'on fait séjourner de douze à vingt-quatre heures dans la bouche C'est donc une action toute spéciale; mais cette action exerce une telle influence sur l'économie, qu'elle porte atteinte à la santé, qu'elle prédispose à une salivation nouvelle par la moindre dose de mercure, et qu'elle s'oppose ainsi à la continuation d'un traitement devenu nécessaire.

Tel autre malade aura pris du mercure pendant huit à dix jours, il aura cessé ce médicament durant un laps de temps plus ou moins long pour le reprendre ensuite; en un mot, il n'aura pas fait un traitement régulier. Un troisième aura vu disparaître les accidents après un mois ou cinq semaines de l'usage des préparations mercurielles, il se sera aussitôt arrêté. Un quatrième aura pris une composition infidèle de sa nature, etc.

Or il est des accidents syphilitiques secondaires ou tertiaires qui ne peuvent être guéris qu'après trois, cinq, six et huit mois de l'usage du mercure, et ce n'est qu'avec une grande persévérance dans l'emploi de ce médicament que l'on parvient à obtenir une guérison à l'abri de récidives. Mais il ne suffit pas d'employer longtemps cet agent thérapeutique, il faut surtout s'adresser à une bonne préparation. C'est à ce point de vue que nous allons

isager les divers composés mercuriels le plus généralemen ployés.

tablissons d'abord que le but qu'on se propose c'est de porter s le torrent de la circulation un agent médicamenteux ; que l'on indra d'autant plus facilement ce but que cet agent sera de sa ure dans des conditions faciles d'absorption ; qu'il pourra être é de telle sorte que rien n'échappe pour ainsi dire à l'absorption, que l'on sache quelle dose de principe médicamenteux on admitre au malade.

r on a préconisé et l'on préconise aujourd'hui des composés olubles de mercure, c'est-à-dire ceux qui sont dans les condis les moins favorables à l'absorption ; exemples : le mercure à at d'onguent mercuriel, le calomélas, le mercure soluble lahnemann et le proto-iodure de mercure.

Non-seulement ces composés sont insolubles, mais encore pluars d'entre eux, loin d'avoir une composition franche et tours fixe, constituent des mélanges variables dans leur composi-. Cette dernière observation est justement applicable au composé , est aujourd'hui le plus généralement employé, le proto-iodure mercure ; ce composé doit probablement sa faveur aux succès que ment certaines préparations d'iode dans le traitement de la sylis. Les praticiens ont été portés à attacher une grande importance tte association de l'iode et du mercure, sans réfléchir que ces deux stances sont solubles et très facilement absorbables lorsqu'on les me chacune isolément à certains états de dissolution : à l'état de nbinaison, ils forment un composé insoluble dans lequel nonlement les propriétés de l'iode et celles du mercure sont en ade partie neutralisées, et par conséquent sans effet ; mais encore s constituent un composé insoluble qui, s'il est absorbé comme a lieu de le croire, ne peut l'être que dans une très faible portion et de telle sorte que le médecin ignore absolument s quel rapport cette absorption s'effectue. La preuve de cette rtion existe dans ce qui se passe généralement lorsqu'on admitre le proto-iodure. C'est une des préparations mercurielles que n donne à plus haute dose, et si l'on n'atteint pas cette dose éle-, la médication est sans effet. Or si l'on est obligé d'administrer

de 5 à 10, et quelquefois 15 centigrammes de proto-iodure par jour, tandis que l'on donne pour obtenir le même effet 8 à 12 *milligrammes* de sublimé, il est évident que l'absorption est toute différente dans les deux cas.

Mais il y a plus: le proto-iodure est un des composés mercuriels qui donnent le plus souvent lieu à la salivation. Cette circonstance tient à deux causes : la première, c'est que l'on est obligé de donner de fortes doses de proto-iodure; la seconde, c'est que ce médicament, par le fait même de sa préparation, est souvent mêlé à un sel *soluble* de mercure, s'il n'a pas été parfaitement lavé et dépouillé de ce sel par le lavage. Quoi qu'on ait dit à cet égard, je soutiens que la salivation est très communément observée avec le proto-iodure de mercure, et qu'elle ne se montre que bien rarement lorsqu'on emploie un sel soluble de mercure et qu'on l'emploie avec ménagement.

Il est vrai que le proto-iodure de mercure ne saurait encourir les reproches que l'on a faits à certaines préparations mercurielles, le sublimé par exemple, celui de donner lieu à des douleurs d'estomac, d'apporter du trouble dans la digestion, et même d'exercer une influence fâcheuse sur les poumons. Mais, à quelle époque a-t-on adressé ce reproche au sublimé? Dans un temps où ce composé mercuriel était prescrit sans ménagement ; où il était donné jusqu'à 25 milligrammes et même jusqu'à 5 centigrammes par jour; quand il était surtout pris à l'état de liqueur de Van Swieten, de sorte qu'il exerçait directement toute son influence sur la membrane muqueuse stomacale. Mais aujourd'hui que les praticiens sont plus sobres de mercure, aujourd' hui qu'ils en atténuent les doses, on ne voit que bien rarement les accidents qu'on reprochait autrefois au sublimé. Ainsi le proto-iodure de mercure n'offre plus aucun avantage sur le sublimé sous le rapport des accidents gastriques; il présente des inconvénients très marqués au point de vue de la salivation qu'il fait naître souvent, et surtout en raison des variétés qu'il offre dans sa composition, et qui par cela même en constituent un remède d'un effet incertain entre les mains du médecin. Pour nous, nous n'employons jamais le proto-iodure de mercure, parce que la matière médicale a à sa disposition des composés mer-

riels plus sûrs et ne présentant pas les mêmes inconvénients que lui.

J'adresserai une partie des mêmes reproches aux autres composés solubles de mercure. Ainsi le mercure métallique donné à l'état de pilules mercurielles, le calomélas administré par les praticiens, soit en pilules, soit en frictions, et dont l'emploi est d'ailleurs presque abandonné, etc.

Ce qui, suivant moi, doit guider le praticien lorsqu'il s'agit d'un médicament destiné à être absorbé et à entrer dans le torrent de la circulation, et notamment du mercure dont l'excès exerce sur l'économie une influence fâcheuse, ce sont les règles suivantes. Il est constant qu'il suffit de doses excessivement faibles de mercure introduites dans la circulation pour obtenir des effets puissants; mais il est impossible de préciser, même par l'observation, la dose de mercure qui doit être absorbée. D'une autre part, le mercure n'exerce pas seulement des effets fâcheux sur l'économie en général, mais exerce encore sur les organes dans lesquels on l'introduit, de sorte que pour faire pénétrer le mercure dans le torrent de la circulation il faut éviter deux écueils, l'administration d'une trop grande quantité de mercure à la fois, et l'emploi d'un composé mercuriel et d'un excipient qui le laisse à nu sur les surfaces avec lesquelles il se trouve en contact par le fait de son administration. Nous avons rejeté les composés mercuriels insolubles, parce qu'on sait qu'ils sont peu absorbés, qu'on est obligé d'en administrer de trop fortes doses, et que, dans le cas de préparations mal faites ou dans certaines conditions accidentelles de l'estomac et des intestins, ces composés insolubles peuvent être transformés en combinaisons solubles.

Nous rejetons aussi les composés solubles, administrés dans un véhicule inerte qui leur sert de dissolvant sans diminuer leur intensité d'action et sans s'opposer à leur effet local ; restent donc les composés solubles que l'on enveloppe de telle sorte qu'ils sont en état de parcourir peu à peu le tube intestinal de manière à n'être mis à nu que graduellement. Ainsi, aux composés mercuriels insolubles, tels que le mercure métallique à l'état d'onguent, le protoiodure, le deuto-iodure de mercure, le calomélas, nous joignons

comme devant être rejetée la liqueur de Van Swieten. Nous admettrions plus volontiers les sirops mercuriels, et notamment le sirop de Larrey, parce que le sublimé y est enveloppé et associé à des extraits amers; mais nous préférons de beaucoup le sublimé associé à des extraits amers et donné à l'état pilulaire, comme l'ont formulé Dupuytren et plusieurs autres praticiens, parce que dans l'état pilulaire nous trouvons la condition d'une action qui n'est pas limitée à l'estomac, mais qui s'étend à une surface plus ou moins grande du tube digestif. Et quant à cette idée d'action multiple d'iode et de mercure, soit dans un composé insoluble, soit dans un composé soluble de mercure, nous dirons qu'elle est *tout entière imaginaire;* que le praticien qui veut obtenir les deux effets doit administrer isolément les deux substances, parce qu'une fois à l'état de combinaison, les propriétés de l'une et de l'autre sont plus ou moins neutralisées, et les effets sont par conséquent de nulle valeur ou à peu près.

Mais il me reste, en terminant l'exposé de mes idées sur l'emploi des préparations mercurielles dans le traitement des accidents syphilitiques, à établir un principe dont le praticien sage ne doit jamais se départir : c'est d'associer constamment l'opium au mercure, quelle que soit la combinaison mercurielle que l'on emploie. Comment agit l'opium, nous l'ignorons, mais il est constant qu'il modifie l'influence du mercure et qu'il s'oppose aux effets fâcheux de ce médicament; on en trouve la preuve dans cette circonstance que l'on guérit quelquefois les accidents qui ont résisté à de fortes doses de mercure, surtout ceux qui ont été accrus par des doses exagérées de ce métal, en administrant l'opium seul : c'est ce que bon nombre de praticiens sont à même d'observer tous les jours.

J'ai cherché à établir que le mercure était l'agent le plus puissant pour combattre ces maladies; que partant de cette idée que les préparations d'iode jouissent d'une certaine efficacité dans la thérapeutique de cette maladie, les médecins avaient été conduits, mais à tort, à donner aux iodures de mercure une certaine préférence sur les autres préparations mercurielles, parce qu'ils ont pensé que ces composés agissaient en vertu de l'iode et du mercure qui les constituent, sans réfléchir que dans ces deux composés insolubles, les

propriétés de leurs éléments se neutralisaient de manière à former un composé nouveau d'une énergie bien moindre : semblable en cela à de l'acide sulfurique et à de la soude caustique que l'on associe et qui ne donnent plus naissance qu'à un sel purgatif, le sulfate de soude. J'ai combattu l'usage de ce médicament, parce que l'on est obligé d'en exagérer les doses, qu'il donne souvent lieu à la salivation, et que d'ailleurs sa composition n'est pas toujours la même. A l'appui de ce que je disais, je puis ajouter un fait significatif : c'est que M. Dublanc, pharmacien des hôpitaux de Paris, voyant la composition si variable de proto-iodure de mercure, a ajouté aux nombreux procédés déjà proposés pour sa préparation un procédé nouveau qui en fait un corps plus identique pour l'usage de la pharmacie. Aussi est-ce en présence de ces faits que j'ai conseillé l'usage du sublimé, dont je me suis toujours servi dans la pratique, et qui ne m'a jamais offert d'inconvénient quand il est associé à l'opium.

Après les préparations mercurielles vient naturellement s'offrir l'*iodure de potassium*. Nul ne saurait contester à ce médicament son efficacité dans un bon nombre de cas, et notamment lorsqu'il est employé après un traitement mercuriel prolongé, ou qui n'a pas complétement guéri les accidents. Tous les praticiens sont d'accord sur ce point, que l'efficacité de l'iodure de potassium se dessine d'autant plus qu'un traitement mercuriel antérieur a donné moins de résultats.

C'est ce fait si généralement admis qui m'a dirigé dans le choix d'un traitement *mixte*, traitement devenu presque banal dans mon service à l'hôpital et dans ma clientèle, parce qu'il me donne les résultats les plus satisfaisants. J'y ai joint pour le compléter les sudorifiques, et voici comment je prescris son usage.

Le matin à jeun, et le soir, trois heures après le repas, un verre de tisane sudorifique faite à raison de 20 à 25 grammes de chacun des quatre bois pour 1,000 grammes d'eau à faire bouillir pendant six minutes à un quart d'heure. Ajouter dans le verre de tisane du matin et dans celui du soir une cuillerée à bouche d'une liqueur composée d'eau : 500 grammes, et d'iodure de potassium, 8 à 10 grammes. Une heure après le verre de tisane du matin et une

heure après celui du soir, prendre en même temps qu'un demi-verre d'eau sucrée une pilule contenant : extrait de gaïac, 20 centigrammes; extrait thébaïque, 12 milligrammes; sublimé, de 4 à 5 ou à 6 milligrammes, suivant la force des sujets. Il est même des cas où je ne prescris que 3 milligrammes de sublimé par pilule. Aujourd'hui je fais même prendre la pilule en même temps que le verre de tisane additionnée d'iodure de potassium.

Dans cette manière d'administrer l'iodure de potassium d'une part, le mercure de l'autre part, et enfin les sudorifiques, on place les malades dans les conditions les [illegible]us favorables en leur donnant les trois médicaments qui c[illegible] e plus de succès.

Mais, objectera-t-on, vous les [illegible]z à dose tellement faible, que leur influence ne doit s'exercer que d'une manière très peu puissante : ainsi, c'est à l'état de con[illegible]tration qu'agissent les sudorifiques, soit en décoction aqueuse, soit en essence, soit en sirop, soit en rob. A cela je répondrai que le charlatanisme a une grande part dans toutes ces préparations, et qu'elles ont eu ou qu'elles ont encore une réputation plutôt assise sur leur nom que sur leur composition réelle.

J'ajouterai que l'estomac supporte mal, en général, les sudorifiques à l'état de concentration ; que très souvent je remédie à de l'anorexie, à du malaise de l'estomac, à des digestions difficiles, chez les malades qui sont en traitement, en rendant la tisane sudorifique plus légère ou en diminuant sa quantité.

Je sais bien qu'on a préconisé l'iodure de potassium à haute dose ; qu'on a porté ce médicament jusqu'à 4 et 6 grammes par jour et même plus. Mais interrogez les malades qui ont subi ces traitements. Si dans un certain nombre de circonstances, il a été inoffensif à l'égard de l'estomac, dans beaucoup de cas il a amené des gastralgies dont l'intensité et la durée ont porté une atteinte fâcheuse à la constitution du malade. J'ai vu bon nombre de personnes qui avaient pour ce médicament une telle répulsion, que le nom seul, la pensée de le prendre de nouveau leur faisait manifester la plus vive répugnance. Je n'ai jamais eu besoin de porter la dose d'iodure de potassium à plus de 2 grammes par jour, et il est rare que je dépasse cette dose lorsque j'emploie l'iodure seul.

Du reste, je ne gradue mes doses, soit d'iodure, soit de sublimé, que chez les malades déjà affaiblis par la maladie ou par des traitements antérieurs. Le plus souvent je n'élève que la dose de sublimé. Si le sujet est en bon état de santé, je débute par 6 milligrammes matin et soir, et je ne vais pas au delà.

Dirai-je que ce traitement guérit indistinctement tous les malades; que je n'ai jamais eu recours à aucun autre traitement? Non, sans doute; mais les exceptions sont tellement rares, que je compte à peine une circonstance dans l'année où je suis obligé d'agir ainsi : or, j'ai toujours dans mon service d'hôpital douze ou quinze syphilides en traitement.

Je puis donc préconiser cette méthode avec toute confiance, convaincu du succès qu'elle procure, et certain de ne pas induire mes confrères en erreur.

C'est ici le cas de dire quelques mots des sudorifiques. J'avoue qu'à l'état de tisane, je n'en ai jamais rien obtenu; j'ai retiré quelques avantages marqués de la tisane de Feltz; j'ai peu employé le rob Laffecteur, parce que je n'en ai jamais eu besoin et que j'ai pu voir ses insuccès. En sorte que je considère les sudorifiques comme des adjuvants, et des adjuvants utiles, mais impuissants à guérir une affection constitutionnelle contre laquelle il n'aurait pas été dirigé de traitement mercuriel. C'est surtout lorsque des médications mercurielles variées ont été mises en usage, lorsque l'on a fait alterner ces médications avec d'autres, lorsque l'affection constitutionnelle est arrivée à l'état de produire des accidents tertiaires, c'est-à-dire de ceux qui engendrent les exostoses, les caries, que les sudorifiques et l'iodure de potassium deviennent utiles.

Mais les sudorifiques ne sont guère supportés qu'à l'état de rob ou de sirop. En décoction, ils fatiguent l'estomac, amènent l'anorexie, l'état saburral de la bouche, et donnent des malaises qui troublent la digestion et empêchent la nutrition. Il résulte de leur emploi prolongé une faiblesse marquée, un amaigrissement auquel un régime succulent associé aux ferrugineux peut seul parer.

Je formule aussi un sirop dans lequel entrent, pour 500 grammes, de 10 grammes d'iodure de potassium et 12 centigrammes de bichlorure de mercure, en remplacement des deux médicaments donnés

isolément; mais les malades supportent moins bien cette préparation. La prédominance de l'iodure de potassium ne peut pas laisser de crainte sur l'insolubilité du nouveau sel qui se forme.

Dans les accidents tertiaires où l'économie et surtout les forces digestives sont souvent affaiblies, j'introduis dans ce sirop 2 grammes d'iodure de fer selon ma formule (voy. *Formulaire*), et dans les accidents tertiaires où les os sont atteints, où des traitements nombreux ont été faits, j'y joins souvent la solution de Fowler à la dose de 2 grammes pour la même quantité de sirop (voy. *Formulaire*). Ce sont ces médications que j'ai préconisées sous le nom de médications mixtes. (Voyez ces médications dans la *Pathologie générale*.)

L'expérience a fait justice de certains composés antisyphilitiques, le chlorure d'or, le chlorure d'argent, l'iodure de fer; nous ne nous y arrêterons pas. Quant aux liqueurs d'Arnoud, de Pollini et de Zittmann, on sait qu'elles ont amené des résultats remarquables, mais dans les cas seulement où les autres médications antisyphilitiques avaient échoué. Enfin la méthode externe, soit à l'aide des frictions mercurielles, soit surtout à l'aide des bains de sublimé à la dose de 4 grammes pour commencer, en augmentant de 2 grammes tous les deux bains de manière à arriver quelquefois à 30 grammes, est souvent très utile dans les cas où les organes digestifs ne peuvent pas supporter un médicament.

Après cette appréciation sommaire de ces diverses médications, je me hâte d'aborder les préceptes qui sont relatifs aux modifications que les traitements antisyphilitiques doivent subir en raison de l'espèce de syphilide et surtout de l'état général du malade. J'exposerai ces indications sous forme de propositions.

1° *En thèse générale, une syphilide, quelle que soit sa forme, doit être guérie par une médication générale, et non pas par une médication générale aidée d'une médication locale.*

J'établis cette proposition en principe, non pas qu'on ne puisse guérir de l'extérieur à l'intérieur, puisque les bains de sublimé produisent, par exemple, cet effet, mais parce que l'on ne sait jamais à quoi s'en tenir sur le résultat de la médication. Je sais qu'on ne saurait affirmer qu'il faudra un traitement de deux, de trois ou de quatre mois pour être certain d'une guérison à l'abri d'une récidive;

de même qu'on ne saurait préciser la dose de mercure ou d'iodure de potassium qu'un malade devra prendre dans le même but; mais on peut établir en règle générale, qu'un traitement, continué pendant un temps double de celui qui est nécessaire pour obtenir la disparition des accidents secondaires et tertiaires de la syphilis, est en général suffisant pour donner de la sécurité au médecin. Or, je suppose que l'on n'applique pas à l'extérieur d'agent propre à favoriser la disparition des symptômes, et par conséquent que la guérison s'opère complétement de l'intérieur à l'extérieur. Eh bien, je trouve dans le précepte que j'avance plusieurs avantages : le premier, c'est d'être sûr que le traitement agit avec efficacité; le second, c'est que j'ai la mesure de son action, et que je puis proportionner la durée du traitement au temps qui a été nécessaire pour amener la guérison du symptôme.

Par rapport à la durée du traitement, il est sous ce rapport des praticiens d'un très grand mérite qui pensent qu'un traitement antisyphilitique doit être prolongé pendant six à huit mois, pour donner toute sécurité au malade. M. Chomel, par exemple, est un de ceux qui n'accordent de confiance qu'à des traitements de si longue durée.

Cette manière de voir a certainement été justifiée par l'observation dans bon nombre de cas, et notamment lorsqu'il s'est agi d'accidents tertiaires avec carie, gonflement des os, exostoses et ulcérations; car alors c'est moins la dose élevée du médicament que la durée prolongée de son emploi qui a amené des résultats avantageux. Mais il ne faut pas partir de quelques cas particuliers et peu nombreux, relativement à la masse des autres faits, pour établir un précepte général.

Il est cependant des cas où une médication locale est nécessaire, mais où alors son emploi n'est que momentané : ce sont ceux où d'abord il y a doute. L'application des mercuriaux, venant à modifier heureusement l'affection, lève toute incertitude et permet d'aborder franchement le traitement général. En second lieu, il est des symptômes tertiaires, des ulcérations, par exemple, dont la marche est rapide, détruit et ronge les parties molles dans un court espace de temps; alors il faut enrayer la marche du mal, et les applications locales deviennent nécessaires. Nous pouvons encore citer les cas

dans lesquels l'affection de forme ulcéreuse attaque une partie du corps habituellement à découvert et tend à détruire l'harmonie des formes. Ainsi pas de règle sans exception; mais j'ai tenu à faire sentir, pour nous résumer sur ce point, qu'il y a tout avantage à ne pas employer des remèdes à l'extérieur en même temps que des agents médicamenteux à l'intérieur. On guérit plus sûrement; on peut suivre les progrès de la guérison et arriver à mesurer approximativement quelle sera la durée du traitement. On oblige, pour ainsi dire, le malade à persister avec persévérance dans un traitement suffisant, parce qu'il n'est arrivé que pas à pas à la période de mieux. Cette considération est puissante dans la pratique, beaucoup de malades ayant une tendance à ne plus persévérer dans une médication de si longue durée.

2° *Ce sont moins les doses de médicaments qui guérissent que la persévérance dans le traitement à dose à peu près initiale.*

On compte quelques succès de maladies syphilitiques fort anciennes par l'usage seul des sudorifiques à haute dose, soit sous forme de tisane, soit sous celle de rob et d'essence ou extrait. Ces cas sont, on peut le dire, exceptionnels par rapport aux guérisons nombreuses que donne l'association des sudorifiques aux autres agents médicamenteux. Il y a plus, les sudorifiques employés seuls n'ont réussi qu'autant que les mercuriaux avaient été employés souvent avec abus.

D'une autre part, si l'iodure de potassium, mis en usage à doses progressives et successivement de plus en plus élevées, a procuré des guérisons assez remarquables pour que ce médicament ait été rangé au nombre des antisyphilitiques, c'est qu'alors aussi l'iodure de potassium a été donné après l'emploi du mercure. Et cela est si vrai, que de l'aveu même de ceux qui ont préconisé l'iodure de potassium, on a dit que ce composé ne guérissait qu'imparfaitement les accidents primitifs, qu'il était plus efficace quand il s'agissait de combattre des accidents secondaires, et d'un effet plus certain encore quand on avait affaire à des accidents tertiaires.

Cet exposé de l'historique de l'iodure de potassium démontre évidemment la justesse de l'observation que nous venons d'énoncer à son égard. Mais on a cru devoir, encouragé par de premiers

succès, élever l'iodure de potassium à des doses très fortes dans le but d'obtenir des effets très puissants. De quelques centigrammes on est arrivé à 3, 4, 6 et 8 grammes par jour; en un mot, on est arrivé à l'*abus*. Ces doses ont été tolérées, mais sans plus de résultats qu'à des doses moins élevées. On a fatigué l'estomac des malades sans plus de succès pour le traitement de la maladie. A cet égard, non-seulement l'observation vient démontrer qu'il y a inefficacité et abus, mais encore les phénomènes physiologiques qui se passent alors prouvent que la médication est surabondante : c'est ce que je vais chercher à démontrer par l'analogie.

L'iodure de potassium ne guérit pas par son action locale, mais bien par l'influence générale qu'il exerce sur les liquides et les solides de l'économie. Il est absorbé, porté dans la circulation, excrété avec les matières fécales quand il est pris surabondamment, et rejeté par les sécrétions dans le même cas. Or il résulte d'expériences bien faites, que du moment que la dose d'iodure de potassium administrée journellement est de 50 centigrammes à 75 centigrammes, on retrouve cette substance dans les matières fécales et dans les urines, on la rencontre dans la salive et probablement dans tous les liquides des sécrétions. Qu'est-ce que ce fait démontre, si ce n'est que l'économie se débarrasse d'un excédant? On objectera que cette circonstance ne prouve rien, que l'iodure de potassium n'est pas assimilable, que l'économie doit le rejeter dans tous les cas. Erreur ! Toute substance réputée non assimilable s'assimile parfaitement, à moins qu'elle ne nuise au point d'amener la maladie et la mort. Que l'on arrose de la vigne avec de l'eau salée, et l'on aura du raisin salé; que l'on arrose une plante avec de l'arsenic, et l'on aura une plante arsenicale sans que pour cela elle meure. Il en sera de même si, au lieu de sel ou d'arsenic, on se sert de cuivre ou de toute autre dissolution saline. Mais lorsque la dose absorbée sera suffisamment élevée, alors l'élimination commencera, et il y a tout lieu de croire que l'élimination commence là où l'influence de la médication ou de l'absorption de la matière, quelle qu'elle soit, devient nuisible.

Avant les recherches que j'ai faites au lit du malade sur la médication arsenicale au moyen de la solution de Fowler, on en élevait

la dose jusqu'à 20, 25, 30 et même, a-t-on dit, 40 gouttes par jour. Nous avons prouvé par des faits qu'en thèse générale il suffisait de porter la dose de solution à 14 ou 16 gouttes par jour, pour obtenir tout ce que l'on peut obtenir de ce médicament, ce dont nous avons donné la preuve en montrant les colorations brunes qu'il amène dans les points occupés par la maladie (*psoriasis*, *pityriasis*, *eczéma chronique*, etc.). Or, à partir de la médication portée à 10 gouttes par jour, le malade rend de l'arsenic et par les urines et par les matières fécales.

J'ajouterai que jamais je n'ai obtenu de succès plus marqué de l'iodure de potassium à 3 ou [illegible] mes qu'à celle de 1 gramme 5 décigrammes par jour à 2 [illegible], et qu'à dose plus élevée j'ai souvent remarqué les effets [illegible] u médicament sur l'estomac, dont les fonctions ont été plus ou [illegible] oins profondément altérées. Ainsi, ni sous le rapport des sudori[illegible] ues, ni sous celui de l'iodure de potassium, le succès n'a eu pour [illegible] se la dose élevée du médicament, mais la durée de la médication.

Abordons maintenant le sublimé ou toute autre préparation mercurielle. On se rappelle l'abus qu'on faisait autrefois de ce médicament. Commençant son administration par un demi-grain, on l'élevait successivement jusqu'à 2 grains par jour dans quelques cas. Qu'arrivait-il? On voyait surgir des salivations abondantes; alors on faisait des traitements incomplets; ou bien par la dose et la durée d'un pareil traitement on jetait bientôt le malade dans un état très prononcé de marasme et de dépérissement. On signalait à cette époque la phthisie comme la conséquence commune de l'usage des préparations mercurielles. Plus tard, la grande généralité des accidents tertiaires, exostoses, caries, ulcérations profondes, a été regardée, et il faut le dire avec raison, par les antagonistes du mercure, alors partisans des doctrines de Broussais, comme une conséquence de cet abus du mercure. L'observation, de nos jours, où l'on trouve ces accidents bien moins fréquents qu'ils ne l'étaient autrefois, semble donner à cette assertion une valeur réelle. Dirai-je que depuis vingt-cinq ans que j'emploie le sublimé avec réserve, je n'ai jamais eu à déplorer de pareils accidents? Ajouterai-je que depuis dix-sept ans surtout où je suis journellement appelé à pres-

rire le sublimé sur une grande échelle, je n'ai eu qu'à me louer e ses effets, mais en ne dépassant pas la dose de 12 milligrammes ar jour ?

Et cependant il ne s'agit pas ici d'accidents primitifs, je n'en vois ue rarement, mais bien d'accidents secondaires et tertiaires.

Résulte-t-il de ces faits et de ces réflexions qu'il ne faille jamais oser un médicament et qu'on ne doive jamais obtenir des résul- ıts meilleurs d'une dose plus élevée que d'une dose faible? Loin e moi cette pensée. S'il faut soutenir une médication par sa durée, faut encore lui maintenir son efficacité par un certain accroisse- ıent dans la dose des médicaments, parce que l'économie s'habitue tout, aux mauvaises comme aux bonnes influences, dans une ertaine limite. Mais c'est chose différente d'augmenter la dose d'un ıédicament pour contre-balancer l'influence de l'habitude, ou 'augmenter cette dose dans des proportions de plus en plus fortes ı vue d'une médication de plus en plus active.

3° *La dose des médicaments doit être proportionnée à la force ou à faiblesse du sujet ainsi qu'à son âge.*

C'est un principe de saine thérapeutique de proportionner la dose ıs médicaments aux deux conditions que je viens d'énoncer. Ce ıincipe doit surtout être appliqué lorsqu'il s'agit de médicaments ıssi actifs que le sublimé et l'iodure de potassium. Lorsqu'on ıministre les mêmes doses d'un agent thérapeutique à deux sujets ı force opposée, on voit se développer chez le sujet faible une ıergie de médication que l'on ne rencontre pas chez le sujet fort. ıuvent même le sujet faible ne peut supporter longtemps cette ıse primitive, et l'on est bientôt obligé de l'abandonner à cause des ıcidents qu'elle développe. Voilà ce que démontre l'observation urnalière. N'est-il pas dès lors rationnel de doser le mercure et odure de potassium proportionnellement à la force ou à la fai- esse du sujet, ainsi qu'à son âge? C'est ce qu'il faut faire lorsqu'un aitement antisyphilitique devient nécessaire et ne pas abandonner sublimé sous ce prétexte que le malade ne serait pas en état de le pporter. Il est bien vrai qu'il ne le tolérera pas à la dose ordi- ıire, mais il le supportera parfaitement à une dose notablement ténuée. A cette dose, le sublimé agira comme il agit à dose élevée,

il produira les mêmes résultats; il guérira le malade, et tout en faisant un traitement ainsi proportionné à ses forces, la santé de ce malade s'améliorera parce que la cause virulente sera détruite: non-seulement cette cause virulente exerce son influence comme élément de symptômes syphilitiques appréciables à nos sens, mais encore comme cause d'altération de la santé générale.

J'ai donné des soins à un jeune homme du Mans qui avait au début fait plusieurs traitements incomplets, et qui m'est arrivé avec les apparences d'une phthisie : la physionomie altérée, de la toux, de la faiblesse, de l'anorexie ; une poitrine étroite ; les traits effilés du visage; et avec cet ensemble d'une constitution plus ou moins menaçante, des ulcérations dans l'arrière-gorge, une odeur fétide du nez avec enchifrènement, avant-coureurs des symptômes graves des cavités nasales. Il a pris pendant six mois du sublimé, de l'iodure de potassium et de la tisane sudorifique ; l'appétit est revenu, les forces se sont rétablies, la figure a bientôt porté le cachet de la santé, les symptômes du côté du nez et de l'arrière-gorge ont disparu. Mais la tisane sudorifique a été prescrite à la dose de 20 grammes seulement d'un mélange des quatre bois sudorifiques pour 1,000 grammes d'eau ; l'iodure de potassium a été donné à raison de 40 centigrammes tous les jours ; et le sublimé n'entrait que pour 3 milligrammes dans les pilules dont il prenait deux par jour. Plus tard, je suis arrivé à 5 décigrammes d'iodure de potassium, à 4 et même à 5 milligrammes de sublimé par pilule ; mais je n'ai pas eu besoin d'atteindre la dose de 6 milligrammes que l'on peut même dépasser sans grands inconvénients. Les cas de ce genre sont très communs, ils ne doivent pas arrêter le médecin dans la prescription du traitement antisyphilitique, sous ce prétexte que l'individu est trop faible pour le supporter. C'est une grande erreur que celle-là.

Voici un fait analogue et beaucoup plus grave, dans lequel le traitement à dose atténuée a été suivi de résultats fort remarquables, après cinq années d'affections syphilitiques permanentes. — Après cinq années passées dans des hôpitaux civils ou militaires, un garde municipal est réformé comme incurable. Il entre dans mon service à l'hôpital Saint-Louis, avec une large carie des os du front; un séquestre dans toute la longueur de l'un des tibias; des ulcéra-

tions à la figure, sur les membres; des douleurs ostéocopes, etc.; amaigri d'ailleurs par le séjour dans les hôpitaux, par le défaut de nourriture, il était réduit à prendre un peu de lait pour aliment. Il est mis au traitement par les sudorifiques, l'iodure de potassium, le sublimé, et au bout de sept mois il sort de l'hôpital, obligé de se faire faire un pantalon, le sien étant trop étroit par l'embonpoint qu'il a pris; il quitte l'hôpital pour prendre les fonctions de *gardien de nuit* d'un des cimetières de Paris, et depuis sept ans cet homme n'a pas vu paraître d'accident. Or, il avait subi à l'hôpital une opération grave, celle de l'application de quatre couronnes de trépan pour l'ablation du séquestre du tibia; pendant sept mois il avait été mis à l'usage du mercure, de l'iodure de potassium et des sudorifiques, mais dans ces pilules le sublimé n'a pas dépassé 4 à 5 milligrammes, et il a fallu pendant longtemps ne l'administrer qu'à 3 milligrammes, traitement dans lequel entraient d'ailleurs les préparations ferrugineuses à dose assez élevée.

Je pourrais muliplier ces faits, car ils sont journaliers; ils suffiront, je l'espère, pour porter la conviction dans l'esprit des médecins sur la nécessité de proportionner les médicaments à la force et à l'âge des sujets.

4° *La médication antisyphilitique n'exclut pas l'emploi des toniques, des ferrugineux et du régime animal tonique; souvent même ces agents peuvent être considérés comme des adjuvants très puissants de la médication.*

En thèse générale, il est indispensable de prescrire aux malades qui font un traitement antisyphilitique des conditions hygiéniques basées sur une sobriété hors des habitudes de la vie ordinaire. On le fait surtout dans les cas où la médication s'adresse à des personnes dont la santé générale est bonne, qui vivent de la vie commune, et chez lesquelles la syphilis est un accident qui n'a pas altéré les fonctions digestive et assimilatrice. On diminue alors les aliments, on supprime le vin pur, le café, les liqueurs, parce que de deux chose l'une, ou la médication antisyphilitique serait sans effet, ou elle apporterait un trouble notable dans la santé.

Mais lorsqu'il s'agit de syphilides qui existent depuis longtemps, dont les symptômes ont une certaine gravité; dont la forme de

rupia, de carie, d'exostose, de douleurs nocturnes a exercé une influence fâcheuse sur l'économie, altéré les forces digestives, diminué la nutrition, soit par ces accidents mêmes, soit par la répétition de traitements mal administrés : alors, loin de diminuer l'alimentation et de la choisir parmi les viandes blanches, le poisson et le laitage, il faut donner des viandes noires rôties, du bouillon et du vin vieux légèrement étendu d'eau.

Il y a plus, l'expérience nous a démontré que l'association du fer à l'état pilulaire, ainsi que l'extrait de quinquina à la dose de 20 à 25 centigrammes pris en mangeant la soupe, viennent singulièrement contribuer au succès du traitement. Je donne le plus ordinairement quatre pilules de Lanfranchi ou de Blaud par jour, espacées dans le cours de la journée.

A l'aide de ces moyens toniques, les forces digestives se relèvent, l'appétit renaît, la pâleur générale et la faiblesse se dissipent peu à peu, malgré l'emploi des antisyphilitiques, de sorte qu'on est conduit à atteindre une dose de sublimé plus élevée, de fractions médicamenteuses primitivement employées au point de départ, lorsqu'on arrive aux derniers temps du traitement. Je ne saurais trop recommander cette association dans tous les cas ordinaires de syphilides à forme cachectique.

5° *Il est quelques symptômes locaux dont la gravité est telle qu'il y a lieu d'en arrêter les progrès par une médication externe.*

Cette proposition n'est pas en opposition avec la première que j'ai établie : c'en est l'exception, et si je la traite d'une manière spéciale, c'est qu'il me faut indiquer les moyens particuliers qui m'ont le mieux réussi pour combattre des phénomènes dont la persistance peut compromettre des organes essentiels et en modifier ou la forme ou les fonctions.

A la tête de ces sortes de phénomènes morbides, je placerai les ulcérations dont le siége existe sur des parties apparentes du corps. Ces ulcérations sont simples ou compliquées : *simples*, et alors elles n'affectent qu'un tissu mou; *compliquées*, et dans ce cas on les voit coïncider avec des exostoses et plus souvent avec des caries des os ou des cartilages, quelquefois avec des nécroses.

Toute ulcération qui siége à la figure amènera tôt ou tard une

formité dont l'importance sera en raison de la durée de l'ulcération et de sa marche progressive plus ou moins rapide. De là la cessité d'en opérer le plus tôt possible la guérison. Est-elle avec me inflammatoire, c'est à l'aide d'émollients qu'on en arrête les ogrès; mais il arrive quelquefois que les émollients sont insuffiants; qu'il devient nécessaire d'enrayer la marche du mal en modint la surface malade au moyen de caustiques légèrement appliés. L'expérience a démontré que le nitrate d'argent, le chlorure antimoine, le chlorure de zinc, le caustique de Vienne, étaient moins icaces que les caustiques qui ont pour base un sel de mercure, et cet égard on sait quelle importance on a donnée au nitrate acide mercure du Codex. Dans ce composé, c'est ordinairement le uto-nitrate que l'on emploie; l'acide nitrique qu'on y ajoute en uble ou en triple l'activité. Il y a plus : c'est, suivant moi, plutôt vertu de l'acide nitrique qu'en vertu du sel de mercure que ce ustique agit; ou au moins la dose d'acide nitrique qu'il renferme t si considérable, proportionnellement à celle du composé merriel, qu'il doit exercer une influence au moins aussi grande que lle du corps qu'il tient en dissolution. Ce sont ces considérations i m'ont déterminé à formuler et à essayer un caustique du même mre dans lequel l'effet inverse doit être produit, c'est-à-dire dont causticité ou la modification locale provient plutôt de la préparaon mercurielle. Les essais que j'ai tentés à cet égard depuis onze s ont mis pour moi hors de doute l'utilité de cet agent, et je hésite pas à en donner la formule :

Protonitrate de mercure cristallisé.	4 grammes.
Eau.	8 grammes.
Acide nitrique.	2 grammes.

Réduisez en poudre le protonitrate de mercure; mettez-le dans l'eau, chauffez lle-ci jusqu'à une température voisine de l'ébullition, sans l'atteindre, et utez-y l'acide nitrique goutte par goutte, en agitant le mélange. On obtient si une dissolution limpide du sel, qui ne s'effectuerait pas sans la chaleur et s l'addition d'acide nitrique.

Que si l'on faisait bouillir le mélange, on obtiendrait un deutoitrate au lieu d'un proto-nitrate. Or, le sel de mercure dans le

proto-nitrate est bien plus facilement attaqué par les matières animales que le deuto-nitrate : résultat qu'il importe d'obtenir.

Pour employer cette substance, on se sert d'un pinceau de charpie que l'on promène légèrement sur les surfaces malades. Celles-ci prennent aussitôt une teinte grisâtre toute particulière. Quant à l'eschare, elle est superficielle, et elle se détache facilement par la suppuration. On répète la cautérisation deux ou trois fois à deux ou trois jours d'intervalle, et l'on obtient en définitive une plaie qui tend vers la production de bourgeons charnus et la cicatrisation.

Il est des ulcérations syphilitiques qui prennent une telle habitude d'exister, qu'il faut des applications d'un caustique puissant pour parvenir à les guérir. Tel était le cas d'un malade qui est entré dans mon service dans le cours de l'année 1856 ; il portait à l'aine une ulcération syphilitique de 4 centimètres de longueur sur 2 centimètres de largeur. Il avait été soumis à toutes les formes possibles de traitement. M. Osias Turenne, qui vit ce malade, me dit que je ne le guérirais qu'en lui faisant pratiquer 150 à 180 inoculations. En effet, un traitement composé très régulier ne fit que réduire l'étendue et l'épaisseur des surfaces de l'ulcère. Voyant que je n'arrivais pas à bien, quoique la cause fût détruite, je me décidai à attaquer les bords et la surface de l'ulcère par le caustique de Canquoin, et une fois la vitalité du tissu modifiée, la guérison fut rapide.

Toutefois on n'est pas toujours maître d'arriver à ce résultat. Il est des ulcérations qui ne cèdent qu'avec le concours du traitement interne, mais dans ce cas-là même on arrête au moins les progrès du mal.

Lorsqu'une ulcération n'a qu'une marche fort lente, je tiens à la respecter, et à la voir guérir par le traitement interne ; la guérison est pour moi le gage assuré de la persévérance du malade dans le traitement et dans l'observation de l'hygiène qui lui est appropriée. Il n'en saurait être de même pour les ulcérations qui reposent sur des os et sur des cartilages, et qui peuvent les détruire par la carie, et notamment pour les ulcérations du nez, des fosses nasales et de la voûte palatine. Remarquons, en effet, que leurs progrès sont rapides et que les cloisons sont très promptement détruites.

Que les deux fosses nasales communiquent entre elles par une

petite ouverture, cela a peu d'importance; mais lorsqu'il s'agit de la perforation de la voûte palatine, alors il en résulte plusieurs sortes d'inconvénients. D'abord les aliments et surtout les boissons passent ou tendent à passer dans les fosses nasales. La voix et la phonation surtout sont altérées, les individus parlent du nez. Si la luette est détruite, c'est un son guttural particulier qui se produit.

Les ulcérations envahissant de plus en plus les cornets des fosses nasales et des lames de l'ethmoïde, le nez se déforme par la destruction des portions cartilagineuses, et porte après la guérison l'empreinte indélébile d'une affection syphilitique. D'une autre part, on est obligé de remédier à la perforation de la voûte palatine par des moyens mécaniques; de sorte que, dans ces cas, l'attention du médecin ne saurait trop être éveillée par ces ulcérations rongeantes des parties molles et des os.

C'est alors qu'il faut chercher à en arrêter les progrès par les cautérisations au moyen de l'agent que j'ai préconisé; par des injections répétées d'eau chlorurée dans les fosses nasales. Je commence ordinairement par des injections contenant 1/25e de chlorure de soude, et je rends la liqueur graduellement de plus en plus forte en la portant à 1/10e de chlorure. Cet agent est d'un résultat très efficace. J'introduis parfois des mèches de charpie dans les narines pendant la nuit, après avoir imprégné la charpie d'onguent mercuriel simple.

Il est rare que l'on ait besoin de cautériser les ulcérations qui existent sur les piliers du voile du palais; le plus souvent elles guérissent avec le traitement général.

Toute ulcération avec exostose, carie et séquestre, doit être abandonnée à elle-même, si elle ne fait pas de progrès rapides. Il faut alors laisser agir la médication générale; mais il est un point sur lequel je veux appeler l'attention : c'est celui qui est relatif à l'ablation du séquestre. Si cette opération est faite trop tôt, il en résulte de larges ulcérations ; la transformation en ulcères sanieux suppurants, des plaies qui ont été pratiquées pour enlever l'os nécrosé et des couronnes de trépan qui ont pu être appliquées. A cet égard, je poserai le précepte, qu'il faut attendre deux mois de traitement interne avant d'opérer.

J'ai eu sous les yeux, à l'hôpital, une jeune fille de dix-neuf ans, qui a été victime d'une erreur de diagnostic et qui en a subi toutes les conséquences. Née de parents probablement syphilitiques, elle a vu se développer à la tête, il y a trois ans, des tumeurs indolentes qui plus tard sont devenues fluctuantes, de très dures qu'elles étaient.

Elle est entrée dans deux hôpitaux de Paris, et dans l'un d'eux on a cru voir une affection des os et des tumeurs non syphilitiques qu'il fallait opérer. Non-seulement on a ouvert, mais encore on a enlevé les tumeurs à l'aide de la gouge et du maillet et en appliquant des couronnes de trépan. La dure-mère a été mise à nu, dans une étendue assez considérable. Mais la plaie ne s'est pas cicatrisée, en sorte qu'il s'est produit en arrière et en haut de la tête une surface sanieuse avec production imparfaite de bourgeons charnus, sous laquelle se sont dessinés les mouvements d'expansion et de retrait du cerveau. Depuis le traitement mercuriel employé, les douleurs nocturnes ont disparu, la santé générale s'est améliorée, et la plaie a présenté un développement de bourgeons charnus de bonne nature. Ainsi on enlèverait en vain un séquestre; l'os malade autour de lui continuerait à l'être, si déjà le traitement n'avait été fait depuis un temps assez long pour favoriser la cicatrisation des plaies.

Il est une sorte d'ulcération syphilitique qui devient la source d'accidents parfois assez graves pour le malade, et auxquels il faut parer en cherchant à hâter la cicatrisation des ulcérations. Je veux parler des ulcères qui se trouvent sur les croûtes du rupia syphilitique à forme cachectique. D'abord les croûtes qui les recouvrent sont sanieuses, noirâtres et de peu de solidité; le malade les fait souvent tomber par les mouvements et les frottements qui se produisent dans le lit; ensuite, ces ulcérations donnent souvent lieu à des hémorrhagies qui affaiblissent le malade. J'ai pour habitude de chercher à les cicatriser successivement peu à peu ou au moins à les modifier. Dans ce but, je fais tomber les croûtes au moyen de cérat ou d'un cataplasme, et je fais panser les ulcères avec de la charpie enduite de cérat créosoté, cérat que je formule à raison de *huit à dix gouttes* de créosote pour 30 *grammes* de cérat. La créosote change le mode de vitalité de la plaie. Si elle ne guérit pas l'ulcé-

ration, elle donne lieu à des plaies moins sensibles, à la surface desquelles se forment des croûtes plus solides, et le traitement général fait le reste.

Il me faut, pour compléter le tableau de la thérapeutique des affections syphilitiques, parler d'une complication sur laquelle les auteurs ne se sont peut-être pas assez étendus et qu'il est assez fréquent de rencontrer dans la pratique : c'est la liaison de la forme ou du symptôme syphilitique avec le symptôme scrofuleux. Cette liaison n'est pas rare chez les sujets à prédominance du système lymphatique ; elle est telle souvent, que les antisyphilitiques sont insuffisants pour guérir complétement la maladie. Déjà j'ai abordé ce sujet à l'occasion de ce que je nomme les scrofulo-syphilides de la peau. (Voyez ce chapitre.)

Les symptômes sont d'ailleurs assez variés, et pour justifier cette liaison, il suffira d'une exposition simple des faits.

Chacun sait que le bubon est un accident qui coïncide souvent avec le chancre ou la blennorrhagie; il constitue le premier degré de la complication scrofuleuse; et si on le regarde comme un accident isolé, il n'en est pas moins vrai que c'est le premier degré, la première liaison de l'inflammation syphilitique avec l'inflammation lymphatique. Cela est si vrai, qu'aujourd'hui quelques praticiens ne considèrent le bubon comme syphilitique, que lorsqu'il a pour point de départ le chancre, et qu'au début du chancre le bubon n'est à leurs yeux qu'une inflammation accidentelle du système ganglionnaire, véritable scrofule aiguë.

Maintenant il est très commun de rencontrer dans le cas de chute syphilitique des cheveux, de douleurs nocturnes à la tête, du rupia au cuir chevelu, les ganglions de la partie postérieure et supérieure du cou à l'état d'engorgement. — On voit aussi naître sur diverses parties du corps, les pommettes, le bout du nez, le milieu des cuisses, des espèces d'engorgements ou tubercules d'un rouge violacé, sans limite bien tranchée, et affectant des enfants ou des sujets éminemment lymphatiques. — Le lupus, maladie essentiellement scrofuleuse, est aussi parfois de nature syphilitique ; et ces sortes de cas sont communs.

Des exostoses sous forme héréditaire peuvent se montrer à la tête,

être accompagnées de carie, de plaies qui s'étendent en surface, qui sont blafardes, indolentes, et que les antisyphilitiques ne guérissent pas seuls.

Ainsi il n'est pas douteux que la syphilis, soit dans les accidents primitifs, soit dans les accidents consécutifs, mais surtout lors de l'existence de ces derniers, ne se lie à la scrofule pour former une variété de syphilide très importante à connaître au point de vue de la thérapeutique.

Ce sont ces liaisons entre la syphilis et la scrofule qui ont fait avancer à certains médecins que la scrofule était une modification de la maladie syphilitique, et que les enfants nés de parents syphilitiques étaient scrofuleux quand ils n'étaient pas eux-mêmes atteints de syphilis, opinion que je soutiens.

Comment reconnaître cette complication ; il est très difficile de la dépeindre, et il faut de l'habitude pour la reconnaître. En effet, ce n'est qu'une nuance dans le symptôme, ce n'est qu'un aspect plus blafard, un engorgement plus pâteux, plus diaphane, moins limité, moins nettement dessiné ; un siége qui n'est pas celui des syphilides communément observées, qui peut faire soupçonner la coïncidence des deux affections, et mettre sur la voie. Or, si déjà le praticien éprouve des difficultés à reconnaître certaines syphilides, à plus forte raison échouera-t-il plus souvent dans cette complication ; ajoutons cependant que si les syphilides ordinaires ont pour caractère essentiel la multiplicité des symptômes sur divers points du corps, dans la syphilide scrofuleuse ces symptômes sont beaucoup moins nombreux, sont beaucoup plus limités. Je regrette de ne pouvoir faire plus au point de vue du diagnostic ; mais les descriptions ne peuvent pas toujours remplacer la nature, et, à ce point de vue, j'avoue dans ce cas toute mon insuffisance. (Voy. SCROFULO-SYPHILIDES DE LA PEAU.)

Quoi qu'il en soit, voici maintenant la conséquence thérapeutique. Je ne change rien à mon traitement ordinaire, je ne fais qu'y ajouter : j'y associe d'une part les ferrugineux, d'une autre part l'huile de foie de morue. Mais je ne porte pas cette huile à la dose énorme de douze cuillerées par jour, comme dans le lupus ; j'en fais prendre alors de deux à quatre cuillerées seulement, et cette

dose, associée à la médication syphilitique, est suffisante pour amener la guérison, et de la maladie, et de sa complication.

J'ai toujours plusieurs malades en traitement de cette manière, et je puis assurer que tous les jours la maladie fait des progrès sensibles vers la guérison. Ne sait-on pas d'ailleurs que le mercure est un des résolutifs puissants des engorgements scrofuleux? Ne retirons-nous pas fréquemment des avantages signalés de l'onguent mercuriel, des pommades mercurielles employées à l'extérieur contre les engorgements scrofuleux? Pourquoi le mercure à l'intérieur n'agirait-il pas plus encore, lorsque la scrofule a pour cause un élément syphilitique?

Au surplus, laissons de côté toute théorie; c'est un résultat pratique que je viens d'énoncer, et j'ai la conviction que son application ne fera pas défaut.

ONZIÈME GROUPE.

Maladies exotiques.

Ce groupe comprend sept maladies dont les noms seuls justifient le rapprochement que nous avons fait. Ce sont la *pellagre*, la *lèpre*, le *pian d'Amérique*, le *molluscum*, le *frambœsia*, le *bouton d'Alep*, la *kéloïde* et la *plique*. Ce n'est pas à cause des analogies de caractères morbides que nous les avons réunies, mais parce que ce sont ordinairement des affections étrangères à nos climats, ou tellement rares, que beaucoup de praticiens n'ont jamais occasion de les observer durant le cours de leur pratique médicale. Cette seule considération nous paraît péremptoire; mais nous devions faire connaître les motifs qui nous avaient déterminé dans ce classement.

PELLAGRE.

On doit à Francesco Frapoli, médecin du grand hôpital de Milan, la première description de la pellagre, qui, en 1771, faisait des progrès effrayants dans la Lombardie. Mais, dès 1730, D. Gaspar Casal, médecin espagnol, observait les ravages que cau-

sait une maladie qui régnait dans les campagnes voisines d'Oviédo, et en donnait la description, sous le nom de *mal de la rosa*, dans un ouvrage sur les Asturies qui a été publié en 1762, après la mort de Casal. Cependant Thierry, médecin français, qui avait eu occasion de fréquenter Casal et d'observer cette maladie, en parla dès l'année 1755 dans le journal de Vandermonde. Sauvages la rangea parmi les *lèpres* (*lepra asturiensis*). Vingt ans plus tard, Antonio Rijati décrivait dans ses leçons une maladie qui régnait dans les États de Venise, et qu'il désignait sous le nom de *scorbuto alpino*. La pellagre de Lombardie, le mal de la rosa de l'Espagne, le scorbut alpin, étaient la même affection. Quelques années après, Francesco Zanetti signalait l'existence de la même affection dans les environs du lac Majeur. En 1784, on fonda à Milan un hôpital destiné à recevoir soixante pellagreux; Strambio dirigea le traitement de ces malades. Plus tard, l'existence de la pellagre fut constatée sur la presque totalité du territoire du Piémont, et l'on s'assura qu'elle existait dans le royaume de Naples et dans la Grèce.

Jusqu'alors cette maladie à noms divers ne paraissait exister qu'au delà des Alpes; la France, à cet égard, était en pleine sécurité, lorsqu'en 1829 M. Hameau, de la Teste-de-Buch, lut à la Société royale de Bordeaux une notice sur une maladie qu'il observait depuis 1818 dans toute la vallée d'Arcachon; elle fut désignée sous le nom de *maladie de la Teste*. Bientôt MM. Gintrac et Bonnet en reconnurent l'existence dans les villages du nord de la Gironde. Enfin, en 1842, au retour d'un voyage en Italie, M. Roussel, alors élève interne de M. Gibert, à l'hôpital Saint-Louis à Paris, fut à même d'observer une maladie qui lui retraçait les caractères de ce qu'il avait vu au delà des Alpes. La maladie fut d'abord méconnue, on considérait l'affection locale comme une éruption érythémateuse ; mais bientôt un ensemble de symptômes généraux des plus graves ne put faire illusion plus longtemps, et M. Roussel n'hésita pas à en porter le diagnostic sous le nom de *pellagre*. Rien d'ailleurs de plus naturel après le voyage qu'il avait fait, comme aussi rien de plus naturel que l'erreur de M. Gibert en présence d'une maladie qu'il n'avait jamis vue, et dont on était loin de supposer l'existence dans nos climats. La femme atteinte de cette maladie succomba, et l'on ne

put constater que les désordres que la pellagre laisse ordinairement à sa suite.

Un an s'écoula sans que l'attention eût été éveillée par ce fait, lorsqu'un nouveau pellagreux entra dans le service de M. Gibert. Nous ne le vîmes pas ; mais il en fut parlé, et dès ce moment l'attention fut appelée sur cette affection. Aussi pûmes-nous à première vue reconnaître, à notre consultation publique de l'hôpital Saint-Louis, le troisième cas de pellagre qui fut observé à Paris, et que nous présentâmes à l'Académie. La maladie était encore à sa première période. Elle laissa subsister des doutes sur sa nature dans l'esprit de quelques médecins; mais durant les années suivantes, le même malade, reçu dans notre service à chaque printemps, parce qu'à chaque printemps l'affection faisait des progrès, vint confirmer notre diagnostic primitivement porté.

C'est en juillet 1843 que cet homme avait été montré à l'Académie, et c'est quelques jours après que M. Léon Marchand vint lire devant cette société un mémoire sur la pellagre des Landes, qu'il observait depuis six ans. Bientôt les faits se multiplièrent ; on reconnut que la pellagre était beaucoup plus communément répandue qu'on ne le pensait, et qu'elle pouvait se développer au voisinage de Paris même.

Il y a dans la pellagre deux ordres de faits très distincts, qui doivent appeler l'attention : les phénomènes d'éruption, ou locaux, et les phénomènes généraux. Tout d'abord la pellagre débute par un érythème, un coup de soleil exerçant son influence sur les parties du corps habituellement découvertes, le dos des mains, le devant de la poitrine chez les individus qui portent habituellement la chemise ouverte, et la figure. Mais les mains et la poitrine sont primitivement et le plus généralement affectées tout à coup. L'expérience apprend que le dos des mains est très sensible à l'impression solaire. Pour peu que l'on n'ait pas l'habitude du contact du soleil en pleine campagne, on y éprouve des sensations de picotement et de cuisson qui invitent ou à mettre des gants ou à reporter les mains derrière le dos. Dans un coup de soleil ordinaire, à la figure par exemple, il est rare qu'il ne survienne pas un état érythémateux accompagné de phénomènes du côté du cerveau, qui de la céphа-

lalgie peut être porté jusqu'au délire. Eh bien, dans la pellagre, s'il y a coup de soleil au début, il y a aussi prédisposition à le contracter. Les vignerons robustes, et suffisamment nourris, n'auront jamais de pellagre, ils pourront avoir un ou plusieurs coups de soleil; mais un homme des champs, qui dans sa vie aura reçu plusieurs coups de soleil sans autres accidents que ceux qui résultent de cette sorte d'érythème de cause externe, pourra être frappé d'un nouveau coup de soleil avec pellagre, s'il est depuis un certain temps dans des conditions de mauvaise alimentation, de misère, en un mot, s'il existe chez lui un état de prédisposition que nous croyons être dû à la mauvaise alimentation.

Ainsi la différence entre la pellagre et le coup de soleil consiste en ce que le coup de soleil peut être indépendant de tout phénomène général; par contre, les phénomènes généraux, la maladie d'ensemble constituent essentiellement la pellagre, l'érythème pellagreux n'étant que l'accident de la cause déterminante. Et tandis que dans le coup de soleil, s'il se montre des accidents généraux, ils ont la forme aiguë dès le début et se dissipent sans laisser de traces, dans la pellagre au contraire ces symptômes généraux sont le plus souvent très légers au début, ils persistent et ne décroissent que dans une période de plusieurs mois. Il y a plus : le pellagreux ne s'aperçoit probablement pas du premier coup de soleil qu'il reçoit, au moins dans les pays où la pellagre est endémique. C'est surtout d'après ce que nous avons observé à Paris que nous donnons une certaine importance à ce mode d'invasion, et cependant, chez plusieurs pellagreux que nous avons observés, le phénomène a été tellement marqué, que nous pensons être dans le vrai.

Quoi qu'il en soit, nous croyons devoir, pour la netteté de la description de cette maladie, distinguer, à l'instar des auteurs, trois périodes distinctes. La première, marquée par les phénomènes locaux auxquels viennent se joindre des symptômes encéphaliques et intestinaux très légers; la deuxième, où les phénomènes rachidiens se montrent, et la troisième, où se développent des symptômes encéphaliques les plus prononcés.

Strambio, qui nous a donné une des meilleures descriptions de la pellagre, la distingue en *intermittente*, *rémittente* et *continue*. Dans

ı première espèce, il comprend les pellagres qui se traduisent par es phénomènes passagers, au printemps, durant cette saison, et stent pendant neuf mois de l'année à l'état de disparition com-lète, pour se renouveler au printemps suivant. Dans la seconde, ou *ellagre rémittente*, les accidents sont plus graves au printemps ; ils iminuent notablement dans le reste de l'année, mais sans dispa-ître entièrement, pour reparaître au printemps suivant. Enfin, ans la *pellagre continue*, l'affection fait des progrès incessants, quelle ue soit la saison. Ces périodes ne sauraient exprimer que des egrés de la même affection : la pellagre est une. C'est le propre e cette maladie de n'apparaître d'abord qu'au printemps, et de isparaître pour se montrer aux printemps suivants en progressant, e manière qu'il arrive un moment où il n'est plus possible de ébarrasser complétement les malades des accidents soit cérébraux, oit intestinaux, qu'elle a fait naître, et alors se montre l'état con-nu. Il vaut donc mieux dire : pellagre au premier, au deuxième, u troisième degré.

Le début de la pellagre est-il précédé de phénomènes généraux, u les phénomènes généraux sont-ils consécutifs aux phénomènes ocaux ? L'opinion des auteurs est très variée à cet égard. La pré-isposition à contracter le coup de soleil, qui est le phénomène pparent et sensible de l'affection, doit se manifester par quelques érangements dans les fonctions nutritives. Aussi M. Briere de oismont dit-il, probablement avec raison, que l'inappétence, le égoût, les pesanteurs d'estomac, la sécheresse de la bouche, sont es signes précurseurs de cette maladie. Ces prodromes doivent ependant être très variables et de très peu d'importance, puisque ı généralité des pellagreux déclarent qu'ils étaient en parfait état de anté lorsque l'affection s'est brusquement montrée avec ses sym-ômes extérieurs. Certains praticiens pensent qu'il peut exister des ellagres sans état érythémateux.

Le plus généralement apparaît à l'équinoxe du printemps, sous influence de l'insolation, un état érythémateux du dos des mains t des pieds, aux avant-bras, au devant de la poitrine, et plus rare-nent à la figure, avec sensation de cuisson, plutôt qu'avec déman-eaison. Cette sensation est constamment exaspérée par l'insolation.

Cet érythème, qui peut avoir lieu par plaques disséminées ou uniformément répandues, n'est pas généralement accompagné de gonflement, on bien ce dernier n'est que passager ; le plus souvent, au contraire, la peau tend à s'amincir, en même temps que le tissu cellulaire sous-cutané perd une partie de son état graisseux dans un espace de temps de douze, quinze ou dix-huit jours, de manière que la peau tende à se parcheminer et à brunir. La rougeur érythémateuse disparaît d'ailleurs sous la pression du doigt. Parfois il s'en détache, mais d'une manière lente, des écailles épidermiques ; en même temps, le malade est frappé d'inappétence, de diarrhée, sentiment d'ardeur à la gorge ou à l'estomac ; parfois aussi, au début, le malade a quelques vertiges et quelques étourdissements. Tous ces phénomènes sont loin de se produire instantanément au début ; ils ne s'opèrent que d'une manière successive dans une période d'un mois à six semaines.

L'ensemble de ces symptômes cède peu à peu au régime, à l'usage de quelques bains. La santé générale s'améliore durant la saison chaude ; les forces renaissent au fur et à mesure que celle-ci décroît, et lorsque l'automne arrive, les malades se croient entièrement débarrassés. Mais ce qui ne reprend jamais d'une manière complète, c'est l'embonpoint du dos des mains et des parties frappées d'érythème.

Au printemps suivant, retour des mêmes phénomènes, avec une intensité variable suivant le climat et le pays que le malade habite. Ainsi la marche de la pellagre dans le centre de la France ne sera jamais aussi rapide que dans la Lombardie, par exemple. Mais à cette récidive les phénomènes des voies digestives sont plus marqués et déjà accompagnés de quelques vertiges. Leur ténacité est plus grande, la peau des mains est plus colorée, plus amincie, plus tannée.

Arrive le second degré de l'affection qui se dessine par des phénomènes locaux et des phénomènes généraux plus graves. Amincissement de plus en plus prononcé de la peau, état plus ou moins parcheminé de ce tissu ; coloration brune ; disparition complète du tissu graisseux ; état très dessiné des tendons qui se prolongent sur la face dorsale des mains. Aussi quelques auteurs ont-ils comparé

peau des mains à celle des pattes de l'oie, d'où ils l'ont désignée us le nom de *peau ansérine*. Écailles épidermiques plus marquées, ais adhérentes; elles ne tombent qu'à la fin du printemps; chez ielques sujets, vésicules, phlyctènes, pustules ou croûtes.

Du côté de l'état général, éblouissements, vertiges, sorte d'état ivresse qui fait que le malade a une démarche vacillante et parıis des tendances à tourner sur lui-même. Passe-t-il de l'ombre ı soleil, il est tout à coup frappé d'étourdissements, et aussi rapiement que par la foudre. En même temps le malade perd toute sa ıieté et son énergie; il arrive peu à peu à un état de tristesse vériıblement effrayante. Chez beaucoup de malades se montre de la *iplopie*. Les nuits se passent sans sommeil, ou le sommeil est accomıgné de rêves plus ou moins effrayants; déjà se dessinent quelıes douleurs vagues le long de l'épine, un commencement de ıchialgie. Quant aux fonctions digestives, elles s'accomplissent fort ıal. Il y a peu d'appétit, de la diarrhée plus ou moins permanente. uis se montrent, suivant les individus, une série de phénomènes ıriables. Celui-ci éprouve dans le cerveau la sensation d'une meule e moulin qui tourne; celui-là croit sentir les battements d'un ıarteau, ou entendre le son d'une cloche, le chant d'une cigale. hez quelques-uns se montrent parfois le dégoût de la vie et la ensée du suicide.

Dans un troisième degré de l'affection, la peau des parties atteintes ıt devenue réellement malade : elle se couvre de croûtes noirâtres; y naît des fissures et même quelquefois des ulcérations d'aspect ınieux, tout en se colorant de plus en plus, de manière que les ıains ressemblent un peu à celles des lépreux.

Les facultés intellectuelles se troublent de plus en plus et s'afıissent; la pensée du suicide devient dominante, et c'est toujours ers l'eau qu'elle est dirigée. La rachialgie devient convulsive; elle ıtraîne souvent l'*opisthotonos*, des contractions convulsives des ıuscles du cou latéraux ou postérieurs; un affaiblissement croisınt de la circulation; de l'*amblyopie crépusculaire*, des soubreauts partiels des muscles, des crampes, des spasmes cyniques; un tat douloureux de toute une moitié du corps que M. Roussel a ésigné sous le nom d'*hémiopalgie*, et qui paraît plus particulière-

ment se dessiner sur le côté gauche du corps ; une puanteur qui se répand autour des pellagreux qui tombent dans le délire; une diarrhée colliquative que rien ne peut arrêter ; un amaigrissement en rapport avec cet ensemble de phénomènes. Puis un état de démence continuel qui s'empare de ces malheureux et qui les amène à une sorte de stupidité. La face terreuse, à traits effilés, porte l'empreinte de la vieillesse. Des sueurs fétides se montrent, et les malades ne tardent pas à succomber soit à la diarrhée incessante, soit à des maladies intercurrentes, des états typhoïdes, la tuberculisation pulmonaire, une dysentérie, une hydropisie générale, ou le développement du scorbut, de là le nom de *scorbut alpin* que la pellagre avait reçu à Milan. Enfin, chez des sujets jeunes et vigoureux, le délire va jusqu'à la méningite, qui amène la mort.

Cette maladie parcourt ses périodes durant un espace de temps variable : huit, dix, vingt années. On a vu des pellagreux vivre soixante ans, au milieu des tourments physiques et moraux qu'entraîne une pareille affection. C'est ce que Calderini a observé à l'hôpital de Milan. Tel est l'ensemble des phénomènes locaux et généraux qui sont propres à la pellagre. Les observations que nous relatons à la fin de cet article donnent des exemples de cas de pellagre qui se sont présentés à notre observation à Paris. Il est rare qu'il s'écoule une année sans que nous en observions un ou deux du même genre à l'hôpital.

Quant aux altérations pathologiques que l'on remarque à l'ouverture des corps, elles ne sont le plus souvent pas spéciales à la pellagre ; car c'est par des complications de maladies que la mort survient. Chez tous ou presque tous, altération du canal digestif que l'on peut rattacher à la gastro-entérite à forme plus ou moins aiguë; péritonite chez quelques malades; membranes du cerveau, arachnoïde et pie-mère injectées, infiltrées, adhérentes, épaisses, opalines ; augmentation dans la consistance du cerveau et de la moelle épinière; substance cérébrale et cérébro-spinale sablée. Chez quelques-uns absence complète de liquide.

Que si l'on compare l'ensemble de ces phénomènes à ceux qui ont été signalés dans le *scorbut alpin*, le *mal de la rosa* des Asturies, le *mal de la Teste*, ou pellagre des Landes, la *pellagre des Landes*,

la *pellagre du Lauraguais* (département de la Haute-Garonne et de l'Aude), et celle observée dans le centre de la France, on trouve une analogie la plus complète dans ces maladies, à des degrés divers suivant les pays.

Reste la question de la cause de cette singulière maladie, point de la recherche duquel s'est surtout attaché M. Théophile Roussel dans son excellent ouvrage sur cette affection (*De la pellagre*, Paris, 1845); elle nous conduirait à des détails intéressants, sans doute, mais inutiles au point de vue pratique. Il a voulu rattacher exclusivement à l'alimentation par le maïs le développement de cette affection. Il a été facile de prouver que la pellagre existait d'abord dans des contrées où l'on ne faisait pas un usage habituel du maïs, mais encore qu'elle n'existait pas dans des pays où les habitants en faisaient un usage exclusif. Certes, l'alimentation doit entrer pour beaucoup dans le développement de cette affection, mais c'est la mauvaise alimentation, due d'ailleurs à d'autres causes débilitantes qui se rattachent aux divers actes de la vie et surtout aux conditions sociales des individus.

Quant au traitement, c'est ici le cas ou jamais de faire une médecine des symptômes: c'est celle qui réussit le mieux. Rarement des émissions sanguines; un régime simple, doux, émollient, dans le cas de l'existence de phénomènes qui dénotent l'activité de la circulation ou qui se rattachent à une surexcitation nerveuse. Sous ce rapport aussi l'emploi des calmants, mais celui des opiacés à petite dose. S'attacher surtout à combattre la diarrhée, à soutenir les forces du malade, mais autant avec les toniques proprement dits que par une nourriture succulente et en petite quantité.

Le 5 juillet 1843, un homme se présente à ma consultation : c'était le nommé Guéret (François), âgé de trente-quatre ans. Dès l'abord, à la vue de sa mains, à l'aspect de sa physionomie et de son allure, que l'on me passe l'expression, je diagnostiquai immédiatement une pellagre. Il était charretier-conducteur de plâtre de Pantin à Paris, sans cesse sur la grande route, exposé à l'ardeur du soleil. Fort d'ailleurs, très trapu, bien constitué et n'ayant jamais saigné personne dans une lutte, ainsi qu'il le dit. Sa vie est régulière ; il boit, mais sans excès, sans jamais se griser ; il se nourrit parfaitement. Levé à trois heures du matin, il charge son plâtre, mange un morceau et boit un verre de vin ; il fait dans le cours de la journée trois repas de viande, et prend deux

ois de la soupe. Un jour, nous dit-il, j'étais endormi sur ma voiture, le dos étendu sur mes sacs de plâtre vides, exposé d'ailleurs à l'ardeur du soleil; je revenais à Pantin. Je suis tout à coup éveillé en sursaut par un vif sentiment de cuisson; je porte mes mains à ma figure et je frotte en même temps le dos de mes mains; j'éprouve des éblouissements, et j'arrive chez ma bourgeoise comme un homme ivre: je n'avais pas pris plus de vin que de coutume.

La nuit se passe agitée; le matin la figure est rouge, animée: j'avais reçu un coup de soleil.

Je garde plusieurs jours de repos. Cependant l'appétit ne revient pas; je fus pris de diarrhée, ma démarche resta vacillante, les membres devinrent faibles, je perdis toute énergie.

Mais loin de se dissiper, l'espèce d'état d'ivresse dans lequel il se trouvait fit des progrès; de temps en temps des éblouissements; le passage de l'ombre au soleil était surtout marqué par un malaise instantané, qui le forçait à s'arrêter pour se maintenir sur le sol les deux jambes écartées. L'appétit était nul, aussi l'amaigrissement était survenu. Six semaines s'étaient ainsi écoulées dans des variations de bien et de mal, c'est alors qu'il fut admis dans notre service. La figure était rouge, animée, les yeux saillants, très brillants et se rapprochant de l'expression d'un homme ivre; les bras étaient sans cesse en mouvement comme dans l'état de demi-ivresse; la parole brève, jetée avec abandon; les réponses saccadées. Le dos des mains était d'un brun rougeâtre, la peau sèche, plissée, amincie et un peu parcheminée. Il s'y montrait un sentiment de picotement et de cuisson qui devenait surtout très intense lorsque les mains recevaient l'ardeur du soleil. Quant à la poitrine, elle ne présentait aucune plaque érythémateuse; mais il faut dire que cet homme tenait constamment sa chemise fermée par une agrafe au col.

Je montrai ce malade à l'Académie: c'était le troisième cas que l'on observait à Paris. Quelques-uns reconnurent avec moi la pellagre; mais le plus grand nombre mit en doute ce diagnostic.

Le malade fut traité par la médecine expectante, et il sortit guéri au bout de six semaines, me promettant bien de changer d'état. Cependant il n'en fit rien, et le printemps suivant il fut repris des mêmes symptômes, mais plus intenses, et avec des phénomènes cérébraux plus marqués. — Quand de nouveau il crut changer de profession en se bornant à conduire des charrettes de charbon dans les rues de Paris, il fut peu incommodé le printemps suivant, et ne vint pas à l'hôpital; mais il s'y présenta l'année d'après avec des phénomènes cérébraux des plus marqués. Il ressemblait tout à fait à un homme ivre: sa démarche était vacillante; il était quelquefois obligé de tourner plusieurs fois sur lui-même, en rejoignant le mur de la rue pour s'y appuyer. D'ailleurs toujours de la diarrhée. Les mains s'étaient de plus en plus desséchées, et l'amaigrissement général était plus marqué. Il sortit encore bien rétabli, mais il fallut un séjour de deux mois et demi à l'hôpital. Depuis cette

que je ne l'ai plus revu. A-t-il changé de pays? cela est probable, car il
honteux que la pellagre lui ait fait défaut pendant plusieurs années, et il
ait certainement revenu me trouver. Il avait déjà un penchant au suicide
le dégoût de la vie que lui inspirait sa position.

Observation recueillie par M. Goré, *interne de mon service. — Pellagre,
et érythémateux de la face, sans altération des mains.*—Le 16 juin 1847,
malade se présente à la consultation de l'hôpital Saint-Louis avec un facies
remarquable pour que M. Devergie, sans autre question préalable que
de connaître la profession de cet individu, le reçût dans son service, et
immédiatement pour diagnostic : *pellagre.* Nous fûmes vivement im-
sionné de ce diagnostic, ainsi que les élèves présents à la consultation, et
recueillîmes bientôt les détails suivants sur ce malade, qui, durant son
à l'hôpital, fut examiné avec une scrupuleuse attention par un grand
de médecins et d'élèves.
Delaunay, charretier, âgé de vingt-cinq ans, demeurant rue de la Bour-
, à la Villette, vit apparaître au printemps de 1845, sur chaque joue, une
plaque rouge, irrégulière, qui augmenta de plus en plus en étendue au
de recouvrir bientôt les deux joues ; il y avait en même temps, au
et pendant les grandes chaleurs, une démangeaison vive qui, ainsi que
rougeur, diminuait lorsque le malade restait à l'ombre. Quelques sym-
mes généraux, mais peu intenses, tels que malaise, lassitude générale,
pétence, etc., ne remarquaient seulement de temps à autre. Il n'existait
alors aucun trouble digestif, aucun désordre cérébral bien marqués.
chaleurs cessèrent et avec elles tout disparut. Cet homme jouit d'une
santé pendant l'hiver de 1845 à 1846, mais il éprouva au printemps
cette dernière année les mêmes symptômes que ceux précédemment
cés. Bien que ces phénomènes, si l'on ajoute foi au rapport du malade,
dû être plus prononcés que la première fois, il n'y eut encore ni dé-
cérébro-spinal, ni trouble digestif assez intenses pour le forcer de quitter
occupations habituelles.
l en fut autrement cette année. Pour la troisième fois, la maladie éclata en
une marche bien différente de celle des années précédentes. Les
mènes cutanés, qui s'étaient jusqu'alors montrés à peu près seuls, ne
pas un grand développement ; mais en revanche des troubles diges-
et cérébro-spinaux assez intenses se manifestèrent pour la première fois
rent éclairer le diagnostic.
De la plupart des causes que l'on puisse soupçonner en pareil cas, telles
la misère, une mauvaise alimentation, la consommation de céréales alté-
, l'excès de travail, une habitation malsaine, etc., il n'en est aucune qui
pu exercer son influence sur notre malade. Une seule cause occasionnelle,
la plus puissante de toutes, l'insolation, a paru agir dans ce cas ; cet
me, en effet, obligé par sa profession de rester la plus grande partie du

jour dans les champs ou sur les routes, se trouve exposé à l'ardeur des rayons du soleil.

Mais laissons de côté, pour le moment, l'étiologie et sa valeur dans ce cas relativement au diagnostic, et racontons ce que cet homme éprouva cette année.

Ce fut seulement le 10 juin que Delaunay fut pris au milieu de ses occupations, et sans cause appréciable, de violents maux de tête et d'étourdissements. Les jours suivants, il continua de travailler; mais le 13 juin, il fut obligé de quitter ses chevaux et sa voiture. Il éprouvait alors un malaise général, de l'abattement, de la tristesse, de l'éloignement pour le travail; en même temps céphalalgie plus intense, étourdissements plus fréquents. Ces symptômes, loin de disparaître, ne faisant qu'augmenter en intensité, il entra à l'hôpital Saint-Louis dans l'état suivant :

La figure revêt un cachet tout particulier; elle est amaigrie, tiraillée, empreinte de tristesse mélancolique ou hypochondriaque, en même temps que les yeux sont brillants et comme saillants dans leurs orbites. La peau des joues, un peu amincie et sèche, présente çà et là des plaques d'un rouge brun, parsemées d'écailles épidermiques adhérentes, qui tranchent d'autant plus sur les parties voisines, que celles-ci offrent une teinte terreuse. Cette couleur sombre des pommettes était accompagnée d'une sensation de chaleur, de tension et de prurit, surtout au soleil. Cependant la figure était amaigrie et non pas tuméfiée.

La peau du reste du corps, du dos des mains et des pieds, n'offrait aucune altération. A la paume des mains et à la plante des pieds, l'épiderme est jaune et très épais, ce qui rend la peau très épaisse et calleuse. Quant à cette dernière altération, due sans doute à la profession pénible de notre malade, elle datait d'années antérieures à la maladie de la face.

On observait d'ailleurs de l'anorexie, de la soif; la langue était saburrale, blanchâtre au milieu, rouge écarlate à la pointe et sur les bords; les lèvres étaient rosées; les gencives, un peu tuméfiées, offraient à leur bord libre, près du collet des dents, un liséré d'un rouge vif; la salive était plus abondante et de saveur salée; enfin, quelques douleurs à l'épigastre et dans l'abdomen, quelques garderobes liquides à de longs intervalles.

Malgré ces symptômes, le malade conservait de l'appétit, et celui-ci était assez dessiné pour qu'au quatrième jour de son entrée, ayant été mis à des potages pour aliments, il menaçât de sortir de l'hôpital si l'on ne lui donnait pas à manger. D'ailleurs il était assez triste, abattu, la face hébétée, se plaignant de céphalalgie avec vertiges, amblyopie, rêvasseries pendant la nuit, douleurs et fourmillements siégeant aux reins et le long de la colonne vertébrale, mais ne s'étendant pas aux extrémités; faiblesse des membres, marche incertaine, chancelante, analogue à celle d'un homme ivre; crampes dans les doigts et les pieds. La peau est douce, le pouls est un peu fréquent (84), sans résistance. Le malade se plaint par-dessus tout de ses maux de tête :

son amaigrissement ne date que de huit jours. — Orge et chiendent pour tisane; deux bouillons, deux soupes.

Le 19 juin, le malade a eu trois selles liquides dans la journée, un sommeil agité, rêvasseries pendant la nuit. La langue est sèche et rouge à la circonférence; malaise général, affaissement, mais pas de fièvre. — Riz gommé pour tisane; cataplasmes laudanisés sur l'abdomen; lavements laudanisés; bouillons.

Cet état se prolonge jusqu'au 21 juin, époque à laquelle le pouls se relève, devient plus fréquent; de la sensibilité se montre à la pression du ventre. Aussi le malade, qui faisait l'objet de l'attention des élèves et des médecins qui assistent à la clinique de M. Devergie, était-il considéré par les uns comme un pellagreux, par les autres comme ayant une fièvre typhoïde. M. Devergie fait appliquer quinze sangsues à l'anus en recommandant de les faire peu couler. A partir de ce moment, il s'opère un changement et une amélioration progressive si notable, que toute pensée de fièvre typhoïde disparaît, et que chacun se range au diagnostic qui avait été primitivement porté.

En effet, le lendemain, plus de céphalalgie, langue un peu moins rouge, pas de coliques, deux garderobes.

Le 24, le malade n'a eu qu'une garderobe sans dévoiement, et l'appétit est si prononcé qu'il veut manger; du reste, la peau est moite et la figure meilleure. M. Devergie lui accorde une portion.

Le 25 juin, on remarque que la sécrétion salivaire est diminuée et que la saveur salée n'existe plus. Enfin, il n'y a plus de diarrhée, plus de coliques; les douleurs de tête, du dos et des lombes, diminuent chaque jour avec la prostration. — Deux portions.

Le 2 juillet, l'amélioration est de plus en plus notable; la figure bien, quoique encore amaigrie; elle n'est plus aussi empreinte de mélancolie, les traits sont épanouis. Le malade mange deux portions d'aliments et n'éprouve aucun malaise, aucun trouble digestif ou nerveux; appétit excellent, digestions très bonnes, sommeil paisible.

De tous les symptômes dont nous avons constaté l'existence à l'entrée du malade, deux seulement persistent encore aujourd'hui: ce sont la faiblesse dans les jambes et le liséré rouge des gencives.

Malgré cet état, on peut regarder comme complétement guéri le nommé Delaunay, qui sort de l'hôpital Saint-Louis le 10 juillet 1847, promettant d'abandonner la profession de charretier.

Observation recueillie par M. RIPOLL, *interne du service.* — Ayrel (Jacques), trente-deux ans, mesureur de charbon, né dans le département du Cantal; entré le 20 mai 1848, salle Saint-Louis, 66. Tempérament nerveux sanguin, bonne constitution. Son père est vivant et bien portant; sa mère a succombé à une fièvre inflammatoire; lui-même jouit d'une excellente santé, il n'a jamais été malade. Il y a six ans, il a eu une blennorrhagie qu'il a

gardée pendant six mois, et qui a cédé aux balsamiques drastiques. Il y a douze ans qu'il exerce sa profession. Exposé aux ardeurs du soleil toute la journée, et le travail étant très fatigant, son appétit est toujours très vif; il mange bien, fait usage d'une nourriture saine et digère bien; il n'a jamais subi de privations sous ce rapport. Il boit habituellement de un à trois litres de vin dans sa journée, quelquefois quatre; il porte très bien le vin, dit-il, il ne s'est jamais grisé. Son domicile présente toutes les conditions d'hygiène possibles; ses vêtements de travail consistent dans une chemise dont les manches sont relevées au-dessus du poignet, et un gilet boutonné jusqu'au cou. L'année dernière, au mois de mai, il fut pris de diarrhée, de perte d'appétit, d'étourdissements; parfois il lui arrivait de marcher comme un homme ivre, en allant en arrière tandis qu'il voulait aller en avant; mais il n'a jamais remarqué que l'insolation ou l'exposition à l'ombre fussent pour rien dans la production de ces phénomènes. Il survint des douleurs vives dans la région lombaire, une lassitude générale. Bientôt il s'aperçut que le membre inférieur gauche perdait de sa force, cependant il pouvait encore marcher sans bâton; il se mit à l'usage de tisanes rafraîchissantes. Au bout d'un mois, il remarqua avec étonnement, un matin, après avoir lavé ses mains, que le dos de celles-ci ne présentait pas le même aspect que la veille. L'épiderme était desséché, gercé, et s'enlevait par écailles; il fit alors des onctions avec le beurre de cacao. Il éprouvait au siége du mal de très vives cuissons. Pendant une quinzaine de jours encore il continua son travail; mais enfin, voyant que ni la diarrhée, ni ses douleurs, ni la faiblesse du membre, ni la gerçure des mains, ne subissaient d'amélioration, il se présenta à la consultation de l'Hôtel-Dieu. Il fut admis dans le service de M. Roux, qui ne lui prescrivit que le repos et le régime; au bout de dix jours il sortit de l'hôpital dans le même état. Il alla alors consulter un médecin qui le soumit à l'usage de pilules purgatives dont il ignore la substance, et sous l'influence desquelles la diarrhée cessa complétement; l'appétit revint, le membre reprit un peu plus de force, mais l'aspect des mains ne fut pas modifié. Il reprit son travail habituel. Peu de temps après la diarrhée avait reparu, il avait quatre ou cinq selles dans le jour; la nuit se passait bien; la faiblesse du membre était devenue tout aussi grande que précédemment. Quant aux mains, elles étaient toujours dans le même état; il continua néanmoins son travail sans faire aucun traitement, sans rien changer à son régime habituel. A cette époque il a vu se supprimer une transpiration journalière, générale, très abondante, aux pieds surtout: depuis elle ne s'est point rétablie. A la fin de l'été, quand le soleil a été un peu moins ardent, il lui a semblé que ses mains allaient mieux, mais ni la diarrhée, ni la faiblesse du membre ne diminuaient; cette dernière même subissait chaque jour de l'accroissement. Il est cependant resté sans traitement, travaillant toujours, jusqu'au commencement de mai 1848. A cette époque, la maladie, qui avait, aux mains surtout, subi une modification sensible pendant l'hiver, a repris de l'intensité sous l'influence des

premières chaleurs. L'affaiblissement étant extrême, la maigreur très grande, l'appétit perdu, l'état des mains s'aggravant, il a cherché à entrer dans un hôpital : il a été admis le 8 mai à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. Husson, qui a pensé avoir affaire à un état typhoïde. Il l'a soumis à l'usage des bains sulfureux, a prescrit des cataplasmes sur le ventre, une tisane amère, des lavements et des purgatifs. Le cinquième jour, la diarrhée était supprimée, et la douleur lombaire, la faiblesse du membre diminuées. Le sixième jour, on a commencé à nourrir le malade; il est sorti le 19 mai. Cependant les douleurs lombaires, la faiblesse du membre semblant empirer depuis quelques jours avant la sortie du malade de l'hôpital, et l'état de ses mains finissant par inquiéter, il se présente à la consultation de M. Devergie, à l'hôpital Saint-Louis. Il est admis le 20 mai 1848. — *État actuel.* Il n'a pas de douleur de tête dans ce moment, mais il est sujet aux migraines; la vue est un peu affaiblie, l'ouïe est un peu dure du côté droit; il y a de ce côté des tintements d'oreille; l'intelligence est assez nette, un peu lente; il dort bien, il est un peu triste; il a souvent des fourmillements le long de la colonne vertébrale; rien d'anormal du côté des gencives et de l'appareil salivaire, rien au cœur et aux poumons; le pouls est un peu lent, petit; il a bon appétit et digère bien; il est un peu amaigri; il éprouve sur le côté gauche de la région lombaire de très vives douleurs : qu'il soit couché, assis ou debout, elles sont égales le jour et la nuit : une assez vive douleur se fait également sentir dans le creux poplité de la jambe gauche. Ce membre est faible, le malade le traîne en marchant, la pointe du pied en bas et un peu en dehors, de façon à broncher très fréquemment; il marche sans bâton cependant, mais il ne peut aller que très doucement. Lorsqu'il veut presser son pas, il est bientôt obligé de s'arrêter, car alors il sent ses jambes fléchir sous lui; son corps se couvre d'une sueur froide, il est pris de vertige, il va tomber en arrière; à ce moment la douleur devient tellement vive dans la région lombaire, que malgré qu'il s'appuie d'une main pour se maintenir debout, il porte vivement son autre main sur la région lombaire du côté gauche pour la soutenir. Sur le dos des deux mains également l'épiderme est desséché, comme parcheminé, brillant, fendillé, brisé çà et là en écailles soulevées sur les bords et qu'arrache le malade. Quelques jours à peine après la chute de ces écailles, dit le malade, il s'en produit de nouvelles. Au-dessous le derme est légèrement injecté, assez pourtant pour trancher nettement sur la pâleur de la peau voisine. Cet aspect se remarque à partir d'un peu au-dessous de la racine des doigts, sur le dos des mains, jusque sur les poignets, à une hauteur de deux travers de doigt. Sur le bord interne et externe du dos des mains et de la face postérieure des poignets, la peau reprend son aspect normal. Cet état des mains ne provoque aucune douleur, aucune démangeaison. Rien de semblable ne se remarque sur aucune partie du corps, seulement à la face on aperçoit çà et là, dans quelques points circonscrits, une sorte de desquamation furfuracée, sans changement de couleur à la peau, sans modification de

son épaisseur. — *Prescription*. Tilleul, bains simples, deux portions. Dans plusieurs points il s'est détaché des séries d'écailles, dont la chute laisse à nu un nouvel épiderme très fin et d'apparence normale. L'injection dermique paraît diminuée, surtout dans les points où les écailles se sont détachées. Le malade est moins triste et a bon appétit.

26 mai. Le malade ce matin a de la fièvre ; il n'a pas d'appétit, la soif est vive, la langue blanche, piquetée ; il y a des étourdissements qui rendent la marche impossible ; il y a un sentiment de froid extrême dans le genou gauche, céphalalgie violente sus-orbitaire et occipitale, douleur lombaire excessive. Deux bouillons. — 27 mai. Céphalalgie moindre, pas d'éblouissement, appétit, soif moins vive, froid à peine sensible dans le genou ; la fièvre est tombée ; hier soir, épistaxis abondante, quelques vésicules d'herpès se montrent sur la lèvre supérieure. Une portion. — 29 mai. Le malade est rétabli de son indisposition dernière ; la desquamation des mains est presque terminée, il ne paraît pas devoir se former de nouvelles écailles épidermiques, le derme perd chaque jour sa coloration rouge-brun, la main semble être un peu *engraissée* ; un seul phénomène persiste à peu près au même degré, c'est la douleur lombaire et la faiblesse du membre ; la sensation de froid diminue, l'état général est excellent. Tilleul, bain simple, douches de vapeur dans la région lombaire. Trois portions. — 3 juin. Les mains du malade ont repris à peu de choses près leur coloration et leur embonpoint normal ; quant à la desquamation, elle ne se reproduit pas. L'état général est bon, le malade a bon appétit, son membre reprend de la force, la douleur lombaire est moindre ; le malade se plaint d'avaler difficilement, de souffrir de la gorge. Celle-ci, examinée, présente une légère rougeur. Constipation depuis quelques jours. — Même prescription, plus un gargarisme aluminé et purgation avec jalap. — 8 juin. L'aspect des mains est parfaitement normal, le facies a repris son expression habituelle ; le malade est gai, il a bon appétit et digère bien, il a presque repris toutes ses forces ; les douleurs lombaires sont à peine sensibles, il n'y a plus de sensation de froid dans la jambe, la tête est parfaitement libre. — 9 juin. Le malade sort complétement guéri.

LÈPRES.

Lèpres avec hypertrophie :	Lèpres avec atrophie :
Éléphantiasis des Grecs.	Lèpre anesthésique de l'Inde.
Éléphantiasis des Arabes.	Lèpre de Holstein.
Mal rouge de Cayenne.	Radesyge.
Jambe des Barbades.	Mal de Crimée.
Andrum de Malabar.	Lèpre des Hébreux.
Pedarthrocace.	Mal-mort.
Senki du Japon.	Lèpre de France.
Labri-suicium d'Irlande, ou chéilocace.	

Jusqu'alors on a décrit isolément chaque espèce de lèpre sans chercher à les rattacher directement entre elles par des caractères

spéciaux communs à certaines variétés. M. Rayer a cependant commencé ce rapprochement en décrivant les unes à côté des autres les variétés qui ont entre elles de l'analogie et en formant ainsi plusieurs groupes. Je crois qu'on peut aller plus loin et dire que la lèpre est une maladie générale de l'économie, plus spéciale à certains pays, à certaines contrées qu'à d'autres, mais qui peut naître sous tous les climats. Je relaterai ici plusieurs exemples de lèpre française, qui a toujours une marche lente, chronique, menaçante pour la vie, et qui est caractérisée par les principaux phénomènes d'hypertrophie ou d'atrophie des parties malades, et dans lesquelles on observe l'existence de tubercules plus ou moins nombreux et plus ou moins volumineux, celle de taches ou décoloration de la peau avec *insensibilité* de la partie affectée, cette dernière condition se remarquant surtout dans la lèpre avec atrophie. Quant aux sécrétions, aux ulcérations et à la gangrène, elles ne se voient qu'accidentellement, et ne constituent pas un phénomène commun comme ceux que je viens de signaler.

Quoi de plus propre à jeter de la confusion que ces dénominations de lèpres par le pays où on les rencontre; elles ne laissent rien à l'esprit, elles n'apprennent rien. Certes la lèpre des Grecs, qui affecte principalement la figure, de manière à lui donner de la ressemblance avec le facies du lion, se distingue de la lèpre des Arabes qui atteint spécialement les jambes; mais ces deux sortes de lèpres ne se relient-elles pas entre elles par les variétés qui amènent l'hypertrophie de la figure, des bourses, des seins, du ventre ou des membres; de même pour les lèpres avec atrophie, qui, au lieu d'augmenter le volume des parties, ne font que le diminuer progressivement au point d'amener l'émaciation, la maigreur générale. Nous croyons donc être plus logique en groupant sous ces deux chefs toutes les lèpres, et en établissant ensuite les différences qu'elles peuvent présenter entre elles.

Un autre inconvénient de la dénomination employée par les dermatologistes, c'est celui de faire croire que telle lèpre propre à un pays ne peut se montrer que dans ce pays-là seulement. C'est là une erreur qu'il faut détruire, et puisqu'on observe assez fréquemment encore des lèpres en France, il est bien probable qu'il peut

s'en rencontrer dans tout pays, sauf à réserver à certaines contrées le berceau de telle ou telle variété de lèpre.

Caractères des deux catégories de lèpres. — Hypertrophie des parties molles. — Ce phénomène est commun à toutes les lèpres de la première catégorie, mais l'augmentation de volume ne s'opère pas de la même manière dans chacune d'elles. Ainsi, dans l'éléphantiasis des Grecs, c'est par une hypertrophie du tissu cellulaire sous-cutané et par des tubercules, qui se montrent principalement au front, aux sourcils, que la maladie débute; c'est par la multiplicité et l'augmentation de volume de ces tubercules, qu'il s'opère une prédominance des sourcils, en même temps que les joues, le nez et les lèvres prennent aussi de l'accroissement; mais c'est surtout le volume du front et celui des sourcils qui augmentent en même temps que la forme de ces parties est conservée ainsi que les rides ou plications naturelles qui s'y trouvent; de là l'enfoncement des yeux qui conservent leur volume, et la physionomie léonine que prend la figure. La peau, d'ailleurs, tout en devenant plus ferme, plus consistante, conserve une grande partie de sa souplesse. Le tissu cellulaire, tout en prenant de l'accroissement, ne s'engorge pas comme dans la lèpre des Arabes.

Dans celle-ci, ce sont principalement les membres abdominaux qui sont affectés. Ce ne sont plus des tubercules qui amènent l'accroissement de volume des parties, mais bien l'hypertrophie de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. En effet, les descriptions qui en ont été données par les observateurs français semblent empreintes de la pensée de la préexistence d'une phlébite à l'engorgement des jambes; mais, si cela se passe ainsi pour l'éléphantiasis des Arabes, que l'on peut observer sur des sujets d'origine française, il n'en saurait être de même pour la maladie prise dans la localité où elle est endémique. Le même antécédent ne saurait plus être invoqué pour la même affection qui se montrera aux seins, aux bourses ou au ventre. Il est vrai de dire que d'après les observations de Hendy, qui a décrit cette maladie sous le nom de *jambe des Barbades*, le début de l'affection peut prendre une forme aiguë, la peau devenir érythémateuse, des chapelets de ganglions sous-cutanés se dessiner le long de la partie interne du membre abdominal

affecté, en même temps que le tissu cellulaire se prend, et qu'il se manifeste un ensemble de phénomènes généraux, comme frissons, soif, malaise, efforts de vomissement, délire parfois et chaleur intense accompagnée de fréquence du pouls, bientôt suivie de sueurs prolongées, générales ou partielles; que ces phénomènes paraissent sous forme d'accès, à retours assez éloignés, qui peuvent varier de 3 à 14 par an, ou se renouveler seulement au bout de sept ans. A cette seconde période, les ganglions lymphatiques de l'aine et du jarret, devenus plus volumineux, sont quelquefois *sains* et *indolents;* mais ce qui caractérise cette espèce d'éléphantiasis, c'est surtout le développement du tissu cellulaire et celui de la peau. Le tissu cellulaire distend la peau outre mesure en augmentant de volume dans des points très variables, et cependant en conservant au membre des formes sphériques, douces, moulées, qui donnent à la totalité des muscles une conformation bizarre, et qui au toucher ne produit pas du tout la sensation de tubercules, comme dans l'éléphantiasis des Grecs; d'une autre part, la peau, qui, dans les premiers temps, pouvait être lisse, se recouvre bientôt de lames épidermiques et d'écailles grisâtres, alors que la peau s'épaissit de plus en plus. Ces phénomènes se produisent d'une manière plus ou moins marquée dans l'*andrum* du Malabar ou éléphantiasis des bourses. Dans ces diverses maladies, c'est aussi sous forme d'accès qu'elle se montre, ordinairement tous les mois; il se fait une turgescence des bourses ou du pied, parties qui restent successivement de plus en plus engorgées. Dans l'affection du Japon, désignée sous le nom de *senki*, maladie d'ailleurs très commune, qui attaque un adulte sur dix, après des phénomènes généraux, fébricitants et nerveux, il se montre sur la surface du corps une série de tumeurs, avec un engorgement prodigieux des sourcils chez l'homme, et avec un développement plus ou moins considérable de tubercules dans les grandes lèvres chez la femme.

Dans toutes ces affections il arrive une époque où, soit que la peau reste saine, soit qu'elle ait été malade, il se manifeste des points ou des espaces plus ou moins étendus, où ce tissu perd sa sensibilité quand on vient à le toucher; circonstance qui semble établir une corrélation très directe avec la seconde variété de lèpre

que nous appelons tuberculeuse ou anesthésique. Ajoutons que des ulcérations se montrent çà et là sur les mains, les poignets et sur diverses parties des membres, de sorte qu'il arrive un moment où il y a fusion par les symptômes, des deux principaux genres de lèpre que nous avons cherché à grouper.

Atrophie des parties et anesthésie. — Toutes les lèpres comprises dans la deuxième catégorie ont ces deux caractères communs très nettement dessinés. Toutes se manifestent à la surface du corps et en dehors des phénomènes généraux qui constituent une maladie d'ensemble, par le développement de taches ou de décolorations de la peau, en général très limitées, *avec insensibilité tellement prononcée, que l'on peut piquer ces taches avec une épingle sans que le malade en ait la conscience.* Dans la lèpre désignée sous le nom de *radesyge*, elles débutent à la face et elles s'étendent ensuite à la surface du corps; c'est le contraire dans la *lèpre de Crimée* (lèpre taurique ou lèpre des Cosaques); toute la surface du corps est couverte de ces taches qui débutent aux poignets, et sur le côté radial des avant-bras, pour s'étendre ensuite de bas en haut, les mains seules exceptées. Il est vrai qu'elles sont accompagnées d'ulcères mous, plats, indolents; qu'elles prennent une teinte sombre et brunâtre. Ces tubercules et tumeurs augmentent légèrement d'année en année, de manière à se transformer en ulcères, qui eux-mêmes finissent par amener la chute de toutes les phalanges des doigts; ces ulcères existent aussi bien aux joues, au palais, à la langue, qu'à la surface des membres; ils s'étendent à l'intérieur des fosses nasales et dans la trachée. C'est ordinairement dans une période de six ans que s'accomplissent ces faits, et la mort arrive avec les désordres concomitants qui se manifestent du côté du tube intestinal.

Dans la lèpre anesthésique de l'Inde, au contraire, ces décolorations très bien circonscrites de la peau se montrent aux mains et aux pieds, quelquefois le long des membres, et çà et là sur le tronc, mais beaucoup plus rarement. Elles sont insensibles, accompagnées seulement de quelques ganglions engorgés, très rarement disséminés sur le trajet des vaisseaux, aux aisselles et aux aines. Elles sont bientôt accompagnées d'un amaigrissement qui donne aux doigts un aspect effilé. Plus tard ces parties deviennent comme engourdies par

» froid; puis des gerçures dures et sèches se forment à la paume des mains et à la plante des pieds; une matière squameuse et furfuracée est disposée sous les ongles, les soulève, les décolle, les ronge, les atrophie, et détermine même leur ulcération. Cet état des ongles dans les lèpres très discrètes peut même exister uni avec faiblesse d'un membre, au début de la maladie. Plus tard la peau devient plus malade, se gerce sur les avant-bras et y reste écailleuse, elle finit par se détacher en lambeaux sans tuméfaction ni douleurs, et dans cet état les individus qui sont atteints deviennent un sujet d'horreur pour tous ceux qui les entourent. C'est par la diarrhée et la dysentérie que périssent ces individus.

La lèpre des Hébreux (*saraat*) présente des phénomènes assez analogues. Moïse, dans ses lois sur le discernement de la lèpre (chap. XIII et XIV du Lévitique), indique les signes auxquels les prêtres hébreux peuvent les reconnaître. Ces signes sont : taches blanches, allant en s'accroissant à ce point que, lorsque l'individu était tout à fait décoloré, on le considérait comme atteint de lèpre pure; tumeurs blanchâtres sur diverses parties du corps, ces taches et tumeurs entraînant la décoloration ou la chute des cheveux. Quant au mal-mort (*malum mortuum*), observé au moyen âge, il consistait, d'après Jean de Vigo, en des ulcérations des jambes et des bras, allant en s'accroissant; et en de l'insensibilité la plus complète, au point de pouvoir les inciser sans que le malade s'en aperçût.

A ces divers caractères locaux des lèpres, il faut ajouter dans tous les cas un ensemble morbide qui est tantôt sous forme aiguë dès le début, le plus souvent sous forme chronique, qui laisse dans l'économie une empreinte de faiblesse de plus en plus marquée, et finit par amener une mort plus ou moins lente. Chose remarquable, toutes les lèpres qui portent une certaine atteinte à la figure exercent une influence assez marquée sur la voix; elle la rend rauque, profonde, et le type de cette altération se fait principalement observer dans l'éléphantiasis des Grecs. Il faudrait détailler chaque espèce de lèpre pour décrire leur mode d'être et suivre leur marche et leur terminaison; nous ne saurions entrer dans ces détails que ne comporte pas notre ouvrage et que M. Rayer a reproduits avec tant de soin dans le sien.

La distinction que nous venons d'établir entre les deux formes principales de la lèpre, celle avec hypertrophie, celle avec atrophie, est bonne surtout pour l'étude, elle ne saurait exister d'une manière absolue pour tous les cas de lèpre. C'est surtout pendant les premières années qui coïncident avec le développement des états lépreux que l'on peut observer ces deux formes d'une manière tranchée: mais plus tard, dans la lèpre anesthésique ou avec prédominance de taches, d'hypertrophie des parties affectées, on voit surgir des tubercules, des engorgements ou hypertrophies des parties malades et des ulcérations; de même aussi les phénomènes opposés se montrent dans le cas contraire. Il faut néanmoins convenir que dans les lèpres des divers pays il y a en général prédominance d'un symptôme, soit des taches, soit des tubercules, soit de l'hypertrophie des parties, soit des ulcérations.

Mais il est un fait sur lequel nous devons spécialement appeler l'attention, c'est que les deux espèces de lèpres, celle avec hypertrophie, celle avec anesthésie et atrophie, peuvent naître dans nos climats, et les cas n'en sont pas très rares; nous avons pu en observer quelques exemples. MM. Andral, Larrey, Rayer, etc., en ont rapporté plusieurs. M. Bergeron a fait de l'éléphantiasis du scrotum le sujet de sa thèse inaugurale. Du IXe au XVIe siècle, on comptait en France, comme en Europe, un grand nombre d'hospices destinés aux lépreux. A une époque beaucoup plus rapprochée de nous, Vidal, Valentin et Fodéré, l'ont vu aux Martigues et à Vitrolles. Delpech cite la maladie comme étant commune dans le Roussillon; il en est de même des plaines de l'Aragon; mais M. Rayer se pose la question de savoir où la maladie a pris primitivement naissance.

Pour moi, je suis convaincu qu'elle peut naître sans avoir été importée ou transmise par des parents à leurs enfants et petits-enfants. Voici au surplus quelques exemples de lèpres, parmi ceux que nous avons observés, et dont le cachet ne saurait être douteux; sauf le fait suivant, qui m'a paru être une éléphantiasis partielle du cuir chevelu.

Éléphantiasis du cuir chevelu. — Mademoiselle X..., âgée de dix-huit ans, habitant une ferme dans le département de Seine-et-Oise (Franxeville), lieu sain, d'ailleurs sans humidité, me fut adressée par le docteur Charandet,

le 13 avril 1850. Il me demandait mon avis sur une maladie du cuir chevelu, avec invitation d'en établir le diagnostic et le traitement.

Cette jeune fille, très grande, très forte, bien constituée, avait les apparences de la santé ; seulement elle offrait, quoique colorée, les caractères du tempérament lymphatique, peau blanche, cheveux blonds, assez d'embonpoint ; étant plus jeune, elle avait eu des glandes au cou, et des poux s'étaient montrés dans ses cheveux. Réglée à l'âge de quatorze ans, la menstruation a été parfaite depuis cette époque, les fonctions digestives s'exécutent bien; rien d'anormal dans l'état des organes.

Il y a trois ans ses cheveux étaient longs et bien venus, lorsqu'elle crut sentir que la peau de la partie postérieure de la tête s'épaississait; elle y faisait peu d'attention; mais par une gradation insensible, elle devint de plus en plus pâteuse, épaisse, sans douleurs, sans démangeaison; peu à peu quelques plicatures légères se dessinèrent; elles devinrent de plus en plus profondes en même temps que le cuir chevelu formait bourrelet à leur voisinage. Ces plicatures sont aujourd'hui au nombre de cinq, trois du côté droit et deux du côté gauche; elles sont disposées de haut en bas parallèlement, semi-elliptiques; deux d'entre elles, les plus déclives, tendent à prendre la forme d'un S. La peau qui les sépare offre une saillie très notable, produite par une sorte d'empâtement qui occupe le tissu cellulaire et la peau ; cet empâtement est assez souple au toucher, quoique plus dense que le tissu graisseux. Dans les plis se trouvent des cheveux poussés très serrés les uns contre les autres, de manière à dessiner des mèches qui ont le trajet des sillons. Ces cheveux sont parfaitement sains et paraissent plutôt plus forts que moins forts que les autres; la peau n'est pas adhérente au périoste; on déplace ces plicatures avec assez de facilité.

Il y a quelques mois cette jeune fille ayant consulté le docteur Charaudet, il prescrivit diverses pommades, et notamment une dans laquelle entrait le deutonitrate de mercure. Cette pommade amena de la douleur, ce fut la seule que la malade ressentit depuis l'origine de sa maladie.

La peau elle-même paraît tout à fait saine; le tissu cellulaire sous-cutané paraissait hypertrophié comme dans l'éléphantiasis.

Lèpre tuberculeuse d'origine française. — Marchand (Henri), âgé de quarante-trois ans, laboureur, né à Vorly (Cher); admis à l'hôpital Saint-Louis, le 16 septembre 1844, et couché salle Saint-Louis, n° 18, service de M. Devergie.

Ce malade arrive de son village, qu'il a quitté pour la première fois, afin de venir se faire traiter à Paris. Son père vit encore et se porte bien ; sa mère était chétive, souvent malade; elle est morte fort jeune, emportée par une maladie rapide. Il a un frère et une sœur qu'il n'a jamais vus malades; il est marié et père de trois enfants bien portants, dont le plus jeune a sept ans. Personne dans sa famille n'est sujet aux maladies de la peau ; jusqu'à ces der-

nières années il jouissait lui-même d'une fort bonne santé, et passait, dit-il, pour un bon ouvrier; il ne sait pas ce que c'est que la vérole.

Il a toujours habité les champs; sa maison était assez saine, mais située dans une contrée peu fertile, marécageuse. Comme tous les paysans du Berry, il vivait de pain d'orge et de seigle, auxquels on mêlait un peu de froment pendant les bonnes années; il ne mangeait de viande que fort rarement, et c'était ordinairement du porc salé. La famille, du reste, ne souffrait pas de la misère, et il n'était pas plus pauvre que ses voisins.

Il y a environ cinq ans, il ressentit pour la première fois de la démangeaison au cou, puis aux bras, puis aux jambes. Des boutons se montrèrent sur ces parties, puis disparurent, laissant quelques écailles à leur place, mais rien de cette disposition noire et sèche qu'on observe aujourd'hui: le visage restait sain.

Il y a trois ans une tumeur se forma à l'aine droite, et acquit en deux ou trois mois le volume d'un œuf de pigeon; il n'y avait pas de rougeur, pas de douleur vive, mais le malade ressentait dans son membre une lourdeur insolite. Bientôt de nouvelles grosseurs se formèrent dans les deux aines; elles ne suppurèrent pas, ne rougirent pas la peau, mais apportèrent une certaine gêne dans la marche; après six ou huit mois de durée, elles finirent par diminuer de volume, mais ne disparurent jamais complétement.

En même temps que ces tumeurs suivaient leur cours, le malade aperçut sur ses bras et sur ses cuisses d'autres tumeurs de nature tout à fait différente. Celles-ci, au nombre de cinq ou six, avaient déjà le volume d'un abricot, lorsqu'il y fit attention; elles étaient rouges, assez dures, ne causant ni gêne ni douleur; leur nombre s'accrut en peu de mois jusqu'à douze ou quinze, dont quatre ou cinq sur le visage.

Pendant environ deux ans ces tumeurs persistèrent ainsi; les unes grossissant jusqu'au volume d'une noix, les autres disparaissant et étant remplacées par de nouvelles. Cependant la santé restait bonne, l'appétit persistait, lorsqu'il y a près de dix-huit mois il survint de l'amaigrissement, du trouble dans les digestions et bientôt un affaiblissement, tel que le travail devint tout à fait impossible.

Pendant ces quinze ou dix-huit derniers mois, le malade est resté dans sa chaumière, à la charge de la famille, comme il dit, et faisant le travail d'un enfant de dix ans; ne souffrant pas du reste, mangeant un peu sans en être incommodé, mais ayant de temps à autre une diarrhée qui durait cinq ou six jours et augmentait rapidement son état de faiblesse. A la peau, l'éruption et la disparition des tumeurs continua, leur volume était surtout énorme pendant l'hiver; elles laissaient en guérissant un état écailleux, mais aucune ne suppura, aucune ne se creva.

Le malade s'était habitué peu à peu à cet état, et attendait sans demander aucun secours. Mais pendant le dernier mois la faiblesse et la maigreur ayant beaucoup augmenté, il se décida à consulter un médecin, lequel, sans

prescrire aucun traitement, lui conseilla de venir à Paris se présenter à l'hôpital Saint-Louis.

A son entrée il est dans l'état suivant :

La maigreur est extrême, les yeux sont caves, le regard éteint, les pommettes saillantes et recouvertes d'une peau jaune-serin, unie, fortement appliquée sur les os. Le sujet est faible, fatigué au moindre effort, ne serre la main qu'avec une force très médiocre ; il est très inquiet de n'avoir pas pu venir à pied du chemin de fer d'Orléans, car il marche encore d'un pas assez ferme et se tient assez droit.

Il n'éprouve jamais d'oppression, jamais de battement de cœur, n'est pas enrhumé, ne crache pas. Le bruit respiratoire s'entend parfaitement normal dans toute l'étendue des deux poumons ; il n'y a pas eu de diarrhée depuis quelques jours ; le malade se sent assez d'appétit, n'éprouve pas de soif vive, urine naturellement.

Depuis plus de six mois, il n'a pas eu d'érection et n'a pas désiré approcher sa femme ; il était cependant avant sa maladie fort porté au coït.

Son intelligence est saine ; il s'exprime même fort nettement et demande avec insistance combien il faudra de temps pour le guérir ; mais sa voix est rauque, d'un timbre dur et pénible à entendre, quoiqu'il n'éprouve ni gêne ni douleur, soit en parlant, soit en avalant. L'inspection de l'arrière-gorge ne montre, au reste, aucune lésion appréciable.

Les paupières sont rouges et à peu près complétement dépourvues de cils. Dans toute l'étendue de la tête, les cheveux sont rares, courts, lanugineux ; le front et les tempes sont complétement chauves ; des écailles blanches, sèches, dures, couvrent le cuir chevelu et les sourcils.

Sur le visage, les mêmes écailles dures, sèches, adhérentes, sont disposées sans ordre ; elles abondent surtout dans les favoris, qui sont restés assez bien fournis. Sur le front, on voit quatre tubercules rosés, durs, ayant chacun environ 4 à 5 lignes de diamètre et 1 ligne $\frac{1}{2}$ de saillie.

Sur les bras, la peau est uniformément écailleuse et noirâtre ; les mains, qui offrent un état analogue, mais porté à l'extrême, ont assez l'aspect du dos d'une écrevisse crue. Cet état s'est développé peu à peu, sans éruption vive. Cette disposition est interrompue de temps en temps par des espaces de peau blancs, non écailleux, se terminant par fusion avec les parties voisines ; et l'on se demande si c'est là de la peau encore saine ou bien une altération particulière. La sensibilité est, du reste, parfaitement conservée sur ces points. Les bras et les avant-bras sont en outre le siége de tubercules de divers volumes, rosés et recouverts d'un épiderme léger et lisse. Le plus gros de tout le corps existe sur l'avant-bras gauche, vers le milieu de sa face palmaire ; il a environ 15 lignes de diamètre et 6 lignes de saillie ; il est très régulièrement demi-sphérique ; il est, comme les autres, rosé, ferme, solide, sans fluctuation. Sur la paroi antérieure de l'aisselle du même côté, se voient

plusieurs autres tubercules, dont un a 10 lignes, et deux autres de 7 à 8 lignes de diamètre.

Sur les cuisses, sur les jambes, sur le dos des pieds, sur la poitrine, sur les épaules, on remarque pareillement : 1° cet état rude, squameux et brunâtre de la peau ; 2° ces espaces arrondis, mal limités, où la peau est d'un blanc de cire, lisse et sans aucune altération de sensibilité ; 3° des tubercules peu saillants, répandus çà et là, ayant le volume de pois, de haricots, etc.

La peau du ventre est très brune, très dure, très écailleuse ; son épiderme semble fendillé, et est hérissé de rugosités comme au dos des mains ; mais jamais il n'y a eu de tubercules sur cette partie, non plus que sur les fesses, sur la plante des pieds, ni sur la paume des mains. On sent dans les deux aines des engorgements volumineux, durs, sans trace de fluctuation, qui existent depuis plusieurs années, dit le malade ; il n'y a aucune cicatrice à leur niveau.

Prescription. — Bain, deux portions.

13 septembre. — Le malade a pris trois bains prolongés qui n'ont rien changé à l'état de la peau ; il mange ses deux portions, se lève dès le matin, et est descendu quelques moments dans la cour ; mais, presque toujours, il reste assis dans la ruelle de son lit.

22. — Diarrhée depuis deux jours ; on cesse les bains ; riz gommé pour boisson, crème de riz ; lavement amidonné.

26. — La diarrhée continue ; il y a eu hier huit selles liquides exhalant une odeur extrêmement fétide, putride. Les urines sont rendues naturellement, sont claires, sans odeur. La faiblesse est grande ; le malade ne peut plus quitter son lit. Lavement avec dix gouttes de laudanum.

29. — Hier, dix selles toujours très fétides ; le malade peut à peine répondre ; mais il est plein d'espérance, et assure ne pas souffrir.

Mort le 1er octobre, à cinq heures du matin.

Autopsie. — La peau a une coloration un peu moins foncée que pendant la vie ; les tumeurs sont un peu affaissées, moins saillantes ; elles ont complétement perdu leur couleur rosée, et offrent la teinte cadavérique ordinaire. Plusieurs tubercules incisés offrent tous la même disposition suivante : la limitation est fort brusque, fort nette ; mais la tumeur adhère à la peau ambiante, et il est impossible de l'en séparer. Sa couleur est grisâtre, uniforme, sans aucune vascularisation ; sa texture est résistante, comme lardacée, sans aucune disposition fibreuse ; elle ne donne aucun liquide, soit qu'on la presse, soit qu'on la racle avec le tranchant du bistouri ; elle ne se laisse déchirer que très difficilement ; elle est recouverte d'une couche d'épiderme impossible à enlever. On ne reconnaît en aucun point les autres parties constituantes de la peau. Dans tous les points où il n'y a pas de tubercule, le derme n'a éprouvé aucune altération ; le tissu sous-cutané est aussi intact et à peu près complétement dépourvu de graisse.

La mâchoire étant sciée, la bouche, le pharynx, le voile du palais, sont

ainés avec soin ; le larynx est détaché et ouvert ; les poumons sont enle- et incisés en plusieurs points : toutes ces parties sont saines et n'offrent à noter. Le cœur est petit, mou, flasque ; il contient, ainsi que l'aorte, caillots abondants, fort adhérents, grisâtres, analogues à de la gelée de ine.

e foie est foncé en couleur, plutôt petit que gros, résistant, et difficile à hirer. Incisé, il laisse écouler une quantité de sang fort épais et noir. La te est uniformément brune, sans mélange de jaune ; la vésicule est gor- de bile ; la rate est saine. Les reins n'ont de notable qu'une rougeur assez ande. L'estomac est rétracté, sa cavité est rétrécie ; la muqueuse forme plis nombreux, couturés, régnant en divers sens. L'intestin grêle est ce, son calibre est fort étroit, mais la muqueuse est saine. La muqueuse côlon est en tous les points épaissie, tomenteuse, d'un rouge assez foncé ; s, çà et là, on voit des plaques plus saillantes, d'un rouge plus fort et une lie-de-vin. Le rectum, à sa partie supérieure, est uniformément rouge ncé, et la muqueuse est très épaisse. En outre, il existe à cette partie un nd nombre d'ulcérations nettement arrondies, ayant de 1 à 4 lignes de ètre, à bords découpés à pic, comme avec un emporte-pièce ; les ds sont adhérents, durs, tandis que le reste de la muqueuse est flasque. plus larges de ces ulcérations ont environ trois quarts de ligne de profon- r ; toutes se posent sur un fond dur, résistant, d'un jaune soufré, qui ne ait que difficilement par le grattage, et qu'un filet d'eau même assez ne peut enlever. La partie inférieure du rectum redevient saine.

ncéphale n'offre rien à noter.

a peau des deux aines étant incisée, on tombe sur des ganglions engorgés, posés en chapelet, non adhérents entre eux, enveloppés d'une coque euse, dont on les sépare facilement. Incisés alors, ils se présentent avec consistance dure, partout la même, de couleur grisâtre, et sillonnés de ns fibreuses, sans arrangement particulier ; dans l'aine gauche, un de ces glions a environ un pouce de diamètre, et plusieurs autres ont de 6 à 10 ne.

es deux bras sont détachés, et l'on pousse dans les artères brachiales une ction d'essence de térébenthine mêlée d'un peu de suif fondu, et colorée ide du vermillon. La dissection des parties injectées est faite le lendemain. jection n'a pas été suffisamment pénétrante, surtout au bras gauche ; même bras droit, on ne la trouve dans la peau qu'en de rares arcades assez dé- s et d'une étendue assez grande. En aucun point, ces arcades ni aucun filet sté ne pénètrent dans les tumeurs nombreuses examinées pour les recher- r : en certains endroits, ces filets cessent brusquement, et les arcades sont rrompues au point où commencent ces tubercules. On ne saurait donc n conclure d'une manière absolue de l'absence de l'injection dans les par- malades.

Nous avions, il y a peu de temps, dans nos salles un homme du département de l'Eure, qui avait une lèpre tuberculeuse avec hypertrophie affectant le front, le nez et les doigts. Nous joignons à ces faits trois exemples de lèpre que nous avons aussi observés, et nous plaçons immédiatement celle d'une lèpre anesthésique du département de l'Indre.

Lèpre tuberculeuse anesthésique. — Paparati, vingt-huit ans, négociant, constitution bonne, tempérament bilioso-nerveux, né à Metelin (Lesbos); il séjourne chaque année six semaines à peu près dans son pays; le reste de l'année, il le passe à Constantinople, où le retiennent ses affaires. Son père et sa sœur jouissent d'une excellente santé; sa mère est morte à la suite d'une couche; aucun d'eux n'a été touché par son affection, pas plus que ses aïeux et ses parents éloignés. Le lieu de sa naissance est distant de deux lieues de quatre villages entièrement et exclusivement remplis de lépreux; jamais il n'a eu de communication avec eux. Les premières taches qu'il a offertes à la peau se sont développées, il y a six ans et demi, à la partie postérieure de l'avant-bras droit, à la partie postérieure et interne du poignet gauche, et plus tard à la face. Ces taches se sont montrées sans influence de causes à lui appréciables. Toutefois, dans son pays et à Constantinople, les personnes de sa profession font abus de substances alimentaires très stimulantes et alcooliques. Les taches qui parurent les premières prirent un accroissement lent, et leur développement s'accompagna de l'éruption de nouvelles taches, mais moins grandes; il avait même déjà quelques tubercules, mais fort peu prononcés, quand, il y a deux ans et demi, il fut atteint d'une blennorrhagie qui fut traitée par des bains et des potions dont il ne connaît pas la nature; il ajoute qu'un autre médecin lui prescrivit, un peu plus tard, contre cet écoulement, qui n'avait pas complétement disparu, de l'acide arsénieux, dont il ne peut préciser la dose; il en a pris pendant treize jours dans du lait. Pendant ce traitement, les taches, qui primitivement se développaient avec assez de lenteur, prirent une marche plus rapide; les légers tubercules déjà existants s'accrurent et se multiplièrent; tout resta alors dans l'état stationnaire. Mais, deux mois plus tard, il fit, comme traitement de la lèpre, usage d'une préparation mercurielle qu'il ne peut définir, qui fut continuée pendant vingt-cinq jours, et suivie d'un accroissement des tubercules et des taches. On cessa alors cette médication, qu'on lui conseilla de reprendre plus tard, et les accidents restèrent stationnaires. Il demeura alors quatre mois sans traitement, prit de nouveau le mercure, sur l'indication d'un médecin italien, pendant quinze jours: nouveaux accidents, nouvelle suspension. Il fit alors usage de l'iodure de potassium pendant cinquante jours, il ne sait à quelle dose. Ce traitement avait été précédé de quatre purgations et de quatre saignées dans l'espace d'un mois. L'iodure de potassium fut porté à

des doses de plus en plus élevées ; on y joignit l'usage de pilules mercurielles. La maladie ne fit qu'augmenter, les forces s'amoindrirent. Le traitement fut suspendu, et repris après trente jours de repos ; il amena de nouveaux accidents, qui déterminèrent son médecin à l'envoyer à Paris.

Jamais ce malade, depuis sa blennorrhagie, n'a éprouvé d'accidents du côté de la gorge ni de douleurs ostéocopes.

État actuel. — A la face se voient des tubercules disséminés, de différentes grosseurs, offrant une coloration fauve et une sensibilité presque nulle dans quelques-uns, complétement nulle dans d'autres. Les plus volumineux siégent au-dessus des sourcils, à la joue droite et au menton ; ceux de la joue gauche présentent moins de volume, et la peau y conserve à peu près sa coloration normale ; quelques tubercules même, dans ce point, sont tout à fait sous-cutanés, et ne peuvent être perçus qu'au toucher. Les bras sont le siége de taches fauves, disséminées, insensibles ; lorsqu'on les attaque avec une épingle, le malade n'éprouve aucune douleur ; il ressent seulement la pression qui se transmet aux parties sous-jacentes à la peau. Sur la face postérieure du bras droit se voient des cicatrices, traces d'ulcérations qui ont été la suite d'applications de pommades douées d'une grande énergie, mais dont l'action n'a pas été ressentie par le sujet. L'affection, de ce côté, se termine au-dessous de l'articulation radio-carpienne, en obliquant vers le petit doigt, qui aussi est atteint. A l'avant-bras gauche, les taches sont plus rares, disséminées, et dans leurs intervalles la sensibilité se conserve à l'état normal. A la partie postérieure, inférieure, interne de l'avant-bras gauche, existe une tache large, fortement colorée, qui se lie à un épaississement de la peau ; dans ce point, elle est d'une insensibilité absolue. Les cuisses et les jambes sont parsemées de taches analogues, insensibles ou moins sensibles qu'à l'état normal ; la peau, au-dessous d'un certain nombre, est indurée et tuberculeuse. Des tubercules profonds, sous-cutanés, forment comme des chapelets ; à la partie postérieure des jambes, ils ont un volume assez considérable ; la peau qui les recouvre n'a point subi d'altération de couleur ; ils sont doués d'une exquise sensibilité. La pression exercée sur la partie inférieure des jambes du malade y détermine de la douleur. Les pieds et les mains se gonflent spontanément, et le gonflement disparaît de même ; du reste, l'état général est satisfaisant, l'appétit est bon, les fonctions s'exécutent bien.

Lèpre tuberculeuse. — Gautier, quarante-neuf ans, manœuvrier (département de l'Indre). Son père n'a jamais eu d'affection cutanée, est mort à quarante-neuf ans ; sa mère est morte à vingt-quatre ans, d'un purpura ; un frère du même lit que lui est faible, mais a la peau saine ; un autre frère et une sœur d'un second lit sont faibles aussi, mais sains du côté de l'organe cutané ; cinq enfants dont il est le père, et sa femme, jouissent d'une santé parfaite.

Pendant toute sa vie, il a fait un usage à peu près exclusif de l'alimentation végétale et des boissons aqueuses.

Atteint de variole à l'âge de quatorze ans, il était soumis déjà depuis sa plus tendre enfance à des démangeaisons perpétuelles, qui s'exaspéraient lorsqu'il se livrait à quelque exercice violent, ou sous l'influence des variations atmosphériques. Ces démangeaisons et leurs exacerbations offraient leur maximum d'intensité pendant l'été, à l'époque des fortes chaleurs, et alors elles étaient portées si loin, qu'elles forçaient le malade à exercer des frictions sur les diverses parties du corps, mais principalement sur sa poitrine ; toutefois, à cette époque, elles n'existaient ni à la tête, ni à la face, ni aux extrémités; elles s'amoindrirent même sur les autres parties pendant l'accroissement du sujet, sans pourtant disparaître complétement, en sorte qu'elles se perpétuèrent, quoique avec une moindre intensité, jusqu'à l'époque à laquelle commença à se dessiner d'une manière nette et tranchée l'affection qu'il porte aujourd'hui. En mars 1841, apparurent au front, au-dessus de la région sus-orbitaire, de petits tubercules plombés, de la grosseur d'une forte lentille, dont le nombre est évalué à vingt ou vingt-cinq par le malade. Le développement de ces tubercules, en tout analogues à ceux qu'il porte aujourd'hui sur sa poitrine, fut suivi de l'apparition au front de la démangeaison qui jusque-là avait respecté cette partie. Cette première poussée resta d'abord stationnaire sous le rapport du nombre et du volume. En juin 1842, une nouvelle poussée donna naissance à une série nouvelle de tubercules de même dimension et de même coloration, disséminés dans les intervalles qui séparaient les premiers; ceux-ci prirent alors un développement plus considérable. Par trois ou quatre nouvelles éruptions successives, ils envahirent le front et les sourcils ; dans ce dernier point, ils prirent un développement rapide et devinrent promptement confluents. Il y a quinze mois environ, la maladie, toujours successivement envahissante, attaqua les autres parties de la face, d'abord les joues et les oreilles, puis le nez et le menton. Le malade fit alors une tentative pour s'en débarrasser, et s'appliqua pendant une demi-heure un masque de chaux éteinte : sous l'influence de ce moyen, dit-il, il vit complétement disparaître sa maladie : les tubercules se détachèrent en eschares brunâtres, et il eut, pendant quelques jours, l'espoir d'une guérison parfaite ; mais le soulagement fut passager, car, trois jours après, nouvelle poussée générale de tubercules là où ils avaient été détruits, avec marche plus rapide cette fois dans leur développement; enfin, la tuberculisation se propagea bientôt plus loin, gagna le cou, puis la poitrine, le dos, les épaules, les bras; aujourd'hui, elle atteint le ventre et ne paraît pas devoir s'arrêter là.

État actuel. — L'appétit est bon, les fonctions digestives s'accomplissent régulièrement ; la peau offre une teinte légèrement jaunâtre. Le malade dit que, sans souffrir beaucoup, il a pourtant subi un amaigrissement notable. La musculation est effectivement peu développée ; les tissus présentent une mollesse assez prononcée ; toutes les parties du corps, sauf les pieds, les mains et le cuir chevelu, sont le siége d'une démangeaison qui est plus prononcée là où existent les tubercules. La poitrine, le dos, les épaules et les

bras représentent l'affection à son premier état de développement. C'est un semis de tubercules très rapprochés et quasi confluents sur la poitrine, plus rares et disséminés sur le dos et les autres parties. Chaque tubercule offre une teinte grise comme ardoisée ou plombée, élastique et comme résistant sous la pression du doigt; il égale en volume un petit pois. Là où la maladie paraît se limiter, les tubercules sont plus rares et offrent moins de volume. A la face, la maladie a grandi, et, bien qu'on y retrouve la lésion élémentaire tout à fait caractérisée, les tubercules, en général, y ont un volume beaucoup plus considérable que sur les autres parties : on en voit au menton, au front, qui ont déjà dépassé le volume du plus gros pois; à mesure qu'ils s'accroissent, ils semblent se détacher plus nettement de la peau qui leur sert de base. Très durs au menton, bien qu'offrant une certaine élasticité, ils sont, au contraire, assez dépressibles au front, et donnent à la pression la sensation d'un tissu fongueux à mesure qu'ils croissent en volume. Jusqu'à la teinte que nous venons d'indiquer, le teinte grise primitive qu'ils offraient d'abord se transforme en une coloration rouge plus ou moins vive. Le nez, l'extrémité droite de la lèvre supérieure, sont le siége de deux tubercules énormes, qui paraissent dus à la fusion d'un certain nombre, et dont la surface, lisse et polie, mais un peu brunâtre, est sillonnée de rameaux vasculaires, veineux, multiples. C'est surtout aux sourcils que la maladie présente son plus complet développement : ils sont le siége de deux demi-arcs tuberculeux faisant saillie d'un centimètre et demi environ et se réunissant vers la racine du nez; ils sont formés par la juxtaposition de gros tubercules devenus confluents à leur base, de manière à ne former plus qu'une tumeur aplatie de haut en bas, et couchée en travers sur les sourcils. Cette tumeur est parcourue verticalement et transversalement par des sillons profonds qui donnent à sa surface un aspect mamelonné, et qui indiquent la limite primitive des tubercules actuellement réunis entre eux; les mamelons, gros, rouge foncé, bruns, et même quelquefois presque noirs, sont festonnés au-dessous de l'épiderme aminci qui les revêt par une arborisation veineuse très riche. Cette masse offre une dureté caractéristique et comme squirrheuse.

La sensibilité paraît exagérée dans une partie des tubercules, pris surtout parmi les plus volumineux; pourtant il en est qui semblent frappés d'anesthésie quasi complète là où règnent les tubercules à leur état primitif; la sensibilité est à peu près normale, et même en certains endroits diminuée.

Le malade, pendant le bref séjour qu'il a fait à l'hôpital, a été soumis à l'usage de l'iodure de potassium; mais l'efficacité du traitement n'a pu être convenablement appréciée. Il sort sur sa demande, le 3 juin 1845.

Lèpre anesthésique occupant la face, le cou, les aines, le ventre et le dos. — Le nommé Jean Lallemand, soixante-quatre ans, cultivateur. Entré le 2 janvier 1854, à l'hôpital Saint-Louis, n° 22 salle Saint-Louis. Le malade qui fait le sujet de cette observation est d'un tempérament sanguin lymphatique,

court, gros et trapu. L'aspect général que présente ce sujet frappe tout d'abord, de manière à ne point permettre de confondre la maladie qu'il porte avec aucune autre : aussi vais-je essayer d'en esquisser d'une manière générale la physionomie, avant d'entrer dans les détails des régions pathologiques qui se trouvent sur lui. — Il faut vous représenter un homme à face plate, plus large que longue, empreinte d'un air d'hébétude et de stupidité qui est aussi le résultat de la dégradation de l'intelligence que l'on observe chez tous les sujets atteints de lèpre ; sur laquelle se voient au front, aux paupières, aux joues, aux lèvres et au menton une série de masses tuberculeuses, dont le diamètre longitudinal varie de 2 à 4 quatre centimètres et qui sont rangées suivant la direction des plis de la peau. Insensibles au plus haut degré, ces tubercules sont, récents, les uns d'un diamètre plus petit, lisses, ayant une couleur rouge fauve, et siégent au cou et au-devant du sternum ; d'autres plus gros, plus âgés, déprimés à leur centre, donnent au toucher la sensation de lipomes encore petits, sont livides, et en certains points, au front, à la joue gauche, ils sont ulcérés et laissent écouler un liquide jaunâtre sale et puisseux, auquel succèdent des croûtes noirâtres fortement adhérentes. Cet ensemble de tubercules soit isolés, soit agglomérés, donne à la peau de ce malade l'aspect du plastron tuberculeux de quelques pachydermes, et à sa face la ressemblance la plus parfaite et l'expression de l'ignama tuberculeux de Laurenti. — Entre ces masses tuberculeuses la peau est ridée, épaissie, bleuâtre. Puis, si l'on vient à découvrir successivement le malade, on rencontre une série moniliforme. L'étiologie paraît assez difficile à établir : il ne semble pas avoir contracté cette maladie, car peu nomade, il ne s'est jamais éloigné de son département, jamais il n'a eu de maladies vénériennes et s'est toujours bien porté ; c'est seulement à la suite d'un érésypèle dont il fut atteint, il y a quatre ans, que cette maladie s'est déclarée : ainsi donc développement de cette maladie sans contagion, spontanément ; sous le rapport de l'hérédité, nous ne trouvons chez aucun de ses parents qui l'ont précédé dans l'échelle généalogique ni lèpre, ni affection vénérienne chez son père et sa mère, etc. Un fait fort remarquable vient confirmer les idées de non-contagion émises par les auteurs modernes et principalement par Fernel et par Forest : ce malade a tout le temps cohabité avec sa femme sans que celle-ci ait été atteinte en aucune manière de cette affection.

Lèpre tuberculeuse. — Dréard, soixante-huit ans, cultivateur (Yonne). Entré, le 23 janvier 1854, à l'hôpital Saint-Louis, n° 23 salle Saint-Louis, mort le 11 mars 1854. Ce malade, d'un tempérament sanguin lymphatique, grand, maigre, n'ayant eu aucune maladie antérieure, a été atteint de l'affection qu'il porte, il y a seulement quatre ans. Voici les seuls antécédents qu'il a été possible de recueillir : l'étiologie et le point de départ de la maladie sont assez obscurs ; ainsi le malade dit n'avoir eu aucune maladie vénérienne et n'en avoir pas vu de trace dans sa famille ; l'interrogation du malade, du

nète, n'en démontre point. Sous le rapport de l'hérédité, point de maladies analogues sur les parents qui l'ont précédé. L'habitation du malade ne paraissait ni malsaine, ni sale ; sa nourriture était bonne. Enfin, sous le rapport de la contagion, rien d'analogue, ni sur ses parents ou ses sœurs avec lesquels le malade se trouvait en contact ; rien non plus de semblable dans la localité ; il n'a jamais quitté son pays. Cette maladie est survenue, il y a quatre ans, à la suite d'une rougeur érythémateuse générale, qui a envahi le corps de la partie supérieure vers la partie inférieure, et à la suite de laquelle se sont développées sur quelques points du corps des saillies rouges, qui bientôt ont un impétigo, puis se sont agglomérées et ont fait prendre à la peau l'aspect chagriné et tuberculeux que nous lui voyons aujourd'hui. Ces tubercules sont plus nombreux à la face antérieure du tronc et à la face interne des membres. Leur volume varie depuis la grosseur d'un pois jusqu'à celui d'une noisette. Les plus petits sont moins colorés que la peau qui les entoure et qui est brune; les plus gros sont rougeâtres ou bleuâtres : ils ont une base large, sont généralement assez rapprochés les uns des autres et, ainsi agglomérés, ils donnent à la peau un aspect mamelonné qui la fait ressembler à une peau de chagrin dont les granulations seraient volumineuses et inégales. De ces tubercules, il en est, et ce sont les plus volumineux, qui sont profondément ulcérés ; l'ulcération est profonde, la peau est décollée sur les bords dans l'espace d'un millimètre, livide et frangée sur les bords; le fond en est gris et rugueux, semble noir un petit cratère, et si l'on prend l'empreinte de la cavité ulcérée, elle forme un cône à base plus large, correspondant au fond de l'ulcération à sommet tronqué plus étroit. Les croûtes qui se forment en quelques points sont d'un gris noirâtre. Ces ulcérations, peu nombreuses, se rencontrent çà et là sur toutes les parties du corps. Une vaste plaque ulcéreuse et saigne, formée par la réunion de plusieurs tubercules ulcérés, occupe les deux tiers externes de la cuisse droite et a son plus grand diamètre suivant le pli du membre; ces ulcérations ont l'aspect qu'offrent ces excoriations que on voit sur la peau des chevaux que le harnais a déchirée. On dirait qu'un emporte-pièce y a taillé d'une manière irrégulière une série de trous qui, étant réunis, forment un bord irrégulièrement découpé. Enfin, au centre, se trouvent par-ci, par-là des points qui ne sont pas encore ulcérés et qui offrent des îlots violacés ; le fond de cette vaste ulcération est rougeâtre et donne une sanie roussâtre d'une odeur infecte : tel est l'aspect que présente le malade. Depuis qu'il est atteint de cette maladie, il a maigri d'une manière notable ; de temps en temps, il a un peu de diarrhée qui cesse facilement, qui cependant se montre plus rebelle depuis quelque temps. Il sent ses jambes s'affaiblir, les cheveux tombent également depuis quelque temps ; du reste point d'autres symptômes généraux. Comme symptômes locaux, point de douleurs, point de démangeaisons, les sueurs sont moins abondantes, c'est-à-dire que la peau est généralement sèche et moins sensible. En effet, les tubercules sont pour la plupart insensibles, ce qui n'a duré que quelques

jours, car à peine le malade a-t-il été en traitement que la sensibilité est devenue moins obtuse. Depuis le 20 janvier jusqu'au 7 février, affaiblissement notable des tubercules, rétrécissement des ulcérations, tendance générale à la cicatrisation. Depuis le 7 février, le malade a senti ses forces diminuer de plus en plus ; il fut pris d'une diarrhée fétide et éprouva des borborygmes, des coliques sourdes, jamais aiguës; le pouls est devenu faible, petit, lent ; la langue pâle d'abord, puis sèche ; le ventre mou, indolent ; la peau a pris généralement une température peu élevée, puis elle devint sèche, la face jaune bistre ; les yeux s'excavèrent, etc. Le malade tomba dans le marasme le plus complet. Durant tout ce temps, il fut soumis à la médication antidiarrhéique complète, opiacés, astringents, lavements au carbonate de plomb, carbonate de soude à 1 décigramme, acétate de plomb à deux décigrammes. Rien ne peut l'arrêter pendant les huit derniers jours. Il se manifesta un subdelirium qui ne le quitta plus jusqu'à son dernier moment. Pendant que ces phénomènes se passaient du côté du tube digestif, il s'en passait d'analogues du côté de la peau. Les tubercules non ulcérés semblaient s'être affaissés, les bords de ceux qui étaient ulcérés semblaient s'être affaissés, de telle sorte que les ulcérations paraissaient moins profondes, on aurait dit qu'elles s'étalaient. Elles devinrent blafardes comme le sont les ulcères chez les sujets atteints de diarrhée chronique; puis se recouvrirent de croûtes noires, sanguines, peu adhérentes, légères, comme l'est la croûte noire qui se forme sur la surface desséchée de certaines tourbes noires; en frappant dessus, elles donnent la même sensation que fait éprouver un corps léger, spongieux et desséché ; enfin une eschare gangréneuse se formait sur le grand trochanter droit, mais elle était superficielle et peu profonde. Face : tubercules peu nombreux et non ulcérés. Autopsie : la peau est moins colorée que pendant la vie ; elle semble amincie et plissée longitudinalement comme si on l'avait tirée et allongée par ses deux extrémités. L'enveloppe cutanée, le tissu adipeux sous-cutané a disparu presque complétement. Les tubercules sont un peu affaissés, légèrement décolorés ; la peau dans les intervalles est brunâtre. Les tubercules sont arrondis, leur diamètre varie, en procédant du plus petit au plus gros de 5 à 15 millimètres, leur épaisseur au centre est de 3 à 10. Le tissu cellulaire sous-cutané est parfaitement sain. Le tissu musculaire est plus dense qu'à l'ordinaire, plus fortement coloré en violet. Si l'on vient à fendre les tubercules, ils crient sous le scalpel, comme se fend le tissu fibroplastique ; fendus, on voit que la lésion occupe exclusivement l'épaisseur de la peau, elle présente l'aspect suivant : hypertrophie générale du tissu fibreux de la peau aux points où se trouvent les tubercules ; intégrité parfaite de ce tissu dans leurs intervalles. — Division des tubercules en trois couches colorées différemment en ces trois points : 1° couche profonde ayant 1 millimètre d'épaisseur avec sa coloration normale ; 2° noyau central gris ardoisé éclairé, d'aspect lardacé, ayant 3 millimètres ; 3° couche superficielle de 1 millimètre, vascularisée, rouge et recouverte par une couche d'épiderme

hortement adhérente. Les tubercules ulcérés et ramollis présentent le même aspect; mais la substance centrale ardoisée a envahi la couche vasculaire superficielle, et la vascularisation de son côté a fait des progrès vers la substance centrale qui, coupée, présente un aspect sablé mélangé de rouge et de gris. La coupe de la portion ulcérée représente un cône à base tournée vers la partie profonde de la peau, à sommet tronqué plus étroit, racorni vers la face superficielle de la peau. Tel est l'aspect que présentent ces différents tubercules non ulcérés; puis à leur période d'ulcération. du côté des autres organes, voici ce que l'on observe : muqueuse des neuf dixièmes supérieurs du tube digestif dans un état parfait d'intégrité. Seulement, dans les deux derniers tiers du côlon on trouve des ulcérations tantôt arrondies, tantôt serpigineuses, n'occupant que la muqueuse; en tout semblables à celles de la peau et d'autant plus nombreuses qu'on s'avance vers le rectum, recouvertes d'une exsudation membraniforme analogue à celle qui recouvre les ulcérations cutanées ; ce n'est qu'au niveau de l'S iliaque que la muqueuse se trouve tellement vascularisée dans la portion supérieure, c'est à peine si un cercle rougeâtre les entoure, leur fond est rose. — Du côté des poumons, rien ; du côté du cœur, rien ; du côté du foie, cet organe a son volume normal, mais il est très dense, la substance rouge prédomine, sa surface est inégale, irrégulière et comme chagrinée par la substance jaune qui est devenue plus dense, la vésicule est remplie de bile et un peu distendue; du côté des autres organes, rien de remarquable.

Observation de lèpre tuberculeuse dans sa période la plus avancée.

Lèpre tuberculeuse. — Buchy (Antoine), entré le 19 avril 1854, salle Saint-Louis, n° 60, âgé de vingt-huit ans, ancien marin, né dans l'île de la Réunion (Inde), est atteint depuis huit ans d'une lèpre tuberculeuse anesthésique. — L'affection occupe la face et les membres supérieurs. La base du front, les arcades sourcilières et le menton sont couverts de tubercules blanc-jaunâtre, lisses, durs, irréguliers, confluents par leur base, séparés entre eux par des sillons sinueux et profonds qui donnent à la peau de ces parties un aspect mamelonné. Sur les oreilles, les joues et au voisinage des commissures des lèvres, tubercules agglomérés et ouverts ne formant plus qu'un ulcère ou plutôt une réunion de petits ulcères à circonférence arrêtée; mais on trouve disséminées au pourtour de ces plaies un grand nombre de petites éminences sous-épidermiques, isolées et différemment circonscrites, qui rappellent la forme morbide de l'affection. Le bord libre des paupières est dépourvu de cils et couvert de tubercules. — Les lèvres épaisses, tuberculeuses; la bouche déformée continuellement ouverte; la langue envahie par les tubercules est dure, marronnée et d'une couleur violette très foncée. Le nez, couvert d'éminences tuberculeuses, porte à sa face supérieure un ulcère

large, profond et sanieux, dont l'étendue est à peu près de deux à trois centimètres carrés. Toutes les parties envahies par la maladie sont dépourvues de poils, sillonnées par de nombreux capillaires sanguins et privées de sensibilité. — Aux membres supérieurs, tubercules semblables à ceux de la face, isolés ou réunis en petit nombre sur les bras, agglomérés en grand nombre à la partie postérieure de l'articulation du coude, disséminés sur les avant-bras mais plus nombreux que sur les bras, très confluents à la face dorsale des phalanges, lesquelles sont déformées, volumineuses au niveau des articulations et profondément endommagées par la maladie. Un grand nombre de ces tubercules, recouverts par un épiderme aminci, plus ou moins altéré, laissent couler une sanie purulente qui nécessite plusieurs pansements par jour. — L'ensemble du malade est affreux. Qu'on se figure un homme aveugle, d'une maigreur extrême, la peau livide, terreuse et lâchement appliquée sur les muscles atrophiés, les orbites profondes, les yeux d'un blanc mat, peu mobiles et imparfaitement recouverts par les paupières; la face longue, maigre, couverte d'un masque dégoûtant de tubercules, d'ulcères et de concrétions purulentes; la bouche continuellement béante; la voix rauque, sourde et profonde; la tête peu mobile sur un cou très long; les bras décharnés recouverts d'ulcérations; les mains déformées; les doigts couverts de plaies suppurantes; enfin une odeur fétide qui s'exhale de toute sa personne, et l'on comprendra que cet homme, sorte de spectre hideux, soit un objet d'horreur pour tous ceux qui l'approchent. — Voici les détails que nous avons pu rassembler sur les antécédents du malade. Élevé à Calcutta et à Pondichéry (Indoustan), il entra dans la marine à l'âge de dix-neuf ans; d'une constitution robuste, il supporta sans peine les fatigues des longs voyages maritimes. Dans sa jeunesse, pas de scrofules, pas de maladies graves. Son père et sa mère vivent encore et jouissent d'une bonne santé; ses frères et sa sœur n'ont jamais été malades: personne dans sa famille n'est atteint de maladie de la peau; son père a eu la gale il y a quinze ans, à bord d'un navire où l'équipage tout entier était atteint de cette affection. Son hygiène a toujours été bonne, il n'a jamais éprouvé de chagrins ni de privations. Comme tous les marins, il a été exposé aux intempéries des saisons et à des variations de température assez notables. — A vingt-un ans il quitta l'Inde en parfaite santé, revint en France, séjourna quelques mois à Marseille et vint ensuite habiter Saintes (Charente-Inférieure) où il contracta la vérole en 1847, maladie qui ne fut pas traitée. — Le malade se portait bien quand, un jour d'hiver, ayant été fortement impressionné par le froid, il s'exposa devant un grand feu et ressentit aussitôt une vive démangeaison à la figure et immédiatement apparut une éruption considérable de tubercules, gros comme des lentilles, durs, mamelonnés, sans coloration autre que celle de la peau, disséminés sur la face, principalement au front, au menton, sur les sourcils et les pommettes des joues. La démangeaison disparut d'elle-même et les tubercules conservèrent leur aspect primitif pendant près d'une année. Traitement

ferrugineux, bains de Barèges, incision des tubercules, pas d'amélioration. — Le malade vint à Paris dans le service de M. Cazenave, qui le traita par la strychnine et l'huile de foie de morue; mais, loin de se modifier sous l'influence de cette médication, l'affection continua sa marche : au bout de six mois, nouvelle poussée de tubercules, les premiers s'ulcèrent et l'état du malade devient des plus alarmants. Après un séjour de plus d'un an, il quitta l'hôpital pour y rentrer bientôt se livrer aux soins de M. Gibert. Cette fois on le soumit aux antiscorbutiques et aux mercuriaux; amélioration apparente pendant quelque temps, mais bientôt récidive de la maladie avec plus d'intensité que jamais; les ulcérations se multiplient, la tuberculisation envahit les membres supérieurs qui jusque-là étaient restés sains. La cornée se couvre de taches blanches opaques et le malade est réduit à une cécité complète dans l'espace de quelques mois. Il quitta le service et resta en province sans faire aucun traitement. — Aujourd'hui il se présente dans le service de M. Devergie dans l'état où nous l'avons décrit il y a un instant. Nous ajouterons seulement qu'en outre de la période fort avancée de la maladie, les forces sont épuisées, les ganglions sous-maxillaires engorgés, et qu'il existe des troubles très grands du côté de la digestion : une diarrhée abondante qui dure depuis plus d'un an. L'appétit est cependant assez bien conservé. — Traitements. Le malade a d'abord été soumis au traitement suivant : tisane sudorifique, six pilules de Vallet, pansement avec du cérat simple, une portion. Ce régime, continué jusqu'au premier mai, n'a produit aucun effet; la suppuration était toujours abondante et les ulcères se multipliaient. A cette époque M. Devergie a fait remplacer le cérat simple par un cérat au sulfate de fer (0,50 pour 30 gr.); et voici dans quel état nous retrouvons le malade le premier juin, c'est-à-dire un mois après l'emploi du cérat au sulfate de fer : — La faiblesse est toujours très grande, pas d'appétit; la voix excessivement faible, une toux quinteuse, des crachats blancs, visqueux, d'une expectoration difficile; la diarrhée dure toujours. Mais d'un autre côté l'affection cutanée s'est beaucoup modifiée : sur le front il ne reste plus de traces de tubercules; les sourcils sont beaucoup moins volumineux, on n'y trouve plus ces nombreuses ulcérations que nous y avons décrites; la surface des joues commence à se débarrasser, les ulcères que l'on y remarque encore sont réunis les uns aux autres et disposés de manière à représenter un polygone très irrégulier dont la surface est occupée par des masses blanches, lisses, inégales, sous-épidermiques, qui semblent formées par la réunion d'un certain nombre de tubercules à leur première période. La guérison semble marcher du centre à la périphérie. Sur les autres parties de la face, les ulcérations ont presque toutes disparu et le petit nombre que l'on y retrouve encore ne sécrète plus une sanie aussi abondante. L'ulcère de la face dorsale du nez est moins profond et présente quelques bourgeons charnus qui font espérer la cicatrisation prochaine. Sur les bras on ne retrouve plus que de larges taches brunâtres, irrégulières, qui sont les derniers vestiges des ulcérations que nous avions

signalées. Les phalanges sont presque entièrement guéries et les articulations des doigts beaucoup moins volumineuses. Enfin l'état de la peau s'est beaucoup amélioré et nous sommes frappés chaque jour des progrès rapides de la cicatrisation. Plus tard ce malade fut pris d'une diarrhée que rien ne put arrêter, et il succomba après huit à dix mois de séjour à l'hôpital. Ce fut là qui nous fit connaître les publications faites par M. Boileau dans le *Journal des Colonies*. La mort survint avant que nous ayons pu nous procurer le remède expérimenté par ce médecin.

Que dire maintenant du traitement? On sait que toutes les ressources de l'art sont impuissantes à guérir cette affection, même lorsqu'elle a pris naissance en France: énumérer par conséquent les moyens qui ont été employés, c'est tracer la série des médications les plus énergiques et les plus actives que l'on préconise ordinairement contre les maladies de la peau, et cela fort inutilement, puisqu'elles sont connues de tout le monde. Soutenir le malade, combattre les symptômes que l'on peut atteindre, sans nuire à la santé, telle doit être la première idée du médecin. Il est difficile de rester spectateur oisif d'une maladie aussi grave et aussi pénible: aussi faut-il tenter l'effet de quelques agents puissants en raison de l'intensité de la lèpre et du tempérament et de la constitution de l'individu; mais ce qu'il y a lieu de faire surtout dans l'intérêt du malade, c'est de prescrire une hygiène bien entendue et un régime alimentaire aussi fortifiant que possible.

Telle était la manière dont nous nous exprimions dans la première édition de cet ouvrage. Depuis cette époque, le hasard nous a mis à même de donner nos soins assidus à plusieurs lépreux, et de vérifier jusqu'à quel point telle ou telle médication peut être plus utilement employée. Et d'abord il est constant que les médications mixtes ou composées sont plus efficaces que les médications simples. Ainsi l'administration simultanée de l'huile de foie de morue, des amers et d'un sirop dans lequel entrent les préparations de fer, l'iodure de potassium, le bichlorure de mercure et la solution de Fowler, en petites doses, m'a amené à des résultats fort remarquables et a singulièrement amélioré la position des lépreux, en arrêtant les progrès de la lèpre. Chose remarquable et dont il faut que le praticien se pénètre, c'est que les lépreux ne supportent que des doses très peu élevées des médicaments, qu'ils sont surexci-

tés par les doses ordinaires d'iodure de potassium, ou de fer, ou d'arsenic, ou de mercure.

En avril 1854, je reçus dans mon service, à l'hôpital Saint-Louis, le malheureux jeune homme dont je viens de retracer l'histoire; il avait déjà été traité par mes collègues Cazenave et Gibert, mais sans succès, pour une lèpre tuberculeuse de l'Inde. Ce jeune homme, qui avait une certaine instruction, m'informa un jour que l'on avait publié dans un numéro du *Journal des Colonies* les bons résultats obtenus par M. le docteur Boileau, de l'île Maurice, sur lui-même et sur un certain nombre de lépreux, de l'usage de l'*hydrocotyle asiatica*. Je fis immédiatement, au ministre de la marine, la demande d'une certaine quantité de cette substance sous diverses formes, et je reçus, très peu de temps après, de l'hydrocotyle à l'état de feuilles, d'extrait aqueux et d'extrait alcoolique, le tout préparé à la pharmacie du gouvernement à Pondichéry.

Quelque empressement que Son Excellence ait mis à acquiescer à ma demande, ces préparations arrivèrent trop tard pour les utiliser en faveur du jeune marin qui m'en avait indiqué l'efficacité présumée. Singulièrement amélioré d'abord par la cicatrisation des nombreux ulcères qui recouvraient toute la surface du corps, il succomba à un épuisement et à un amaigrissement général, dernier degré de cette terrible affection.

Mais le hasard mit bientôt à ma disposition trois malades atteints de la lèpre : un à l'hôpital, Grec d'origine; deux en ville. Celui de l'hôpital était atteint d'une lèpre tuberculeuse éléphantiasique, développée à la figure et plus tard aux mains, aux pieds et sur le corps. Même forme, mais plus ancienne et plus avancée sur un des deux lépreux de la ville, et chez lui ulcérations assez nombreuses sur les mains, les pieds, les membres et le corps. Quant au troisième malade, c'était un jeune enfant de onze à douze ans, qui m'a été amené de l'île Bourbon par ses parents pour recevoir mes soins. La lèpre chez lui consiste principalement dans l'existence de taches ou décolorations de la peau, avec perte de sensibilité (lèpre anesthésique), dont quelques-unes étaient entourées d'une auréole brunâtre. Quelques petits tubercules s'observaient çà et là sur le corps et à la figure.

Or, il résulte des faits consignés dans le *Journal des Colonies* par M. Boileau, et dans un Mémoire publié en 1853 par M. Lépine, pharmacien de première classe de la marine, sur l'hydrocotyle asiatica, que cette plante a été employée pour la première fois par M. le docteur Boileau, de l'île Maurice, sur lui-même, qui était atteint de la lèpre, et essayé plus tard aussi par lui sur une soixantaine de lépreux. Depuis, plusieurs médecins à Pondichéry, à Port-Louis, à Madras, ont expérimenté les effets de cette plante. Les résultats obtenus n'ont pas toujours été les mêmes quant au degré d'efficacité de l'hydrocotyle asiatica ; et je remarque que plusieurs d'entre eux l'ont administré en même temps que d'autres agents aussi très actifs.

Je ne veux pas émettre dans cette note une opinion définitive sur l'hydrocotyle comme médicament. Il faut laisser au temps à se prononcer sur ce nouvel agent thérapeutique ; mais comme je l'emploie depuis plus d'une année, comme il a développé sous mes yeux sur plusieurs malades des effets toxiques qui m'ont obligé à en suspendre l'usage, j'ai voulu faire connaître les résultats de mes premiers essais, qui sont les premiers qui aient été faits en France.

Employant pour la première fois un agent que je ne connaissais pas, et ayant à ma disposition environ 500 grammes seulement de la plante, je ne crus pas devoir me servir de l'hydrocotyle en sirop, comme le recommande surtout M. Boileau, non plus qu'en poudre. J'avais d'ailleurs à ma disposition une grande quantité d'extrait aqueux et d'extrait alcoolique qui devaient me représenter les éléments d'un sirop, et que je pouvais donner en pilules.

Je m'arrêtai donc à l'usage d'une tisane et d'un extrait. Cette plante étant très aromatique, je fis faire pour essai de la tisane par infusion et de la tisane par décoction. Je m'aperçus de suite que dans la décoction, on perdait tout le principe aromatique de la plante : je n'employai pas cette préparation, et je m'arrêtai à l'usage de l'infusion. Quant à la dose, le goût et la force de la tisane, aidé de son influence sur l'estomac de mon premier malade, me guidèrent seuls ; car dans son Mémoire M. Boileau n'a fait connaître aucune dose. J'appris plus tard, par le Mémoire de M. Lépine, que la poudre était préférée, et qu'on la donnait au plus à 50 centigrammes, dose que beaucoup de malades ne pouvaient même supporter.

Pour moi, j'ai commencé par une infusion de la plante non pulvérisée, à la dose de 15 grammes pour un litre d'eau, que j'ai dû réduire par l'usage à 8 grammes. A cette dose mes malades l'ont généralement bien tolérée, à raison d'un litre par jour, excepté le lépreux adulte de la ville. Il est vrai qu'il était dans un tel état de débilité, que tous les médicaments, quels qu'ils fussent, devaient être considérablement fractionnés pour son estomac.

Plus tard j'ai été conduit, en raison de la propriété essentiellement aromatique de la plante, à remplacer l'extrait aqueux par l'extrait alcoolique, que je crois beaucoup plus actif. L'analyse chimique, dont je donnerai tout à l'heure quelques indications, conduit naturellement à cet emploi.

Le malade lépreux que j'avais à l'hôpital était un homme bien constitué, dans la force de l'âge, d'une santé très peu altérée par la maladie. Je le mis le premier à l'usage journalier de la tisane et de pilules d'extrait aqueux de 5 centigrammes, en commençant par une et augmentant d'une pilule tous les cinq jours, c'était le 1er août 1855. Arrivé à sept pilules par jour, il fut pris de phénomènes très remarquables, et tout à fait semblables à ceux que produisent les opions narcotico-âcres : étourdissements, éblouissements, regard incertain, plus ou moins fixe, vacillation des membres, physionomie plus ou moins analogue à celle de l'ivresse, malaise général, anorexie, affaiblissement, démarche incertaine, céphalalgie, tendance au sommeil.

Cet état ne fut pas passager chez notre malade, malgré la suspension des médicaments ; il dura cinq à six jours, en perdant peu à peu de son intensité, mais en laissant une prostration des forces qui persista, et un dégoût pour les aliments qui fut assez prononcé pendant une quinzaine de jours.

Le malade sortit de là assez amaigri, mais il reprit bientôt son embonpoint.

Quant à l'action du l'hydrocotyle sur l'*état lépreux*, il fut peu marqué. Le malade y gagna cependant une diminution notable de l'empâtement des mains et de la figure, de sorte que les tubercules en devinrent plus saillants, car ils n'avaient pas perdu de leur volume. Les arcades sourcilières et le nez se trouvaient moins volu-

mineux. Mais il s'était développé quatre ou cinq tubercules, et la sensibilité des mains était plus obtuse, au dire du malade. C'est alors qu'étant arrivé au 3 novembre, le traitement fut cessé. Le malade avait supporté 20 centigrammes d'extrait alcoolique par jour dans cette seconde période du traitement.

Ce phénomène d'intoxication dut me rendre plus circonspect à l'égard des lépreux de la ville auxquels je donnais des soins. L'un d'eux, homme de quarante ans, vint me trouver après avoir reçu sans succès les soins de M. Cazenave pendant dix-huit mois. Il était hideux à voir, affaibli, à parole lente, à voix cassée. Sa maladie était beaucoup plus ancienne. (Je donnerai plus tard l'observation détaillée de ces divers malades.) Je le mis à l'usage de l'hydrocotyle en tisane et en pilules d'extrait alcoolique de 25 milligrammes chacune, en débutant par une pilule et augmentant d'une tous les quatre jours. Dans les premiers temps de l'emploi du médicament, le malade annonçait se trouver mieux, mais il avouait qu'il en avait été ainsi toutes les fois qu'il changeait de remède, et il en avait pris de toute sorte. Cependant cette amélioration dans l'état général ne fut pas de longue durée, et je dois néanmoins dire qu'une grande partie des ulcérations qu'il portait avaient paru se cicatriser; arrivé à 5 pilules par jour, c'est-à-dire à 25 centigrammes d'extrait alcoolique d'hydrocotyle, il fut pris de tous les accidents observés sur le premier malade, et comme ce dernier était beaucoup plus gravement atteint de la lèpre, et dans une période plus avancée; que d'ailleurs il était déjà très affaibli, ces effets de l'hydrocotyle asiatica le jetèrent pendant six semaines dans un état de prostration extrême. C'était d'ailleurs la similitude la plus complète entre les deux malades quant aux effets toxiques, et il ne saurait exister aucun doute à cet égard.

Chez le jeune enfant D..., je ne dépassai pas la dose de 4 pilules d'extrait alcoolique à 25 milligrammes chacune. Mais après six semaines de son usage et de celui de la tisane, dont il prenait jusqu'à trois verres par jour, ne voyant aucune amélioration survenir, remarquant, d'ailleurs, que l'enfant perdait l'appétit et les forces, je dus abandonner son emploi. Les effets à la fois nuls, et plutôt fâcheux comme influence générale, furent appréciés par les parents

x-mêmes, qui m'engagèrent à supprimer l'usage d'un moyen nt ils avaient cependant entendu vanter l'efficacité à l'île Bourbon.

Il résulte de ces faits, dont nous donnons les observations détaillées après, que l'hydrocotyle asiatica ne nous a pas fourni de résul- ts réellement utiles chez les trois malades sur lesquels nous l'avons ployé, tant à l'hôpital qu'en ville; que sous son influence, pendant, la guérison d'une partie des ulcérations chez l'un des alades a paru s'opérer, et que l'état d'engorgement de la figure des mains chez le malade de l'hôpital a paru diminuer. Je dis *a ru*, car ces résultats ont été très temporaires, et nous nous de- andons, surtout en ce qui concernait l'*empâtement* des tissus, si t effet est le résultat de l'action thérapeutique de l'hydrocotyle iatica, ou si la secousse et l'amaigrissement consécutifs aux fets toxiques du médicament n'ont pas été pour quelque chose ns ce genre de résultat obtenu. Ajoutons que, pendant le trai- ment par cet agent, il est survenu un certain nombre de bercules.

Mais il ressortait évidemment de ces observations : 1° que l'hy- ocotyle asiatica était une substance très active; 2° qu'elle devait rtout ses propriétés à des principes volatils et à des principes incipalement solubles dans l'alcool; 3° qu'à une dose assez faible, le était vénéneuse à la manière des poisons narcotico-âcres.

Or, M. Lépine, à la page 25 de son Mémoire, s'exprime ainsi : Nous pouvons assurer que l'hydrocotyle asiatica n'exerce aucune action délétère sur l'économie. »

D'une autre part, il regarde la vellarine comme le principe actif l'hydrocotyle asiatica. Tout en considérant l'œuvre de M. Lépine mme très exacte en fait d'analyse, il fallait nous procurer de la llarine pour en étudier les effets. Nous avons donc prié M. Lefort, armacien à Paris et chimiste habile, de répéter les expériences alytiques de M. Lépine et de les contrôler au burin. Il s'occupe ce travail depuis deux mois, et voici à quel résultat il a été con- uit jusqu'à présent. La minime proportion de vellarine qui existe ns l'hydrocotyle asiatica, 1 pour 100 suivant M. Lépine, 1 pour 300 ivant M. Lefort, a porté M. Lefort à penser qu'une autre substance rtage ou possède les propriétés actives de la plante. Ce serait,

suivant lui, la résine verte. Il croit que la résine brune de M. Lépine n'est autre que la résine verte; de là les effets plus marqués sur l'économie des préparations obtenues au moyen de l'alcool. Aussi allons-nous administrer à nos malades la teinture. M. Lefort poursuit ses recherches; il en fera connaître les résultats.

N'ayant pas d'autres lépreux sur lesquels je pusse essayer l'hydrocotyle asiatica, j'ai recherché si cette substance pourrait être de quelque efficacité dans le traitement d'une maladie rebelle, l'eczéma. Cinq malades, dont je donne ici l'observation, ont été traités par ce médicament en tisane et en pilules d'extrait alcoolique. J'ai dû suspendre tout traitement chez l'un des malades, à son début, par suite de causes accidentelles; mais chez les quatre autres l'hydrocotyle a été employé régulièrement et *seul*, sans aucune application notable de pommade à l'extérieur et sans bains médicamenteux. Dans un cas, et lorsque l'affection était tout à fait voisine de la guérison, j'ai terminé la maladie par l'usage de pommade de sulfate de fer; mais j'ai tenu à soumettre uniquement ces malades à l'influence de l'hydrocotyle, afin que l'on pût mieux apprécier ses effets.

Les eczémas pour lesquels je l'ai mis en usage sont des eczémas localisés, en général très rebelles. Il a amené la guérison dans les quatre cas et dans un espace de temps assez court; c'est donc là un résultat remarquable : le médicament n'a développé aucun accident, soit du côté de l'estomac, soit du côté de la santé générale. La dose, chez ces malades, n'a pas dépassé 25 centigrammes d'extrait alcoolique par jour, en débutant par 25 milligrammes et augmentant tous les trois ou quatre jours de 25 milligrammes, plus trois à quatre verres d'une tisane préparée par infusion, avec 40 centigrammes de plante desséchée pour 1,000 grammes d'eau.

L'expérimentation d'un médicament nouveau étant toujours longue, quand elle est prudemment et consciencieusement faite, j'ai tenu à publier ces premiers résultats, afin d'appeler l'attention des médecins sur ce nouvel agent thérapeutique, comme aussi pour les engager à essayer son influence dans les maladies autres que celles de la peau. Je vais d'ailleurs, de mon côté, poursuivre mes tentatives dans d'autres formes de maladies cutanées.

Voici les observations d'eczéma dans lesquelles ce médicament a é essayé.

Obs I. *Eczéma chronique général.* — La nommée L...., âgée de cin nante et un ans, a déjà été traitée trois fois à Saint-Louis de trois attaques 'eczéma qui avait envahi une grande partie du corps ; c'était chaque fois près un accouchement. Aujourd'hui, 6 mars 1856, elle revient demander les secours de la médecine. La tête est couverte de croûtes jaunâtres et est le ége d'une sécrétion abondante qui se sèche et roidit les linges. Les oreilles, s tempes, une partie des joues, le milieu de la poitrine, les mamelons, le ombril, le pourtour des parties génitales sont le siége de plaques rouges, couvertes de croûtes peu épaisses et qui exhalent de la sérosité. Quelques laques peu larges et disséminées se rencontrent sur les bras et les jambes, ais se rapprochent là du psoriasis quant à l'aspect. La rougeur est intense artout, les démangeaisons sont très vives, excepté aux membres. Prescrip- ion : chicorée, deux pilules iodure de soufre, bain de vapeur, glycérine au iéjin, en application sur les parties malades, trois portions.

Le 25 mars, la maladie a augmenté d'intensité ; la rougeur, la sécrétion, a démangeaison, n'ont pas diminué, et les plaques se sont élargies. On aban- onne le traitement et on adopte le suivant : infusion d'hydrocotyle asiatica, grammes par litre ; une pilule d'hydrocotyle, et augmenter d'une pilule ous les cinq ou six jours, jusqu'à six pilules ; chaque pilule contient un emi-grain d'extrait alcoolique ; bains simples.

Le 11 mai, la malade est presque entièrement guérie : les membres, le ronc, les oreilles, la face, sont à l'état normal, et la peau est entièrement ettoyée ; la démangeaison a disparu ; sur la tête seule existent encore quelques ellicules minces qui reposent sur un fond dont la teinte est naturelle. L... emande sa sortie.

Obs II. B... est d'un tempérament lymphatique, ses règles sont irrégulières. ntrée le 10 avril 1856. Depuis deux ans, la tête est couverte de pellicules blan- hes ; il y a six mois, les oreilles devinrent malades, et un eczéma franc ne tarda as à envahir le cuir chevelu, les oreilles, les tempes et le front. Prescrip- ion : infusion d'hydrocotyle ; deux pilules d'extrait alcoolique d'hydroco- yle ; augmenter jusqu'à six par jour ; bain de vapeur ; saindoux ; couper les heveux ras.

Le 12 mai, amélioration sensible ; la rougeur a diminué ainsi que la sécré- ion de sérosité. On ajoute au traitement, tous les jours, 45 grammes de irop d'iodure de fer.

Le 1er juin, on a suspendu pendant quelques jours le traitement, et il est ris aujourd'hui. La malade avait éprouvé des douleurs dans le dos et l'es- omac ; elle accusait un sentiment de constriction sur le front qui a complé- ement disparu, et un mal de gorge caractérisé par un chatouillement dés-

agréable ; il y a de la constipation, qui n'existait pas auparavant ; les bains simples sont remplacés par des bains alcalins.

Le 13 juin, la sécrétion de sérosité a cessé ; les squames ne se reforment plus aux tempes ni aux oreilles ; la tête seule présente encore quelques croûtes sans rougeur. Continuation du traitement à l'hydrocotyle ; on y ajoute de la pommade au sulfate de fer pour terminer et faire disparaître les dernières traces de la maladie. Enfin, le 25 juin, la malade sort complétement guérie.

Obs. III. B....., soixante-cinq ans, entre le 12 juin 1856 dans la salle Saint-Thomas, hôpital Saint-Louis. Depuis dix-huit mois, elle est tourmentée par un eczéma au bas-ventre et à la vulve. Après avoir été guérie chez M. Gibert, elle voit sa maladie reparaître aux oreilles, au front, au cuir chevelu. Les règles ont cessé depuis dix-sept ans. Chagrins et misère. Le front, les tempes, les pommettes, le cou, les joues, les oreilles, le cuir chevelu, sont le siége d'une rougeur intense et de démangeaisons accompagnées de chaleur. Il y a des squames minces, sans hypertrophie de la peau ; la sécrétion séreuse, après avoir été abondante, n'existe plus qu'aux oreilles. Prescription : infusion d'hydrocotyle ; une pilule, et augmenter jusqu'à six, d'extrait alcoolique à un demi-grain par pilule ; bains simples ; trois portions.

Le 14 août, B..... sort guérie ; il n'y a plus ni démangeaisons, ni formation de squames ; les oreilles sont redevenues souples, et il n'existe plus qu'une rougeur rosée sur quelques points, notamment au front, aux tempes et au cou. Aucun trouble, aucune sensation qu'on pourrait rattacher à l'action du médicament n'a été accusée par la malade. Les pilules d'extrait ont manqué pendant environ huit jours, et cela a été la seule interruption de traitement.

Obs. IV. L...., âgée de vingt-neuf ans, est d'un tempérament lymphatique ; ses paupières portent encore les traces d'une blépharite chronique intense ; ses règles sont normales. Il y a trois ans, le front, les oreilles et le cuir chevelu se couvrirent de squames minces et suintèrent de la sérosité au printemps et à l'automne ; elle se traita par des bains de vapeur, de l'axonge et des tisanes amères. Puis survint un érysipèle à la suite duquel les cheveux tombèrent ; elle entra alors à Saint-Louis, salle Saint-Thomas.

Le 19 juin 1856, le cuir chevelu et les oreilles sont rouges, la peau est œdématiée ; elle laisse couler une sérosité purulente qui se concrète en croûte assez épaisse. La tête est presque nue. Démangeaisons modérées ; le front est rouge, ainsi que toute la face. Prescription : infusion d'hydrocotyle ; une à six pilules d'extrait alcoolique ; bains de vapeurs ; quatre portions. Dès le 8 juillet, la démangeaison a complétement disparu ; vers cette époque, les pilules, étant venues à manquer, sont suspendues pendant une dizaine de jours.

Le 14 août, le front et la face ont repris leur coloration normale, les oreilles

e sécrètent plus ou presque plus ; le cuir chevelu a encore des squames, ais minces et se détachant facilement ; les cheveux repoussent.

L...., trente-six ans, tonnelier, est un homme de bonne constitution, tempérament sanguin ; il a un eczéma revêtu de squames sèches, adhérentes ; la eau est encore épaisse ; il y a de temps en temps des poussées caractérisées ar une exhalaison de sérosité. Les plaques existent sur les membres, qui ont envahis en grande partie depuis quatre mois ; le début remonte à cinq ns ; démangeaisons vives, rougeur, chaleur.

A son entrée, le 20 avril 1856, on lui donna tisane de chicorée, saindoux, ains simples.

Le 20 avril, on essaye le traitement par l'hydrocotyle, l'état le plus aigu ant disparu ; tisane d'hydrocotyle ; une pilule à six d'extrait alcoolique ; indoux.

Le 12 mai, les démangeaisons ont presque entièrement disparu, et la maladie semble marcher vers la guérison ; mais cette marche est lente ; il y a de i diarrhée, de l'inappétence. On cesse l'hydrocotyle. L..... reste souffrant nqu'au 22 mai, époque à laquelle on revient aux amers et aux pommades ésolutives, qui terminent la guérison après deux mois de traitement.

Lèpre avec hypertrophie traitée par l'hydrocotyle. —Démétrius (Éthagène), rente-trois ans, né à Samos, professeur de langues, tempérament lymphatique ; on père, sa mère, ses frères et sœurs n'ont été atteints d'aucune maladie de la eau et n'ont jamais eu, pas plus que lui, affirme-t-il, de rapports avec les lépreux, dont le nombre est assez considérable à Samos. Il a eu, à l'âge de vingt ns, quelques attaques de rhumatisme. Jamais ni blennorrhagie ni chancres. n 1840, il quitte Samos pour se rendre à Cyrrha (pays où l'on ne voit point de lépreux). Pendant son séjour dans cette ville, il prend à plusieurs reprises des éléuves froids qui suppriment une transpiration habituelle et très abondante. Peu après, il s'aperçoit de gêne respiratoire ; une dyspnée opiniâtre le tourmente pendant tout l'hiver de 1840, hiver qui se termine pour lui par une bronchite qui le force à garder le lit près d'un mois. Peu après son rétablissement, il commence à éprouver dans les deux pieds des douleurs avec fourmillements et engourdissements. Ces phénomènes augmentent en 1842 et 1843 en même temps que se montre un peu d'amaigrissement des extrémités ; il quitte Cyrrha en 1843, revient à Samos et éprouve de l'engourdissement dans la main droite, puis, près de dix mois après, dans la main gauche. Il dit bien qu'en même temps que ces phénomènes se passaient la peau de ces parties devenait plus sèche, un peu rugueuse, et se couvrait de temps à autre de quelques écailles. En 1845, les pieds et les mains étaient notablement amaigris, engourdis, constamment couverts de furfures. La santé se conserva bonne, à part les phénomènes précédents ; l'appétit conservé, pas de diarrhée, plus de dyspnée, jamais de battements de cœur ; il ne toussait ns, ne souffrait pas des yeux. En 1849 apparaissent sur la face antérieure et

sur le bord radial de l'avant-bras les premières taches; en même temps il en voit quelques-unes à la partie inférieure externe de la jambe, taches brunâtres, mais pas de taches décolorées. Peu après il voit survenir les premiers tubercules, d'abord trois ou quatre aux pieds; quelques mois après apparut celui que porte à la base le deuxième espace intermétacarpien de la main gauche. C'est vers le commencement de l'année 1850 qu'apparurent les tubercules que l'on observe à la région intersourcilière et à la joue gauche. De 1850 à 1853, les taches se multiplient sur les deux avant-bras, sur les jambes; quelques-unes apparurent à la cuisse droite, en même temps l'insensibilité augmente un peu, sans jamais devenir complète. Souvent le malade n'avait pas conscience, dit-il, des saillies ou dépressions des objets qu'il prenait dans sa main gauche. En 1853, il se rend à Hypote pour y prendre les eaux minérales sulfureuses. La peau reste squameuse aux membres inférieurs et aux mains, et la légère teinte bistre de la peau commence à devenir plus complète. La transpiration des mains et des pieds reste nulle, malgré les bains. — 28 juillet 1855. A son entrée à l'hôpital, le malade ne présente pas d'altération notable de la santé; la maigreur est peu marquée, les forces sont diminuées et accusent de la fatigue au moindre exercice; il éprouve souvent des crampes dans les membres inférieurs et serre la main avec peu de force; il plie et étend difficilement les doigts. Les fonctions respiratoires et circulatoires s'exécutent librement, l'appétit est conservé, la soif n'est pas vive; il est souvent constipé, n'a jamais de diarrhée. La physionomie du malade n'est pas altérée, mais on est frappé dès l'abord d'une légère bouffissure de la face qui tient au tissu cellulaire sous-cutané; elle est surtout marquée à la face, aux lobules des oreilles, qui sont devenus volumineux. — Des tubercules de couleur fauve occupent l'espace intersourcilier, la joue et le menton; quelques taches, mais peu marquées, existent sur le front. Les bras à la partie inférieure, les avant-bras dans toute leur étendue, les jambes et les cuisses montrent des taches fauves, disséminées, de grandeurs diverses, plus nombreuses dans les régions externes et postérieures de ces parties. La peau des membres inférieurs est très légèrement écailleuse, farineuse comme dans une ichthyose très légère. Un seul tubercule saillant se trouve à la main gauche, à la base du deuxième espace interosseux, sur la face dorsale; il a 12 centimètres de diamètre et fait une saillie de 3 centimètres environ au-dessus du niveau de la peau. Sur les jambes et les cuisses on voit des taches et des tubercules disséminés sur les faces externes et antérieures. La partie moyenne des deux cuisses présente quelques tubercules à peine saillants au-dessus du niveau de la peau. Sur toutes ces parties, taches et tubercules, de même que sur le reste de la peau, la sensibilité est diminuée; on peut, en piquant avec une épingle, s'assurer que nulle part l'insensibilité n'est complète. — La mensuration des tubercules de la face donne les chiffres suivants : à la région intersourcilière il existe sept à huit tubercules dont cinq plus saillants; trois plus rapprochés de l'arcade sourcilière droite et presque superposés, de haut

en bas : le premier, 8 millimètres ; le deuxième, 6 millimètres ; le troisième, 4 millimètres. Celui qui avoisine l'arcade gauche est le plus volumineux : il a 12 millimètres. Tous ont de 1 à 1 1/2 millimètre d'élévation. — La joue gauche présente une élevure tuberculeuse, et par le toucher seulement on constate cinq à six tubercules. La région mentonnière est garnie de six tubercules ; les supérieurs, plus volumineux, ont cinq et six millimètres de diamètre ; le deuxième est le plus élevé. — 1er août. Deux jours après son entrée, M. Devergie fait la prescription suivante : décoction d'hydrocotyle, deux pilules, *id.* de 5 centigrammes ; bains de vapeur ; deux portions ; côtelette. Trois jours après, trois pilules, puis quatre pilules quatre jours plus tard. Les bains de vapeur, que le malade se plaint de ne pouvoir supporter, sont remplacés par trois bains sulfureux par semaine. — 27 août. Le malade est pris de fièvre, céphalalgie, constipation. Orge, réglisse ; bain simple, puis, le deuxième jour, bouteille d'eau de Sedlitz. — Le traitement est repris le 4 septembre. Depuis cette époque, non-seulement il n'est survenu aucune amélioration jusqu'au 3 novembre, mais encore des tubercules se sont manifestés au nez et aux joues. Le malade déclare que la sensibilité des mains et des pieds est plus obtuse, quoique le gonflement œdémateux qui existait dans ces parties ne se soit pas montré de nouveau. — 8 novembre. Abandon de l'hydrocotyle asiatica, et traitement ci-après : huile de foie de morue, deux cuillerées ; sirop antiscorbutique iodé, deux cuillerées ; sirop composé d'iodure de fer, d'iodure de potassium, de bichlorure de mercure et de solution de Fowler, une cuillerée matin et soir ; tisane de noyer. Pendant le cours de ce traitement, l'hydrocotyle asiatica a été donnée à la dose de 8 grammes par litre en infusion. On avait reconnu par des essais préalables que la décoction faisait perdre à la plante tout son principe aromatique : c'est l'extrait aqueux qui a été donné à la dose de 35 centigrammes par jour, le malade n'ayant pas pu supporter une dose plus élevée. — Il y a une diminution notable dans le volume de l'espace cutané intersourcilier, dans celui du nez et dans celui des joues ; mais par opposition, il s'est développé sept ou huit tubercules du volume d'un gros pois, tant à la racine du nez que sur les joues et le menton. Ils sont rosés, plats à leur base. — La face est évidemment meilleure ; la peau est rosée, injectée ; elle n'a plus la teinte pâle et plombée qu'elle avait avant. La dose à laquelle on s'est arrêté quand les accidents sont survenus, était de 45 centigrammes par jour. Au moment où il éprouva de la gêne à respirer, il avait un certain trouble dans les idées, qui lui faisait perdre la mémoire des choses, qui causait un malaise et un affaiblissement général, sans qu'aucun organe fût particulièrement pris. — 12 décembre 1855. Depuis l'usage d'une pommade sur la figure, dans laquelle entraient 1 décigramme d'iode et 30 centigrammes d'iodure de potassium pour 30 grammes d'axonge, la peau s'est irritée, le tissu cellulaire s'est légèrement tuméfié, des lamelles d'épithélium cautérisé se sont formées sur les joues et sur le front. Néanmoins les tumeurs paraissent avoir un peu diminué,

elles se sont d'abord limitées et circonscrites, puis elles ont un peu perdu de leur volume.

Lèpre tuberculeuse anesthésique et tuberculeuse. — Hydrocotyle asiatica. — M. Simonin (Charles-Félix), âgé de trente-neuf ans, négociant, est né à Chandernagor (Indes), qu'il quitta en 1825 ou 1826 pour entrer dans une école à Calcutta. Placé dans un bureau en 1833, il y resta jusqu'à 1853, époque à laquelle il quitta Calcutta pour se rendre à Paris, d'après l'avis des médecins du pays.

C'est en 1835 que la maladie fit son apparition par quelques taches rouges circulaires sur les cuisses et les fesses. On soumit M... aux préparations arsenicales deux mois après l'apparition de la maladie. Ce médicament porta une atteinte profonde à la santé ; des taches larges se développèrent sur tout le corps. Ayant consulté un des premiers médecins de l'Inde, il lui fut prescrit de frictionner toutes les parties malades avec un liniment dans lequel entrait de l'acide sulfurique, de l'esprit de....; les taches en furent améliorées, mais bientôt l'affection reparut avec plus d'intensité, accompagnée de douleurs générales. Il fut alors mis à l'usage interne d'une mixture dans laquelle entraient de l'acétate d'ammoniaque, de l'éther sulfurique, du sirop de gingembre et de l'opium. Il en éprouva d'abord de l'amélioration, puis elle fut sans effet. Il fut remis à l'usage de l'arsenic, qui produisit, comme la première fois, les plus mauvais effets. Un autre médecin le mit à l'usage des alcalins et en obtint d'abord un bon résultat ; les carbonates de potasse et de soude furent successivement employés, puis la salsepareille. — Les médecins de l'Inde, convaincus que le climat était tout à fait contraire au malade, l'envoyèrent en Europe ; il vint à Paris en juillet 1852. Après quelques mois de séjour à Paris, il crut remarquer de l'accroissement dans son affection, et il eut recours aux soins de M. Cazenave, qui mit successivement en usage l'extrait alcoolique de strychnine, l'eau de Pullna, les eaux d'Enghien, la salsepareille, l'opium, l'extrait de quinquina, l'hydriodate de potasse, le rob Laffecteur, les tisanes amères, etc. (le tout à ce que m'a rapporté le malade). Ces divers traitements, employés pendant une période de trois ans environ, n'amenèrent pas de soulagement au malade. C'est alors que le malade vint réclamer mes soins, c'est-à-dire vers le mois d'octobre 1855. — C'était un homme d'un aspect hideux, représentant plutôt cinquante-cinq ans que trente-neuf, démarche vacillante et pénible, haleine forte ; il répandait assez d'odeur de tout le corps pour infecter mon cabinet dans l'espace de dix minutes. Il était dans un état cachectique, mangeant peu, etc., en un mot, d'une grande faiblesse. Quant aux symptômes lépreux, voici en quoi ils consistaient : La figure avait une physionomie bouffie ; elle était hypertrophiée, hérissée de tubercules disséminés sur toute sa surface, confluents au nez, aux sourcils, les lèvres épaisses, les narines élargies ; la langue épaissie, la voix rauque et cassée ; les mains et les pieds déformés, empâtés, remplis de crevasses et d'ulcérations creuses à

roûtes sèches et noirâtres; de nombreuses ulcérations étaient disséminées ur les bras, les cuisses et les jambes; des taches ou décolorations existaient à et là, le tout avec perte plus ou moins complète de la sensibilité; d'ailleurs très peu d'appétit; faiblesse générale très grande. En présence de son nsé et des nombreuses médications qu'il avait subies, ayant d'ailleurs mon ttention appelée sur l'hydrocotyle, vu l'essai que j'en avais déjà fait sur un utre malade, je n'hésitai pas à prescrire ce médicament, en tisane et en extrait alcoolique, par pilules de 25 milligrammes, en commençant par deux et rogressant tous les trois à quatre jours d'une pilule. Il buvait de plus deux à rois verres de tisane. Il était à peine arrivé à cinq ou six pilules par jour, 'est-à-dire à 15 centigrammes, lorsqu'il fut pris d'accidents qui durent me ire renoncer à l'emploi du médicament. Toutefois pour arriver, cinq à six imaines s'étaient écoulées, et pendant ce laps de temps il était survenu une mélioration très notable dans la santé. Le teint plombé de la figure avait pris ne coloration plus naturelle. L'empâtement des tissus avait diminué; les ains étaient moins gonflées; les plaies s'étaient généralement cicatrisées. — ais à cette dose de 15 à 20 centigrammes d'extrait par jour, le malade fut ris de vertiges, d'anorexie, de malaise et de sensibilité dans la région épiastrique, de prostration générale des plus marquées; il était comme un omme ivre et pouvait à peine marcher; il ne mangeait plus. Cet état de rostration et d'affaissement se soutint pendant fort longtemps, et ce ne fut ère que deux mois après que nous pûmes revenir aux mêmes moyens. joutons que, dans cet espace de temps, le malade perdit à peu près ce qu'il rait gagné et qu'il s'amaigrit considérablement. — Le même traitement fut pris, mais il ne put être supporté, même à faible dose. Nous dûmes en isser totalement l'usage. On ne saurait se faire une idée de l'état dans lequel tte médication l'avait mis. Il faut dire que ce malade, qui avait pris un and nombre de médicaments, était devenu d'une impressionnabilité tirême; et l'expérience nous a démontré plus tard qu'il ne pouvait supirter qu'à très faible dose tout agent un peu actif. — Afin de compléter cette servation, j'ajouterai que je soumis le malade à ma médication la plus mposée, un sirop dans lequel entraient l'iodure de fer, l'iodure de potassium, le bichlorure de mercure et la solution de Fowler. Il en est déjà résulté ne amélioration assez sensible. — J'avais eu le soin de le laisser pendant ux mois sans médication, l'usage du fer excepté, et je me bornais à le soumettre à une bonne alimentation. — Mais bientôt l'estomac se fatigua de cette édication composée. Quelques ulcérations se renouvelèrent; je suspendis ncore tout traitement, puis j'abordai l'usage du bichlorure de mercure seul, à dose très fractionnée, dans du sirop sudorifique. Sous l'influence de ce itement, il y eut des progrès rapides vers la guérison. La figure devint cellente, les forces se rétablirent, l'appétit revint, les plaies disparurent, s tubercules diminuèrent. Il put vaquer à ses occupations de négociant; il a même faire un voyage en Angleterre. Il en revint très bien; en un mot,

il s'est opéré un changement très notable dans son état. — Voulant profiter de la saison, je l'ai envoyé à Bagnères-de-Luchon.

Lèpre anesthésique, taches, ganglions et tubercules. — ***Hydrocotyle asiatica.*** — (Narration du père.) Mon fils est venu au monde fort et vivace. Il annonçait alors avoir une constitution, sinon robuste, au moins bonne en apparence et réunissant les conditions voulues pour permettre d'espérer un développement normal. Ces espérances n'ont pas été trompées jusqu'à l'âge de six à huit mois. A cette époque, une nourriture insuffisante, conséquence de changements assez fréquents de nourrices et de moyens d'alimentation artificielle, jointe aux difficultés d'une dentition pénible, ordinaires d'ailleurs dans le pays, occasionna divers accidents (diarrhée, langueur, prostration), dont on triompha à la longue par des moyens variés ordonnés par le docteur Lhermitte, et exécutés avec persévérance. (Bains de gélatine, bains fortifiants, lait d'ânesse, nourriture artificielle très légère, et substances médicales, *en petite quantité*, qui ne me reviennent pas à la mémoire.) Cette première époque critique franchie, l'enfant se porta assez bien jusqu'à l'âge de deux ans, où un nouveau travail de dentition apporta d'autres troubles dans son économie. Ces seconds phénomènes, en conservant certaines analogies avec les premiers, affectèrent toutefois un caractère assez différent pour qu'il en soit fait mention. Des symptômes nerveux se produisirent particulièrement, consistant en convulsions générales, mais peu développées, et douleurs assez fréquentes dans les mâchoires. La difficulté d'alimentation dans un pareil état fut alors doublée par la perte d'appétit et un extrême dégoût : il en résulta naturellement un grand amaigrissement et une déperdition de forces, qui furent d'une nature inquiétante, circonstances fâcheuses, qui furent combattues par des moyens appropriés, longuement étudiés et péniblement appliqués, associés à des changements d'air varié aux campagnes.

Cette seconde révolution, plus menaçante que la première, s'apaisa peu à peu, et l'on vit le malade reprendre assez de santé et de vigueur. L'état de l'enfant s'améliora ainsi jusqu'à l'âge de quatre ans ; il ne se manifesta point de phénomènes particuliers autres que ceux qui s'observent habituellement dans l'enfance, c'est-à-dire qu'il eut à subir des indispositions accidentelles passagères, telles que petites fièvres, occasionnées tantôt par des refroidissements, tantôt par la présence de vers intestinaux, et autres causes peut-être que je ne saurais indiquer. J'insiste sur ce point, parce que ces diverses indispositions ne parurent jamais sérieuses et cédèrent tout aussi facilement que les pareilles éprouvées par d'autres enfants.

L'enfant, étant dans sa cinquième année, prit la rougeole, qui régnait alors épidémiquement. La maladie n'ayant offert aucun caractère sérieux, il en guérit parfaitement. Quelques jours après qu'il était entré en convalescence, prenant l'air dans le jardin après le coucher du soleil, il se plaignit d'avoir froid. On le rentra aussitôt, et l'on prit toutes les précautions possibles pour

ppeler la chaleur. Mais dans la nuit même il se déclara un accès de fièvre ivi d'autres accès successifs à des heures déterminées, affectant ainsi un ractère intermittent. La fièvre persista pendant une vingtaine de jours, et céda qu'à la suite de l'emploi du sulfate de quinine. Ce fut donc un choc n nouveau genre, mais assez rude, qu'eut à soutenir la constitution de afant. Les forces se réparèrent cependant avec les soins et le temps, et tout mblait faire présager un retour à la santé assez satisfaisant. De cette période a dernière que je vais tracer, il ne s'est manifesté rien d'extraordinaire ns l'état général. Des indispositions passagères encore survinrent, et eurent r cours d'une manière franche et normale. L'enfant subissait alors des luences épidémiques, en suivant toutes les phases de la même manière s ceux de son âge atteints comme lui. Mais à la suite de ces secousses, il est resté un peu de langueur, de la nonchalance, dont il sortait cependant ontiers pour les jeux et exercices de son goût. A part les moments d'oisi- té dans le milieu du jour, à cause de l'excès de chaleur, l'enfant se plaisait rticulièrement aux promenades à pied et à cheval, aux chasses, qu'il sui- it sans efforts apparents et avec une vivacité qui semblait accuser une force nculaire assez satisfaisante. Néanmoins elle ne s'est jamais développée nme on l'eût désiré. Tout annonçait alors qu'il serait d'une constitution lente, mais sèche. Il n'a jamais eu d'embonpoint proprement dit, l'alimen- ion étant restée chez lui un point difficile à atteindre, à cause du défaut ppétit et de la propension au dégoût. C'est dans cette période que des hes blanches, circonscrites à leur début, apparurent aux jambes. Sou- ns, en l'absence du docteur Lhermitte, à un autre médecin, elles n'éveil- nt aucune inquiétude. Elles étaient attribuées à un défaut de circulation i devait disparaître avec l'âge et à l'aide d'un régime tonique. Les taches disparurent point, mais ne prirent pas non plus des proportions remar- ables. Elles étaient encore à peu près dans l'état primitif lorsque l'enfant atteint d'une angine couenneuse grave, qui faisait alors de nombreuses times. Il en guérit parfaitement bien. Il lui en était resté seulement une ère surdité, phénomène qui parut d'autant plus naturel qu'il s'observait lement chez d'autres. Mais bientôt des douleurs se firent sentir dans une ille ; elles devinrent de plus en plus vives et intolérables. A cette époque docteur Lhermitte était en France. Le docteur auquel je confiai mon fils fit appliquer des sangsues à la tempe. Le sang coula en abondance avant on pût l'étancher, et tellement que le malade éprouva des syncopes. A ar de cette époque, les divers symptômes observés prirent un caractère s alarmant. Les taches (blanches comme du lait) se multiplièrent et se ouvrirent d'une auréole couleur cuivrée. Malgré ce travail vers la peau, fant ne fut pas abattu. Un régime tonique, des bains froids d'eau de rivière la mer furent indiqués et suivis ; moyens qui, s'ils n'attaquaient pas le directement, en empêchaient au moins les progrès. Ce ne fut que plus lorsque des taches cuivrées, dont quelques-unes avec indurations, paru-

rent isolément sur les bras et sur les jambes, que M. Lhermitte, de retour de France, jugea à propos d'employer divers moyens. Ce traitement opéra visiblement sur les taches, en particulier par l'amollissement des indurations; mais c'est de ce moment que la plus grande prostration des forces a été remarquée, d'autant plus que le manque d'appétit et le dégoût rendaient l'alimentation très difficile. Dans ces circonstances, le voyage de France fut résolu. Tout traitement avait cessé plusieurs jours avant l'embarquement et pendant tout le voyage, pour n'être repris qu'à Paris sur les ordonnances de M. Devergie. La traversée fut très bien supportée; l'enfant avait repris de l'activité. Mais à cinq ou six jours des côtes de France, l'enfant fut pris de fièvre accompagnée d'une éruption un peu plus intenses que celles observées par M. Devergie lui-même.

L'indisposition s'annonça d'ailleurs peu de jours avant par une nonchalance qui ne s'était pas observée pendant la traversée, l'enfant ayant mené une vie aussi active que possible pour le peu d'espace qu'offre le pont d'un navire. La fièvre, tombant la nuit, reparaissait le lendemain dans l'après-midi. Elle dura ainsi dix à quinze jours, jusqu'à Nantes, où elle fut coupée par l'emploi du sulfate de quinine à très petites doses. En même temps, il se manifesta une éruption qui affecta à peu près toutes les parties du corps, consistant en petits boutons rouges, ou plutôt roses, les uns très éloignés des autres. Le médecin de Nantes qui vit le malade dit que de semblables affections s'observaient alors.

Il fallut donner du repos à l'enfant avant d'entreprendre le voyage de Paris. Débarqués le 14 avril, nous sommes arrivés le 2 mai à Paris. Le 10 je soumettais la note du docteur Lhermitte à M. Devergie, qui examina le malade dès le lendemain. Après quelques jours de repos, de promenade et de vie régulière, l'enfant fut soumis à un traitement général. Tel était alors l'état du malade, qu'il s'offrit aux yeux de M. Devergie dans les conditions suivantes : qu'on se figure un enfant débile, amaigri, au teint jaune et bouffi; d'une assez grande faiblesse, timide à l'excès, d'une nature indolente, avec des muscles grêles et amaigris; la peau d'une teinte bistre, sur les membres inférieurs principalement, et çà et là des taches d'un centimètre de diamètre, blanches, mais entourées le plus souvent d'une auréole d'un jaune verdâtre plus ou moins foncé; quelques ganglions rares au creux des jarrets, le long de la partie interne des cuisses et aux aines; le dos des mains empâté, la figure à traits arrondis, contrastant avec la maigreur générale; quelques petits tubercules aux oreilles, au sommet du menton; la voix très voilée, et une impressionnabilité très grande au froid. Je mis le malade à l'huile de foie de morue depuis une jusqu'à deux cuillerées par jour, deux cuillerées de vin de gentiane et deux cuillerées d'un sirop dans lequel entraient l'iodure de fer, de potassium, de mercure, et la solution de Fowler, mais dans des proportions moindres que pour un adulte. Eau ferrée aux repas; régime substantiel; bains salins et sulfureux. Sous l'influence de ce traitement, tous les symptômes

rent arrêtés et amoindris; les forces reparurent à un tel point, qu'il put re de la gymnastique et arriver à la force des enfants de son âge. Plus tard, le mis à l'usage de l'*hydrocotyle asiatica*, mais sans aucun résultat. Une mée s'écoula avec des intermittences de traitement, tantôt l'iodure de potassium seul, tantôt l'usage d'un sirop mercuriel. L'enfant fut conduit aux ux de Bagnères-de-Luchon dans l'été de 1856; il en revint très bien portant comme état général, mais avec une progression considérable dans le veloppement d'une série de petits tubercules lenticulaires, notamment sur figure. Quant à ce qui restait des taches, elles avaient entièrement disparu ec l'insensibilité qui les accompagnait.

Bouton d'Alep.

La maladie désignée sous ce nom sévit sur l'universalité des habitants des contrées où elle trouve les conditions de son développement; elle n'épargne pas certains animaux domestiques, tels que le hien et le chat; sa cause serait, suivant M. Willemin, parfaitement nnue et facilement évitable, toutes circonstances fort rares dans histoire des endémies.

M. le docteur Willemin s'est trouvé favorablement placé pour tudier et observer cette maladie, dont il a tracé la description. Il a assé un mois dans la capitale de la Syrie; il a trouvé des médecins struits qui, par suite d'un long séjour dans le pays, ont pu lui fourir des documents nombreux et précieux; il a vu un très grand ombre de malades; il a pu recueillir soixante observations détaillées; il a dessiné les principales formes de la maladie; il s'est livré de nombreuses recherches microscopiques; il a tenté, sur seize ndividus, l'inoculation du bouton; il a recueilli de l'eau du fleuve ont l'usage est, selon lui et selon plusieurs autres médecins, la ause de cette étrange affection, et c'est dans ces conditions et avec es chances heureuses qu'il a rédigé un mémoire dont M. le docteur amédée Latour a fait un extrait très substantiel dans un journal, *'Union médicale*, auquel nous empruntons les faits qui suivent.

Le nom de *bouton d'Alep* est une expression vicieuse, non-seulement parce que le mot *bouton* est un mot vague qui ne peut indiquer le véritable caractère de l'affection de la peau, mais encore arce que cette maladie se rencontre ailleurs qu'à Alep, dans tous es villages des environs baignés par le Coïq, fleuve d'Alep, à Antab,

où ce fleuve prend sa source; ailleurs encore, à Orfa, Diarbekir, Mossoul, Bagdad, etc.

A Alep même, le bouton *attaque sans exception tous les indigènes*. C'est principalement dans la première enfance que la maladie apparaît. Il est rare qu'un enfant né à Alep, de père et mère alepins, ait atteint sa septième année sans avoir eu le bouton. Quant aux étrangers, M. Willemin cite des exemples qui prouvent qu'ils peuvent rester indemnes de la maladie, malgré un séjour à Alep de treize et de quatorze ans. Un médecin, M. le docteur Tomasini, est dans ce cas. D'après un relevé de dix observations, la maladie s'est déclarée chez des étrangers après une durée de séjour qui a varié entre un mois et trois ans.

Mais, fait singulier qui, du reste, n'est pas sans analogue dans la science, M. Willemin cite des cas authentiques qui prouvent que la maladie peut se développer chez des étrangers, plus ou moins de temps après qu'ils ont quitté Alep. L'auteur rapporte six observations dans lesquelles on voit la maladie apparaître un mois et demi, un an, deux ans, trois ans, et jusque trente-cinq ans après le départ d'Alep.

M. Willemin a voulu rechercher quel est le tempérament qui prédispose le plus les étrangers à contracter la maladie, ou qui la rend plus grave chez les indigènes; il croit être arrivé à ce résultat, que c'est le tempérament lymphatique.

Abordant l'examen des caractères particuliers du bouton. M. Willemin expose qu'il est difficile d'en donner une idée qui s'applique à tous les cas; car, ainsi qu'il le fait remarquer plus loin, cette affection peut revêtir, même dans sa première manifestation, des formes très diverses, déterminées, sans doute, le plus souvent par la constitution propre du sujet, ou par la maladie dont il est atteint.

« Cependant on peut dire, ajoute l'auteur, qu'en général le bouton d'Alep est constitué par un ou plusieurs tubercules qui se manifestent le plus communément à la face ou aux extrémités. Le tubercule apparaît d'abord sous la forme d'un bouton de la grosseur d'un pois ou d'une fève, le plus souvent indolent et accompagné de peu de rougeur. Le développement en est lent; il emploie plusieurs mois à doubler ou à tripler de volume et à passer au ramol-

sement. Quand cette nouvelle période est arrivée, il se forme, à sa rface, une croûte quelquefois humide et facile à détacher, le plus uvent sèche et fortement adhérente. Celle-ci tombe soit spontament, soit arrachée par le malade ; mais elle ne tarde pas à se former, pour se détacher de nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à que, l'inflammation ayant diminué, une nouvelle croûte se forme persiste jusqu'à la guérison.

» Pendant toute cette période, quand la croûte est tombée, ou, qui est plus commun, lorsqu'elle s'est crevassée et séparée en plusurs fragments, on aperçoit au-dessous d'elle un fond en général se, uni, tantôt au niveau des téguments voisins, tantôt et génélement plus bas. Ce fond est dépourvu de bourgeons charnus, ls que nous les observons dans les plaies ou les ulcères ordinais. Le liquide qui en suinte a rarement le caractère d'un pus bien ; il est le plus souvent séreux ou séro-purulent, parfois très limde, et presque toujours inodore ; dans un ou deux cas seulement, i appris qu'il exhalait une odeur fétide. Cette lymphe est très astique ; aussi, comme je l'ai dit, la croûte ne tarde-t-elle pas à reformer.

» Lorsque la période de cicatrisation est arrivée, à l'ulcération oûteuse succède un tissu inodulaire, de teinte d'abord rosée, qui lit ensuite. Quelquefois elle doit à un dépôt abondant de pigent une coloration brunâtre ; j'en ai observé deux ou trois cas. ne fois formée, la cicatrice, dont les bords sont plus ou moins irréliers, dont la surface est généralement au niveau des téguments, nelquefois un peu plus profonde, la cicatrice ressemble assez exacment à celle que laisse une brûlure ; elle est indélébile. Ajoutons, fin, que la durée moyenne de la maladie est d'une année à peu ès. »

Quant au siége, la maladie se développe presque exclusivement a face et aux extrémités. Elle est aussi plus grave dans le premier s que dans le second, et celui-ci se rencontre plus fréquemment ez les étrangers que chez les indigènes. A la face, c'est plus parculièrement le milieu de la joue et souvent les deux joues, le côté nez, la paupière supérieure, le front, qui en sont atteints ; aux ant-bras, c'est l'extrémité inférieure, plus spécialement le poignet,

et toujours à la face dorsale; c'est également à la face externe de l'avant-bras, de même à la jambe; au pied c'est encore le dos du membre qui est exclusivement le siége de la maladie. M. Willemin ne connaît pas un seul cas de bouton développé sur le tronc.

Quant au tissu anatomique envahi par le bouton, c'est originairement, dit M. Willemin, le tissu cellulaire sous-cutané. Après y être longtemps renfermée, l'affection s'étend au tissu même de la peau, qu'elle finit par perforer et ulcérer. Sans nier que les cartilages soient quelquefois attaqués, comme le lui ont dit les habitants et les médecins du pays, M. Willemin n'a pas vu de cas semblables, pas plus que la destruction complète des paupières et de l'œil, dont on lui a aussi rapporté des exemples.

« Pour le nombre des boutons, il est très variable : les gens du pays nomment le bouton *mâle*, quand il est unique; *femelle*, s'il est multiple (distinction parfaitement oiseuse) : c'est le dernier cas qui est le plus commun. Mais il n'est pas exact de dire qu'un tubercule unique est plus grave que chacun de ceux qui forment une agglomération..... On a parlé d'individus atteints de 60 boutons et plus. Durant mon séjour à Alep, il était question d'un religieux d'Antab qui en aurait eu à la fois 75. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai pu visiter le neveu de l'évêque grec, un Chypriote âgé de dix-sept ans, qui a été attaqué de la maladie huit mois après son arrivée. La rumeur publique lui attribuait, si je ne me trompe, 40 boutons; il en avait 15, présentant la plupart, il est vrai, des dimensions insolites. Une jeune dame d'origine allemande en a eu 21. — On en observe le plus ordinairement 2, 3 ou 4. »

Quant à l'étendue du bouton, ou plutôt de l'ulcère qui succède au ramollissement du tubercule, elle est encore très variable. M. Willemin en a mesuré qui avaient jusqu'à 4 et 5 centimètres de diamètre. Mais il cite d'autres cas assez nombreux de jeunes filles d'Alep, qui portent simplement à la lèvre, sur la joue ou sur l'avant-bras, de petites cicatrices arrondies de la grandeur d'une pièce de 50 centimes, à peine plus pâles que les téguments voisins, dont elles atteignent presque le niveau.

A côté de la forme type dont il a été donné la description, tubercule dur, rosé, indolent, auquel succède une croûte épaisse, entourée

une auréole d'un rouge plus ou moins vif, présentant, quand elle est détachée, un fond lisse et uni, d'une coloration variable, sorte 'ulcère dont les bords élevés, inégaux, offrent une disposition tuberculeuse caractéristique, ces tubercules varient depuis la grosseur d'une tête d'épingle jusqu'à celle d'une petite lentille, ce qui 'empêche pas les bords de l'ulcère de se relier ordinairement par ne pente insensible avec le fond ; à côté, disons-nous, de ces caractères généraux et en quelque sorte pathognomoniques du bouton d'Alep, très importants pour le diagnostic, M. Willemin a observé un grand nombre d'autres formes qu'il indique avec soin, car, it-il, il n'est pas une maladie de la peau dont le bouton d'Alep ne uisse emprunter les caractères. Ainsi, il l'a vu prendre une forme emblable à celle de l'impétigo, de l'ecthyma, de l'acné, de l'eczéma, e l'herpès circiné, du cancer épithélial, de quelques dermatoses yphilitiques. Mais à travers ce masque étranger emprunté à la constitution des malades ou à la diathèse, il reste toujours quelques ignes qui permettent de reconnaître la nature primitive de la naladie.

Quant à la marche de la maladie, son lent développement, sa péiode d'augment et de décroissance : la saillie du bouton s'affaisse eu à peu ; la plaque colorée qui lui succède pâlit par le centre ; e sorte que, parfois, le milieu du cercle est déjà revenu à une einte presque normale, quand subsiste encore la bordure de petits ubercules dont il a été question ; et ceux-ci, contigus d'abord, nissent par se séparer, par suite du retrait de quelques-uns 'entre eux.

Du reste, pendant toute la durée de la maladie, la santé générale e semble nullement altérée, et la maladie débute sans prodrome t sans mouvement fébrile.

Quant à la durée, son nom arabe, qui veut dire bouton d'un an, xprime bien ce qui se passe dans la généralité des cas. Cependant I. Willemin a vu ou on lui a rapporté des cas où l'évolution de la naladie s'était faite tantôt dans sept ou huit mois, tantôt dans pluieurs années.

En général, le bouton d'Alep ne récidive pas. Cependant M. Willmin rapporte plusieurs cas qui prouveraient, contrairement à

l'assertion des auteurs, que le bouton contracté à Orpha ou à Bagdad ne préserve pas de celui de Mossoul ou d'Alep et réciproquement, quoique la maladie soit dans ces différents lieux identique. Néanmoins, dit M. Willemin, on ne voit pas à Alep un individu prendre deux fois le bouton, ou du moins le bouton tel qu'il vient de le décrire. Il est vrai qu'il existe dans cette même ville un second exanthème qui semble être la miniature du premier, et qu'on observe surtout chez les personnes lymphatiques affaiblies, exanthème ayant d'ailleurs le même siége géographique, la même durée, les mêmes caractères anatomiques, mais ne constituant, en définitive pour l'auteur qu'une seconde et moins puissante manifestation de la maladie. Cette similitude des deux exanthèmes paraît avoir échappé jusqu'ici à tous les observateurs. Les habitants eux-mêmes attribuent ce second exanthème à la piqûre du cloporte. M. Willemin a fait de vains efforts pour détruire cette croyance. En présence d'une famille entière, il a mis un cloporte sur son bras, et, quoique à la pression il ait senti une sorte de piqûre déterminée par le bord tranchant de la carapace de l'animal, inutile de dire qu'aucune éruption n'est survenue. C'est avec raison, du reste, que l'auteur insiste sur l'identité de ces deux exanthèmes, car il serait bien extraordinaire, en effet, ainsi qu'il le fait remarquer, que le même pays présentât deux exanthèmes spécifiques différents.

Pian d'Amérique, *frambœsia*, *yaws*, *micosis* d'Alibert.

Le *pian*, ou *frambœsia* de Willan, que l'on observe principalement à Saint-Domingue, à la Guadeloupe, au Brésil, à la Jamaïque, est considéré comme identique avec une autre affection désignée sous le nom de *yaws*, qui existe principalement dans les Indes occidentales, et notamment dans le royaume de Guinée. Cependant, il y a dans le début de ces deux affections des différences assez tranchées : ce qui les a fait rapprocher ainsi, c'est que, dans toutes deux, à une certaine période, il se montre à la peau de petites tumeurs fongueuses, rouges, granulées, ressemblant à une framboise.

La maladie n'est pas exclusive à ces climats d'une manière absolue. Raulin a décrit, sous le nom de *pian de Nérac*, une affection

épidémique qui a régné dans le département de Lot-et-Garonne en 1752, et qui a de l'analogie avec celles que l'on nomme *yaws*. Biett a eu dans ses salles une affection tuberculeuse du genre du pian, chez une jeune fille française. J'ai traité et guéri une demoiselle du département de l'Allier, qui avait des tubercules nombreux de pians sur la figure et le cou, ce qui prouve que les maladies étrangères à nos climats peuvent aussi s'y montrer spontanément, mais accidentellement, il est vrai; c'est d'ailleurs ce que nous faisions observer à l'occasion de la lèpre. Voici quelle est la physionomie de ces deux maladies.

Dans l'une et dans l'autre, l'affection cutanée est précédée ou non de symptômes généraux : faiblesse, lassitude générale, amaigrissement, anorexie, etc.; puis, dans le pian, apparaît à la surface un nombre plus ou moins considérable de petites taches ou boutons rouges, sur diverses parties du corps, avec fièvre, douleurs dans les membres et dans les os. Ces symptômes diminuent d'intensité, et le malade entre alors dans la seconde période de la maladie; alors aussi l'éruption caractéristique se manifeste sous trois formes différentes : 1° des *gros pians* ou *pians blancs*, 2° des *petits pians*, 3° des *pians rouges*.

Les pians blancs sont quelquefois aussi larges que la main; leur chair est fongueuse et blafarde; il s'en écoule une humeur épaisse et sanieuse. Les *petits pians* sont rouges, beaucoup moins fongueux, et sans sécrétion marquée. Les *pians rouges* constituent, à proprement parler, le *frambœsia*, par leur couleur et leur volume; ils se développent très lentement, mais ils représentent la forme la plus grave de la maladie; l'un d'eux, plus considérable que les autres, s'excorie, s'ulcère, prend un mauvais aspect, se guérit très difficilement, et constitue ce que l'on nomme la *mère pian* ou *mama pian*.

On a de plus rattaché à cette maladie diverses productions morbides consécutives, telles que les *guignes*, ou excroissances de chair qui se montrent à la paume des mains, au bout des doigts, à la plante des pieds; 2° les *crabes*, ou excroissances blanchâtres sur les mêmes parties; 3° les *saouaouas*, ou épaississement de la peau de la plante des pieds et de la paume des mains; 4° enfin, le *mal aux os*,

ou douleurs ostéocopes ambulantes, avec tuméfaction des os spongieux, des exostoses, la carie, etc. On conçoit qu'avec de tels symptômes, certains auteurs aient pu considérer cette maladie comme étant de nature syphilitique : la physionomie de la maladie désignée sous le nom d'*yaws* est différente. Les prodromes sont à peu près les mêmes, langueur, faiblesse, douleurs dans les articulations et fièvre ; apparition d'une sorte de poussière blanche, farineuse, avant l'éruption ; quelques jours après, apparition sur la peau, et notamment sur le front, de taches semblables à des piqûres de puce ou à de petites papules. Accroissement de ces phénomènes pendant huit à dix jours, après lesquels se forment des croûtes qui cachent un pus sanieux et mal élaboré. Ces sortes de pustules croissent en nombre ainsi qu'en largeur, et prennent la dimension de 1 à 2 centimètres ; si on les enlève, on aperçoit un ulcère de mauvais aspect. Ce n'est qu'après un, deux ou trois mois, et quelquefois plus tard, que se montre l'état fongoïde, encore est-il souvent précédé de plusieurs éruptions à ulcère croûteux du genre de ceux que nous venons de décrire, et ces tubercules fongueux sont-ils presque tous ulcérés. Ils occupent principalement la face, les aines, les aisselles, la marge de l'anus et les grandes lèvres de préférence. Comme dans le pian, il existerait toujours une pustule plus large qui constituerait la *mère pian* ou répondrait à ce que l'on désigne sous ce nom dans le *pian d'Amérique*. Enfin, ces malades sont sujets aussi à des douleurs nocturnes, à des gonflements dans les os et à des ulcérations dans le pharynx.

On voit, par cette description succincte, qu'il existe beaucoup d'analogie entre l'*yaws* et le *pian d'Amérique*, la forme seule diffère ; aussi pourrait-on dire avec quelque raison qu'il existe deux espèces de pians, le *pian non ulcéreux*, ou *frambœsia*, *pian d'Amérique*, et le *pian ulcéreux*, dit *yaws*.

C'est de cette dernière variété qu'il faut rapprocher l'épidémie de *pian de Nérac* qui a eu lieu en 1752. Les sujets qui en étaient atteints commençaient à maigrir, puis il survenait des pustules au visage, à la bouche, au cou, aux fesses et aux cuisses. Les enfants à la mamelle en étaient les premiers atteints ; ils communiquaient cette maladie à leur nourrice par la succion des seins, et bientôt

l'infection devenait générale chez ces dernières. D'abord à l'état de pustules dures et calleuses, la maladie passait à l'état de pustules croûteuses, et, plus tard, plus ou moins largement ulcérées. Les pustules et les ulcères se réunissant bientôt, compromettaient les jours de ces petits malades, dont quelques-uns succombèrent.

Chez le malade de Biett, l'affection était entièrement tuberculeuse; elle occupait principalement la partie interne et inférieure des cuisses, où les tubercules, réunis en cercle, formaient une espèce de bourrelet comme fongueux, fort adhérent aux parties sous-jacentes et entouré de tous côtés de cicatrices qui avaient succédé à d'anciens tubercules; quelques-uns se rencontraient aussi sur le dos et sur la face dorsale du pied. Voici maintenant le fait que j'ai été à même d'observer.

Mademoiselle D...., âgée de dix-huit ans, est réglée seulement depuis une année; sa bisaïeule était une créole de la Guadeloupe; sa grand'mère est née à Nantes, elle est allée dans les colonies, elle s'y est mariée, et y est restée peu de temps, pour revenir en France; sa mère est née dans le Bourbonnais. Jamais maladie semblable n'a été observée dans la famille. Il y a cinq ans, apparition d'un bouton au-dessus de l'œil gauche et sur le sourcil; plus tard, il en apparut un deuxième sur le lobule de l'oreille gauche, et successivement à des intervalles plus ou moins éloignés: un troisième au milieu du front, un quatrième sur le sourcil droit, un cinquième à la joue gauche, un sixième sur l'aile droite du nez; plusieurs autres au menton, au voisinage de la bouche, et près de l'un des deux angles de la mâchoire inférieure; puis l'autre oreille s'est prise; de nouveaux tubercules se sont formés et groupés à côté des premiers.

Ces tubercules sont d'un rouge sanguin, se décolorant par la pression; ils font à la peau une saillie de 25 millimètres, en forme de bourrelet. Quand ils sont rassemblés en plaques, leur surface est hérissée çà et là de petits points blanc jaunâtre, qui paraissent contenir du pus sous-épidermique; mais, quand la malade excorie ces surfaces, il ne s'en échappe que du sang en quantité plus ou moins grande. Les diverses tumeurs sont nettement circonscrites, de sorte que l'on passe brusquement de la peau malade à la peau

saine; leur coloration ressemble à celle de la framboise. Tous les tubercules n'ont pas, cependant, cet aspect aussi dessiné : il en est de pâles et de flétris; ajoutons que leur surface est hérissée généralement d'aspérités qui donnent à ces tumeurs l'aspect de ce fruit.

C'est en mars 1850 que j'ai commencé le traitement de cette affection. Cette jeune fille était d'un tempérament lymphatique sanguin. Elle a été mise à l'usage de l'huile de foie de morue mêlée à du sirop d'iodure de fer et aux pastilles soufrées. Elle recevait tous les deux jours des douches sulfureuses sur les tumeurs; celles-ci étaient enduites d'huile de cade tous les trois jours; des ablutions générales d'eau froide sur tout le corps tous les matins en été. Sous l'influence de ce traitement, j'obtins un affaissement gradué des tubercules, et, au bout de trois mois, lorsqu'ils étaient réduits à un très petit volume, j'ai commencé une cautérisation partielle à l'aide du caustique de Canquoin. J'ai obtenu ainsi, par l'ensemble de ces moyens, dont l'emploi a été prolongé pendant cinq mois, une guérison parfaite et exempte de cicatrices à la figure, si ce n'est dans deux ou trois points très circonscrits où la malade avait arraché les croûtes.

A la description sommaire que nous avons faite de l'*yaws* et du *pian d'Amérique*, nous ajouterons que c'est principalement chez les nègres malpropres et mal nourris que se développe l'*yaws*. Cette affection est contagieuse; elle ne peut être communiquée qu'une seule fois chez l'homme. La maladie, quant au traitement, est livrée aux seuls efforts de la nature, unis à une bonne alimentation. On a préconisé aussi l'usage du soufre, des préparations mercurielles et des sudorifiques. C'est aussi et surtout aux pommades mercurielles, aux préparations mercurielles à l'intérieur alliées aux sudorifiques, que l'on attribue le plus de succès dans le traitement du pian, qui est aussi contagieux, mais que l'on peut avoir plusieurs fois. — J'ai eu dans mes salles, à l'hôpital, un homme qui avait contracté le pian en Amérique. Il me montra une cicatrice assez semblable à celle d'un rupia, qui existait vers le tiers inférieur d'un tibia, et qui avait été surmontée d'une petite tumeur que le malade assimilait à une framboise.

KÉLOÏDE.

Entrevue d'abord par Retz et désignée par lui sous le nom de *lartre de graisse*, cette maladie n'a réellement été bien décrite ue par Alibert, qui en a admis deux espèces, d'après les formes ous lesquelles elle pouvait se présenter : *kéloïde cylindracée*, ou umeur étendue en longueur; *kéloïde ovalaire*, ou tumeur ramassée ur elle-même et sans prolongements.

Le siége de cette affection est le plus ordinairement sur le ster- um ou au bas du sternum et en travers de la région épigastrique. e siége, s'il est le plus commun, n'est pas exclusif de toute autre artie du corps. La tumeur se développe sans cause connue, aussi ien sur une plaque de cicatrice de brûlure que sur une peau tout fait saine; elle se montre par un petit noyau charnu ne produisant ucune sensation, sans changement de couleur à la peau, seule- ent avec une sorte d'induration des chairs. Le noyau charnu fait eu à peu des progrès, mais d'une manière très lente, et prend alors ans sa forme deux dispositions différentes : l'une cylindrique, avec es espèces de prolongements de même forme qui s'étendent en se ligitant, en même temps que la peau se plisse en travers sur la urface de ces cylindres; tandis que dans l'autre variété, au lieu e gagner en longueur, la tumeur s'élargit dans tous les sens; lle prend une forme irrégulièrement quadrilatère, à bords renflés t inégaux, tout en envoyant cependant de sa circonférence quel- ues prolongements irréguliers en forme et en étendue. Ainsi, dans ette maladie, il existe une sorte d'hypertrophie, avec induration u tissu de la peau, sans aucune sensation, avec des progrès ex- rêmement lents, au point que presque tous les malades, en général, préfèrent garder ces tumeurs plutôt que de se soumettre à aucun raitement; elles acquièrent d'ailleurs un petit volume, celui d'un ès petit œuf au plus, et cela après un grand nombre d'années. l faut ajouter qu'on ne les guérit pas, et qu'elles ne portent aucune teinte à la santé.

MOLLUSCUM ; *mycosis fongoides* d'Alibert ; *élevures folliculeuses* de Rayer.

Il existe une grande divergence d'opinions parmi les auteurs sur ce que l'on doit désigner sous le nom de *molluscum*, dénomination primitivement adoptée par Bateman, qui le premier a bien décrit deux variétés de cette maladie. Alibert a évidemment décrit sous le nom de *mycosis fongoïde* une sorte de *pian* ou d'*yaws*. Il en est de même de la maladie décrite par Bontius, car il est question de l'ulcération consécutive à presque toutes les tumeurs. Quant à Bateman, il a décrit deux espèces de *molluscum*, celui qui est contagieux, et celui qui n'est pas contagieux. Le premier n'est autre chose que l'*acné tuberculoïde* dont nous avons donné la description (voy. ACNÉ TUBERCULOÏDE), et dont nous avons rapporté un exemple de transmission douteuse de l'enfant à la mère ; mais à l'égard de cette transmission ou contagion, les faits cités par Bateman et Rayer ne sauraient laisser de doute. On a fait dans ces derniers temps revivre cette maladie sous les noms de tumeurs d'*ecdermoptosis*, d'*acné varioliforme*, d'*acné tuberculeuse ombiliquée ;* mais il faut bien reconnaître que tout ce que l'on a écrit à ce sujet se trouve dans les traités de Bateman et de M. Rayer.

Quant au *molluscum* non contagieux, il consiste dans le développement sur diverses parties du corps, et notamment à la face de tubercules nombreux, de peu de sensibilité, se développant avec lenteur, et dont le volume varie depuis la grosseur d'une vesce jusqu'à celle d'un œuf de pigeon. Ces tubercules contiennent une matière athéromateuse ; leur forme est diverse, quelques-uns sont sessiles, globuleux ou aplatis ; quelques autres présentent un pédoncule. Leur accroissement n'est lié à aucun dérangement fonctionnel interne ; ils ne sont disposés, ni à s'enflammer, ni à s'ulcérer ; mais ils subsistent *pendant toute la vie*. Ils ne demandent aucun traitement. En présence de ces considérations et de ces faits, je crois qu'il faut réserver le nom de *molluscum* seulement à cette dernière maladie.

DOUZIÈME GROUPE.

PRODUCTIONS ANORMALES ET ACCIDENTELLES DE LA PEAU.

Changement de couleur.— Lorsque ces changements dans la couleur de la peau se montrent à la naissance, ils rentrent dans la catégorie des *nævi* pigmentaires. Telles sont d'abord les taches de *café au lait* qui peuvent porter sur un point quelconque de la surface de la peau des enfants nouveau-nés, et que l'on considère comme le résultat d'envies non satisfaites pendant la grossesse de la mère. Leur étendue, l'intensité de leur couleur sont très variables. Ces taches sont indélébiles. Dans quelques cas, elles sont foncées, d'une teinte brune ou même bronzée ; dans d'autres circonstances, c'est une teinte bleuâtre tout à fait semblable à celle que produit sur la peau l'explosion de la poudre ; tantôt ces taches diminuent avec l'âge ; tantôt elles restent stationnaires ou elles augmentent. On peut les faire disparaître en modifiant le corps muqueux par l'application de vésicatoires, que l'on met en suppuration : mais la nuance qui en résulte est quelquefois plus désagréable que la tache elle-même.

En fait de colorations accidentelles et maladives, rien n'est plus curieux que le cas de coloration accidentelle en bleu de la majeure partie de la figure et du cou, rapporté par Billard dans un mémoire sur la cyanopathie cutanée (*Arch. génér. de méd.*, t. XXVI, p. 453). Il s'agit d'une personne de seize ans, bien réglée, qui vit peu à peu apparaître cette affection. Chose remarquable, la peau suintait et laissait suinter cette couleur, que l'on pouvait enlever avec un mouchoir, et on en retrouva des traces dans du sang qu'elle vomit à plusieurs reprises. Cette maladie ne céda qu'à l'usage des alcalins.

En fait de coloration *ab ingestis*, on sait que l'usage lontemps prolongé du nitrate d'argent à l'intérieur fait naître une teinte ardoisée de la peau, effet qui se produit aussi sur les membranes muqueuses.

Verrues; porreau; *acrochordon.* — Ce sont de petites tumeur

arrondies, lisses ou granuleuses, qui se montrent à la surface de la peau, principalement sur les doigts, et qui tantôt sont uniques, tantôt sont multiples, et qui poussent avec une rapidité effrayante. Elles sont formées par une exubérance d'épiderme au centre, ou à la base desquelles existe une vascularisation quelquefois considérable; aussi arrive-t-il que lorsqu'on coupe ces dernières, elles fournissent une proportion très notable de sang. Parfois elles prennent la forme de traînées ou de bandes verruqueuses. Elles sont contagieuses; on a été même jusqu'à citer un fait d'extension de verrues par le sang qui s'en écoulait après leur coupure. M. Cruveilhier rapporte à ce sujet que Barruel lui a montré une traînée de verrues développées sur sa main sous l'influence de cette cause. Le cachet de l'affection est donc l'hypertrophie de l'épiderme, et probablement aussi du derme. Divers moyens ont été proposés pour les guérir : la ligature avec une soie, la cautérisation par l'acide nitrique ou tout autre caustique, avec ou sans la section préalable de ce que l'instrument tranchant peut enlever; les frictions avec le sel ammoniac, les sucres âcres de feuilles de chélidoine, d'euphorbe, de sabine, de figuier. Il est un moyen que j'ai employé plusieurs fois avec succès : il consiste à recouvrir les verrues de feuilles de joubarbe, en macération depuis plusieurs jours dans du vinaigre. Il faut que ce moyen soit mis en usage toutes les nuits pendant quinze jours ou trois semaines.

Il existe des exemples de *nævi* verruqueux. A. T. Thomson (*Atlas of delineation of cutaneous eruptions*, Londres, 1849, p. 100) cite deux observations de ce genre où des éminences papillaires, fongoïdes, granulées à leur surface, saignantes quand on la déchirait, existaient en plus ou moins grand nombre ; or c'est à cette sorte de *nævi* qu'il faut rapporter ces éminences que l'on a comparées à des fraises ou à des framboises.

Productions cornées. — Le fait le plus remarquable en ce genre est celui cité par Dubois père, d'une femme qui portait au front une corne ovoïde, dont la base avait six à sept pouces de diamètre sur six pouces de hauteur. Astley Cooper pense que ces productions, dont le volume varie infiniment, ont leur origine dans les follicules de la peau ; aussi naissent-elles principalement sur le cuir

chevelu. Ces productions cornées peuvent d'ailleurs se montrer sur toutes les parties du corps. Au rapport de M. de Villeneuve, sur 71 cas, 9 s'observaient à la tête, 14 au front, 12 à la cuisse, 3 à la tempe, 5 au nez, 2 à la joue, 1 à la mâchoire, 4 à la poitrine, 4 au dos, 3 à la verge et au gland, 4 à l'ischion, 2 au genou, 2 aux jarrets, 1 à la jambe, 2 au pied, 1 au talon. Il est remarquable que les cicatrices en sont souvent le siége, ce qui est opposé à l'opinion d'Astley Cooper. Ces productions cornées finissent par tomber seules, mais elles se reproduisent le plus souvent.

On a compris sous la dénomination de *nævi* des altérations de couleur ou des productions organiques, toutes deux congénitales, qui peuvent se montrer à la naissance et sur la surface de la peau, mais d'une manière limitée et plus ou moins discutée. On en admet trois espèces : les *nævi* pigmentaires, ou simples changements de coloration de la peau ; les *nævi* vasculaires, ou développement patent et anormal des vaisseaux capillaires sanguins limités, et, comme troisième espèce, une série de tumeurs ou hypertrophies cutanées congénitales.

Les *nævi* pigmentaires varient de couleur et d'étendue : tantôt c'est une tache d'aspect vineux, tantôt une tache jaune verdâtre semblable à celles du *pityriasis vernicolor :* ce sont les taches dites de café ; dans d'autres cas, une tache brune du genre de celles que l'on observe dans le *pityriasis nigra ;* puis des nuances intermédiaires. Dans tous ces cas, ces taches sont considérées dans le monde comme le résultat d'envies non satisfaites pendant la grossesse de la mère. Quoique quelques-unes d'entre elles ressemblent à des maladies connues curables, elles s'en distinguent parce qu'elles sont indélébiles. Elles varient d'ailleurs tellement de forme, de siége et d'étendue, qu'il est impossible de les décrire. Elles sont toutes plus ou moins superficielles. On peut encore en détruire un assez grand nombre par l'application de vésicatoires ou par la cautérisation. Toutefois, les taches vineuses, évidemment formées par une dilatation des vaisseaux les plus superficiels de la peau, sont les plus difficiles à faire disparaître ; elles tendent à s'agrandir avec l'âge et à prendre de la saillie à la surface de la peau. Il est rare que ces taches disparaissent ; elles peuvent s'atténuer par l'âge et

par le développement que prend la peau sous l'influence de l'accroissement en volume du corps ; mais elles ne s'effacent jamais. Billard, *Mémoire sur un cas de cyanopathie cutanée* (*Archives générales de médecine*, t. XXVI, p. 453), a rapporté l'exemple d'une jeune fille de seize ans qui présentait au visage, au cou, à la partie supérieure de la poitrine une belle teinte bleue, mais elle sécrétait une matière blanche qui teignait le linge.

Quant à la seconde espèce de *nævi*, elle a une étendue très variable, depuis le volume d'une tête d'épingle jusqu'à occuper la moitié de la surface du corps. Nous avons vu un enfant dont la presque totalité du côté droit, membres compris, offrait cette dilatation vasculaire capable d'amener une couleur rouge très foncée, avec saillie à la surface cutanée. Lorsque les *nævi* sont très limités, ils constituent ce que l'on appelle dans le monde une fraise, une framboise, etc. On compare ces productions à toute espèce de fruit, et, il faut bien le dire, il en est qui se bourgeonnent à leur surface de manière à donner lieu à cette assimilation. Ces altérations innées de la peau peuvent rester stationnaires ou prendre tout à coup un certain accroissement par des frottements ou des grattages. Quand ces tumeurs sont excoriées, elles donnent un écoulement de sang qu'il est quelquefois difficile d'arrêter.

Aucun agent thérapeutique ne les guérit efficacement. On parvient quelquefois à les flétrir en tannant pour ainsi dire la peau par des ablutions avec une dissolution de sublimé, par l'application de poudres ou de corps astringents. Des caustiques seuls peuvent en faire justice ; mais il faut alors que les *nævi* soient très limités et qu'il y ait nécessité de les mettre en usage par l'accroissement que la tumeur a pu prendre dans un moment donné. Ainsi, lorsqu'elles siégent à la figure, elles deviennent parfois d'un aspect désagréable, et c'est alors que l'on a recours aux lumières du médecin.

Lorsque l'on veut cautériser ces petites tumeurs, il faut avant tout s'adresser à des caustiques qui produiraient une *eschare sèche*, afin d'éviter tout écoulement ultérieur de sang. Dans des cas de ce genre, je me suis servi avec avantage du chlorure d'or tombé en déliquescence au contact de l'air, et, par des applications répétées, j'ai fait disparaître complétement ces petites tumeurs. On peut

aussi se servir de chlorure de zinc, qui attaque plus profondément les tissus. Ce qui est remarquable dans ces tumeurs, c'est le développement du corps papillaire de la peau. Au fur et à mesure que l'on cautérise, on aperçoit des chapelets de papilles qui se dessinent à la surface du tissu attaqué. En général, il faut agir avec beaucoup de modération dans ces sortes de cas, sauf à mettre plus de temps pour obtenir la guérison, et à répéter les cautérisations jusqu'à ce que toute trace d'état papuleux ait disparu, sans quoi on court le risque de voir reparaître la tumeur.

TREIZIÈME GROUPE.

MALADIES DES ONGLES.

Il n'entre pas dans le cadre que nous nous sommes tracé de décrire ici toutes les maladies des ongles; il ne s'agit que de faire connaître celles qui rentrent dans le cadre de la dermatologie. Déjà à l'occasion du psoriasis, nous avons fait l'histoire de l'ongle squameux ou atteint seul de cette affection; nous nous bornerons donc ici à une énumération plutôt qu'à une description.

On appelle *onyxis*, *onglade*, toute inflammation de l'ongle, de la matière de l'ongle ou de la peau qui la tapisse. Il existe un *onyxis* de cause externe, provenant de piqûres, de contusion ou de toute autre cause du même genre. Une autre variété constitue ce que l'on nomme l'*ongle rentré dans les chairs*, ou *onyxis latéral*. Puis viennent les formes d'*onyxis* de cause interne, telles que les *onyxis eczémateux*, *scrofuleux*, *syphilitique* et *charbonneux* ou *gangréneux*. Nous renvoyons donc, pour ce qui regarde celles de ces variétés qui nous concernent, aux maladies que nous avons décrites en général, et qui se trouvent localisées dans ces points circonscrits.

Viennent ensuite : 1° la chute des ongles, qui peut dépendre de l'inflammation de leur matrice, survenue à la suite d'une cause externe ou d'une chute toute spontanée analogue à l'alopécie; 2° l'accroissement exagéré de ces organes, comme nous l'avons indiqué dans le psoriasis, et quelquefois sans maladie de peau générale. Dans d'autres cas, c'est la racine de l'ongle qui se découvre, et l'on-

.e de l'enfant, constitue la croûte de lait. Il consiste dans la ›n d'une humeur visqueuse et à moitié purulente, qui se con- ussitôt qu'elle est sécrétée et forme une croûte épaisse d'un jaunâtre, adhérente à la peau et aux cheveux. Limitée d'ailleurs oint plus ou moins étendu ou, au contraire, envahissant toute face du cuir chevelu, il s'en détache de temps en temps des ›ns de croûte, sans que pour cela les parties les plus profondes nt d'adhérer à la peau.

cachet de ces deux affections, c'est leur marche chronique. Et ju'elles prennent de l'extension, c'est qu'alors elles sortent des litions communes pour affecter l'état aigu et envahir une grande ie de la surface du corps.

n'en est pas de même de l'*eczéma muqueux* des enfants (*acor ifluus*); ici le développement de la maladie est brusque. La sur- › de la tête est envahie en peu de temps; on voit s'opérer au cuir velu un état inflammatoire plus ou moins marqué, avec un ès de sensibilité de la peau, démangeaisons intenses, qui déter- nent les enfants à se gratter et à s'excorier de plus en plus; suin- nent plus ou moins abondant, visqueux, filant, tachant et empesant rtement le linge. Cette sécrétion est quelquefois considérable; elle ut même par son abondance porter atteinte à la santé de l'enfant. › sont surtout les démangeaisons qui l'excitent, le privent de mmeil, puis d'appétit, et déterminent un amaigrissement plus ou oins grand. Aussi l'allaitement ne se fait-il que d'une manière complète.

Voilà donc trois formes de maladies très nettes, très tranchées, › montrant toutes trois dans les mêmes points, se développant au ême âge et réclamant des soins différents. Une seule, la dernière, ut offrir quelque gravité par les atteintes qu'elle porte, dans cer- ins cas, à la santé.

La thérapeutique de ces trois affections n'est pas la même. Les eux premières veulent être en général respectées; la dernière exige es soins, mais des soins parfaitement dirigés.

Les mères, fières et presque coquettes de leurs enfants, s'at- chent toujours à enlever avec beaucoup d'empressement les pla- ues de crasse qui constituent l'acné sébacée. Quand tous les matins

on se borne à brosser la tête avec une brosse de chiendent, cela n'a pas d'inconvénient; mais quand la plaque existe depuis longtemps et qu'on vient à l'enlever brusquement, alors on peut apporter quelque trouble dans la santé. Des soins bien entendus consistent donc à se borner à l'usage de la brosse de chiendent, et si dans quelques cas la couche de sécrétion morbide prend trop d'étendue, il faut alors agir partiellement sur elle, en étendant çà et là, chaque soir, un peu d'huile de lis, et détachant le lendemain les sécrétions morbides que l'huile a rendues moins consistantes. Il ne faut jamais employer de pommades résolutives. Plus la maladie a d'étendue, plus il faut savoir la respecter. On doit attendre que l'enfant ait pris de la force et de l'accroissement avant de chercher à obtenir la guérison de cette affection, qui, du reste, ne présente aucune gravité. Son aspect seul est désagréable pour les parents.

Ces mêmes préceptes sont applicables à la croûte de lait. Toutefois il ne faut pas aller au delà de la prudence, et c'est une exagération que de suivre scrupuleusement le précepte de quelques médecins, qui prétendent que dans aucun cas *on ne doit y toucher*. S'il est vrai que cette sorte de sécrétion est dans beaucoup de circonstances un bienfait de la nature qui semble porter au dehors un principe morbide, il y a des inconvénients à trop respecter ces émonctoires naturels. Ce sont les cas, par exemple, où la croûte de lait reste stationnaire après avoir pris une grande étendue. Ainsi, tant qu'il y a accroissement de la maladie et sécrétion soutenue, il faut respecter d'autant plus cette sorte d'émonctoire, qu'en général il donne peu de sécrétion morbide, et que par cela même il n'altère pas la santé de l'enfant.

Il n'en est pas de même lorsque la maladie est arrivée à sa période de stase, d'inertie, c'est-à-dire à cet état stationnaire en vertu duquel la croûte de lait ne fait plus de progrès, ni en bien, ni en mal. Cet état bien constaté, on peut agir, mais avec beaucoup de réserve. Que le médecin sache bien qu'il guérira toujours cette affection avec la plus grande facilité. Qu'il sache de plus que, dans certains cas, et j'en ai vu plusieurs exemples, un cataplasme de farine de graine de lin appliqué sur les parties malades détermine la chute des croûtes, met le corps muqueux de la peau à nu ; sa dessiccation

opère alors; elle supprime toute sécrétion morbide, et cause une rte de répercussion, en vertu de laquelle se développent des symômes cérébraux très violents et très compromettants pour la vie l'enfant.

Quelle est donc la marche à suivre en présence de résultats si aves obtenus sous l'influence d'un moyen en apparence inoffen-? J'ai donné des soins à un enfant de deux ans, très fort, très bien nstitué, appartenant à une famille anglaise dans une grande ance, et chez lequel un œdème général est survenu brusquement, rce qu'un de nos honorables confrères, cédant aux vives sollicitions de la mère, a proposé l'usage, chaque soir, de cataplasmes de rine de graine de lin sur toute la surface de la tête; dès le second le troisième jour, il y eut suppression totale de maladie cutanée augmentation du volume du tissu cellulaire sous-cutané général un tel degré, que l'enfant ne pouvait plus respirer.

En opposition avec ce fait, je me rappelle qu'il y a trois ans un onducteur de malle-poste vint me consulter pour sa fille âgée de ept ans, et chez laquelle on avait tellement respecté la croûte de ait, que cette enfant présentait au côté gauche du front, au voisinage le la tempe, une plaque jaunâtre de 5 centimètres de diamètre. Cette plaque, qui tombait à de très longs intervalles, se reformait rès lentement; elle avait fait une empreinte profonde sur la peau n la déprimant, elle s'était opposée à la croissance des cheveux; lle se fût ainsi perpétuée des années, et eût laissé en définitive une icatrice indélébile qui eût défiguré cette jeune personne. Il a suffi e quelques cataplasmes et de l'emploi, pendant quelques jours, 'une pommade légèrement résolutive, pour amener la guérison omplète de ce que j'appelai alors une infirmité. Les croûtes de lait forme chronique s'opposent, en effet, à la croissance des cheveux; ussi les enfants chez lesquels elles se développent n'ont-ils que uelques cheveux rares et maigres.

Lorsque le médecin juge convenable d'opérer la guérison des roûtes de lait, il faut qu'il les attaque par portions de petite tendue: c'est là une condition importante à observer pour éviter tout développement d'accidents du côté des organes internes de l'économie. A cet effet, il fera étendre tous les soirs un peu de

crème ou un peu de beurre sur un point malade jusqu'à guérison de ce point. Il en attaquera un second, puis un troisième et successivement toute la surface malade dans un temps donné très long. Il est rare que l'on soit obligé d'arriver à des résolutifs ; cependant, s'il y a lieu d'employer quelques pommades, il faut s'adresser de préférence à la pommade au tannin dans la proportion de 5 décigrammes à 1 gramme de tannin pour 30 grammes d'axonge. On peut y ajouter, dans certains cas, quelques centigrammes de camphre.

Ces moyens simples suffiront dans la plupart des cas, sauf ceux de date fort ancienne où l'âge assez avancé de l'enfant permet d'avoir recours à tous les agents que nous avons proposés pour le traitement de l'eczéma impétigineux chronique, traitement tant externe qu'interne.

L'*eczéma muqueux* réclame d'autres médications. Comme dans les deux affections précédentes, il faut d'abord laisser le suintement s'opérer seul, ne rien employer pour l'arrêter, se borner à des soins de propreté qui consisteront dans des lavages matin et soir avec une éponge imbibée d'eau de sureau ; changement fréquent des linges ; éviter les grattages des enfants autant que possible. Quand ces grattages sont trop répétés, enduire la tête d'un peu de crème fraîche. Le suintement devient-il par trop abondant, au point de fatiguer l'enfant, de diminuer les besoins de l'allaitement, on tarit la sécrétion à l'aide d'un peu de poudre d'amidon appliquée sur des portions limitées du mal ; mais on ne l'applique pas soir et matin : on supprimerait l'éruption trop brusquement. On arrive peu à peu et après plusieurs mois d'écoulement, à des lotions résolutives ayant pour base l'eau de sureau, que l'on active un peu plus tard par l'addition de quelques gouttes d'extrait de Saturne ; en même temps on établit un exutoire au bras. Ce traitement simple suffit pour la guérison de l'*acor mucifluus*.

Comme on le voit, nous avons été sobre de moyens ; c'est que nous considérons comme dangereux la plupart d'entre eux ; c'est que, dans cet article, il convenait de porter dans l'esprit des médecins une grande réserve dans la thérapeutique des maladies des enfants à la mamelle. Ce n'est guère que vers la deuxième ou la

ième année que l'on peut se permettre d'opérer la guérison des adies qui n'ont pas cédé sous le bénéfice seul de la nature.

n recommandant l'inaction intelligente du médecin pour les trois cipales affections du cuir chevelu qui peuvent survenir durant la ode de l'allaitement de l'enfant, nous avons cédé à l'impres- pénible que m'ont fait naître les nombreux exemples d'acci- ts que j'ai été à même d'observer par suite d'une pratique osée. — Actuellement nous allons considérer l'enfant comme nt déjà acquis plus de vitalité, plus d'énergie avec l'âge; nous le posons ayant dépassé deux à trois ans et portant cependant ore les traces de l'une des trois affections que nous avons citées. le deux choses l'une, ou la maladie est restée à la tête, et alors a successivement envahi tout le cuir chevelu; ou elle s'est atrée sur les diverses parties du corps dans une étendue plus ou ins considérable. Les deux cas sont possibles et de longue durée; rais en citer des exemples. J'ai donné mes soins à une demoi- e de seize ans qui habite le département de l'Allier. Ses parents ient jusqu'alors négligé la maladie dont il s'agit d'après l'avis de r médecin, qui déclarait que la menstruation ferait disparaître te affection. La menstruation s'est parfaitement établie, et lorsque s le commencement de l'un des étés précédents on confia cette ne personne à mes soins, en la faisant résider à Paris, afin que pusse la suivre. A part les oreilles et les mamelons qui s'étaient etés, le reste de la peau du corps était sain. Cette enfant fut guérie trois mois. Je l'envoyai à Baréges pour y compléter sa guérison, is la rigueur de la saison suivante a fait en partie reparaître la ladie, qui d'ailleurs s'exaspérait tous les hivers. Ainsi, pendant ne ans, l'*eczéma impétigineux* a été borné au cuir chevelu, quoi- il se soit manifesté très peu de temps après la naissance.

En regard de cette limitation du mal, malgré sa durée, je puis er bon nombre d'exemples où, au contraire, toutes les parties du ps ont été plus ou moins affectées; je citerai, en particulier, deux nes personnes des colonies, auxquelles j'ai donné des soins, soit ns les couvents à Paris, soit chez leurs parents. L'une d'elles est ivée à l'âge de dix-huit ans. Je l'ai soignée trois années de suite que hiver, mais à chacune d'elles l'affection avait une intensité

moindre, et depuis quatre ans les hivers se sont passés sans que l'affection ait reparu et sans qu'aucun traitement ait été fait. Chez l'une de ces jeunes personnes la menstruation s'est établie pendant le traitement, elle n'a apporté aucun changement dans la maladie; il y a plus, celle-ci subissait alors une légère recrudescence à l'approche des règles.

Dans tous ces cas, l'*eczéma impétiginodes* se lie toujours à la constitution molle et au tempérament lymphatique, dont on retrouve la prédominance dans la bouffissure de la face, l'état chassieux des yeux, l'abondance de la graisse, les formes arrondies des membres, la lenteur dans les actes des enfants, leur peu d'impressionnabilité et leur intelligence peu avancée.

Il ressort toutefois de ces faits une induction fort importante pour la pratique médicale, à savoir : que la nature ne fait absolument rien pour la guérison de cette maladie, et que le médecin qui entretient une famille dans la pensée que tôt ou tard les transitions naturelles d'âge par lesquelles devra passer l'enfant opéreront des changements salutaires, ce médecin, dis-je, est blâmable. J'insiste sur cette circonstance, à cause des exemples si nombreux de réserve médicale, dont j'ai été témoin, même de la part des hommes les plus distingués et que leur spécialité dans le traitement des maladies de l'enfance devait éloigner de ce que j'appellerai une erreur déplorable.

Mais on va même plus loin, et lorsque la menstruation est arrivée sans résultats, le médecin dit aux parents : *Attendez encore, un mariage, une grossesse feront disparaître ces accidents.* Conseils pernicieux, non-seulement pour la jeune fille, mais encore pour toute la famille qu'elle est appelée à procréer; car les enfants présenteront bientôt comme la mère une maladie dont ils auront hérité. C'est ainsi qu'on propage de descendants en descendants les affections cutanées. C'est ainsi que l'on crée les maladies héréditaires et qu'un médecin devient la cause de la perpétuation dans toute une famille d'un mal si difficile à détruire.

Ceci posé, cherchons à dépeindre l'état de l'affection à forme chronique et de date ancienne, et établissons les phases de son traitement général et local. La maladie cutanée se montre, ou sous forme

de croûtes d'un aspect blanchâtre, filamenteuses, plus ou moins brillantes, et se rapprochant assez de l'amiante; de là le nom de *teigne amiantacée*, qui lui a été donné par Alibert; ou sous celle de croûtes d'un jaune plus foncé, cassantes, se réduisant facilement en poussière, et se détachant quelquefois par petites pelotes ou globules, qui adhèrent aux cheveux, et qui ont beaucoup d'analogie avec la variété de teigne que je désigne sous le nom de *teigne granulée*. En cet état de granulations adhérentes aux cheveux, on nomme encore cette maladie *impétigo granulé chronique*.

Dans ces deux variétés, les cheveux sont plus ou moins accolés les uns aux autres et appliqués le long du cuir chevelu, de manière à ne pouvoir les en séparer qu'avec peine. Le plus souvent, ils tombent sous l'influence d'une légère traction. Ils sont rares, parce que les parents les ont détachés en brossant la tête; ils ne poussent pas sensiblement. Recouverts de la production amiantacée de la première espèce, ils ressemblent alors à des filaments d'amiante accolés les uns aux autres, avec la couleur blanche qui lui est propre. Dans la seconde variété, ils conservent plus ou moins leur couleur naturelle, à part des points où adhèrent les productions morbides.

Vient-on à faire tomber, dans les deux espèces, les deux variétés de croûtes, on trouve le cuir chevelu épaissi, plus ou moins rugueux, dénudé, rouge, et suintant au moindre frottement, saignant même quelquefois. Ajoutez à cet ensemble des démangeaisons dont l'intensité est variable, une sécrétion par les grattages, enfin un accroissement du mal en certaines saisons, toujours les mêmes, sous l'influence d'un état aigu accidentel.

Le diagnostic de l'une de ces affections, celle qui est avec granulations, présente parfois des difficultés pour la distinguer de la teigne granulée. Bon nombre de médecins croient avoir guéri des teignes, qui n'ont réellement traité que des eczémas impétiginodes chroniques, et cela est si vrai qu'assistant, il y a quelques années, à une séance mensuelle de l'une des sociétés de médecine les plus distinguées de Paris, chacun sourit d'incrédulité, lorsque je parlai des difficultés que l'on éprouvait à guérir la teigne proprement dite. C'était à qui prendrait la parole pour diriger le sarcasme contre mon

assertion. La discussion alla jusqu'à ce point qu'au moment de sa clôture, je supplial la société de vouloir bien consentir à ce que cette discussion ne fût pas publiée dans les procès-verbaux de ses séances, *pour l'honneur de la Société!* Je raconte cette circonstance, qui m'a vivement impressionné, pour arriver à établir que, dans certains cas, le secours du microscope devient indispensable au diagnostic, qui est d'une importance extrême. La teigne est contagieuse; l'eczéma impétiginode chronique l'est fort rarement. Les moyens propres à guérir la teigne ne réussissent presque jamais à détruire l'affection qui nous occupe. Enfin, en déclarant une jeune personne atteinte de la teigne, c'est dire qu'elle sera, dans la plupart des cas, privée de cheveux à toujours; c'est porter sur sa personne un stigmate de réprobation et mettre le désespoir dans une famille.

Le traitement à employer contre ces deux formes de maladies est presque le même pour toutes les deux, à de légères différences près. Il est général et local : général, en ce sens qu'il faut s'attacher d'abord à modifier la constitution scrofuleuse, en prescrivant une médication appropriée (voy. MÉDICATION ANTISCROFULEUSE).

Quant au traitement local, en voici les bases : 1° Faire tomber, à l'aide de cataplasmes de farine de graine de lin, toutes les croûtes de la tête, ou bien imprégner ces croûtes de saindoux en abondance et plusieurs fois dans les vingt-quatre heures; 2° couper les cheveux tout à fait ras et ne pas les faire raser; mettre ainsi le cuir chevelu parfaitement à nu; répéter cette section des cheveux tous les douze ou quinze jours; 3° si le cuir chevelu est épaissi, notablement enflammé, continuer toutes les nuits des cataplasmes très minces de fécule de pomme de terre ou de farine de riz, afin que ces cataplasmes ne fassent pas un poids trop considérable sur la tête; 4° plus tard, commencer l'usage, le matin et l'après-midi, d'une pommade légèrement astringente et composée de :

Axonge.	30 grammes.
Tannin.	1 gramme.

Augmenter peu à peu la dose de tannin de manière à arriver à 3 ou 4 grammes : y ajouter même un peu de camphre, 25 centi-

rammes; 5° tous les trois jours nettoyer la tête, d'abord avec une au contenant 10 grammes de carbonate de soude pour 500 grammes 'eau; puis avec de l'eau à laquelle on ajoute un quarantième de m poids de chlorure de soude.

6° Remplacer plus tard la pommade au tannin par de la pommade de goudron au 40e de son poids; 7° à cette période, commencer à toucher les parties malades, soit avec de l'huile de cade, oit avec une solution de nitrate d'argent au 10e de son poids; ' arriver enfin à une pommade qui contienne 25 centigrammes de arbonate de cuivre pour 30 grammes d'axonge.

9° Joindre, en hiver, à ce traitement local l'usage des bains de apeur en étuve, qui sont d'un secours très puissant dans ces sortes s cas; ou, à défaut de ces bains, ceux de Baréges artificiels, à ible dose.

Telle est l'énumération des principaux agents dont je me sers our obtenir la guérison de cette maladie de date ancienne. Inutile s faire observer que tout le talent du médecin consiste dans le hoix et l'opportunité du remède en raison de l'état du mal. En hérapeutique, il ne suffit pas d'avoir des agents, il faut savoir les mployer en temps utile.

J'ajouterai que la saison la plus favorable à la guérison de cette maladie, *c'est l'hiver;* que l'on n'obtient que très rarement une uérison à l'abri de toute récidive lors du premier traitement; que maladie revient une première fois, une deuxième fois pendant la aison où elle s'est toujours montrée avec plus d'intensité, mais que haque fois elle est beaucoup moins étendue, beaucoup moins ténace et surtout d'une guérison plus facile. J'affirme enfin que l'on eut, avec quelque persévérance, obtenir une guérison radicale, et ue les cheveux repoussent avec une nouvelle vigueur, de manière faire disparaître toute trace de maladie et à ne pas laisser supposer u'elle ait jamais existé. Inutile d'ajouter qu'en présence d'une ffection qui reflète d'une manière si évidente un tempérament lymhatique, il faut joindre à ce traitement externe une médication terne antilymphatique.

MALADIES QUI ENTRAÎNENT LA CHUTE DES CHEVEUX.

Il est des affections de la peau pour lesquelles les médecins ne sont pas toujours consultés, parce que le monde ne voit que l'effet, sans savoir quelle en est la cause. Il s'adresse alors au coiffeur et à tous ces charlatans qui annoncent et vendent des médicaments contre la chute des cheveux, ou ayant pour vertu spécifique de les faire croître, d'en augmenter le nombre et la force. On sait jusqu'à quel point a été poussée l'impudence sous ce rapport.

Tout ce qui naît et croît dans notre économie a son organe de développement. Les cheveux, tout organisés qu'ils sont par eux-mêmes, ont néanmoins pour point de départ et d'accroissement des bulbes dans lesquels ils puisent les matériaux de leur nutrition. Ces bulbes sont placés dans la partie la plus profonde de la peau, et ils sont enveloppés par les réseaux de son tissu, de sorte que si, par une circonstance quelconque, la peau vient à être frappée d'une maladie qui modifie sa consistance et son volume, les bulbes des poils en reçoivent une influence directe ou indirecte, mais toujours fâcheuse.

Indépendamment de la modification que reçoivent les bulbes des cheveux par la maladie de la peau, ces bulbes peuvent être malades eux-mêmes.

Dans ces divers cas, les cheveux ne trouvent plus dans les bulbes les matériaux nécessaires à leur accroissement et à leur vie; dès lors ils s'amaigrissent ou ils tombent.

La chute des cheveux peut donc provenir de deux ordres différents de maladies : ou de maladies de la peau, ou de maladies des bulbes. Mais ce ne sont jamais les cheveux qui sont malades par eux-mêmes, ou, s'ils le deviennent, ce n'est jamais que consécutivement et par extension de l'affection de la peau ou de celle des bulbes.

Ceci posé; on voit tout d'abord que la chute des cheveux doit être ou naturelle ou accidentelle; dans le premier cas, elle constitue l'alopécie proprement dite; dans le second, elle se lie à des affections cutanées diverses. On conçoit que s'il est des maladies qui, en

général, ne l'entraînent pas nécessairement, et ces maladies sont nombreuses, elles peuvent, lors de leur permanence et en vertu de l'atteinte portée à la peau par leur durée, amener une sorte d'atrophie des bulbes des poils, et par suite devenir une cause de la chute des cheveux. Il ne s'ensuit pas qu'à l'occasion de la chute des cheveux nous devions traiter de toutes ces maladies; nous dirons seulement quelques mots de leur influence et des circonstances dans lesquelles elles produisent cet effet.

ALOPÉCIE. *Chute naturelle des cheveux.*

Congénitale.
Sénile.
Accidentelle.
Sans état morbide de la peau.
  Sénile.
  Suite de couches.
  Maladies générales de l'économie.

Avec état morbide de la peau ou des bulbes des poils.
  Eczéma chronique.
  Impétigo.
  Pityriasis.
  Teigne.
  Vitiligo.
  Herpès tonsurant.
  Porrigo decalvans.

On désigne sous le nom d'*alopécie* la chute totale ou partielle des cheveux ou des poils, quelle qu'en soit d'ailleurs la cause. Aussi l'alopécie peut être naturelle lorsqu'elle est congénitale ou lorsque, par des conditions que l'on ne peut pas apprécier, les cheveux tombent sans qu'il existe aucune maladie, soit de la peau, soit du bulbe des poils, et que l'on peut seulement rapporter à l'âge cette perte de la chevelure ou des poils. De là l'alopécie congénitale ou sénile; mais la chute des cheveux peut arriver naturellement à l'âge de l'adolescence et lorsque les parents en ont été eux-mêmes atteints, sans que la peau ou les bulbes paraissent malades.

Il faut, au contraire, comprendre sous la dénomination d'alopécie accidentelle une série de cas qui dérivent de causes toutes différentes entre elles, et parmi ces causes se trouvent plusieurs maladies qui par elles-mêmes entraînent forcément la chute des cheveux : telles sont celles que nous avons énumérées en tête de cet article. Nous allons donc fournir quelques données spéciales sur l'alopécie congénitale et celle dite sénile; puis nous traiterons de la

chute des cheveux accidentelle, en rappelant les maladies qui peuvent la déterminer.

On a quelques exemples d'alopécies congénitales dans lesquelles les enfants sont nés sans cheveux, sans sourcils, et chez lesquels il ne se développe, par la suite, ni barbe ni poils. Ces enfants ont la peau blanche et souvent blafarde; les paupières deviennent entièrement rouges par la suite et sans cils. Le cuir chevelu n'est pas privé de cheveux d'une manière absolue, mais il ne s'y montre qu'un duvet semblable à celui de la peau des nouveau-nés, qui tombe après les premières semaines de la vie. Plus tard et avec l'âge ces enfants peuvent se fortifier, prendre de l'accroissement, acquérir de la force et les marques de la virilité, mais c'est en général l'exception : le plus souvent ils offrent tous les attributs de sujets mous, lymphatiques, à voix féminine et doués de peu d'énergie; cet état est irrémédiable.

L'alopécie dite sénile se montre avec les progrès de l'âge. Elle ne porte en général que sur la chevelure et sur les poils du pubis; mais quand elle survient durant la jeunesse de vingt-cinq à trente-cinq ans, c'est qu'elle est la suite soit d'une cause syphilitique, soit de conditions héréditaires que l'on ne saurait apprécier. Ce n'est plus alors une alopécie sénile, c'est une alopécie dépendante de conditions toutes spéciales d'organisation acquise. Il existe pourtant une différence assez grande entre l'alopécie de cause syphilitique et l'alopécie dite prématurée; dans la première, les cheveux tombent de tous les points; dans la seconde, au contraire, l'alopécie affecte ou le devant, ou le sommet de la tête, mais toujours dans le même point et d'une manière uniforme; de sorte que le front se trouve de plus en plus à découvert en procédant d'avant en arrière; ou le sommet de la tête étant le siége de l'alopécie, il en résulte bientôt une sorte de tonsure qui va en s'élargissant peu à peu et laissant à sa circonférence les cheveux dans leurs conditions naturelles.

La peau dans tous ces cas n'est pas le siége de la maladie. Il n'y existe aucune sensation anormale ; mais Bichat a observé que dans l'époque sénile il s'opère peu à peu une sorte de resserrement du canal cutané des cheveux et des poils au point qu'il finit par disparaître. Il s'est donc produit là une véritable atrophie du bulbe des poils

qui ne permet plus aucun espoir de faire renaître les cheveux.

Cependant lorsqu'il s'agit d'un homme jeune, le médecin doit conseiller et mettre en usage tout ce qui peut tendre à fortifier les cheveux, et que nous indiquerons en parlant de la chute des cheveux, à la suite de maladies graves.

Alopécie accidentelle. — Il est peu de maladies sécrétantes ou non sécrétantes de la tête qui n'amènent à la longue la chute des cheveux et qui ne s'opposent à leur développement. Ainsi l'eczéma, l'impétigo, l'eczéma impétiginodes, le psoriasis, font tomber les cheveux. Cette chute n'est que temporaire. Le bulbe a plus ou moins été gêné dans sa nutrition ; une fois la maladie de la peau terminée, il reprend son accroissement, sa vitalité, et les cheveux repoussent avec plus ou moins de vigueur, suivant que l'atrophie du bulbe a duré un temps plus ou moins long. Ainsi, tel enfant qui aura eu dès l'abord une chevelure forte, et qui sera affecté pendant plusieurs années d'un eczéma du cuir chevelu, pourra ne plus offrir, même longtemps après la guérison, pendant toute sa vie peut-être, que des cheveux minces, rares et courts. Tel autre, au contraire, verra reparaître sa chevelure aussi forte, aussi belle, si la maladie n'a duré que quelques mois.

Il n'en saurait être de même d'un *favus*, d'un *herpès tonsurant*, d'un *porrigo decalvans*, quoique la durée de ces affections ait été beaucoup plus restreinte, parce que dans ces maladies c'est sur le bulbe du poil que siége l'affection avec le parasite végétal qui l'accompagne ; elle s'étend même aux cheveux, elle en modifie essentiellement la structure, et dès lors elle porte atteinte à l'organisation de tous les deux. Après un certain laps de temps, l'altération du bulbe est si profonde qu'il y a désorganisation ou atrophie complète. Le bulbe étant détruit, il ne saurait y avoir de recrudescence des cheveux, quoique la maladie elle-même soit guérie. Enfin, il est certaines conditions générales qui influencent assez les cheveux pour en déterminer la chute.

Ces préliminaires, sur lesquels nous insistons, viennent corroborer les préceptes que nous avons donnés sur la nécessité d'arrêter les affections cutanées à cette époque de l'enfance où l'organisation a pris une énergie suffisante, afin d'éviter les conséquences fâcheuses

qui en sont la suite nécessaire. Il appartient donc au médecin de faire pressentir aux parents les dangers de cette sorte d'inertie, en vertu de laquelle ils laissent persister le mal. Il appartient au médecin d'appliquer, contre ces diverses maladies, les moyens que nous avons énumérés à l'occasion de l'histoire de ces maladies.

Mais la chute des cheveux peut être indépendante d'une maladie de la peau ; il est probable que, dans ce cas aussi, le bulbe n'est pas malade, mais qu'il ne reçoit pas une nourriture suffisante à la croissance des cheveux. Ce n'est pas en général pendant l'enfance que l'on voit apparaître cette chute graduée des cheveux sur laquelle nous venons d'appeler l'attention ; c'est à deux époques principales de la vie : 1° à la suite des couches chez les femmes ; 2° dans l'adolescence dans les deux sexes.

Dans le premier cas, la chute des cheveux est consécutive à un accouchement dont les suites ont été longues, accompagnées de symptômes généraux ou locaux qui ont entraîné un long séjour au lit, et nécessité surtout l'abstinence la plus complète des soins ordinaires de la chevelure. La tête est restée longtemps enveloppée ; la transpiration y a été retenue; souvent même des sueurs abondantes ont eu lieu ; les cheveux n'ont pas reçu le contact de l'air ; il s'est manifesté alors un état qui doit être le précurseur des phénomènes d'une maladie qui se montre surtout dans certains pays où l'on observe la négligence la plus absolue et la malpropreté la plus dégoûtante ; je veux parler de la plique polonaise. Je n'affirme pas que cette dernière maladie dût se montrer nécessairement, si un pareil état morbide se prolongeait, mais il est probable qu'elle pourrait se montrer.

Les personnes qui sont affectées de fièvres graves se trouvent placées dans des conditions pareilles lors de leur convalescence. C'est que la peau de la tête, comme la peau du reste du corps, a reçu une influence propre à modifier sa vitalité ; qu'elle veut de l'air et de la propreté ; c'est que la transpiration à la fois aqueuse et graisseuse qui s'opère à sa surface doit être soustraite, et au moyen de l'évaporation, et au moyen des agents mécaniques dont nous nous servons pour la toilette ; c'est que toute transpiration aqueuse, d'acide qu'elle est, devient alcaline et par cela même irritante pour la peau;

que toute transpiration huileuse se rancit à l'instar des matières grasses, et qu'enfin les cheveux doivent vivre aux dépens de l'air, comme la peau elle-même qui absorbe des gaz et exhale, semblables en cela aux végétaux dont notre organisation ne saurait différer; parce que tout ce qui est doué de vie dans la nature est soumis aux mêmes lois de développement comme aux mêmes conditions physiques d'organisation et aux mêmes influences extérieures. Pendant longtemps on a douté de cette exhalation gazeuse cutanée assimilable aux végétaux, parce qu'elle avait échappé à nos sens ; comme quelques personnes doutent encore aujourd'hui de l'absorption gazeuse par la peau ; et cependant rien de plus fondé en théorie comme en expérience. Si ce n'était nous éloigner de notre sujet, nous invoquerions les phénomènes les plus communs et les plus journaliers à l'appui de ces assertions. Nous avions toutefois besoin de les rappeler pour faire comprendre comment les cheveux s'étiolent et tombent à l'instar des feuilles, des fleurs et des fruits.

Il est évident que dans l'espèce il ne s'agit pas ici de maladie, et par conséquent le remède doit être puisé dans des soins hygiéniques bien ordonnés : d'abord débarrasser graduellement la tête des enveloppes que l'on y maintient pour conserver la chaleur, autant toutefois que l'état général du malade le permet ; démêler peu à peu les cheveux, les passer ensuite au peigne de plus en plus fin tous les matins ; les couper du quart et même plus tard de la moitié de leur longueur. Cette mesure trouvera souvent de l'opposition de la part de beaucoup de dames ; mais elle est basée sur la saine raison ; et, pour prolonger nos comparaisons, que nous croyons justes, que fait-on à un arbre qui languit et ne donne que des pousses de peu d'importance ? On coupe la plus grande partie des branches et souvent même on le tronçonne pour le rajeunir, dit-on. En effet, l'année suivante il devient plus vigoureux que jamais, parce que sa séve est assez forte pour nourrir ses rejets. Il en est de même des cheveux ; et telle chevelure qui se nourrissait mal à une longueur donnée, va croître et se fortifier avec une étendue moitié moindre ; ce sont de ces comparaisons qu'il faut faire aux malades parce qu'elles satisfont l'esprit de tout le monde.

A ces soins de propreté il faut joindre l'emploi de lotions ou de

pommades toniques afin de redonner à la peau et aux bulbes des cheveux de l'activité. L'eau salée au 200e de son poids ; l'eau avec addition de sulfate de fer dans la proportion de 1 pour 100 ; la pommade au tannin ; celle de Dupuytren, mise aujourd'hui en usage d'une manière si banale : voilà des modificateurs qui conduiront certainement à de bons résultats ; mais ce n'est pas sur des cheveux qu'il faut étendre ces pommades ou qu'il faut faire ces lotions, c'est sur le cuir chevelu.

Règle générale, toute croissance chétive des cheveux chez les enfants comme chez les adolescents doit être traitée d'après les mêmes principes. Une chevelure trop fine devient plus forte et plus abondante par le raccourcissement répété et fréquent des cheveux. C'est ce que l'on fait avec avantage à beaucoup d'enfants qui ont des cheveux très fins, de nuances différentes variant du blond au roux, ce qui est d'un aspect désagréable et ce que l'on peut facilement modifier par ce moyen. Enfin, dans ces sortes de cas, il faut surtout employer une médication générale qui fortifie le malade et le ramène peu à peu à sa santé primitive.

Dans les divers cas que nous venons de citer, et à l'occasion desquels nous avons donné quelques conseils puisés principalement dans l'hygiène, nous avons supposé que la peau, les bulbes des cheveux et les cheveux eux-mêmes n'étaient pas malades ; aussi, dans l'espèce, les malades n'éprouvent aucune sensation anormale, pas ou peu de démangeaisons ; ils n'ont pas de sécrétions ou de productions morbides.

Une autre forme de chute de cheveux se fait observer principalement à l'âge de l'adolescence, et c'est la plus commune ; elle se transmet dans les familles de père en fils, et il n'est pas rare de voir à vingt-quatre ou vingt-six ans des personnes devenues presque chauves de la partie antérieure de la tête à la partie postérieure, et obligées de recourir à l'art du coiffeur pour suppléer à leur infirmité. Chaque année elles sont obligées de faire donner plus d'étendue à leur chevelure artificielle jusqu'à ce qu'elles portent une perruque.

Cette perte lente, incessante, de cheveux s'observe sous une autre forme chez la femme. Au même âge, et lorsque les cheveux ont pris

un accroissement souvent considérable, de jeunes personnes, soit avant, soit pendant les premières années du mariage, voient, comme elles le disent, leurs cheveux s'éclaircir, quoique aucune cause apparente n'ait pu déterminer un pareil état. Les seuls phénomènes sensibles consistent dans l'apparition de petites écailles qui se détachent sous forme de farine lorsqu'elles passent le peigne fin et qui adhèrent le long des cheveux ; de sorte que cette espèce de poussière très fine est enlevée par la brosse et vient salir les vêtements durant le temps consacré à la toilette. Ajoutez à ce symptôme une démangeaison légère à la peau de la tête dans certains moments de la journée.

Plus tard, on observe dans certaines places, là où les poussières farineuses ont été plus marquées, le cheveux plus clairsemés, la peau moins garnie, en même temps que les points ou ce que l'on nomme les pores de la peau sont plus larges, à orifices plus dilatés que de coutume. Examinez la peau de plus près, et vous lui trouverez une teinte rosée qui fera contraste avec les parties non malades, car celles-ci sont d'un blanc mat. Enfin, exercez des pressions sur la peau, et elle offrira une certaine résistance comme si elle était légèrement tuméfiée ; elle sera plus mobile, moins appliquée aux os et moins adhérente.

C'est ainsi que commence la maladie de la peau que l'on désigne sous le nom *pityriasis* chronique.

Est-ce une affection du tissu de la peau qui vient à réagir sur les cheveux ? est-ce une affection des bulbes ? C'est ce que la science n'a pas encore déterminé d'une manière certaine, malgré les recherches récentes qui l'attribuent à un cryptogame, le *microsporon furfur*. Il faudrait que des études microscopiques fussent entreprises sous ce rapport pour décider la question. Toujours est-il que c'est à la peau qu'il faut s'adresser pour arrêter la chute des cheveux.

Notez que la maladie est diffuse, *qu'elle n'est jamais circonscrite*, limitée à une étendue qui précise nettement un point malade, et ce dernier caractère distingue cette affection du *porrigo decalvans*, de l'*herpès tonsurant*, du *favus* et du *psoriasis* du cuir chevelu. Or l'affection débute ordinairement chez la femme au sommet de la tête con-

trairement à ce qui se passe dans la chute précoce et naturelle des cheveux.

On peut guérir cette affection quand elle n'est pas trop ancienne, de manière à voir renaître une chevelure au moins aussi belle que celle qui existait. Si l'affection est ancienne et qu'elle ne soit pas encore arrêtée, on peut réduire les désordres existants et s'opposer à leurs progrès.

J'ai cherché à établir une différence tranchée entre la chute des cheveux, qui est la conséquence d'un trouble porté dans toute l'économie par une maladie fébrile grave ou par des suites de couches de longue durée, et celle qui dépend d'un *pityriasis*, soit accidentel, soit héréditaire.

J'ai fait sentir que dans le premier cas il fallait fortifier la peau à l'aide de pommades et de lotions toniques ou astringentes, telles que les lotions de sulfate de fer, la teinture de cantharide, les mélanges d'eau et d'eau-de-vie, ou de rhum, les pommades au rhum, la pommade de Dupuytren, celle au tannin, etc., tous moyens analogues aux médicaments que l'on prescrit à l'intérieur, et surtout à l'alimentation fortifiante, que l'on met en usage dans le but de rétablir la santé.

Il n'en saurait être de même dans la maladie dont nous nous occupons, et qui entraîne la chute des cheveux sous une forme chronique, mais tenace et toujours persistante.

Faisons observer, tout d'abord, que la chute des cheveux, dont le pityriasis est la cause, peut exister seule ou être liée à une altération des voies intestinales qui en dérange les fonctions et qui amène un trouble plus ou moins prononcé dans la digestion. Ordinairement cet état se dessine par des céphalées ou céphalalgies (migraines) dont la fréquence est en rapport avec le trouble du côté du tube digestif.

On conçoit dès lors que la maladie du cuir chevelu se lie nécessairement à cette cause, qu'elle est entretenue par elle, qu'elle augmente avec le trouble fonctionnel de l'estomac ou des intestins, et diminue ou reste stationnaire durant les améliorations temporaires qui peuvent se montrer dans la santé générale.

La migraine la plus bénigne est toujours accompagnée d'un état

ionnaire ou congestionnel plus ou moins marqué, et cette con-
ion, quelque légère qu'elle soit, vient ajouter à la forme inflam-
oire de la maladie de la peau. Dans d'autres cas, le pityriasis se
à un état ichthyosé des coudes et des genoux ; c'est alors que
uérison n'en peut être obtenue qu'à l'aide des arsenicaux.
ous ne saurions donc trop appeler l'attention sur ces coïnci-
ces si communes, parce qu'il n'est guère de traitement possible,
r une affection cutanée, lorsqu'une cause incessante en entre-
t la permanence, en venant détruire, d'un moment à l'autre,
élioration qu'un traitement externe bien dirigé a pu produire.
e nous appartient pas ici de poser les bases d'une médication
ropriée à l'état du canal intestinal. Il nous aura suffi d'avoir
alé les fâcheuses conséquences de cet état, pour qu'un médecin
onduise, à cet égard, en raison des données générales de la
nce, et qu'il n'entreprenne le traitement de la maladie locale
après avoir notablement amendé la cause qui peut perpétuer
e maladie.
upposons donc le pityriasis isolé de toute influence locale étran-
e à la maladie de la peau, et traçons les meilleurs moyens d'ar-
r à une guérison.
ucun traitement n'est possible sans la section des cheveux.
core une fois, c'est sur la peau qu'il faut pouvoir agir. On devra
c couper les cheveux par portions, un huitième, un dixième de
r longueur à la fois, et couvrir la tête de plus en plus au fur et
esure des sections, de manière à réduire les cheveux à un cen-
ètre, au plus, de longueur. Chez les dames, on fait conserver
elques cheveux en avant pour figurer deux petits bandeaux, et
r permettre une coiffure en bonnet.
La section des cheveux, à laquelle le rasoir ne doit jamais parti-
er, devra employer quinze jours plus ou moins, suivant le volume
le poids de la chevelure.
Cette opération préalable étant achevée, on s'occupera de la peau.
et effet, on devra tenir compte de deux formes de pityriasis très
tinctes : l'une avec chaleur et démangeaison notables du cuir
evelu, principalement le soir et le matin; l'autre sans démen-
aison très sensible, et surtout *sans chaleur*.

Les malades qui sont dans la première condition supportent des moyens que l'on ne saurait employer pour les personnes qui se trouvent placées dans la seconde catégorie. Dans le premier cas, ce sont des lotions aqueuses sur la tête, lotions fréquemment répétées, et qui soulagent d'une manière notable les démangeaisons et la chaleur.

Je fais passer une éponge fraîche, dix ou douze fois dans la journée, sur la tête ; cette éponge est imbibée d'eau, et dans d'autres cas d'eau vinaigrée, contenant un trois-centième, un deux-centième de son poids de vinaigre ; j'associe à ce moyen l'usage, durant la nuit, d'une pommade entièrement formée de moelle de bœuf avec un douzième de son poids d'huile d'amande douce ; je continue l'emploi de ces moyens jusqu'à ce que toute chaleur soit tombée et que la périodicité dans la démangeaison soit détruite. Souvent même il reste peu à faire pour obtenir la guérison ; quelques pommades résolutives, dont je ferai connaître la composition plus bas, suffisent pour la rendre parfaite. Y a-t-il persistance, on a obtenu alors la cessation complète d'un état aigu plus ou moins prononcé, et l'on peut dès lors avoir recours au traitement que je vais faire connaître à l'occasion de la seconde forme de pityriasis.

J'ajouterai encore un mot : il n'est pas rare d'observer, dans le cours de ce pityriasis avec chaleur de la peau et démangeaison intense, un état de pléthore générale, avec somnolence ou pesanteur de tête. Il ne faut pas hésiter soit à faire précéder le traitement local d'une saignée, soit à pratiquer cette saignée générale pendant le cours du traitement. J'insiste sur toutes ces conditions préliminaires, parce qu'elles conduisent au succès et qu'elles sont le résultat des observations que j'ai faites dans ma pratique journalière.

Mais il y a plus : le pityriasis à forme chronique chez les jeunes filles se lie souvent à une constitution délicate, chétive, avec laquelle l'appétit n'est pas nettement dessiné, et où la menstruation est imparfaite ; ces jeunes personnes, qui ne sont pas pour cela lymphatiques, sont cependant lentes dans leurs mouvements, veules, comme on le dit communément, pâles, sans expression dans la physionomie, à moins qu'elles ne soient excitées. Dans ces sortes de cas j'ai recours à la teinture de cantharides à l'intérieur, administrée

après les principes que j'ai posés dans ma *Thérapeutique générale* (voy. p. 99).

Les cheveux étant coupés, il faut de suite mettre en usage deux sortes de moyens : la pommade au tannin, à la dose de 4 grammes pour 30 d'axonge, et tous les deux jours des lotions avec le carbonate de potasse, mis dans l'eau, à la dose de 10 grammes pour 60 d'eau. Ces préparations doivent être aromatisées avec une essence de menthe, de rose, ou avec du benjoin, de manière à obtenir des préparations de toilette agréables. Il faut supprimer l'emploi des peignes et des brosses ; ils irritent la peau, perpétuent la production de l'état farineux.

Quinze jours ou trois semaines après, on associe à cette pommade le camphre, dans la proportion de 25 à 50 centigrammes. Plus tard encore, on arrive à l'emploi d'une pommade légèrement alcaline, composée de 30 grammes d'axonge ou d'un mélange de glycérine et de stéarine, 10 grammes d'huile d'amande douce, 2 grammes de carbonate de soude, et 10 grammes de cendres de fucus de varech, ou à leur défaut de cendres d'angélique : en un mot, d'une pommade très alcaline.

Il est convenable, en même temps, de saupoudrer, tous les deux jours, le cuir chevelu, après l'avoir bien lavé avec l'une ou l'autre de ces cendres parfaitement tamisées.

Plus tard, on remplace ces moyens par une pommade, soit au précipité blanc, à la dose de 1 à 2 grammes, pour 30 d'axonge ; soit au goudron ou à l'huile de cade, au 20e seulement de l'axonge employée. Alors on doit aussi, tous les quatre ou cinq jours, étendre une légère couche d'huile de cade sur la peau, en ayant soin de bien essuyer avec du coton, de manière qu'il ne reste de l'huile que ce qui peut adhérer à la peau.

Enfin et lorsque la sensibilité de la peau le permet, on termine la guérison par l'emploi d'une pommade au carbonate de cuivre, d'après une formule que j'ai donnée en traitant du pityriasis en général (voy. *Formulaire*).

A ces moyens locaux, à ces soins constants de propreté, il faut joindre l'emploi soutenu de bains généraux, soit des bains sulfureux ou sulfo-gélatineux, soit des bains de vapeur en étuve. On

excite, dans les deux cas, la transpiration cutanée générale, et l'on détourne ainsi l'irritation chronique locale (voy. l'Histoire générale du pityriasis pour plus de détails).

Exubérance des cheveux.

Il est un état tout opposé, qui se rencontre assez fréquemment chez les jeunes personnes, et dont les auteurs n'ont pas parlé : c'est l'exubérance des cheveux. Certes, on a signalé cette exubérance chez certains adultes très forts, très bien musclés, et quelques-uns d'entre eux ont profité de cette chevelure abondante pour s'établir débitants de pommades propres à l'accroissement des cheveux ; on a encore parlé de la présence de poils sur des parties du corps qui n'en sont pas habituellement recouvertes. Ce ne sont pas là les conditions sur lesquelles je veux appeler l'attention des médecins.

J'ai eu l'occasion de voir bon nombre d'enfants, et notamment des jeunes filles, dont la chevelure était trop abondante, principalement en longueur, de sorte que les cheveux ramassés sur la tête, et s'accroissant avec rapidité, constituaient une chevelure compacte sous laquelle on trouvait un teint pâle, des yeux plus ou moins cernés, une figure amaigrie, des membres grêles et une poitrine réduite à l'état osseux. Chez ces enfants, peu d'appétit ; des digestions souvent difficiles ; dégoût pour beaucoup d'aliments ; un sommeil plus ou moins agité et une susceptibilité nerveuse très grande, jointe à un état, sinon d'indolence, au moins de fatigue sous l'influence du moindre exercice.

En vain on médicamente ces enfants, on leur administre un régime tonique, une alimentation forte : on n'obvie pas à l'état de langueur dans lequel elles se trouvent. L'estomac répugne à une forte et abondante nourriture.

Sont-elles accidentellement prises de fièvre, tout à coup des symptômes cérébraux se manifestent ; en un mot, il semble qu'il y ait sans cesse un état de congestion vers la tête, état tout prêt à amener des désordres sous l'influence de la moindre cause excitante. On dirait que les cheveux vivent aux dépens de tout le reste de l'économie.

Coupez la moitié de la chevelure, et tout à coup l'harmonie va s'opérer; vous allez voir renaître les fonctions de l'estomac et, par suite, s'opérer la nutrition générale; la maigreur cédera peu à peu; la physionomie reprendra de l'expression et de la gaieté; l'appétit se dessinera, et la substance nutritive, mieux répartie, améliorera la santé générale d'une manière remarquable.

Il ne faudrait pas, dans ce cas, dégarnir la tête par la section des cheveux à leur racine : ce serait exposer l'enfant à des dangers. Il suffit de couper les cheveux à moitié de leur longueur, de manière à alléger le poids que supporte la tête sans en diminuer l'abri naturel. On conçoit, d'ailleurs, qu'il s'opère en partie ce qui arrive tous les jours à un sujet scrofuleux ou lymphatique auquel on ampute un membre : toute l'économie ressent l'influence de cette perte d'une partie du corps dans laquelle il n'y a plus à verser des matériaux de nutrition. Mais ce qui probablement contribue surtout au rétablissement de la santé, c'est de faire cesser par la section des cheveux l'état fluxionnaire du cerveau et le surcroît d'activité qu'il recevait par la congestion permanente du sang vers la tête.

Quoi qu'il en soit de ces explications auxquelles nous attachons fort peu d'importance, nous livrons les observations que nous avons faites sur l'exubérance des cheveux aux méditations de nos confrères, persuadé qu'ils trouveront dans nos conseils une application utile.

FIN.

FORMULAIRE.

BAINS.

Alcalins.

℞ Eau ..... 200 litres.
Carbonate de potasse 80 à 100 gram.
ou carbon. de soude 80 à 125 —

Les bains alcalins sont ordinairement donnés à la dose de 125 grammes de carbonate de potasse; c'est une dose généralement trop élevée. Je préfère le carbonate de soude au carbonate de potasse, parce que ce sel est moins caustique.

Alunés.

℞ Eau ..... 200 litres.
Alun ..... 125 à 500 gram.

Au sublimé.

Depuis 4 grammes jusqu'à 12 et même 30, en augmentant progressivement par 2 grammes de la dose la plus faible à la plus forte.

Barèges artificiel ou sulfureux (voy. BAINS SULFUREUX.)

Barèges dit inodores ou artificiels.

℞ Sulfure de sodium cristallisé ..... 30 à 60 gram.
Carbonate de soude cristallisé ..... 30 à 60 —
Chlorure de sodium .... 50 —
Eau ..... 200 litres.

Émollients.

℞ Eau ..... 200 litres.
Gélatine ..... 125 à 500 gram.

Autre.

Eau ..... 200 kil.
Amidon ..... 500 à 1000 gram.

Iodés.

N° 1.

℞ Iode ..... 8 gram.
Iodure de potassium .... 16 —
Eau ..... 126 —

N° 2.

℞ Iode ..... 10 gram.
Iodure de potassium .... 20 —
Eau ..... 120 —

N° 3.

℞ Iode ..... 16 gram.
Iodure de potassium .... 30 —
Eau ..... 125 —

N° 4.

℞ Iode ..... 12 gram.
Iodure de potassium .... 24 —
Eau ..... 125 —

Sulfo-alcalin et gélatineux.

℞ Foie de soufre ..... 50 gram.
Carbonate de soude ..... 50 —
Gélatine ..... 125 —

Sulfo-alcalin salin et gélatineux.

℞ Foie de soufre ..... 45 gram.
Carbonate de soude ..... 50 —
Sel commun ..... 500 —
Gélatine ..... 125 —

Sulfo-gélatineux.

℞ Eau ..... 200 litres.
Foie de soufre ..... 50 à 90 gram.
Gélatine ..... 125 à 250 —

Sulfo-savonneux.

℞ Foie de soufre ..... 45 à 60 gram.
Savon blanc ..... 500 —

Bain imitant les eaux sulfureuses naturelles (Soubeiran).

℞ Sulfure de sodium crist. 32 gram.
Carbonate de soude ..... 32 —
Chlorure de sodium .... 16 —
Eau ..... 200 litr.

Bain avec une partie d'acide sulfhydrique libre (Soubeiran).

℞ Sulfure de sodium ..... 40 gram.
Acide tartrique cristallisé 13 —
Eau ..... 200 litr.

Bain acide hydrosulfurique libre (Soubeiran).

℞ Sulfure de sodium crist. 40 gram.
Acide tartrique ..... 35 —
Eau ..... 200 litr.

Sulfureux.

Bain blanc d'hydrosulfure de potasse.

℞ Sulfure de potasse du com. 50 gram.
Acide tartrique ..... 16 —

Bain blanc hydrosulfurique.

℞ Sulfure de potasse..... 50 gram.
Acide tartrique..... 32 —

CAUSTIQUES.

℞ Bi-iodure de mercure... 15 gram.
Mucilage de gomme adraganthe..... q. s.
pour tenir le sel en suspension.

Pâte antimoniale.

℞ Chlorure d'antim. tombé en déliq.
Ajoutez de la farine.

De Canquoin.

Chlorure de zinc cristallisé tombé en déliquium au contact de l'air, et associé à de la farine.

Du frère Côme.

℞ Acide arsénieux ..... 5 décig.
Cinabre..... 2 gram.

A appliquer en pâte à l'aide d'eau gommée.

De Dubois.

℞ Acide arsénieux..... 2 gram.
Vermillon de Hollande .. 30 —
Sang-dragon..... 16 —

En faire une pâte avec une solution de gomme pour appliquer.

Au protonitrate de mercure. (A. Devergie.)

℞ Protonitrate de mercure cristallisé..... 4 gram.
Eau ..... 8 —

Réduisez en poudre, et faites dissoudre dans l'eau, portée jusqu'à la température de l'ébullition.

Ajoutez, goutte à goutte :
Acide nitrique ..... 2 gram.

Autre (Codex).

℞ Acide nitrique..... 30 gram.
Protonitrate de mercure. 30 —

De Rousselot.

℞ Sulfure de mercure..... 30 gram.
Sang-dragon..... 45 —
Acide arsénieux..... 2 —
Triturez et mêlez exactement.

De Vienne.

℞ Potasse à la chaux } aa. part. égal.
Chaux vive en poud. }

Mêlez à de l'alcool pour faire une pâte molle que l'on applique sur la peau et que l'on recouvre de sparadrap.

Au chlorure d'or.

℞ Chlorure d'or tombé en déliquium associé à de la farine, ou employez-le seul.

DOUCHES.

à raison de 200 litres d'eau.

Alcaline.

℞ Carbonate de soude. 80 à 125 gram.

Alcaline-gélatineuse.

℞ Carbonate de soude. 80 à 125 gram.
Gélatine ..... 125 à 250 —

Alcaline-saline.

℞ Carbonate de soude. 80 à 125 gram.
Sel commun.... 1000 à 2000 —
Gélatine..... 250 —

Artificielle de Plombières.

℞ Carbonate de soude .... 45 gram.
Sulfate de soude..... 45 —
Sel de cuisine ..... 30 —
Chlorure de calcium.... 30 —
Gélatine ..... 100 —

De Barèges artificielle.

℞ Sulfure de sodium crist. 64 gram.
Carbonate de soude crist. 64 —
Chlorure de sodium..... 64 —

Savonneuse.

℞ Savon blanc.... 500 à 1000 gram.

Sulfo-alcaline.

℞ Foie de soufre ..... 50 gram.
Carbonate de soude..... 50 —
Gélatine ..... 250 —

Sulfo-gélatineuse.

℞ Foie de soufre..... 50 à 90 gram.
Gélatine ..... 125 à 250 —

Sulfo-savonneuse.

℞ Foie de soufre..... 45 à 60 gram.
Savon blanc ..... 500 —

Sulfo-savonneuse et gélatineuse.

℞ Foie de soufre..... 45 à 60 gram.
Savon blanc..... 500 —
Gélatine ..... 125 —

Sulfureuses.

℞ Foie de soufre..... 50 à 90 gram.

EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES.

Sulfureuse pour bains.

℞ Sulfure de sodium crist. 0,135 gram.
Chlorure de sodium... 0,135 —
Carbonate de soude cristallisé..... 0,125 —
Eau privée d'air..... 625 —

Vichy.

℞ Carbonate de soude crist. 1 gram.
Chlorure de sodium.... 7 cent.
Chlorure de calcium.... 6 décig.
Sulfate de soude..... 83 cent.
— de magnésie ..... 16 —
— de fer..... 1 —
Eau privée d'air..... 625 gram.
Gaz acide carbonique 3 vol. 4 —

LAVEMENTS.

Au carbonate de plomb.

℞ Carbonate de soude ... 1 à 4 décig.
Acétate de plomb crist. 2 à 8 —

Dissolvez séparément les deux sels chacun dans la huitième partie d'un lavement; mêlez au moment de l'administration, et ajoutez laudanum de Sydenham, 10 gouttes.

LINIMENTS.

Au sulfure de potassium, dit de Jadelot.

℞ Savon en poudre ..... 125 gram.

Ramollissez le savon à la chaleur à l'aide de quelques gouttes d'eau.

Ajoutez : huile d'olive ou d'œillette..... 250 gram.
Sulfure de potasse..... 22 —

Le savon vert donne un mélange parfait.

LOTIONS.

Alcaline.

℞ Carbonate de potasse... 10 gram.
Eau..... 500 —

Autre.

℞ Carbonate de soude.... 10 gram.
Eau..... 500 —

Alunée.

℞ Eau..... 1000 gram.
Alun..... 5 à 15 —
Essence de menthe..... 30 gout.

N° 2.

℞ Eau..... 500 gram.
Alun..... 5 à 30 —
Alcoolat de menthe..... 10 gout.

De Barlow.

℞ Sulfure de potasse ..... 8 gram.
Savon blanc..... 10 —
Alcool rectifié..... 8 —

Triturez le tout dans un mortier de porcelaine, et ajoutez :

Eau de chaux..... 250 gram.

Au borax.

℞ S.-borate de soude.... 4 à 6 gram.
Émulsion d'amandes douces..... 125 —

Antiputride au chlorure de soude.

℞ Eau..... 500 gram.
Chlorure de soude.. 15 à 20 —

Au cyanure de potassium.

℞ Cyanure de potassium... 60 cent.
Émulsion d'amandes amères..... 200 —

Essentiellement sedatives des démangeaisons.

De Dupuytren.

N° 1.

℞ Sulfure de potasse ..... 125 gram.
Acide sulfurique..... 15 —
Eau commune..... 1 kil.

De Dupuytren.

N° 2.

℞ Sulfure de potasse..... 90 gram.
Eau..... 500 —
Ajoutez : acide sulfurique 4 —

A la dextrine.

℞ Eau chaude..... 1000 gram.
Dextrine ..... 125 —

Dite eau noire.

℞ Calomel ..... 4 gram.
Eau de chaux..... 180 —

Agitez.

A l'usage des observations du lupus et de la syphilis (en Allemagne).

Iodée.

N° 1.

le..... 25 cent.
commun..... 30 gram.
u..... 1250 gram.

N° 2.

le..... 25 cent.
commun..... 30 gram.
u..... 625 —

tions d'iodure de soufre de M. Cazenave contre la gale.

lure de potassium.. 8 —
u..... 1000 gram.
le..... 2 —
ours de traitement.

N° 2.

lure de soufre..... 15 gram.
u..... 1 lit.
ours de durée.

N° 3.

ure de soufre..... 6 —
ure de potassium.... 6 —
u..... 1000 gram.
1 7 jours de durée.

ns de Wieminsck au sulfure de chaux contre la gale.

urs de soufre..... 20 gram.
aux vive..... 10 gram.
u..... 155 gram.
re bouillir jusqu'à combinaison
te; passez à l'étamine pour obte-
00 grammes environ de liqueur.

Au bichlorure de mercure.

u..... 1000 gram.
hlorure de mercure.. 7 à 10 cent.
ence de menthe.... 30 gout.

N° 2.

u..... 500 gram.
hlorure d'hydrarg .. 1 à 5 décig.
oolat de menthe.... 10 gout.

ntive et plus ou moins caustique au nitrate d'argent.

N° 1.

u distillée..... 9 gram.
rate d'argent cristall. 1 —

N° 2.

u distillée..... 4 gram.
rate d'argent cris tall. 1 —

N° 3.

℞ Eau distillée..... 1 gram.
Nitrate d'argent cristall. 1 —

Ces lotions s'emploient à l'aide d'un pinceau de charpie que l'on promène légèrement sur les surfaces malades, en laissant sécher; elles ne sont faites qu'extemporairement, et en général, à plusieurs jours d'intervalle.

Au sous-acétate de plomb.

℞ Eau..... 1000 gram.
S.-acétate de plomb.... 30 —

Salée.

℞ Eau..... 500 gram.
Sel commun ..... 50 à 10 —

Saturnée.

℞ Sous-acét. de plomb. 1 à 3 part.
Eau..... 300 —

Savonneuse.

℞ Eau..... 500 gram.
Savon blanc..... 60 —

Au sulfure de potassium, dite de l'hôpital Saint-Louis.

℞ Sulfure de potassium.. 1 part.
Eau..... 16 —

Au vinaigre.

℞ Eau..... 1000 gram.
Vinaigre..... 20 à 30 —

PILULES.

D'aconit.

℞ Extrait hydro-alcoolique d'aconit..... 15 décig.
Poudre de guimauve. 20 —
Mêlez et divisez en 40 pilules.

1 à 2 matin et soir contre les douleurs ostéocopes, dans les syphilis constitutionnelles.

D'arséniate de fer, de Biett.

℞ Arséniate de fer..... 15 cent.
Extrait de houblon..... 36 décig.
Poudre de guimauve... 18 —
Sirop de fl. d'oranger... q. s.
Masse pour 48 pilules; une par jour.

Asiatiques.

℞ Acide arsénieux..... 5 cent.
Poivre noir pulvérisé... 6 déci.
Gomme arab. en poudre. 1 gram.
Eau..... q. s.
Divisez en 12 pilules; 1 à 2 par jour.

De Blaud.

Ferrugineuse de Vallet.

D'iodure de soufre (A. Bévergie).

℞ Iodure de soufre, non altéré..... 1 à 2 gram.
Sucre.....
Gomme arabique.....
Huile d'amand. douces. } aa. q. s.

Pour amener à l'état pilulaire et faire pilules n° 20.

De Plummer.

℞ Soufre doré d'antim.
Protochlor. de mercure. } part. égal.
Mucilage de gomme adragante, q. s.

Faites des pilules de 15 centigrammes, et prendre 1 à 2 par jour.

De soufre précipité.

℞ Soufre précipité et lavé. 1 gram.
Sucre.....
Gomme arabique.....
Sirop de sucre..... } aa. q. s.

Chaque pilule contient un décigr. de soufre.

POMMADES.

Alcaline.

N° 1.

℞ Axonge..... 30 gram.
Carbonate de potasse, 5 décigr. à..... 2 —

N° 2.

℞ Axonge..... 30 gram.
Carbon. de soude. 1 à 3 —

Chaque carbonate doit être préalablement dissous dans l'eau, avant de l'incorporer à l'axonge.

A la belladone et à l'opium.

℞ Axonge..... 30 gram.
Extrait de belladone... 2 —
Extrait aqueux d'opium. 2 —

Au sous-nitrate de bismuth.

℞ Axonge..... 30 gram.
Sous-nitr. de bismuth.. 3 à 6 —

A l'huile de cade.

N° 1.

℞ Axonge..... 49 gram.
Huile de cade..... 1 —

N° 2.

℞ Axonge..... 39 gram.
Huile de cade..... 1 —

N° 3.

℞ Axonge..... 29 gram.
Huile de cade..... 1 —

N° 4.

℞ Axonge..... 30 gram.
Huile de cade..... 3 —

N° 5.

℞ Axonge..... 30 gram.
Huile de cade..... 30 —

Au camphre.

℞ Axonge..... 30 gram.
Camphre..... 5 à 30 cent.

Cérat calaminaire.

℞ Cérat simple..... 30 gram.
Calamine..... 1 à 3 —
Camphre..... 20 cent.
Ou chloroformé..... 2 gram.

Au chloroforme.

℞ Axonge..... 30 gram.
Chloroforme..... 2 à 6 —

Au chlorure de chaux.

℞ Chlorure de chaux..... 4 gram.
Axonge..... 30 —
Huile d'am. douces..... 10 —

Au sulfate de cuivre.

℞ Axonge..... 30 gram.
Oxyde de cuivre obtenu par précipitation. 5 déc. à 1 —

Au sulfate de fer.

℞ Axonge..... 30 gram.
Protosulfate de fer cristallisé..... 5 déc. à 1 gram.

Lavez ; dissolvez à l'aide de quelques gouttes d'eau avant évaporation à l'axonge.

Au cyanure de potassium.

℞ Cérat simple.....
Cold-cream..... } aa 15 gram.
Cyanure de potasse... 30 à 60 cent.

Épilatoire.

℞ Carbonate de soude.... 8 gram.
Chaux..... 4 —
Axonge..... 30 —

Au goudron.

N° 1.

℞ Axonge..... 49 gram.
Goudron..... 1 —

N° 2.

℞ Axonge..... 30 gram.
Goudron..... 1 —

N° 3.

℞ Axonge ..... 40 gram.
Goudron ..... 2 —

N° 4.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Goudron ..... 3 —

N° 5.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Goudron ..... 30 gram.

D'Hémerich.

℞ Soufre ..... 15 gram.
Carbonate de potasse ..... 8 —
Axonge ..... 60 —

A l'iode.

℞ Iode ..... 30 à 60 cent.
Axonge ..... 30 gram.
Dissolvez l'iode à l'aide de quelques gouttes d'alcool.

A l'iode et à l'iodure de potassium.

℞ Iode ..... 5 cent.
Iodure de potassium, 4 à 6 gram.
Axonge ..... 30 —
Dissolvez l'iode dans l'iodure de potassium, préalablement dissous dans un peu d'eau, et incorporez.

A l'iodure de potassium.

℞ Iodure de potassium ... 4 à 8 gram.
Axonge ..... 30 —
Dissolvez l'iodure de potassium dans quelques gouttes d'eau, avant de l'incorporer à l'axonge.

Au bioxyde de mercure.

℞ Bioxyde de mercure ... 2 gram.
Axonge ..... 30 —

Au deuto-iodure de mercure.

N° 1.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Deuto-iodure de mercure ..... 1 à 2 —
Contre les maladies cutanées.

N° 2.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Deuto-iodure de mercure ..... 2 à 4 —
Contre les engorgements scrofuleux.

Au deuto-iodure de mercure et à l'iodure de potassium.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Deuto-iodure de mercure ..... 5 déc. à 1 —
Iodure de potassium 2 à 4 —
Contre les engorgements scrofuleux.

Au proto-iodure de mercure.

N° 1.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Proto-iodure de mercure ..... 5 déc. à 1 —
Contre les affections cutanées.

N° 2.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Proto-iodure de mercure ..... 2 à 4 —
Contre les engorgements scrofuleux.

A l'oxyde rouge de mercure.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Oxyde de mercure .. 2 à 4 —

A l'iodure de chlorure mercureux (sel de Donligny).

Pommade du docteur Rochard.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Iodure de chlorure mercureux ... 25 cent. à 1 gram.

A l'iodure de plomb.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Iodure de plomb, de 4 à 6 gram.

Au carbonate de potasse ou de soude.

N° 1.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Carbonate de potasse ou de soude, 5 déc. à 1 gram.

N° 2.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Carbonate de potasse ou de soude ..... 1 à 4 —
Dans ces deux pommades il faut, pour ainsi dire, dissoudre l'un ou l'autre carbonate à l'aide de quelques gouttes d'eau, avant de les incorporer à l'axonge.

Au précipité blanc.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Précipité blanc .... 1 à 4 —

Au sous-acétate de plomb.

N° 1.

℞ Axonge ..... 30 gram.
Sous-acétate de plomb. 10 gout.

Au sous-acétate de plomb et à la créosote.

℞ Axonge ..... 30 gram.
S.-acét. de plomb. 10 à 15 gout.

A l'iodure de soufre.

℞ Iodure de soufre ... 1 à 2 gram.
Axonge ..... 30 gram.

A la fleur de soufre.

N° 1.

℞ Axonge.....	30 gram.
Soufre précipité et lavé 5 déc. à.....	2 —

De suie.

N° 2.

℞ Axonge.....	30 gram.
Fleur de souf. lavé. 1 à	[illegible] gram.

Sulfo-alcaline.

℞ Suie.....	8 gram.
Axonge.....	30 —

N° 1.

℞ Axonge.....	30 gram.
Carbonate de potasse ou de soude, 5 décig. à	1 —
Fleur de soufre.... 1 à	3 —

N° 2.

℞ Axonge.....	30 gram.
Carbonate de potasse ou de soude..... 1 à	3 —
Fleur de soufre.... 3 à	6 —

Au sulfure de potassium, foie de soufre.

℞ Axonge.....	30 gram.
Sulfure de potassium, 5 décig. à.....	2 —

Idem, pour celle au sulfure de sodium ou au sulfure de calcium.

Au tannin.

℞ Axonge.....	30 gram.
Tannin..... 1 à	4 —
Camphre.....	20 cent.
Chloroforme.....	2 gram.

A l'oxyde de zinc.

℞ Axonge.....	30 gram.
Oxyde de zinc..... 1 à	3 —
Camphre.....	20 cent.
Chloroforme.....	2 gram.

POUDRES.

Astringentes.

Poudre de vieux bois.
Poudre de tan tamisé.
Poudre de lycopode.

Autre.

℞ Poudre de tan.....	30 gram.
Alun calciné..... 2 à	4 —

Autre.

℞ Poudre de tan.....	30 gram.
Oxyde de zinc.... 2 à	4 —

Émollientes.

Amidon des parfumeurs ou des co[illegible] fiseurs, non aromatisée.
Poudre de riz.

SIROPS.

Alcalin.

℞ Sirop de sucre.....	500 gr[illegible]
Bicarbonate de soude...	12 -

Au chlorure de calcium.

℞ Chlorure de calcium cristallisé.....8 à	15 gr[illegible]
Eau distillée.....	30 -
Sirop de sucre.....	500 -

Une ou deux cuillerées matin [illegible] soir.

A l'iodure de fer (A. Devergie).

N° 1.

℞ Limaille de fer non oxydée.....	40 [illegible]
Iode..... 1 gram.	70
Eau.....	2 g[illegible]

Combinez à froid par trituration [illegible] un mortier, en ajoutant l'eau [illegible] goutte et incorporez à :

Sirop de sucre.....	500 g[illegible]

N° 2.

℞ Limaille de fer non oxydée.....	40 [illegible]
Iode.... 1 gram. 75 ou	80
Eau.....	6 [illegible]

Le reste de la formule comme dessus.

Autre, à l'iodure de fer et à l'i[illegible] de potassium.

℞ Limaille de fer non oxydée.....	40 [illegible]
Iode.. 1 gram., 70, 75 ou	80
Eau.....	6 [illegible]

Combinez comme pour la prépa[illegible] des sirops d'iodure de fer. Dissolve[illegible] la plus faible quantité d'eau pos[illegible]

Iodure de potass..	6, 8 ou 10

Mêlez les deux dissolutions, et [illegible] porez à :

Sirop de sucre.....	500

Autre, à l'iodure de fer, de pota[illegible] et de mercure.

Ajoutez dans la formule précé[illegible]

Bichlor. d'hydrarg. 12 à	15

ntre, à l'iodure de fer, de potassium, de mercure et d'arsenic.

Ajoutez dans la formule précédente :
Solution de Fowler.. 1,5 à 2 gram.

A l'iode.

℞ Teinture d'iode ..... 8 gram.
Sirop de sucre..... 500 —

D'écorce d'orme pyramidal de M. A. Devergie.

℞ Écorce d'orme ..... 500 gram.

Faites digérer par macération dans un litre d'alcool à 32° pendant vingt-quatre heures. Distillez l'alcool, de manière à obtenir un extrait. Reprenez par l'eau ; faites une décoction, passez, additionnez de sucre, et rapprochez de manière à faire :

Sirop ..... 1000 gram.

Au sulfure de potassium (Codex).

N° 2.

℞ Foie de soufre pur..... 45 cent.
Sirop de sucre ..... 30 gram.
Sirop beaucoup trop fort.

Au sulfure de potassium.

℞ Foie de soufre... 1 gr. 30 cent.
Sirop de sucre..... 500 —
F. s. a.

Au sulfite sulfuré de soude.

℞ Sirop de fumeterre..... 375 gram.
— de pensée sauvage. 125 —
Sulf. sulfuré de soude.. 8 —

Préconisé par Biett dans les eczémas chroniques et le lichen chronique, à la dose de deux cuillerées par jour.

SOLUTIONS.

Arsenicale de M. A. Devergie.

℞ Ac. arsénieux..... } aā 225 mill.
Carbon. de potasse. }
Eau distillée ..... 500 gram.
Alcoolat de mélisse.... 16 gram.

Teinture d'orcanette, q. s. pour colorer. 1 gramme correspond à une goutte de solution de Fowler.

De Fowler.

℞ Ac. arsénieux..... } aā. 5 gram.
Carbon. de potasse. }
Eau distillée..... 500 —
Alcoolat de mélisse.... 16 —

Commencer par une goutte, et porter successivement jusqu'à 16 ou 18 gouttes. 22 gouttes de liqueur représentent un 5e de grain ou 10 milligr. d'acide arsénieux.

De Pearson.

℞ Arséniate de soude..... 5 cent.
Eau distillée..... 32 gram.

Depuis 5 gouttes, en augmentant progressivement jusqu'à 100. Cinq gouttes de solution de Pearson répondent à une goutte de solution de Fowler.

SUCS D'HERBES.

℞ Feuille de chicorée... }
— de fumeterre.... }
— de bourrache.... } aā. part. ég.
— de cerfeuil..... }
— de laitue..... }

100 à 125 grammes le matin à jeun. On l'étend quelquefois d'un quart ou d'un tiers d'eau.

TABLETTES.

Soufrées.

℞ Soufre lavé..... 16 gram.
Sucre en poudre..... 125 —
Mucil. de gomme adrag. q. s.

Chaque tablette de 90 centig. contient un décigr. de soufre.

TEINTURES.

D'iode.

℞ Iode..... 2 gr. 5 déc.
Alcool ..... 30 gram.

De 5 à 20 gouttes à l'intérieur.

TISANES ET BOISSONS.

De chicorée.

℞ Chicorée sauvage..... 15 gram.
Eau ..... 1000 —

Ébullition 10 à 15 minutes, suivant que l'on emploie les feuilles ou la racine.

Tisane de Feltz.

℞ Sulfure d'antimoine.... 125 gram.

Mettez dans un sachet de linge, et faites bouillir pendant une heure dans l'eau. Retirez le sachet. Mettez dans le liquide :

Salsepareille concass... 90 gram.
Ichthyocolle..... 20 —
Eau ..... 3000 —

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, et passez.

3 verres par jour, matin, midi et soir.

Boisson ferrugineuse alcaline gazeuse.

℞ Eau..... 1000 gram.
Tartrate de potasse et de fer..... 30 à 40 cent.
Carbon. de soude.. 1 à 2 gram.

Ces substances seront mises dans le compartiment supérieur d'un appareil à eau de Seltz artificielle.

Boisson ferrugineuse non gazeuse.

℞ Eau..... 1000 gram.
Tartrate de potasse et de de fer..... 25 à 30 cent.
Rougir de vin.

De gentiane.

℞ Eau..... 1000 gram.
Rac. de gent. incisée... 4 —
Faites bouillir 10 minutes, et ajoutez :
Espèces amères..... 4 —

De houblon.

℞ Sommités de houblon, 10 à..... 15 gram.
Eau..... 1000 —
Ébullition..... 5 à 10 min.

De pensée sauvage.

℞ Eau..... 1000 gram.
Pensée sauvage..... 4 à 8 —
Faites infuser.

Sudorifique.

℞ 4 bois réunis.... 20 à 25 gram.
Eau..... 1000 —
Ébullition..... 10 à 15 min.

Le défaut de cette tisane est généralement d'être trop concentrée. L'estomac la supporte mal.

Autre.

℞ Gaïac râpé..... 30 gram.
Eau..... 1000 —
Ébullition, 15 minutes; ajoutez à la fin de l'ébullition.
Daphne mezereum..... 1 gram.

Tisane laxative.

℞ Infus. de chicorée sauvage..... 500 gram.
Sulfate de soude ou tout autre sel purgatif.... 2 à 8 —

Tisane en décoction de Zittmann.

N° 1.

℞ Salsepareille..... 375 gram.
Eau..... 12 kilog.

Suspendez dans le liquide en ébullition un sachet composé de :

Sulfate d'alumine..... 45 gram.
Mercure doux..... 15 —
Sulfure de mercure..... 4 —

Vers la fin de l'ébullition, ajoutez :

Bois de réglisse..... 45 gram.
Feuilles de séné..... 50 —
Semences d'anis..... 15 —

Retirez du feu, et laissez infuser.

Passez, pour obtenir 8 kilogr. de décoction.

N° 2.

℞ Résidu de la première décoction.
Racine de salsepareille.. 200 gram.
Eau..... 12 kilog.

Faites bouillir pendant 2 heures; ajoutez à la fois :

Écorce de citron.. } ãã. 12 gram.
Cannelle..... }
Cardamome mineur }
Réglisse..... 25 gram.

Laissez infuser pendant une heure.

Passez pour huit kilog. de décoction n° 2.

Mode d'administration. — Le malade prend la veille 6 des pilules suivantes :

℞ Résine de jalap..... 10 cent.
Gomme-gutte..... 2 —
Aloès..... 20 —

Prendre une pilule.

Chaque pilule est prise d'heure en heure. Le lendemain, le matin, moitié d'une bouteille de décoction q. s., par verre, à demi-heure d'intervalle. A midi une bouteille de décoction n° 2, de demi-heure en demi-heure.

Le soir, trois heures après le repas, la fin de la bouteille n° 1. On prend cette décoction pendant vingt-deux ou quarante-cinq jours.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Fig. 1, 2, 3, 4, 5.

Cette planche représente trois formes d'eczéma dans les figures 1, 2, 3, 4 et 5. Les figures 1 et 2 se rattachent à l'*eczema simplex*; celles 3 et 4 à l'eczéma impétigineux, et la 5e à l'eczéma herpétiforme.

La figure 1 donne le dessin de l'eczéma dans son état aigu, sécrétant la sérosité en abondance, et dans laquelle la peau est piquetée de mille pertuis ponctués d'où suinte la sérosité. Ce cachet est reproduit dans une partie de la figure 3 et dans l'eczéma herpétiforme, parce que c'est là un des caractères principaux de l'eczéma aigu, qu'il soit simple ou qu'il soit composé. On y voit aussi la coloration rouge vif qui accompagne cet état aigu, et que plusieurs dermatologistes ont pris à tort pour le cachet de l'*eczema rubrum*. On peut aussi remarquer que la peau est de niveau avec la peau saine, qu'elle ne semble pas notablement tuméfiée; ce qui n'existe plus au même degré pour l'eczéma impétigineux, qui commence à se recouvrir de croûtes ou qui en est recouvert. C'est ce que l'on voit dans les figures 4 et 5. La figure 1, qui a été renouvelée, représente avec un rare bonheur les milliers de vésicules qui sont propres à cette maladie dans son état aigu. Personne ne l'a reproduite encore avec autant de fidélité.

Dans la figure 2, on trouve un tout autre aspect : elle représente la période de décroissance de l'eczéma, c'est-à-dire le moment où cet état piqueté de la peau a disparu, où la sécrétion séreuse a très notablement diminué, pour se concréter et donner naissance à des lamelles épidermiques très adhérentes à la surface de la peau, lamelles qui cachent toutes les petites ouvertures par où s'opérait la sécrétion séreuse. Ces lamelles sont séparées entre elles par des lignes anguleuses. Ce ne sont ni des croûtes ni des écailles : ce sont des lamelles dont les bords seuls sont un peu détachés à la circonférence. C'est à l'apparition de ces lamelles que le médecin doit entrer dans la voie des résolutifs.

Fig. 3 et 4.

Si l'on compare les figures 1 et 2 avec celles 3 et 4, on est frappé de l'absence de croûtes dans les deux premières et de l'existence de croûtes plus ou moins

épaisses dans les deux autres. C'est que ces croûtes constituant un des principaux caractères de l'eczéma impétigineux; mais elles diffèrent entre elles suivant que l'eczéma impétigineux est à l'état aigu ou qu'il est à l'état chronique. Dans le premier cas, les croûtes sont jaunes, plus suppurantes ; dans le second, elles sont grises, groupées et réunies entre elles parce qu'elles se sont formées très lentement. Aussi la figure 5 est-elle un petit morceau de la figure d'un enfant qui était recouverte de ces croûtes, ce qui lui donnait un aspect repoussant et ce qui formait une espèce de masque sur sa figure : de là le nom d'*impetigo larvalis*.

Fig. 5.

Dans cette variété d'eczéma herpétiforme, deux choses doivent frapper l'attention : 1° la forme arrondie de l'affection ; 2° la saillie de la circonférence où existe un bourrelet de vésicules par où s'étend la maladie sécrétante. De là le nom d'*eczéma herpétiforme* que nous lui avons donné.

Fig. 6.

J'ai placé ici le *pityriasis rubra* en regard des variétés d'eczéma pour en comparer les caractères différentiels. La peau est d'un rouge plus ou moins vif dans les deux cas, mais plus vineuse dans le *pityriasis*. Elle est lisse, turgescente, sans état ponctué, et il s'en sépare à la surface une série de lames épidermiques qui n'ont presque aucune adhérence, dont les bords sont largement soulevés et détachés, circonstance qui contraste avec la période de décroissance de l'eczéma.

Fig. 7.

Cette figure représente l'herpès *type*. J'ai choisi la partie antérieure et latérale du cou comme étant la région où on l'observe le plus souvent. Mais, en parcourant nos planches, on verra qu'il est plusieurs affections qui se ressemblent. C'est qu'en effet ce sont des formes composées participant plus ou moins de la forme simple. Ainsi à côté de l'herpès se trouve, figure 8, un sycosis herpétiforme avec un contour circonscrit ; pl. IV, figure 5, un psoriasis herpétiforme ; fig. 6, même planche, le *lepra vulgaris* qui s'en rapproche ; et enfin, pl. V, fig. 5, l'herpès syphilitique. Ce qui frappe tout d'abord dans ces diverses figures, c'est la forme de ces maladies ; toutes sont plus ou moins nettement arrondies, circinées ; une seule cependant offre un cercle incomplet outre sa disposition ovalaire : c'est l'ichthyose, pl. IV, figure 6 ; de là un caractère distinctif de l'herpès. La figure 5 de cette même planche représente des cercles parfaitement annulaires *recouverts de squames ou d'écailles*. Rien de semblable dans l'herpès proprement dit, qui est purement vésiculeux. Ce sont ces écailles ou squames qui rapprochent cette variété d'herpès du psoriasis pour en constituer un *herpès psoriasiforme*, maladie composée. Quant à

l'espèce d'herpès syphilitique que représente la figure 5 de la planche V, il y a là une sorte d'état intermédiaire qui constitue quelque chose d'anormal comme dans toutes les syphilides. Ce ne sont ni des vésicules, ni des squames, ce sont des furfures sombres, cuivrés, disposés les uns par rapport aux autres en lignes elliptiques, ce qui les différencie de l'herpès proprement dit.

Relativement à ce dernier (pl. I, fig. 7), nous avons cherché à le représenter dans son entier développement. Son centre est dégagé, sa circonférence est parsemée d'une myriade de petites vésicules inappréciables à l'œil nu, qui, par leur agglomération, constituent un bourrelet par lequel l'herpès s'agrandit de plus en plus; et telle est la disposition de cette maladie à suivre des traînées accidentelles d'irritation ou des plicatures naturelles de la peau, que les vésicules de la circonférence sont disposées dans l'une des plaques de manière à subir l'inflexion des dépressions et des saillies formées par l'attache inférieure du muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Fig. 8.

La variété d'herpès sycosiforme représentée par cette figure justifie bien par son aspect une maladie profonde qui la rapproche de la mentagre et qui l'éloigne de l'herpès simple. On voit comment dans cette forme la peau est complétement atteinte. Les poils sont tombés; au centre de l'affection s'est formée une cicatrice, mais la circonférence vésiculo-pustuleuse dans sa nature, comme tout cercle d'herpès, progresse peu à peu, lentement, mais elle progresse. De là ce qui nous a conduit à rattacher la forme circinée au mot *herpès* (ἑρπειν, ramper), qui lui donne une signification nette et précise qu'il n'avait pas.

Fig. 9 et 10.

Les figures 9 et 10 représentent deux maladies voisines que j'ai rangées dans les affections des genres vésicules et dans les bulles. Le type de la bulle dans la figure 10 représente un pemphigus de petite dimension, c'est-à-dire plusieurs ampoules ou phlyctènes remplies de sérosité, et dont le volume peut, dans quelques cas, égaler celui d'un œuf, comme aussi descendre à celui d'un grain de millet; mais c'est là une exception, et jamais il n'existe d'aussi petites bulles sans coïncider avec de grosses bulles. Or, deux maladies sont intermédiaires à cette affection si spéciale dans laquelle les bulles ou les vésicules sont énormes, et aux autres maladies de peau à très petites vésicules, comme l'eczéma et l'herpès : c'est, d'une part, le zona représenté figure 9, et l'herpès phlycténoïde, dont nous n'avons pas donné de dessin, parce que les vésicules sont du volume de celles du zona et qu'elles lui ressemblent, à part la disposition confuse des vésicules, quoiqu'elles se trouvent groupées dans un espace assez limité. On remarquera, en effet, que dans le zona, si la maladie forme une sorte de

ceinture oblique, ce sont des groupes successifs de vésicules séparés entre eux qui la constituent. (On a donné une mauvaise situation aux petits fragments du zona; le carré devrait être placé dans un sens tel que le zona fût vu horizontalement.)

PLANCHE II.

Fig. 1.

La figure 1re donne la représentation d'un impétigo à l'état aigu, avec sécrétion purulente qui se concrète en croûtes jaunes. Nous avons pris cet exemple sur la figure d'un adolescent, parce que cette maladie est très commune à cet âge. Il est là disposé en une plaque arrondie, assez bien conformée, figurée pour représenter l'*impetigo figurata*, dénomination tirée de sa forme et non pas de son siége. Dans cette affection, la confluence des pustules est telle qu'elles se touchent, qu'elles se confondent pour donner naissance à une croûte unique. Mais on peut voir çà et là, à la circonférence de la plaque, plusieurs petites pustules isolées qui donnent une idée de l'élément morbide de l'affection. C'est donc là une maladie à élément pur, très distincte d'ailleurs de l'eczéma impétigineux représenté à l'état aigu et chronique dans la planche I. L'eczéma impétigineux est une forme composée, comme l'impétigo sycosiforme qui est représenté figure 2 est une association de deux maladies, l'impétigo et le sycosis. Aussi dans cette seconde variété la maladie siége toujours à la bouche et principalement au-dessous de la cloison du nez ou du menton. Ce ne sont pas de grosses pustules ou de gros tubercules comme dans le sycosis, mais de petites pustules isolées, assez profondément nées dans la peau, ne sécrétant que par poussées et donnant naissance à une croûte sèche, dure, saillante, adhérente, et dont la chronicité est le cachet.

Fig. 4.

Dans cette figure on représente des pustules tout opposées. Elles sont larges, assez vésiculeuses, très superficielles, mais ombiliquées d'un point noir à leur centre, qui est assez profond, et qui laisse après la guérison une empreinte à la peau. C'est la pustule d'ecthyma, comme c'est aussi celle de la gale. Mais dans un ecthyma aigu, toutes les pustules tendent à s'ombiliquer; dans la gale, ce n'est que l'exception. Cette figure est prise sur le dessus de la partie inférieure de l'avant-bras; c'est aussi là que se rencontre le plus souvent l'ecthyma. On peut voir que l'épiderme est soulevé et que l'engorgement cutané ne forme pas la dixième partie de la pustule. La circonstance qui distingue le plus facilement l'ecthyma de la gale, c'est le siége limité de cette éruption dans un point donné du corps, avec absence de tout bouton sur les points où la gale se montre ordinairement.

Fig. 5.

La figure 5 offre les caractères de pustules d'un autre genre. Elle représente ce que dans le monde on appelle le plus communément des *boutons*. C'est l'engorgement de la peau qui en constitue les neuf dixièmes. Le pus ou la vésicule purulente n'existe qu'au sommet. La coloration indique la forme chronique de ces boutons, et la peau blafarde sur laquelle ils sont nés fait connaître le caractère du tissu où on les rencontre le plus souvent. Cette acné siége le plus généralement à la figure, ainsi que nous l'avons représenté.

Fig. 3.

Dans cette figure on retrouve le *sycosis tuberculeux*, ou mentagre, porté à son plus haut degré de développement. Deux choses frappent tout d'abord dans cette affection : la série de tubercules suppurants qui se sont développés dans l'épaisseur de la peau, et la tuméfaction de la peau, qui double, triple ou quadruple le volume du menton. Nous avons supposé une mentagre très forte en granulations, donnant toutes une suppuration moins purulente, qui a peu de tendance à se concréter et qui forme peu de croûtes. Il existe une autre variété de mentagre que nous avons appelée pustuleuse ; elle n'a que de très rares tubercules, mais elle a surtout de très grosses pustules, et elle est accompagnée d'un engorgement à la peau peut-être plus considérable que dans la mentagre tuberculeuse.

PLANCHE III.

Fig. 1, 2, 3.

Les figures 1, 2 et 3 représentent des affections à forme papuleuse. Dans la figure première, c'est le *lichen simplex ;* on y voit disséminées vers la longueur d'un avant-bras, sans ordre, sans méthode, des papules par groupes, toutes cependant isolées les unes des autres. Elles ont été le siége de grattages, et cependant elles ne sont pas excoriées et sanguinolentes comme dans la figure 3, qui donnent l'image d'un prurigo. Elles sont plus ou moins rosées, plus ou moins vives et inflammatoires. S'il y a eu quelques sécrétions par les grattages, c'est une sérosité qui s'est concrétée en petites écailles adhérentes. Les papules de la figure 2 sont, au contraire, volumineuses, excoriées, quelquefois suppurantes; ce sont des papules de *lichen agrius*, dont le siége le plus commun est à la cuisse, et qui se dispose ordinairement sous forme de rubans; on voit deux bandes de ce genre qui traversent obliquement la portion de cuisse qui se trouve représentée.

Quant au prurigo, il donne d'abord l'aspect de cette peau foncée, sur laquelle siége ordinairement la maladie. En second lieu, une série de petites papules, très superficielles, qui sont toutes excoriées, et qui toutes ont donné lieu à un petit suintement sanguinolent, qui s'est concrété sous forme de croûtes sanguines. Dans le prurigo pédiculaire, les papules sont plus saillantes et moins sanguines; elles fournissent de la sérosité; elles sont accompagnées de traînées d'excoriations allongées, et leur siége est au moins autant sur la poitrine que sur le dos.

Fig. 4.

C'est la représentation du *pityriasis versicolor* que donne la planche IV, non pas sous le rapport de l'étendue, mais comme physionomie des taches qui peuvent avoir une surface plus ou moins considérable. On voit que l'affection est toute superficielle; que c'est une simple coloration de la peau avec quelques légers furfures; il n'y a rien de comparable à cette maladie; aussi est-elle facile à distinguer de toutes les autres. Le *pityriasis nigra* est beaucoup plus foncé.

Fig. 5.

Cette plaque de teigne, espèce de *favus lupinosa*, a été prise sur la tête d'un ancien teigneux, auquel la maladie a déjà fait perdre un grand nombre de cheveux. L'affection est en traitement; la peau était rentrée dans des conditions naturelles, quant à l'aspect. Le traitement a été interrompu pour laisser reparaître la teigne avec ses éléments morbides les plus jeunes, afin qu'ils fussent mieux représentés et mieux compris. Toute cette plaque dessine le cuir chevelu, une portion a été complétement dénudée. Il n'y est resté que quelques cheveux; et c'est là où les cheveux restent que la maladie a reparu. D'ailleurs, telle a été la durée de cette affection abandonnée à elle-même sans traitement, que l'autre partie de la peau n'a plus que des cheveux rares et altérés. Ils sont tous frisés, amincis, amaigris, et évidemment atrophiés et malades. — On peut voir sous quelques-uns d'entre eux la petite capsule du mycoderme parfaitement arrondie, non encore ouverte, et au centre de laquelle se trouve le cheveu; puis cette poche ouverte, allant en s'élargissant de plus en plus, au fur et à mesure que les bords se renversent en dedans pour prendre la forme d'un godet, dans l'état où la maladie se présente au médecin. Tous ces godets sont uniformes, se touchent, se confondent pour donner naisance à une plaque; mais à la circonférence de cette plaque, on distingue très bien la forme des godets. Nous n'avons pas reproduit de *favus scutulata;* ce n'est, en effet, qu'une série de godets généralement isolés, du double ou du triple de ceux du *favus lupinosa*.

PLANCHE IV.

Fig. 1 et 2.

Dans les figures 1 et 2, on voit reproduite la même maladie dans ses deux principales variétés : c'est le rupia non proéminent et le rupia proéminent. Dans la figure 1re, des croûtes plates, noires, parce qu'elles sont sanguinolentes et sanieuses, recouvrent une surface ulcéreuse. La maladie siége sur le tibia; c'est aux jambes qu'on l'observe, en effet, le plus souvent. Si ces croûtes étaient détachées à l'aide d'un cataplasme ou d'un corps gras, on verrait des ulcérations grisâtres, sanieuses, à bords un peu relevés et un cercle de mauvais aspect; la peau avoisinante peut être saine, comme elle peut être parsemée de petites cicatrices de plaques de rupia. En tout cas elle a constamment, surtout aux jambes, un aspect violacé, boursouflé, qui dénote une anémie, un défaut de circulation capillaire. — Le rupia proéminent n'a plus la même physionomie; les croûtes sont souvent isolées, quelquefois agglomérées, toutes formées de couches successives, ainsi que nous l'avons expliqué (*Rupia proéminent*); elles ressemblent parfaitement à des écailles d'huîtres. Celle que nous avons représentée est de petite dimension; il en est qui ont l'étendue d'un segment qui représenterait la moitié de la coquille d'un gros œuf de poule. Les deux variétés sont d'ailleurs liées fort souvent à une cause syphilitique; mais la seconde plus fréquemment que la première.

Fig. 3, 4 et 5.

Ces figures représentent trois variétés de psoriasis; toutes trois ont les mêmes caractères généraux, des écailles ou squames nacrées à la surface. Sous ces squames, la peau d'un rouge plus ou moins foncé, couleur qui est masquée par l'aspect nacré des squames; enfin une saillie de toutes ces parties malades à la surface de la peau saine, en raison de la turgescence de ce tissu. Ces squames adhèrent, mais assez faiblement, car il suffit d'une onction avec un corps gras pour les faire tomber. Le *psoriasis guttata* se reconnaît à sa forme (fig. 3); c'est le plus communément observé. La figure 4 représente la variété de *psoriasis punctata* que nous avons fait connaître Quant à la fig. 3, c'est l'une des variétés de psoriasis herpétiforme, dont nous avons déjà parlé à l'occasion de l'eczéma.

Fig. 6.

Nous ne nous arrêterons pas à la figure 6, qui reproduit le *lepra vulgaris*; on voit que les cercles dans cette maladie sont incomplets, de sorte qu'il en résulte à peu près la forme d'un fer à cheval.

Fig. 7.

Enfin la figure 7 donne une idée de ce que peut être l'ichthyose ; les productions épidermiques, plus ou moins épaisses dans cette maladie, ne sont jamais limitées comme dans les variétés de psoriasis ou de lèpre vulgaire ; elles sont diffuses, s'étendent sur tout le membre, et se perdent insensiblement avec la peau restée saine.

Fig. 8 et 9.

Quant aux figures 8 et 9, elles montrent les deux variétés principales de lupus. — Lupus attaquant en profondeur (fig. 8), et lupus attaquant en surface (fig 9). Dans la première variété, que l'on a nommée *lupus tuberculeux*, le nez ou la partie affectée est généralement plus volumineuse, excepté le sommet plus malade, qui a été détruit, et qui est le siége d'une certaine atrophie qui devient beaucoup plus prononcée lors de la guérison. — C'est souvent le contraire pour le *lupus exedens* ou rongeant en surface, et surtout le lupus tuberculeux en surface, dont la peau, quoique guérie, reste le plus souvent épaisse, et donne à la figure un certain accroissement de volume. Le lupus qui ronge en surface sécrète presque toujours; de là les croûtes colorées qui les recouvrent. Si, au contraire, il existe quelques traces très limitées de croûtes sur le lupus tuberculeux, elles sont sèches, écailleuses, de vieille date, et ne se renouvellent que très accidentellement.

PLANCHE V.

En jetant un coup d'œil d'ensemble sur cette planche, qui ne représente que des syphilides, on doit être frappé de plusieurs dispositions générales de dessins qui sont communes à presque toutes les figures : 1° les dispositions elliptiques sous lesquelles se trouvent rangées les altérations morbides : c'est ce que l'on observe très distinctement dans quatre d'entre elles ; 2° la présence des altérations au voisinage des ouvertures naturelles ou dans les points de flexion des parties ; 3° la couleur sombre, cuivrée, de ces surfaces malades. C'estqu'en effet ce sont là des caractères propres à ces affections.

Fig. 1.

Dans la figure 1re, j'ai fait retracer un impétigo dont la croûte jaune rappelle cette maladie. Mais à l'angle de la bouche existe une ulcération dont

la surface est granulée. Or, cette ulcération était recouverte d'une croûte pareille à l'autre. Jamais on ne trouvera cette surface granulée dans les impétigos ordinaires.

Fig. 2.

Cette figure représente la variété de papule syphilitique, sans suppuration préalable au sommet. C'est là une syphilide papuleuse franche.

Fig. 3.

La syphilide tuberculeuse ne diffère de la précédente que par le volume de ses tubercules. J'ai fait représenter dans la même figure l'un de ces tubercules ulcéré, avec sa forme arrondie et ses bords relevés.

Fig. 4.

C'est l'un des plus beaux exemples de syphilide squameuse que j'aie eu à ma disposition. On y voit le psoriasis disposé en plaques courbes, ondulées et très distinctes.

Fig. 5.

Ici l'herpès syphilitique avec ses cercles complets, mais sans saillie de la peau; la coloration, la forme, quelques légères pellicules sur les plus larges, tels sont les caractères de cette variété.

Fig. 6.

Enfin la figure 6 donne une idée de la syphilide cornée : le dessin, pris au milieu de la main, représente les plicatures de sa flexion. C'est, en effet, à la paume des mains et à la plante des pieds que l'on retrouve le plus souvent cette variété.

Explication de la planche de micrographie.

J'ai d'abord fait reproduire l'état normal d'un cheveu sous un grossissement de 50 diamètres. Rien n'est plus difficile que d'avulser un cheveu avec son bulbe entier, c'est-à-dire totalement enveloppé jusqu'à sa base des membranes qui l'entourent : on obtient plus facilement ce résultat avec un poil qu'avec un cheveu; aussi une portion du bulbe en est-elle dépourvue : c'est

ce qui arrivera dans les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des cas. Cette figure représente la naissance du bulbe, les cellules pigmentaires qui se trouvent surtout à sa naissance, le cheveu prenant naissance à sa racine, sa substance médullaire représentant un canal central noirâtre, ses fibres longitudinales et transversales, ainsi qu'une petite portion du cheveu au moment où il quitte la peau; mais c'est une erreur que d'avoir reproduit ce point par une disposition carrée, qui n'existe pas dans la nature, puisque la tunique épidermique vient même se refléter sur le cheveu. On y voit en dehors la tunique fibreuse du cheveu, en dedans le prolongement épidermique qui pénètre jusqu'à sa racine, puis un espace blanc que l'on suppose vide, mais qui n'est qu'un point de contact lisse, qui permet en quelque sorte la mobilité du cheveu dans les deux gaînes qui l'enveloppent.

Tous ces détails sont reproduits parfaitement à un grossissement de 200 diamètres dans les trois figures qui avoisinent celle-ci, et les données anatomiques du cheveu que l'on retrouve dans tous les traités *ex professo* sur la matière se trouvent représentées : ainsi les cellules pigmentaires dans le corps radiculaire, la naissance des fibres longitudinales. Les auteurs ont représenté la naissance du cheveu avec la forme d'un bulbe d'oignon; il n'a jamais cette disposition arrondie aussi marquée.

On voit très prononcées les fibres transversales et la disposition des membranes dans la figure qui représente le milieu du bulbe. Enfin la partie supérieure figure une partie de cheveu hors du bulbe au même grossissement, avec son canal, qui n'est jamais d'un diamètre régulier, et qui dans beaucoup de cas est effacé, quoique à un âge peu avancé de la vie, ou qui offre des interruptions sur sa longueur.

J'ai tenu à reproduire deux physionomies de ce que je crois être le fait d'une rétraction de l'épiderme ou un état qui précéderait le développement d'une maladie sur le cheveu. Cet état, je l'ai désigné sous le nom d'enroulement épidermique. C'est toujours sur la naissance du cheveu qu'on le rencontre. Il ne faut pas le prendre pour un caractère certain de maladie, et attendre que l'expérience ait prononcé à cet égard. Il n'y a pas de production parasitaire sans spores; de sorte que c'est la spore qu'il faut rechercher.

Le dessin du trichophyton est ce qu'il y a de mieux représenté jusqu'à présent. On y remarque des myriades de spores; à la surface des cheveux, des traînées ou cannelures remplies de spores, qui donnent au corps du cheveu l'aspect d'une écorce de chêne. On voit les spores s'échappant de l'extrémité du cheveu cassé, par le canal central. Ces cheveux se rompent à la manière d'un bois blanc, c'est-à-dire avec éclats. Toutefois ces faits ne sont bien appréciables que sur les cheveux du centre de la plaque d'herpès tonsurant. Pour ceux de la circonférence, ils conservent et leur forme et leur structure, sauf un état d'aspect rugueux parsemé de spores diffuses.

Les deux dessins de microsporon, qui ont été reproduits sous des grossissements de 5 à 600 diamètres peut-être, se distinguent de tous les autres par la

disposition des tubes, et surtout par des spores sans cesse de différentes grosseurs, et très souvent agglomérées. Je dois l'un de ces dessins à l'obligeance de M. Robin ; l'autre, l'herpès inguinal, a été fait par M. Mauvais, interne de l'hôpital Saint-Louis, ainsi que le dessin d'enroulement qui est reproduit au trait.

Quant au favus, pour retrouver l'image de ce que j'ai fait reproduire, c'est-à-dire un ensemble d'une portion de champignon, il faut s'adresser à un très jeune godet, sans quoi on n'a que des spores de diverses grosseurs et des fragments de tubes sporophores cassés et plus ou moins arborisés. Pour apprécier ce dessin, il faut se servir d'une loupe, tant il a été exécuté avec soin. Tous les tubes, quelque déliés qu'ils soient, contiennent des spores.

J'ai emprunté les dessins de la plique à l'ouvrage de M. Ch. Robin.

Quant à la plique, la figure la plus élevée représente un cheveu contenu dans son bulbe; au centre du cheveu se trouvent des spores qui en ont augmenté le volume.

La figure inférieure représente un cheveu distendu par des spores au point d'avoir amené la rupture du cheveu en fibrilles écartées les unes des autres.

Nous avons dû reproduire l'acarus vu par son côté abdominal, afin de représenter dans la seconde figure les parties sexuelles figurées par un point noir entouré de traits représentant un cul-de-sac placé près de l'extrémité abdominale de l'insecte.

Dans cette planche de micrographie, qui diffère peut-être de ce qui a été publié d'analogue, je me suis attaché à représenter en général les objets tels qu'on les voit au microscope, et non pas tels que les donnent les mêmes objets *préparés* à l'aide d'eaux acides, alcalines, ou autres. En effet, le praticien qui veut s'éclairer sur la nature des produits d'une maladie ignore le plus souvent quels sont les dissolvants de tels ou tels tissus, de tel ou tel fluide sécrété que l'on peut avoir à éliminer pour mieux apercevoir le produit végétal qui coïncide avec la maladie. De sorte qu'il ne retrouve plus l'analogue des planches qu'il peut avoir sous les yeux. Les dessins ont été exécutés sous ma direction par un dessinateur habile et habitué à se servir du microscope, M. Lakerbauer, qui les a rendus avec une grande exactitude. Le seul adjuvant dont je me sois servi pour obtenir les modèles de cette planche plus nets et plus évidents, c'est l'eau pure, ou mieux l'eau distillée préparée depuis peu de temps. Je dois dire à cet égard que les objets qui sont imprégnés d'eau dans toutes leurs parties sont beaucoup plus nets qu'à l'état sec.

Au surplus, je vais donner ici quelques renseignements propres à diriger les personnes qui voudraient se servir d'un microscope dans le but d'arriver à vérifier l'existence des productions végétales.

Un microscope doit être lourd ou bien fixé sur un plan solide, afin d'éviter toute vacillation (ceux de M. Georges Oberauser réunissent cette condition à leur supériorité non contestée). On ne doit jamais s'en servir sans vérifier la propreté parfaite du miroir réflecteur, du jeu de lentilles et des deux verres supérieur et inférieur de l'oculaire.

Avant de placer un objet, il faut mettre son microscope à l'état le plus complet d'éclairage. A cet égard, il faut donner au miroir une inclinaison en rapport avec la réflexion la plus complète de la lumière, et de plus imprimer un mouvement de rotation au microscope à droite et à gauche pour chercher le rapport le plus direct avec les rayons lumineux. En général, ce n'est pas une trop vive lumière qu'il faut rechercher; elle fatigue et nuit à la netteté des objets. Il y a plus, il faut que la lumière d'éclairage soit d'autant plus faible que l'on se sert de jeu de lentilles plus fort.

Ces précautions prises, il faut s'assurer de la netteté du verre *porte-objet* et du verre de recouvrement; celui-ci doit être très mince, et d'autant plus mince que l'on se sert de jeux de lentilles plus forts, attendu que leur foyer est beaucoup plus court.

En thèse générale, des lentilles fortes ne sont des instruments utiles qu'entre les mains de personnes qui ont une grande habitude du microscope. Il faut que le praticien se borne à un grossissement de 150 à 200 diamètres.

Pour procéder à l'examen, il faut en général prendre un objet qui ait le moins d'épaisseur possible, le déposer sur le verre porte-objet, le recouvrir de la lamelle de verre, et alors mettre sur le bord de celui-ci une à deux gouttes d'eau distillée. L'eau s'introduit entre les deux verres, et laisse en macération le produit morbide à examiner, puis on procède à cet examen.

Dans le cas d'un résultat négatif, il ne faut pas s'en tenir là. Il faut faire glisser l'un sur l'autre les deux verres, en exerçant une douce pression, de manière à étendre et à étaler des spores qui sont souvent accumulées et invisibles, et qui deviennent alors très appréciables.

Lorsqu'il s'agit d'un favus, il est convenable de mettre le champignon, ou même ses fragments, tout entier en macération dans l'eau pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures. Ici l'écrasement entre les lames de verre devient indispensable, attendu que la matière faveuse est toujours plus ou moins en granulations sèches et d'un certain volume. En s'adressant à un jeune favus, on trouvera des portions qui refléteront l'image de l'échantillon que nous avons donné. Un favus de formation déjà ancienne ne produit que des spores et des tubes sporophores plus ou moins brisés.

Les recherches à faire pour le microsporon deviennent un peu plus délicates. Il est souvent difficile de l'isoler de l'épiderme sur lequel il trace. Il faut toujours choisir, pour faire cette observation, des lamelles épidermiques excessivement fines, aussi franches que possible, et au besoin les mettre en macération dans de l'eau pendant quelques heures. Il sera bon de se servir d'objectifs de différents diamètres pour s'assurer de l'existence du cryptogame.

FIN DE L'EXPLICATION DES PLANCHES.

TABLE DES MATIÈRES.

'ATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALES 1

PATHOLOGIE GÉNÉRALE 1

Causes des maladies de la peau 15

Invasion, marche, terminaison des maladies cutanées 28

Anatomie pathologique des maladies cutanées 34

Classification des maladies de la peau, d'après l'anatomie pathologique . 38

Érythémateuses 39

Vésiculeuses et bulleuses 40

Pustuleuses 42

Papuleuses 43

Tuberculeuses 45

Épidermiques squameuses et cornées 46

Sébacées 48

Chromateuses 50

Hémateuses 50

A. Productions végétales 51

B. Productions animales 55

Formes composées 55

Diagnostic général des maladies de la peau 55

Méthode de diagnostic des maladies de la peau 58

Pronostic des maladies cutanées 59

De la répercussion dans les maladies cutanées 60

Anatomie de la peau, comparée a la pathologie 64

ÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE 74

Médication antiphlogistique 82

Médication antiphlogistique pure 82

Lotions 83

Irrigations 83

Mucilagineux 84

Graisses 84

Poudres 86

Émollients, réfrigérants 86

Bains locaux 87

Bains généraux 87

Médication antiphlogistique résolutive 87
Résolutifs aqueux 88
Résolutifs graisseux 89
Oxyde de zinc 90
Protosulfate de fer 90
Camphre 90
Chloroforme 91
Huile de cade 91
Résolutifs pulvérulents 92
Résolutifs généraux 92
Bains d'alun 92
Bains de sublimé 93
Bains aromatiques 94
Médication dérivative 94
Purgatifs 95
Médication modificatrice ou perturbatrice 96
Vésicatoires 97
Nitrate d'argent en solution 97
Nitrate de mercure 98
Chlorure de zinc (caustique de Canquoin) 99
Chlorure d'or 99
Chlorure d'antimoine 100
Pâte de Vienne 100
Chlorure de zinc au gutta-percha 101
Résumé général de la médication antiphlogistique 101
MÉDICATION ANTILYMPHATIQUE 106
Médication antiscrofuleuse 109
Tisanes amères 109
Iode 110
Fer 110
Huile de foie de morue 111
Sirop antiscorbutique iodé 112
Bains iodés 112
Iode caustique 113
Iodure de potassium et de plomb 113
Proto et deuto-iodure de mercure 114
Médication sulfureuse 116
Soufre 117
Sulfure de potassium 118
Sulfure de calcium 119
Bains artificiels de Baréges 120
Bains au sulfure de sodium 121

Médication antinerveuse ou antipapuleuse 123
Antispasmodiques 124
Alcalins 125
Teinture de cantharides 129
Médication antisquameuse 130
Préparations arsenicales 130
Solution de Fowler 131
Solution de Pearson 131
Solution minérale 134
Préparations antimoniales 139
Médication externe 140
Goudron 140
Huile de cade 140
Médications composées ou mixtes 144
Bains 150
Bains aqueux, chauds et froids 151
Bains d'eau courante 154
Douches liquides 154
Bains et douches de vapeur 157
Bains de vapeur portatifs 160
en étuve 160
Mode d'administration des bains de vapeur 163
Bain russe 164
Bain oriental 164
Hygiène des bains 165
AISON DE L'ANNÉE OU LA CURABILITÉ DES MALADIES DE LA PEAU EST PLUS FACILE 170
LASSIFICATION DES MALADIES DE LA PEAU 173
Classification de Pleuck 174
— de Willan 174
— de Willan modifiée 175
— d'Alibert 175
— de M. Rayer 180
— de M. Baumès 182
— de M. Hardy 184

THOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE SPÉCIALES 188

Premier groupe 188

Affections exanthémateuses 189
EXANTHÈMES 189
ERYTHÈME 190
— symptomatique d'un état morbide général 191
— amorphe 191

Érythème papuleux 192
— tuberculeux 192
— noueux 192
— mamellé 192
— marginé 192
— circiné 192
— excentrique 192
— fugace 193
Érythèmes symptomatiques dépendant d'un état adynamique 200
Érythème lisse (*erithema leve*) 200
— paratrime 201
Érythèmes dépendant d'une cause syphilitique 203
Érythèmes dépendant de causes mal connues 203
Erythème pernio (engelures) 203
Acrodynie 207
Érythèmes idiopathiques 211
— *à solare* 211
— par piqûre 212
— par brûlure 212
— par succion 212
— par contact de fluides altérés 213
— intertrigo 214
URTICAIRE 219
ROSÉOLE 228

Deuxième groupe 231
Affections vésiculeuses et bulleuses 231
ECZÉMA 231
— amorphe 237
— nummulaire 238
— fendillé 238
— *unisquamosum* 239
— *rubrum* 240
— *fugax* 241
— localisé 241
— de la tête 241
— des oreilles 242
— du mamelon 242
— du nombril 243
— de la vulve 243
— des bourses 243
— des jambes 244
— Causes 246

Eczéma. Diagnostic..... 249
— Thérapeutique..... 250
— — période aiguë..... 251
— — période d'arrêt..... 252
— — période décroissante..... 257
Eczémas composés..... 264
— impétigineux..... 264
Herpès..... 267
Herpès à vésicules très ténues..... 269
— nummulaire..... 270
— circiné..... 270
— du bout du nez..... 274
— tonsurant..... 274
— crétacé..... 276
— folliculeux..... 279
Herpès à formes composées..... 280
Herpès eczémateux..... 280
Herpès à grosses vésicules..... 283
Zona..... 284
Labial (*herpes labialis*)..... 289
Préputial (*herpes præputialis*)..... 291
Iris (*herpes iris*)..... 292
Herpès en traînées..... 294
— syphilitique..... 296

Troisième groupe..... 296
Affections symptomatiques d'altérations du sang..... 296
Pemphigus..... 298
— aigu général..... 299
— chronique..... 302
— *diutinus* hémorrhagique..... 306
— des nouveau-nés..... 307
— composé..... 308
— herpès pemphigoïde..... 309
Ecthyma *cachecticum*..... 312
Rupia..... 314
— *non proeminens*..... 314
— *proeminens*..... 315
— *escharotica*..... 316
Formes composées..... 320
Impétigo rupiforme ou *scabida*..... 320
Herpès rupiforme..... 321

PURPURA..... 323
— *simplex*..... 325
— *simplex* ecchymotique..... 326
— *urticans*..... 326
— hémorrhagique..... 327
SCORBUT..... 331
IMPÉTIGO..... 335
— *simplex*..... 336
— *figurata*..... 340
— *larvalis*..... 340
— *granulata*..... 340
— *erysipelatodes*..... 341
— *pilaris*..... 341
— *purifluens*..... 342
— *rodens*..... 344
— Traitement..... 347
Formes composées..... 352
Impétigo eczémateux (voy. *Eczema impetiginodes*)..... 352
— ecthymatiforme..... 352
— sycosiforme..... 354
ECTHYMA..... 357
— *vulgare*..... 359
— *infantile*..... 360
— *luridum* ou *cachecticum* (voy. 3e groupe), impétigineux.... 352
Traitement..... 361
SYCOSIS..... 362
Mentagre..... 362
Sycosis menti..... 363
— *capillitii*..... 365
— *pilaris*..... 365
Formes composées..... 369
Sycosis impétigineux..... 330
— herpétiforme..... 369
Traitement..... 370
ACNÉ..... 372
— *simplex*..... 372
— *rosacea*..... 374
— *indurata*..... 375
— *miliaris*..... 376
— *punctata*..... 377
— *sebacea* sans hypertrophie..... 379
— *sebacea* avec hypertrophie..... 381
— tuberculoïde..... 382

Traitement..... 385
Couperose..... 388

Cinquième groupe..... 391

Maladies papuleuses..... 391
Lichen..... 392
— diffus..... 394
— circonscrit..... 394
— *gyratus*..... 395
— *pilaris*..... 399
— *lividus*..... 399
— *agrius*..... 399

Formes composées..... 401
Lichen urticans..... 401
— eczémateux..... 401
— herpétiforme..... 402
Traitement..... 404
Strophulus..... 406
Prurigo..... 408
— papuleux..... 409
— *formicans*..... 410
— *senilis*..... 410
— *mitis*..... 410
Traitement..... 414
Prurigo pédiculaire..... 415
— non papuleux général..... 417
— non papuleux partiel..... 424
— *podicis*..... 425
— *pudendi*..... 427
— *pudendi muliebris*..... 427
Traitement..... 430

Sixième groupe..... 430

Affections squammeuses..... 431
Pityriasis..... 434
— *alba*..... 434
Traitement..... 439
Pityriasis rubra..... 442
— *versicolor*..... 448
Traitement..... 451
Pityriasis nigra..... 452
Acromie..... 452
Pityriasis pilaris..... 454

Psoriasis 464
Psoriasis 464
— aigu 467
— chronique 468
Formes composées 472
Psoriasis eczémateux 472
— herpétiforme 473
— *palmaria* et *plantaria* 474
— *capitis* 475
— *unguium* 476
— traitement 477
Lepra vulgaris 491
Ichthyose 493
Ichthyose blanche 494
— brune 495
— porc-épic 496

Septième groupe 499
Maladies à parasites végétaux 499
Considérations générales 499
Organisation des poils 508
Végétaux parasites 508
Trichophyton *Malmstein* 510
Microsporon *Gruby* 511
Microsporon Audouini 511
Microsporon *mentagrophytes* 514
Microsporon *furfur* 515
Achorion 516
Teigne 518
Favus lupinosa 522
— *scutulata* 522
— granulé 522
— squammeux 522
Teigne faveuse 522
— tonsurante 523
— mentagre 523
— achromateuse 523
— décalvante 523
— cryptogame de la 525
Description 528
Traitement 533
Herpès tonsurant 541
— cryptogame 543

Porrigo decalvans 547
— cryptogame du 549
— traitement 550
Sycosis (mentagre) 551
Herpès circiné 553
Pityriasis versicolor 557
Plique ; trichoma 557

Huitième groupe 560
Maladies à parasites animaux 560
Gale 560
— description 582
— des pays chauds 585
— caractères de la 586
— acarus de la 588
— sillons 589
— thérapeutique 596
— Méthode de M. Bazin 599
— Méthode de M. Hardy 600
— Méthode de Vleminckx 603-608
— Valeur de ces diverses méthodes 609
— Formule du sulfure de chaux 610
— Formule de la pommade d'Helmerich 610
— Formule de M. Bourguignon (glycérine) 612
— Méthode de MM. Duzard et Pilon 613
Maladie pédiculaire 616
Caractères des insectes 616
Pediculus pubis 622
Thérapeutique 623

Neuvième groupe 629
Maladies scrofuleuses de la peau 629
Lupus 630
— tuberculeux térébrant 634
— tuberculeux serpigineux 635
— ulcéreux 636
— ulcéreux térébrant 637
— ulcéreux serpigineux 638
— traitement 644
— — médication interne 652
Scrofules de la peau 654
Scrofulo-syphilides 654

Dixième groupe 670

Syphilides 670

Caractères généraux 678

Syphilides exanthémateuses 680

— varicelleuse 682

— vésiculeuse 683

— bulleuse 686

— papuleuse 687

— pustuleuse 690

— squammeuse 691

— tuberculeuse 696

— thérapeutique 703

Onzième groupe 725

Maladies exotiques 725

Pellagre 725

Lèpres 742

— avec hypertrophie 744

— Avec hypertrophie et anesthésie 746

Traitement par l'*hydrocotyle asiatica* 768

Bouton d'Alep 781

Pian d'Amérique 786

Kéloïde 791

Molluscum 792

Douzième groupe 793

Changement de couleur de la peau 793

Verrues, porreaux 793

Productions cornées 794

Treizième groupe 797

Maladies des ongles 798

Quatorzième groupe 798

Affections cutanées chez l'enfant à la mamelle 798



Fig. 1. *Eczema à l'état aigu.*

Fig. 2. *Eczema à*

Fig. 6. *Pityriasis rubra aigu.*

Fig. 7. *Herpès Circiné.*

Fig. 8. *Herpès*

...é par Victor Masson.

sant.



Fig. 3. *Eczema impétigineux aigu.*

impétigineux chronique.

Fig. 3. *Eczema herpétiforme.*

Fig. 9. *Zona.*

Fig. 10. *Pemphigus.*

N. Rémond imp. 8 des Nayers 6b

Fig. 1. *Impetigo figurata.*

Fig. 4. *Ecthyma.*

Fig. 3. *Lycosis tuberculeuse (mentagre).*

Fig. 5. *Acné chronique.*

Fig. 2. *Impetigo syccosiforme.*

Gravé par Victor Masson.

J. Renaud imp. r. des Sources. Paris

Fig. 1. *Lichen simplex.*

Fig. 2. *Lichen agrius.*

Fig. 3. *Favus lapinosa (teigne.)*

Fig. 5. *Prurigo.*

Fig. 4. *Pityriasis versicolor.*

Publié par Victor Masson

N. Rémond, lith. à Ste Anne

DEVERGIE. Mal de la Peau.



Fig. 1. *Rupia non proeminens.*

Fig. 2. *Rupia proeminens.*

Fig. 4. *Psoriasis punctata.*

Fig. 5. *Psoriasis herpetiforme.*

Fig. 7.

Publié par Victor Masson.



g. 5. *Psoriasis guttata.*

Fig. 6. *Lepra vulgaris.*

ig. 8. *Lupus tuberculosus.*

ypsis.

Fig. 9. *Lupus exedens.*

N. Reinecal imp. v. Ars Nouveau, 65. Pa

Fig. 1. *Impetigo syphilitique.*

Fig. 2. *Syphilide papuleuse.*

Fig. 3. *Syphilide tuberculeuse et ulcéreuse.*

Fig. 4. *Psoriasis syphilitique.*

Fig. 5. *Herpès syphilitique.*

Fig. 6. *Syphilide cornée.*

...le par Victor Masson. E. Rousseau imp. à Paris

Herpes inguinal. microsporon
Pediculus pubis
Tinea. achorion

Cercueil épidermique
300 diam



Cheveu en poil hors la peau
300 diamètres



Cheveu au milieu du bulbe avec ses enveloppes
300 diamètres

Cercueil épidermique

Papille du bulbe 300 diamètres

CATALOGUE

DES

LIVRES DE MÉDECINE

CHIRURGIE, ANATOMIE, PHYSIOLOGIE,

HISTOIRE NATURELLE, CHIMIE, PHARMACIE,

ART VÉTÉRINAIRE,

QUI SE TROUVENT CHEZ

J.-B. BAILLIÈRE ET FILS,

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE,

Rue Hautefeuille, 19.

(CI-DEVANT RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17.)

A PARIS.

NOTA. Une correspondance suivie avec l'Angleterre et l'Allemagne permet à MM. J.-B. BAILLIÈRE et FILS d'exécuter dans un bref délai toutes les commissions de librairie qui leur seront confiées. (*Écrire franco.*)

Tous les ouvrages portés dans ce Catalogue sont expédiés par la poste, dans les départements et en Algérie, *franco* et sans augmentation sur les prix désignés.— Prière de joindre à la demande des *timbres-poste* ou un *mandat* sur Paris.

LONDRES, H. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET.

NEW-YORK, H. BAILLIÈRE, 290, BROADWAY.

MADRID, C. BAILLY-BAILLIÈRE, 11, CALLE DEL PRINCIPE.

N° 8. **DÉCEMBRE 1857.**

Sous presse, pour paraître prochainement :

Anatomie chirurgicale homalographique, ou description et figures des principales régions du corps humain représentées de grandeur naturelle, et d'après des sections plans faites sur des cadavres congelés, par le docteur F. Q. LE GENDRE, prosecteur de l'amphithéâtre des hôpitaux. Paris, 1858, 1 vol. in-fol., avec 25 planches lithographiées par l'auteur. 20 f.

Traité d'analyse chimique par la méthode des volumes, comprenant l'analyse des gaz, la chlorométrie, la sulfhydrométrie, l'acidimétrie, l'alcalimétrie, l'analyse des métaux, la saccharimétrie, etc., par le docteur POGGIALE, pharmacien en chef du Val-de-Grâce, professeur de chimie à l'École impériale de médecine et de pharmacie militaires, membre de l'Académie impériale de médecine. 1 vol. in-8, avec 200 figures intercalées dans le texte.

Cours de médecine du Collége de France, *Physiologie et pathologie du système nerveux*, par CL. BERNARD, membre de l'Institut (Académie des sciences), professeur au Collége de France et à la Faculté des sciences. Paris, 1858. 2 vol. in-8.

L'École de Salerne, ou l'Art de vivre longtemps; traduction nouvelle, en vers français, par CH. MEAUX-SAINT-MARC, avec des Commentaires par le docteur AMÉDÉE LATOUR. 1 beau vol. grand in-18 avec figures.

Traité d'anatomie chirurgicale et de Chirurgie expérimentale, par J.-F. MALGAIGNE, professeur de médecine opératoire à la Faculté de médecine de Paris, *deuxième édition revue et augmentée*, 2 vol. in-8.

Des méthodes de traitement de la folie adoptées dans les principaux asiles d'Angleterre, par le docteur CONOLLY, traduit de l'anglais et augmenté d'un Précis sur l'avenir des établissements d'aliénés en France, et principalement des hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, par M. BATTEL, chef de division à l'administration de l'assistance publique, 1 vol. in-8.

Description des animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris, pour servir de supplément à la Description des coquilles des environs de Paris, et contenant une revue générale de toutes les espèces actuellement connues, par M. G.-P. DESHAYES, membre de la Société géologique de France.

Cet ouvrage formera environ 25 livraisons, in-4, chacune de 40 pages avec 5 planches. Prix de la livraison. 5 fr.

Les livraisons 1 à 12 sont en vente.

Traité d'anatomie générale, normale et pathologique chez l'homme et les principaux mammifères (Histoire des éléments anatomiques des tissus et Histologie); par le docteur CH. ROBIN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, professeur d'anatomie générale et de microscopie. 2 vol. grand in-8 accompagnés d'un atlas de 40 planches gravées.

Zoologie médicale, par MM. PAUL GERVAIS, doyen de la Faculté des sciences de Montpellier, et J. VAN BENEDEN, professeur de l'université de Louvain. 1 vol. in-8 illustré de figures intercalées dans le texte.

Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale, ou Description et Iconographie pathologique des altérations morbides, tant liquides que solides, observées dans le corps humain, par H. LEBERT, professeur de clinique médicale à l'université de Zurich, membre des Sociétés anatomique, de biologie, de chirurgie et médicale d'observation de Paris, etc. Paris, 1855-1858.

Ce bel ouvrage se composera de 2 vol. in-folio de texte et d'environ 200 planches gravées, dessinées d'après nature et la plupart coloriées. Il se publie par livraisons, chacune composée de 30 à 40 pages de texte sur beau papier vélin et de 5 planches in-folio gravées et coloriées.

Les livraisons 1 à 20 sont en vente. Prix de la livraison : 15 fr.

Paris. — Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

LIVRES DE FONDS.

ABEILLE. Traité des hydropisies et des kystes ou des Collections séreuses et mixtes dans les cavités naturelles et accidentelles, par le docteur J. ABEILLE, médecin de l'hôpital militaire du Roule, lauréat de l'Académie de médecine. Paris, 1852. 1 vol. in-8 de 640 pages. 7 fr. 50

AMETTE. Code médical, ou Recueil des Lois, Décrets et Règlements sur l'étude, l'enseignement et l'exercice de la médecine civile et militaire en France, par AMÉDÉE AMETTE, secrétaire de la Faculté de médecine de Paris. *Deuxième édition*, revue et augmentée. Paris, 1855. 1 vol. in-12 de 470 pages. 4 fr.

Ouvrage traitant des droits et des devoirs des médecins. Il s'adresse à tous ceux qui étudient, enseignent ou exercent la médecine, et renferme dans un ordre méthodique toutes les dispositions législatives et reglementaires qui les concernent.

AMYOT. Entomologie française. Rhyncotes. Paris, 1848, in-8 de 500 pages, avec 5 planches. 8 fr.

† **ANNALES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE MÉDECINE LÉGALE**, par MM. ADELON, ANDRAL, BOUDIN, BRIERRE DE BOISMONT, CHEVALLIER, DEVERGIE, GAULTIER DE CLAUBRY, GUÉRARD, KERAUDREN, LASSAIGNE, LÉVY, MÉLIER, DE PIÉTRA-SANTA, Amb. TARDIEU, TRÉBUCHET, VERNOIS, VILLERMÉ.

Les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, dont la **seconde série** a commencé avec le cahier de janvier 1854, paraissent régulièrement tous les trois mois par cahiers de 15 à 16 feuilles in-8 (environ 250 pages), avec des planches gravées.

Le prix de l'abonnement par an pour Paris, est de : 18 fr.
Pour les départements : 20 fr. — Pour l'étranger : 24 fr.

La **première série**, collection complète (1829 à 1853), dont il ne reste que peu d'exemplaires, 50 vol. in-8, figures, prix : 450 fr. Les dernières années séparément; prix de chaque. 18 fr.

Tables alphabétiques par ordre des matières et par noms d'auteurs des Tomes I à L (1829 à 1853). Paris, 1856. in-8 de 136 pages à 2 colonnes. 3 fr. 50

ANNALES DE LA CHIRURGIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE, publiées par MM. BÉGIN, chirurgien-inspecteur, membre du Conseil de santé des armées, le docteur MARCHAL (de Calvi); VELPEAU, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris; VIDAL (de Cassis), chirurgien de l'hôpital du Midi. Paris, 1841 à 1845. 15 vol. in-8, figures. 40 fr.
Chaque année séparément, 3 vol. in-8. 12 fr.

ANNUAIRE DE CHIMIE, comprenant les applications de cette science à la médecine et à la pharmacie, ou Répertoire des découvertes et des nouveaux travaux en chimie faits dans les diverses parties de l'Europe; par MM. E. MILLON, J. REISET, avec la collaboration de M. le docteur F. HOEFER et de M. NICKLÈS. Paris, 1845-1851, 7 vol. in-8 de chacun 700 à 800 pages. 21 fr.
Les années 1845, 1846, 1847, se vendent chacune séparément 3 fr. le volume.

ARCHIVES ET JOURNAL DE LA MÉDECINE HOMOEOPATHIQUE, publiés par une société de médecins de Paris. — *Collectio complète*. Paris, 1834-1837. 6 vol. in-8. 30 fr.

AUBERT-ROCHE. Essai sur l'acclimatement des Européens dans les pays chauds, par le docteur AUBERT-ROCHE, ex-médecin en chef au service d'Égypte. Paris, 1854. In-8 de 207 pages, avec une carte de la mer Rouge. 3 fr. 50

BAER. Histoire du développement des animaux, traduit par G. BRESCHET. Paris, 1836, in-4. 3 fr.

BALDOU. Instruction pratique sur l'hydro-thérapie, étudiée au point de vue : 1° de l'analyse clinique; 2° de la thérapeutique générale; 3° de la thérapeutique comparée; 4° de ses indications et contre-indications. *Nouvelle édition*, Paris, 1857, in-8 de 691 pages. 5 fr.

BASSEREAU. Traité des affections de la peau, symptomatiques de la Syphilis, par le docteur L. BASSEREAU, ancien interne de l'hôpital Saint-Louis et de l'hospice *des Vénériens, etc.* Paris, 1852, 1 vol. in-8 de 600 pages. 7 fr. 50

BAUDRIMONT. Traité de chimie générale et spéciale, avec les applications aux arts, à la médecine et à la pharmacie, par le docteur A. BAUDRIMONT, professeur agrégé de chimie à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1844-1846. 2 vol. in-8, ensemble 1560 pages, avec 260 figures intercalées dans le texte. 10 fr.
Tome IIe in-8 de 984 pages avec figures. 4 fr.

BAUDRIMONT et MARTIN SAINT-ANGE. Recherches anatomiques et physiologiques sur le **Développement du fœtus**, et particulièrement sur l'évolution embryonnaire des oiseaux et des batraciens. Paris, 1851, 1 vol. in-4 avec 18 planches gravées et coloriées. 35 fr.

BAYLE. Bibliothèque de thérapeutique, ou Recueil de mémoires originaux et des travaux anciens et modernes sur le traitement des maladies et l'emploi des médicaments, recueillis et publiés par A.-L.-J. BAYLE, D. M. P., agrégé et sous-bibliothécaire à la Faculté de médecine. Paris, 1828-1837, 4 forts vol. in-8. 20 fr.

BAZIN. Du système nerveux, de la vie animale et de la vie végétative, de leurs connexions anatomiques et des rapports physiologiques, psychologiques et zoologiques qui existent entre eux, par A. BAZIN, professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux, etc. Paris, 1841, in-4, avec 5 planches lithographiées. 8 fr.

BEAU. Traité clinique et expérimental d'auscultation appliquée à l'étude des maladies du poumon et du cœur, par le docteur J.-H.-S. BEAU, médecin de l'hôpital Cochin, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1856, 1 vol. in-8 de 626 pages. 7 fr. 50

BEAUVAIS. Effets toxiques et pathogénétiques de plusieurs médicaments sur l'économie animale dans l'état de santé, par le docteur BEAUVAIS (de Saint-Gratien). Paris, 1845, in-8 de 420 pages. Avec huit tableaux in-folio. 7 fr.

BEAUVAIS. Clinique homœopathique, ou Recueil de toutes les observations pratiques publiées jusqu'à nos jours, et traitées par la méthode homœopathique. *Ouvrage complet.* Paris, 1836-1840, 9 forts vol. in-8. 45 fr.

BÉGIN. Études sur le service de santé militaire en France, son passé, son présent et son avenir, par le docteur L.-J. BÉGIN, chirurgien-inspecteur, membre du Conseil de santé des armées, de l'Académie impériale de médecine, ex-chirurgien en chef de l'hôpital du Val-de-Grâce, etc. Paris, 1849, in-8 de 370 pages. 4 fr. 50

BÉGIN. Nouveaux éléments de chirurgie et de médecine opératoire, par le docteur L.-J. BÉGIN, *deuxième édition*, augmentée. Paris, 1838, 3 vol. in-8. 20 fr.

BÉGIN. Application de la doctrine physiologique à la chirurgie, par le docteur L.-J. BÉGIN. Paris, 1823, in-8. 2 fr. 50

BÉGIN. Quels sont les moyens de rendre en temps de paix les loisirs du soldat français plus utiles à lui-même, à l'État et à l'armée, sans porter atteinte à son caractère national ni à l'esprit militaire, par L.-J. BEGIN. Paris, 1843, in-8. 1 fr. 25

BELMAS. Traité de la cystotomie sus-pubienne. Ouvrage basé sur près de cent observations tirées de la pratique du docteur Souberbielle, par D. BELMAS, docteur en chirurgie de la Faculté de Paris, etc. Paris, 1827, in-8. fig. 6 fr.

BENOIT. Traité élémentaire et pratique des manipulations chimiques, et de l'emploi du chalumeau, suivi d'un Dictionnaire descriptif des produits de l'industrie susceptibles d'être analysés; par É. BENOIT. Paris, 1854, 1 vol. in-8. 8 fr.

Ouvrage spécialement destiné aux agents de l'administration des douanes, aux négociants, aux personnes qui s'occupent de la recherche des falsifications, ou qui veulent faire de la chimie pratique.

BERNARD. Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la médecine, faites au Collége de France, par Cl. BERNARD, membre de l'Institut de France, professeur au Collége de France, professeur de physiologie générale à la Faculté des sciences. Paris, 1855-1856, 2 vol. in-8, avec figures intercalées dans le texte. 14 fr.
Le Tome II. Paris, 1856, in-8 avec figures. 7 fr.

BERNARD. Cours de médecine du Collége de France, *Des effets des substances toxiques et médicamenteuses*, par Cl. BERNARD, membre de l'Institut de France. Paris, 1857, 1 vol. in-8, avec figures intercalées dans le texte. 7 fr.

BERNARD. Cours de médecine du Collége de France, *Physiologie et pathologie du système nerveux*, par Cl. BERNARD, membre de l'Institut. Paris, 1858. 2 vol. in-8.

BERNARD. Mémoire sur le pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs, particulièrement dans la digestion des matières grasses neutres, par Cl. BERNARD, Paris, 1856, in-4 de 190 pages, avec 9 planches gravées, en partie coloriées. 12 fr.

BERTON. Traité pratique des maladies des enfants, depuis la naissance jusqu'à la puberté, fondé sur de nombreuses observations cliniques, et sur l'examen et l'analyse des travaux des auteurs qui se sont occupés de cette partie de la médecine, par M. le docteur A. BERTON, avec des notes de M. le docteur BARON, médecin de l'hôpital des Enfants-Trouvés, etc. *Deuxième édition* entièrement refondue. Paris, 1842, 1 vol. in-8 de 820 pages 4 fr.

BERZÉLIUS. De l'emploi du chalumeau dans les analyses chimiques et les déterminations minéralogiques; traduit du suédois, par F. FRESNEL. Paris, 1842, 1 vol. in-8, avec 4 planches. 6 fr. 50

BIBLIOTHÈQUE DU MÉDECIN PRATICIEN, ou Résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques, anciens et modernes, publiés en France et à l'étranger, par une société de médecins, sous la direction du docteur FABRE, rédacteur en chef de la *Gazette des hôpitaux*. — Ouvrage adopté par l'Université, pour les Facultés de médecine et les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de France; et par le Ministère de la guerre, sur la proposition du Conseil de santé des armées, pour les hôpitaux d'instruction. Paris, 1843-1851. *Ouvrage complet*, 15 vol. gr. in-8, de chacun 700 pages à deux colonnes. Prix de chaque : 8 fr. 50

Les tomes I et II contiennent les *maladies des femmes* et le commencement des *maladies de l'appareil urinaire*; le tome III, la suite des *maladies de l'appareil urinaire*; le tome IV, la fin des *maladies de l'appareil urinaire* et les *maladies des organes de la génération chez l'homme*; les tomes V et VI, les *maladies des enfants* de la naissance à la puberté (médecine et chirurgie) : c'est pour la première fois que la médecine et la chirurgie des enfants se trouvent réunies; le tome VII, les *maladies vénériennes*; le tome VIII, les *maladies de la peau*; le tome IX, les *maladies du cerveau, maladies nerveuses* et *maladies mentales*; le tome X, les *maladies des yeux* et des *oreilles*; le tome XI, les *maladies des organes respiratoires*; le tome XII, les *maladies des organes circulatoires*; le tome XIII, les *maladies de l'appareil locomoteur*. Le tome XIV contient : *Traité de thérapeutique et de matière médicale* dans lequel on trouve une juste appréciation des travaux français, italiens, anglais et allemands les plus récents sur l'histoire et l'emploi de substances médicales. Le tome XV contient : *Traité de médecine légale et de toxicologie* (*avec figures*) présentant l'exposé des travaux les plus récents dans leurs applications pratiques.

Conditions de la souscription : La Bibliothèque du médecin praticien est *complète* en 15 volumes grand in-8, sur double colonne, et contenant la matière de 45 volumes in-8 ordinaires.

On peut toujours souscrire en retirant un volume par mois, ou acheter chaque monographie séparément. Prix de chaque volume. 8 fr. 50

BLANDIN. Nouveaux éléments d'anatomie descriptive; par F.-Ph. BLANDIN, ancien chef des travaux anatomiques, professeur de la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôtel-Dieu. Paris, 1838, 2 forts volumes in-8. 8 fr.

Ouvrage adopté pour les dissections dans les amphithéâtres d'anatomie de l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris, et par le ministère de la guerre pour les élèves des hôpitaux militaires.

BLANDIN. Anatomie du système dentaire, considérée dans l'homme et les animaux. *Paris, 1836, in-8*, avec une planche. 4 fr. 50

BOENNINGHAUSEN. Manuel de thérapeutique médicale homœopathique, petit traité de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure. Traduit de l'allemand par le docteur D. ROTH. Paris, 1846, in-12 de 600 pages. 7 fr.

BOIVIN et DUGÈS. Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes, appuyé sur un grand nombre d'observations cliniques; par madame BOIVIN, docteur en médecine, sage-femme surveillante en chef de la Maison impériale de santé, et A. DUGÈS, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier. Paris, 1833, 2 vol. in-8, avec atlas de 41 planches in-folio, gravées et coloriées, *représentant les principales altérations morbides des organes génitaux de la femme*, avec explication. 70 fr.

— Séparément le bel atlas de 41 pl. in-fol. coloriées. 60 fr.

BOIVIN. Recherches sur une des causes les plus fréquentes et les moins connues de l'avortement, suivies d'un mémoire sur l'intro-pelvimètre, ou mensurateur interne du bassin; par madame BOIVIN. Paris, 1828, in-8, fig. 4 fr.

BOIVIN. Nouvelles recherches sur l'origine, la nature et le traitement de la môle vésiculaire, ou Grossesse hydatique. Paris, 1827, in-8. 2 fr. 50

BOIVIN. Observation sur les cas d'absorption du placenta, 1829, in-8. 1 fr. 50

BOIVIN. Mémorial de l'art des accouchements, ou Principes fondés sur la pratique de l'hospice de la Maternité de Paris, et sur celle des plus célèbres praticiens nationaux et étrangers, avec 143 gravures représentant le mécanisme de toutes les espèces d'accouchements; par madame BOIVIN, sage-femme en chef. *Quatrième édition augmentée*. Paris, 1836, 2 vol. in-8. 14 fr.

Ouvrage adopté par le gouvernement comme classique pour les élèves de la Maison d'accouchements de Paris.

BONNET. Traité des maladies des articulations, par le docteur A. BONNET, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, professeur de clinique chirurgicale à l'École de médecine. Paris, 1845, 2 vol. in-8, et atlas de 16 pl. in-4. 20 fr.

C'est avec la conscience de remplir une lacune dans les sciences que M. Bonnet a entrepris ce *Traité des maladies des articulations*. Fruit d'un travail assidu de plusieurs années, il peut être présenté comme l'œuvre de prédilection de cet habile chirurgien. Sa position à la tête de l'Hôtel-Dieu de Lyon, lui a permis d'en vérifier tous les faits au lit du malade, à la salle d'opérations, à l'amphithéâtre anatomique, et dans un enseignement public il n'a cessé d'appeler sur ce sujet le contrôle de la discussion et de la controverse. Voilà les titres qui recommandent cet ouvrage à la méditation des praticiens.

BONNET. Traité de thérapeutique des maladies articulaires, par le docteur A. BONNET. Paris, 1853. 1 vol. de 700 pages, in-8, avec 90 pl. intercalées dans le texte. 9 fr.

Cet ouvrage doit être considéré comme la suite et le complément du *Traité des maladies des articulations*, auquel l'auteur renvoie pour l'étiologie, le diagnostic et l'anatomie pathologique. Consacré exclusivement aux questions thérapeutiques, le nouvel ouvrage de M. Bonnet offre une exposition complète des méthodes et des nombreux procédés introduits soit par lui-même, soit par les praticiens les plus expérimentés dans le traitement des maladies si compliquées des articulations.

BONNET. Traité des fièvres intermittentes, par le docteur AUG. BONNET, professeur à l'École de médecine de Bordeaux. *Deuxième édition*, corrigée et augmentée. Paris, 1853, in-8 de 458 pages. 6 fr.

BOUCHARDAT. Du diabète sucré ou glucosurie, son traitement hygiénique, par A. BOUCHARDAT, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1851, in-4. 4 fr. 50

BOUCHUT. Traité des signes de la mort et des moyens de prévenir les enterrements prématurés, par le docteur E. BOUCHUT, médecin des hôpitaux de Paris. *Ouvrage couronné par l'Institut de France*. Paris, 1849, in-12 de 400 pages. 3 fr. 50

Ce remarquable ouvrage est ainsi divisé : — *Première partie* : Appréciation des faits de morts apparentes rapportées par les auteurs. — De la vie et de la mort. — De l'agonie et de la mort. — Des signes de la mort. — Signes immédiats de la mort. — Signes éloignés de la mort. — Signes de la mort apparente. — *Deuxième partie* : Quels sont les moyens de prévenir les enterrements prématurés? — Instructions administratives relatives à la vérification légale des décès dans la ville de Paris. — *Troisième partie* : 78 observations de morts apparentes d'après divers auteurs. — Rapport à l'Institut de France, par M. le docteur Rayer.

BOUCHUT. Nouveaux éléments de pathologie générale et de séméiologie, par le docteur E. BOUCHUT, médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1857, un beau volume grand in-8 de 1084 pages, avec figures intercalées dans le texte. 11 fr.

BOUCHUT. Traité pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle, précédé d'un Précis sur l'hygiène et l'éducation physique des jeunes enfants, par le docteur E. BOUCHUT, professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie (Enfants). *Troisième édition*, corrigée et considérablement augmentée. Paris, 1855, 1 vol. in-8 de 856 pages. 9 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

L'étude des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle exige une attention très grande dirigée par un médecin instruit. Un guide est absolument nécessaire dans l'observation des phénomènes morbides de la première enfance. A l'âge où toutes les fonctions encore incomplètes semblent essayer leurs forces, et où le moindre accident les trouble violemment, il y a toujours à craindre pour le médecin de rester en deçà et au delà de la vérité, et ensuite d'agir tôt ou trop tard. La pratique de ces maladies est toute différente de la pratique des maladies de l'adulte, et l'ouvrage destiné à dissiper les incertitudes qu'elle fait naître sera toujours bien accueilli des médecins.

BOUDIN. Traité de géographie et de statistique médicales, et des maladies endémiques, comprenant la météorologie et la géologie médicales, les lois statistiques de la population et de la mortalité, la distribution géographique des maladies, et la pathologie comparée des races humaines, par le docteur J.-CH.-M. BOUDIN, médecin en chef de l'hôpital militaire du Roule. Paris, 1857, 2 vol. gr. in-8, avec 9 cartes et tableaux. 20 fr.

BOUDIN. Système des ambulances des armées française et anglaise. Instructions qui règlent cette branche du service administratif et médical, par le docteur J.-CH.-M. BOUDIN. Paris, 1855, in-8 de 68 pages, avec 3 planches. 3 fr.

BOUDIN. Résumé des dispositions légales et réglementaires qui président aux opérations médicales du **recrutement, de la réforme et de la retraite** dans l'armée de terre, par le docteur J.-CH.-M. BOUDIN, médecin en chef de l'hôpital militaire du Roule. Paris, 1854, in-8. 1 fr. 50

BOUDIN. Études d'hygiène publique sur **l'état sanitaire, les maladies et la mortalité des armées anglaises** de terre et de mer en Angleterre et dans les colonies, traduit de l'anglais d'après les documents officiels. Paris, 1846, in-8 de 190 pages. 3 fr.

BOUILLAUD. Traité de nosographie médicale, par J. BOUILLAUD, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité. Paris, 1846, 5 vol. in-8 de chacun 700 pages. 35 fr.

BOUILLAUD. Clinique médicale de l'Hôpital de la Charité, ou Exposition statistique des diverses maladies traitées à la Clinique de cet hôpital; par J. BOUILLAUD. Paris, 1837, 3 vol. in-8. 21 fr.

BOUILLAUD Traité clinique des maladies du cœur, précédé de recherches nouvelles sur l'anatomie et la physiologie de cet organe; par J. BOUILLAUD. *Deuxième édition considérablement augmentée.* Paris, 1841, 2 forts vol. in-8, avec 8 planches gravées. 16 fr.

Ouvrage auquel l'Institut de France a accordé le grand prix de médecine.

BOUILLAUD. Traité clinique du rhumatisme articulaire, et de la loi de coïncidence des inflammations du cœur avec cette maladie; par J. BOUILLAUD. Paris, 1840, in-8. 7 fr. 50

Ouvrage servant de complément au *Traité des maladies du cœur.*

BOUILLAUD. Essai sur la philosophie médicale et sur les généralités de la clinique médicale, précédé d'un Résumé philosophique des principaux progrès de la médecine et suivi d'un parallèle des résultats de la formule des saignées coup sur coup avec ceux de l'ancienne méthode dans le traitement des phlegmasies aiguës; par J. BOUILLAUD. Paris, 1837, in-8. 6 fr.

BOUILLAUD. Traité clinique et expérimental des fièvres dites essentielles; par J. BOUILLAUD. Paris, 1826, in-8. 7 fr.

BOUILLAUD. Exposition raisonnée d'un cas de nouvelle et singulière variété d'**hermaphrodisme**, observée chez l'homme. Paris, 1833, in-8, fig. 1 fr. 50

BOUILLAUD. De l'introduction de l'air dans les veines. Rapport à l'Académie impériale de médecine. Paris, 1838, in-8. 2 fr.

BOUILLAUD. Recherches cliniques propres à démontrer que le **sens du langage articulé** et le principe coordinateur des mouvements de la parole résident dans les lobes antérieurs du cerveau; par J. BOUILLAUD. Paris, 1848, in-8. 1 fr. 50

BOUISSON. Traité de la méthode anesthésique appliquée à la chirurgie et aux différentes branches de l'art de guérir, par le docteur E.-F. BOUISSON, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Montpellier, chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Eloi, etc. Paris, 1850, in-8 de 560 pages. 7 fr. 50

BOUISSON. Tribut à la chirurgie, ou Mémoires sur divers sujets de cette science. Paris, 1858. Tome I, in-4 de 564 pages, avec 11 planches lithographiées. 12 fr.

BOUSQUET. Nouveau traité de la vaccine et des éruptions varioleuses ou varioliformes ; par le docteur J.-B. BOUSQUET, membre de l'Académie impériale de médecine, chargé des vaccinations gratuites, *Ouvrage couronné par l'Institut de France*. Paris, 1848, in-8 de 600 pages. 7 fr.

BOUSQUET. Notice sur le cow-pox, ou petite vérole des vaches, découvert à Passy en 1836, par J.-B. BOUSQUET. Paris, 1836, in-4, avec une grande planche. 2 fr.

BOUVIER. Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur, professées à l'hôpital des Enfants pendant les années 1855, 1856, 1857, par le docteur H. BOUVIER, médecin de l'hôpital des Enfants, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1858, 1 vol. in-8 de 500 pages. 7 fr.

BOUVIER. Atlas des Leçons sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur, comprenant les **Déviations de la colonne vertébrale**. Atlas de 20 planches in-folio. 18 fr.

BOUVIER. Études historiques et médicales sur l'**usage des corsets**, par M. le docteur BOUVIER. Paris, 1853, in-8. 1 fr. 50

BREMSER. Traité zoologique et physiologique des vers intestinaux de l'homme, par le docteur BREMSER ; traduit de l'allemand, par M. Grundler. Revu et augmenté par M. de Blainville, professeur au Muséum d'histoire naturelle. Paris, 1837, avec atlas in-4 de 15 planches. 13 fr.

BRESCHET. Mémoires chirurgicaux sur différentes espèces d'**anévrysmes**, par G. BRESCHET, professeur d'anatomie à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien de l'Hôtel-Dieu. Paris, 1834, in-4, avec six planches in-fol. 10 fr.

BRESCHET. Recherches anatomiques et physiologiques sur l'**Organe de l'ouïe et sur l'Audition dans l'homme et les animaux vertébrés** ; par G. BRESCHET. Paris, 1836, in-4, *avec 13 planches gravées*. 10 fr.

BRESCHET. Recherches anatomiques et physiologiques sur l'**organe de l'ouïe des poissons** ; par G. BRESCHET, Paris, 1838, in-4, avec 17 planches gravées. 10 fr.

BRESCHET. Le Système lymphatique considéré sous les rapports anatomique, physiologique et pathologique. Paris, 1836, in-8, avec 4 planches. 3 fr.

BRIAND et CHAUDÉ. Manuel complet de médecine légale, ou Résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière, et des jugements et arrêts les plus récents, par J. BRIAND, docteur en médecine de la faculté de Paris, et Ernest CHAUDÉ, docteur en droit ; suivi d'un *Traité de chimie légale*, par H. GAULTIER DE CLAUBRY, professeur à l'école de pharmacie de Paris. *Sixième édition, revue et augmentée*. Paris, 1858, 1 vol. in-8 de 950 pages, avec 3 planches gravées et 60 figures intercalées dans le texte. 10 fr.

BRONGNIART. Enumération des genres de plantes cultivées au Muséum d'histoire naturelle de Paris, suivant l'ordre établi dans l'Ecole de botanique, par Ad. BRONGNIART, professeur de botanique au Muséum d'histoire naturelle, membre de l'Institut, etc. *Deuxième édition*, revue, corrigée et augmentée, avec une *Table générale alphabétique*, Paris, 1850, in-12. 3 fr.

Dans cet ouvrage indispensable aux botanistes et aux personnes qui veulent visiter avec fruit l'Ecole du jardin botanique, M. Ad. Brongniart s'est applique à indiquer, non seulement les familles dont il existe des exemples cultivées au Muséum d'histoire naturelle, mais même celles en petit nombre qui n'y sont pas représentées, et dont la structure est suffisamment connue pour qu'elles aient pu être classées avec quelque certitude. La *Table alphabétique* comble une lacune que les botanistes regrettaient dans la première édition.

BROUSSAIS. Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie, précédé de propositions renfermant la substance de la médecine physiologique. *Troisième édition*. Paris, 1828-1834, 4 forts vol. in-8. 10 fr.

BROUSSAIS. De l'irritation et de la folie, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la médecine physiologique, par F. J. V. BROUSSAIS, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de médecine de Paris, etc. *Deuxième édition, entièrement refondue.* Paris, 1839, 2 vol. in-8. 6 fr.

BROUSSAIS. Cours de phrénologie, fait à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1836, 1 vol. in-8 de 850 pages, fig. 6 fr.

BROUSSAIS. Mémoire sur la philosophie de la médecine, et sur l'influence que les travaux des médecins physiologistes ont exercée sur l'état de la médecine en France. Paris, 1832, in-8. 1 fr. 50

BROUSSAIS. Hygiène morale, ou Application de la Physiologie à la Morale et à l'Éducation, par C. BROUSSAIS. Paris, 1837, in-8. 2 fr. 50

BROUSSAIS. De la statistique appliquée à la pathologie et à la thérapeutique; par C. BROUSSAIS. Paris, 1840, in-8. 2 fr. 50

BROWN-SÉQUARD. Propriétés et fonctions de la moelle épinière. Rapport sur quelques expériences de M. BROWN-SÉQUARD, lu à la Société de biologie par M. PAUL BROCA, professeur agrégé à la Faculté de médecine. Paris, 1856, in-8. 1 fr.

† **BULLETIN DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE**, publié par les soins de la Commission de publication de l'Académie, et rédigé par MM. F. DUBOIS, secrétaire perpétuel, DEPAUL, secrétaire annuel.— Paraît régulièrement tous les quinze jours, par cahiers de 3 feuilles (48 pag. in-8). Il contient exactement tous les travaux de chaque séance.

Prix de l'abonnement pour un an *franco* pour toute la France : 15 fr.

Collection du 1er octobre 1836 au 30 septembre 1857 : vingt et une années formant 22 forts volumes in-8 de chacun 1100 pages. 160 fr.

Chaque année séparée in-8 de 1100 pages. 12 fr.

Ce *Bulletin officiel* rend un compte exact et impartial des séances de l'Académie impériale de médecine, et présentant le tableau fidèle de ses travaux; il offre l'ensemble de toutes les questions importantes que les progrès de la médecine peuvent faire naître; l'Académie étant devenue le centre d'une correspondance presque universelle, c'est par les documents qui lui sont transmis que tous les médecins peuvent suivre les mouvements de la science dans tous les lieux où elle peut être cultivée, en connaître, presqu'au moment où elles naissent, les inventions et les découvertes.—L'ordre du *Bulletin* est celui des séances : on inscrit d'abord la correspondance soit officielle, soit manuscrite, soit imprimée; à côté de chaque pièce, on lit les noms des commissaires chargés d'en rendre compte à la Compagnie. Le rapport est-il lu, approuvé, les rédacteurs le donnent en totalité, quelle que soit son importance et son étendue : est-il suivi de discussion, ils s'appliquent avec la même impartialité à les reproduire dans ce qu'elles offrent d'essentiel, principalement sous le rapport pratique. C'est dans le *Bulletin* seulement que sont reproduites dans tous leurs détails les discussions relatives à l'*Empyème*, au *Magnétisme*, à la *Morve*, à la *Fièvre typhoïde*, à la *Statistique appliquée à la médecine*, à l'*Introduction de l'air dans les veines*, au *Système nerveux*, l'*Empoisonnement par l'arsenic*, l'*Organisation de la pharmacie*, la *Ténotomie*, le *Cancer des mamelles*, l'*Ophthalmie*, les *Injections iodées*, la *Peste et les Quarantaines*, la *Taille et la Lithotritie*, les *Fièvres intermittentes*, les *Maladies de la matrice*, le *Crétinisme*, la *Syphilisation*, la *Surdi-mutité*, les *Kystes de l'ovaire*, la *Méthode sous-cutanée*, etc. Ainsi, tout correspondant, tout médecin, tout savant qui transmettra un écrit quelconque à l'Académie, en pourra suivre les discussions et connaître exactement le jugement qui en est porté.

CABANIS. Rapports du physique et du moral de l'homme, et **Lettre sur les Causes premières**, par P.-J.-G. CABANIS, précédé d'une Table analytique, par DESTUTT DE TRACY, *huitième édition*, augmentée de Notes, et précédée d'une Notice historique et philosophique sur la vie, les travaux et les doctrines de Cabanis, par L. PEISSE, Paris, 1844, in-8 de 780 pages. 6 fr.

La notice biographique, composée sur des renseignements authentiques fournis en partie par la famille même de Cabanis, est à la fois la plus complète et la plus exacte qui ait été publiée. Cette édition est la seule qui contienne la *Lettre sur les causes premières*.

CALMEIL. De la folie considérée sous le point de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire, depuis la renaissance des sciences en Europe jusqu'au dix-neuvième siècle; description des grandes épidémies de délire simple ou compliqué qui ont atteint les populations d'autrefois et régné dans les monastères, Exposé des condamnations auxquelles la folie méconnue a souvent donné lieu, par *L. F. CALMEIL. Paris*, 1845, 2 vol. in-8. 14 fr.

CALMEIL. De la Paralysie considérée chez les aliénés, recherches faites dans le service et sous les yeux de MM. *Royer-Collard* et *Esquirol*; par L.-F. CALMEIL, D. M. P., médecin en chef de la Maison impériale des aliénés de Charenton. Paris, 1823, in-8. 6 fr. 50

CAP. Principes élémentaires de Pharmaceutique, ou Exposition du système des connaissances relatives à l'art du pharmacien; par P.-A. CAP, pharmacien, membre de la Société de pharmacie de Paris. Paris, 1837, in-8. 2 fr. 50

CARRIÈRE. Le climat de l'Italie, sous le rapport hygiénique et médical, par le docteur ED. CARRIÈRE. *Ouvrage couronné par l'Institut de France.* Paris, 1849. 1 vol. in-8 de 600 pages. 7 fr. 50

Cet ouvrage est ainsi divisé : Du climat de l'Italie en général; topographie et géologie, les eaux, l'atmosphère, les vents, la température. — *Climatologie méridionale de l'Italie* : Salerne (Caprée, Massa, Sorrente, Castellamare, Resina, Portici), rive orientale du golfe de Naples, climat de Naples; rive septentrionale du golfe de Naples (Pouzzoles et Baia, Ischia), golfe de Gaëte. — *Climatologie de la région moyenne de l'Italie* : Marais-Pontins et Maremmes de la Toscane; climat de Rome, de Sienne, de Pise, de Florence — *Climat de la région septentrionale de l'Italie* : climat du lac Majeur et de Côme, de Milan, de Venise, de Gênes, de Mantoue et de Monaco, de Nice, d'Hyères, etc.

CARUS. Traité élémentaire d'anatomie comparée, suivi de **Recherches d'anatomie philosophique** ou **transcendante** sur les parties primaires du système nerveux et du squelette intérieur et extérieur; par C.-C. CARUS, D. M., professeur d'anatomie comparée, médecin du roi de Saxe; traduit de l'allemand sur la deuxième édition, et précédé d'une *esquisse historique et bibliographique de l'Anatomie comparée*, par A.-J.-L. JOURDAN, membre de l'Académie de médecine. Paris, 1835. 3 forts volumes in-8 *accompagnés d'un bel Atlas de* 31 *planches gr. in-4 gravées.* 12 fr.

CASTELNAU et DUCREST. Recherches sur les abcès multiples, comparés sous leurs différents rapports, par MM. les docteurs H. DE CASTELNAU et J.-F. DUCREST, anciens internes des hôpitaux. *Mémoire couronné par l'Académie de médecine.* Paris, 1846, in-4. 4 fr.

CAZAUVIEILH. Du suicide, de l'aliénation mentale et des crimes contre les personnes, comparées dans leurs rapports réciproques. Recherches sur ce premier penchant chez les habitants des campagnes, par le docteur J.-B. CAZAUVIEILH, médecin de l'hospice de Liancourt, ancien interne de l'hospice de la Salpêtrière. Paris, 1840, in-8. 5 fr.

CAZENAVE. Traité des maladies du cuir chevelu, suivi de conseils hygiéniques sur les soins à donner à la chevelure, par le docteur A. CAZENAVE, médecin de l'hôpital Saint-Louis, etc. Paris, 1850. 1 vol. in-8, avec 8 planches dessinées d'après nature, gravées et coloriées avec le plus grand soin. 8 fr.

— *Voyez* CHAUSIT.

CELSE (A.-C.). Traité de la médecine en VIII livres; traduction nouvelle par MM. FOUQUIER, professeur de la Faculté de médecine de Paris, et RATIER. Paris, 1824, in-18 de 550 pages. 2 fr.

CELSI (A.-C). De re medica libri octo, editio nova, curantibus P. FOUQUIER, in saluberrima Facultate Parisiensi professore, et F.-S. RATIER, D. M. Parisiis, 1823, in-18, pap. fin des Vosges. 2 fr.

CHAILLY. Traité pratique de l'art des accouchements, par M. CHAILLY-HONORÉ, membre de l'Académie impériale de médecine, professeur de l'art des accouchements, ancien chef de clinique de la Clinique d'accouchements à la Faculté de médecine de Paris. *Troisième édition*, considérablement augmentée. Paris, 1853, 1 vol. in-8 de 1050 pages, accompagné de 275 figures intercalées dans le texte, et propres à faciliter l'étude. 10 fr.

Ouvrage adopté par l'Université pour les facultés de médecine, les écoles préparatoires et les cours départementaux institués pour les sages-femmes.

« Nous ne devons pas craindre d'avancer qu'il n'est point de livre élémentaire d'obstétrique, quelque mérite qu'il ait d'ailleurs, qui soit pour un jeune accoucheur, à qui ne manquent pas les lumières, mais à qui peut faire défaut l'expérience, un guide plus éclairé, plus sûr que ne l'est l'ouvrage de M. Chailly. Là, en effet, dans tout le cours de la grossesse, dans chaque présentation du fœtus, dans les suites de couches, partout où peuvent se manifester des accidents, sont présentés, sont clairement exposés les plus efficaces moyens d'y remédier. L'auteur est entré dans des détails de conduite que les praticiens sauront certainement apprécier. (Journal des connaissances médico-chirurgicales.)

CHAMBERT. Des effets Physiologiques et Thérapeutiques des éthers, par le docteur H. CHAMBERT. Paris, 1848, in-8 de 260 pages. 3 fr. 50 c.

CHASSAIGNAC. Traité de l'écrasement linéaire, nouvelle méthode pour prévenir l'effusion du sang dans les opérations chirurgicales, par M.-E. CHASSAIGNAC. Paris, 1856, in-8 de 560 pages, avec 40 figures intercalées dans le texte. 7 fr.

CHASSAIGNAC. Clinique chirurgicale de l'hôpital de la Riboisière, par E. CHASSAIGNAC, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital la Riboisière. Paris, 1855-1858, 3 parties in-8, avec figures intercalées dans le texte

— 1° **Leçons sur l'Hypertrophie des Amygdales** et sur une nouvelle méthode opératoire pour leur ablation, avec 8 figures. 2 fr.

— 2° **Leçons sur la Trachéotomie**, avec 8 figures. 2 fr.

— 3° **Leçons sur le traitement des tumeurs hémorrhoïdales** par la méthode de l'écrasement linéaire. Paris, 1858, in-8.

CHATIN (G.-A.). **Anatomie comparée des végétaux**, comprenant : les plantes aquatiques ; 2° les plantes aériennes ; 3° les plantes parasites, par G.-A. CHATIN, professeur de botanique à l'École de pharmacie de Paris, 1856-1858. Se publie par livraisons de 3 feuilles de texte (48 pages) environ et 10 planches dessinées d'après nature, gravées avec soin sur papier fin, grand in-8 jésus. Prix de la livraison. 7 fr. 50

La publication se fera dans l'ordre suivant : 1° les *plantes aquatiques*, un vol. d'environ 560 pages de texte et environ 100 pl. ; 2° les *plantes aériennes* ou *épidendres* et les *plantes parasites*, un vol. d'environ 500 pages avec 100 planches.

Les livraisons 1 à 8 sont en vente.
Les livraisons 1, 2, traitent des *plantes aquatiques*.
Les livraisons 3, 4, 5, 6, 7, 8 traitent des *plantes parasites*.

CHAUFFARD. Essai sur les doctrines médicales, suivi de quelques considérations sur les fièvres, par le docteur P.-E CHAUFFARD, médecin en chef des hôpitaux d'Avignon, ancien interne des hôpitaux civils de Paris. Paris, 1846, in-8 de 130 pages. 2 fr. 50

CHAUSIT. Traité élémentaire des maladies de la peau, d'après l'enseignement théorique et les leçons cliniques de M. le docteur A. Cazenave, médecin de l'hôpital Saint-Louis, par M. le docteur CHAUSIT, ancien interne de l'hôpital Saint-Louis. Paris, 1853, 1 vol. in 8. 6 fr. 50

Le développement que M. le docteur Cazenave a donné à l'enseignement clinique des maladies de la peau, la classification qu'une grande pratique lui a permis de simplifier, et par suite les heureuses modifications qu'il a apportées dans les dernières années dans le diagnostic et le traitement des variétés si nombreuses de maladies du système cutané, justifient l'empressement avec lequel les médecins et les élèves se portent à la clinique de l'hôpital Saint-Louis. Ancien interne de cet hôpital, élève particulier de M. Cazenave depuis longues années, M. le docteur Chausit a pensé qu'il ferait un livre utile aux praticiens en publiant un *Traité pratique* présentant les derniers travaux de l'habile et savant professeur.

CHAUVEAU. Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques, par A. CHAUVEAU, chef des travaux anatomiques à l'École impériale vétérinaire de Lyon. Paris, 1857, un beau volume grand in-8 de 838 pages, illustré de 207 figures intercalées dans le texte, dessinées d'après nature. 14 fr.

Séparément la DEUXIÈME PARTIE (*Appareils de la digestion, de la respiration, de la dépuration urinaire, de la circulation, de l'innervation, des sens, de la génération*), pages 305 à 838, complétant l'ouvrage. Prix de cette deuxième partie : 8 fr.

C'est le scalpel à la main que l'auteur, pour la composition de cet ouvrage, a interrogé la nature, ce guide sûr et infaillible, toujours sage, même dans ses écarts. M. Chauveau a mis largement à profit les immenses ressources dont sa position de chef de travaux anatomiques de l'école vétérinaire de Lyon lui permettait de disposer. Les sujets de toutes espèces ne lui ont pas manqué ; c'est ainsi qu'il a pu étudier successivement les différences qui caractérisent la même série d'organes chez les animaux domestiques, qu'ils appartiennent à la classe des Mammifères ou à celle des Oiseaux. Parmi les *mammifères* domestiques, on trouve le Cheval, l'Ane, le Mulet, le Bœuf, le Mouton, la Chèvre, le Chien, le Chat, le Dindon, le Lapin, le Porc, etc. ; parmi les *oiseaux* de basse-cour, le Coq, la Pintade, le Dindon, le Pigeon, les Oies, les Canards.

CHOSSAT. Recherches expérimentales sur l'inanition, par le docteur CH. CHOSSAT. (*Ouvrage qui a remporté le prix de physiologie expérimentale à l'Académie des sciences de l'Institut.*) Paris, 1844, in-4. 7 fr.

CRUVEILHIER. Anatomie pathologique du corps humain, ou Descriptions, avec figures lithographiées et coloriées, des diverses altérations morbides dont le corps humain est susceptible; par J. CRUVEILHIER, professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, président perpétuel de la Société anatomique, etc. Paris, 1830-1842. 2 vol. in-folio, avec 230 planches coloriées. 456 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin, non rognés. Prix pour les 2 vol. grand in-folio. 24 fr.

Ce bel *ouvrage est complet*; il a été publié en 41 livraisons, chacune contenant 6 feuilles de texte in-folio grand-raisin vélin, caractère neuf de F. Didot, avec 5 planches coloriées avec le plus grand soin, et 6 planches lorsqu'il n'y a que quatre planches de coloriées. Les dessins et la lithographie ont été exécutés par M. A. Chazal. Le prix de chaque livraison est de 11 fr.

Table du contenu de chaque livraison :

1. Maladies du placenta, des nerfs ganglionnaires, des reins, vices de conformation.
2. Maladies des vaisseaux lymphatiques, de la rate, du cerveau, pieds bots.
3. Apoplexie et gangrène du poumon, anévrysmes de l'aorte, maladies du foie, de la moelle épinière.
4. Maladies de l'estomac et des intestins, désarticulations (*Goutte*), de la colonne vertébrale, de l'utérus.
5. Maladies du testicule, de l'ovaire, du larynx, du cerveau (*idiotie, apoplexie*).
6. Maladies des méninges, de la moelle épinière, du rein, du placenta, des extrémités.
7. Entérite folliculeuse, hernie étranglée, productions cornées.
8. Maladies du cerveau (*tumeurs des méninges, dure-mère, hémiplégie, atrophie, idiotie*).
9. Maladies du testicule, des articulations.
10. Maladies de l'estomac (*ramollissement, cancers, ulcères*).
11. Phlébite et abcès viscéraux; gangrène du poumon. Polypes et tumeurs fibreuses de l'utérus.
12. Maladies du foie, de l'estomac.
13. Maladies de l'utérus.
14. Choléra-morbus.
15. Absence de cervelet, hernie par le trou ovalaire; maladies de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, du poumon, du thymus, du pancréas, apoplexie et hydrocéphale chez les enfants.
16. Maladies du placenta, de la moelle épinière, péricardite, phlébite du foie, déplacements de l'utérus, varices des veines.
17. Maladies du cerveau, de la vessie, de la prostate, des muscles (*rhumatisme*), du cœur, des intestins.
18. Maladies des reins, du cervelet, kystes pileux de l'ovaire, fœtus pétrifiés.
19. Acéphalocystes du foie, de la rate et du grand épiploon; maladies du foie et du péritoine, cancer mélanique de la main et du cœur, maladies du fœtus.
20. Maladies du cerveau, du cœur (*péricardite*), des os (*cancer*), de l'estomac (*cicatrices et perforation*).
21. Maladies des os (*cancer, exostose*) hernie du poumon, anévrysme du cœur. Maladies du cerveau (*apoplexie*), maladies des intestins.
22. Maladies du foie, maladies de la prostate, apoplexie du cœur, maladies de l'intestin grêle (*invagination*).
23. Maladies des os et des veines, tubercules cancéreux du foie, cancer de l'utérus.
24. Maladies de l'utérus (gangrène, apoplexie), cancer de la mamelle chez l'homme, productions cornées, hernie ombilicale.
25. Kyste de l'ovaire, maladies du cerveau, maladie du rectum, mal. des os (*luxation*), vice de conformation (*adhésions*).
26. Cancer des mamelles, maladie de la dure-mère, des os, déplacement de l'utérus, maladies de la prostate, des intestins.
27. Cancers de l'estomac des mamelles, de l'utérus, maladies des veines (*phlébite*), maladies des artères (*gangrène spontanée*).
28. Maladies des artères (*anévrysmes*), du cœur, maladies des os (*luxations du fémur*).
29. Maladies des os, cancer du cœur, maladies du foie, maladies du poumon (*pneumonie*).
30. Maladies de la vessie et de la prostate, des intestins (*entérite folliculeuse*), perforation du cœur, péricardite, tissu érectile accidentel des veines.
31. Érosions et ulcérations de l'estomac, cancer des mamelles, maladies du gros intestin, de la rate, hernies intestinales.
32. Maladies de la moelle épinière (*paraplégie*), maladies de la peau, maladie du poumon.
33. Maladies et cancer du rectum, maladies du cerveau (*apoplexie, céphalalgie*), tumeurs érectiles du crâne, vice de conformation du fœtus.
34. Maladies des articulations, maladies de l'estomac et des intestins, maladies des os (*Exostoses*), hernies de l'utérus.
35. Kystes acéphalocystes de la rate, maladies des nerfs, maladies de la protubérance annulaire, maladies du larynx, de la trachée et du corps thyroïde, maladies des veines (*phlébite*), maladie de la moelle épinière (*kyste hydatique, paraplégie*).
36. Maladies du cerveau (*apoplexie capillaire*), maladies du poumon (*mélanose, kystes acephalocystes*), maladies des reins (*calculs, kystes*), maladies de l'ovaire (*grossesse extra-utérine*).
37. Maladies du péritoine, maladies de l'utérus (*gangrène et abcès*); cancer gélatiniforme de l'estomac et de l'épiploon, cancer et abcès enkystés du foie; apoplexie capillaire, tubercules des nerfs du cerveau, hernie inguinale double.
38. Vices de conformation des mains; entérite folliculeuse, pseudo-membraneuse; maladies de la moelle épinière, de l'œsophage et des intestins.
39. Rétrécissement de l'urètre et hypertrophie de la vessie, maladies de l'utérus, du cerveau, de la moelle épinière, de la parotide, du larynx, des yeux; maladies du cœur.
40. Anévrysme, maladies du cœur, du foie, des intestins, vices de conformation, vertèbres.
41. Table générale alphabétique de l'ouvrage.

CRUVEILHIER. Traité d'anatomie pathologique générale, par J. CRUVEILHIER, professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1849-1856. 3 vol. in-8. 26 fr.

Tome II. Paris, 1852. 1 vol. in-8 de 920 pages. 9 fr.

Tome III, 1856. 1 vol. in-8 de 948 pages. 9 fr.

Tome IV et dernier, *sous presse*.

Cet ouvrage est l'exposition du Cours d'anatomie pathologique que M. Cruveilhier fait à la Faculté de médecine de Paris, comme son enseignement. Il est divisé en XVII classes, savoir : 1° solutions de continuité ; 2° adhésions ; 3° luxations ; 4° invaginations ; 5° hernies ; 6° déviations ; 7° corps étrangers ; 8° rétrécissements et oblitérations ; 9° lésions de canalisation par communication accidentelle ; 10° dilatations ; 11° hypertrophies et atrophies ; 12° métamorphoses et productions organiques analogues ; 13° hydropisies et flux ; 14° hémorrhagies ; 15° gangrène ; 16° lésions phlegmasiques ; 17° lésions strumeuses, et lésions carcinomateuses.

CIVIALE. Traité pratique des maladies des organes génito-urinaires, par le docteur CIVIALE, membre de l'Institut, de l'Académie impériale de médecine ; *nouvelle édition* augmentée. Paris, 1850-1851, 3 vol. in-8 avec figures. 24 fr.

Cet ouvrage, le plus pratique et le plus complet sur la matière, est ainsi divisé :

TOME I. Maladies de l'urèthre. TOME II. Maladies du col de la vessie et de la prostate. TOME III, Maladies du corps de la vessie.

CIVIALE. Traité pratique et historique de la lithotritie, par le docteur CIVIALE, membre de l'Institut, de l'Académie impériale de médecine, Paris, 1847, 1 vol. in-8, de 600 pages avec 8 planches. 8 fr.

Après trente années de travaux assidus sur une découverte chirurgicale qui a parcouru les principales phases de son développement, l'art de broyer la pierre s'est assez perfectionné pour qu'il soit permis de l'envisager sous le triple point de vue de la doctrine, de l'application et du résultat.

CIVIALE. De l'uréthrotomie ou de quelques procédés peu usités de traiter les rétrécissements de l'urèthre, par le docteur CIVIALE. Paris, 1849, in-8 de 124 pages avec une planche. 2 fr. 50

CIVIALE. Lettres sur la lithotritie, ou Broiement de la pierre dans la vessie, *pour servir de complément à l'ouvrage précédent*, par le docteur CIVIALE. Ire Lettre à M. Vincent Kern. Paris, 1827.— IIe Lettre. Paris, 1828.—IIIe Lettre. *Lithotritie uréthrale*. Paris, 1831.— IVe Lettre à M. Dupuytren. Paris, 1833. —Ve Lettre, 1837. — VIe Lettre, 1847, 6 parties, in-8. 10 fr.
Séparément les IIIe et IVe Lettres ; in-8. Prix de chaque : 1 fr. 50

CIVIALE. Parallèles des divers moyens de traiter les calculeux, contenant l'examen comparatif de la lithotritie et de la cystotomie, sous le rapport de leurs divers procédés, de leurs modes d'application, de leurs avantages ou inconvénients respectifs ; par le docteur CIVIALE. Paris, 1836, in-8, fig. 8 fr.

CLARCK. Traité de la consomption pulmonaire, comprenant des recherches sur les causes, la nature et le traitement des maladies tuberculeuses et scrofuleuses en général, par J. CLARCK, médecin consultant du roi des Belges ; etc., trad. de l'anglais par H. Lebeau, docteur-médecin. Paris, 1836, in-8. 6 fr.

COLIN. Traité de physiologie comparée des animaux domestiques, par M. G.-C. COLIN, chef du service d'anatomie et de physiologie à l'Ecole impériale vétérinaire d'Alfort. Paris, 1855-1856. 2 vol. grand in-8 de chacun 700 pages, avec 114 fig. intercalées dans le texte. 18 fr.

COLLADON. Histoire naturelle et médicale des casses, et particulièrement de la casse et des sénés employés en médecine ; par le docteur COLLADON. Montpellier, 1816. In-4, avec 19 planches. 4 fr.

COQUAND. Traité des roches considérées au point de vue de leur origine, de leur composition, de leur gisement et de leurs applications à la géologie et à l'industrie, suivi de la description des minerais qui fournissent les métaux utiles, par H. COQUAND, professeur de minéralogie et de géologie à la Faculté des sciences de Besançon. Paris, 1857, 1 vol. in-8 de 423 pages avec 72 figures intercalées dans le texte. 7 fr.

COSTE. Manuel de dissection, ou Éléments d'anatomie générale, descriptive et topographique, par le docteur E. COSTE, chef des travaux anatomiques et professeur de l'École de médecine de Marseille. Paris, 1847. 1 vol. in-8 de 700 pages. 8 fr.

DARCET. Recherches sur les abcès multiples et sur les accidents qu'amène la présence du pus dans le système vasculaire, suivies de remarques sur les altérations du sang, par le docteur F. DARCET, ancien interne des hôpitaux. Paris, 1843. In-4 de 88 pages. 2 fr. 50

DAREMBERG. Notices et extraits des manuscrits médicaux grecs, latins et français, des principales bibliothèques d'Europe. BIBLIOTHÈQUES D'ANGLETERRE. Paris, 1853. In-8. 7 fr.

DAREMBERG. Glossulæ quatuor magistrorum super chirurgiam Rogerii et Rolandi; et de Secretis mulierum, de chirurgia, de modo medendi libri septem, poema medicum; nunc primum ad fidem codicis Mazarinei, edidit doctor CH. DAREMBERG. Napoli, 1854. In-8 de 64-228-178 pages. 8 fr.

DE CANDOLLE. Collection de mémoires pour servir à l'histoire du règne végétal; par A.-P. DE CANDOLLE. Paris, 1828-1838. Dix parties en un volume in-4, avec 99 planches gravées. 30 fr.

Cette importante publication, servant de complément à quelques parties du *Prodromus regni vegetabilis*, comprend :

1° Famille des Mélastomacées, avec 10 pl.; — 2° Famille des Crassulacées, avec 13 pl.; — 3° et 4° Familles des Onagraires et des Paronychiées, avec 9 pl.; — 5° Famille des Ombellifères, avec 19 pl.; — 6° Famille de Loranthacées, avec 12 pl.; — 7° Famille des Valérianes, avec 4 pl.; — 8° Famille des Cactées, avec 12 pl.; — 9° et 10° Famille des Composées, avec 19 planches.

Chacun des six derniers mémoires se vend séparément. 4 fr.

DE LA RIVE. Traité d'électricité théorique et appliquée; par A.-A. DE LA RIVE, membre correspondant de l'Institut de France, ancien professeur de l'Académie de Genève. Paris, 1854-1858. 3 vol. in-8, avec 450 fig. intercalées dans le texte. 27 fr. — Séparément, les tomes II et III. — Prix de chaque volume. 9 fr.

Les nombreuses applications de l'électricité aux sciences et aux arts, les liens qui l'unissent à toutes les autres parties des sciences physiques ont rendu son étude indispensable au chimiste aussi bien qu'au physicien, au géologue autant qu'au physiologiste, à l'ingénieur comme au médecin : tous sont appelés à rencontrer l'électricité sur leur route, tous ont besoin de se familiariser avec son étude. Personne, mieux que M. de la Rive, dont le nom se rattache aux progrès de cette belle science, ne pouvait présenter l'exposition des connaissances acquises en électricité et de ses nombreuses applications aux sciences et aux arts.

DESALLE (E.). Coup d'œil sur les révolutions de l'hygiène, ou Considérations sur l'histoire de cette science et ses applications à la morale, par le docteur E. DESALLE. Paris, 1825. In-8. 1 fr. 50

DESAULT. Œuvres chirurgicales, ou Exposé de la doctrine et de la pratique de P.-J. Desault, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Paris; par XAV. BICHAT, troisième édition. Paris, 1830. 3 vol. in-8, avec 15 planches. 18 fr.

DESAYVRE. Études sur les **maladies des ouvriers de la manufacture d'armes de Chatellerault**. Paris, 1856, in-8 de 116 pages. 2 fr. 50

DESLANDES. De l'onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leurs rapports avec la santé, par le docteur L. DESLANDES. Paris, 1835. In-8. 7 fr.

DESHAYES. Description des Animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris, pour servir de supplément à la Description des coquilles fossiles des environs de Paris, comprenant une revue générale de toutes les espèces actuellement connues; par G.-P. DESHAYES, membre de la Société géologique de France. Paris, 1857-1858.

Cet important ouvrage formera environ 25 livraisons in-4, composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 planches. Les livraisons 1 à 12 sont publiées. Les autres livraisons paraîtront de six semaines en six semaines. Prix de chaque livraison. 5 fr.

DESFONTAINES. Flora atlantica, sive Historia plantarum, quæ in Atlante, agro Tunetano et Algeriensi crescunt. Paris, an VII. 2 vol. in-4, accompagnés de 261 planches dessinées par Redouté, et gravées avec le plus grand soin. 70 fr.

« Cet ouvrage, résultat de huit années d'études, et de l'examen de près de deux mille plantes, parmi lesquelles l'auteur compte jusqu'à trois cents espèces nouvelles, est demeuré comme une de ces bases fondamentales sur lesquelles a été bâti plus tard l'édifice, aujourd'hui si important, de la géographie botanique. » (*Éloge de Desfontaines*, par M. Flourens.)

DÉTILLY. Formulaire éclectique, comprenant un choix de formules peu connues et recueillies dans les écoles étrangères, des paradigmes indiquant tous les calculs relatifs aux formules, avec des tables de comparaison *tirées du calcul décimal*, des tables relatives aux doses des médicaments héroïques; tableaux des réactifs et des eaux minérales, un tableau des médications applicables à la méthode endermique et un choix de formules latines. Paris, 1839. 1 beau vol. in-18. 1 fr. 50

DICTIONNAIRE DES ANALYSES CHIMIQUES. *Voyez* VIOLETTE, pag. 47.

DICTIONNAIRE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE PRATIQUES, par MM. ANDRAL, BÉGIN, BLANDIN, BOUILLAUD, BOUVIER, CRUVEILHIER, CULLERIER, A. DEVERGIE, DESLANDES, DUGÈS, DUPUYTREN, FOVILLE, GUIBOURT, JOLLY, LALLEMAND, LONDE, MAGENDIE, MARTIN-SOLON, RATIER, RAYER, ROCHE, SANSON.

Ouvrage complet. Paris, 1830-1836, 15 vol. in-8 de 600 à 700 p. chacun. 75 fr.

DICTIONNAIRE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, COMMERCIALE ET AGRICOLE, par MM. BAUDRIMONT, BLANQUI aîné, COLLADON, CORIOLIS, DARCET, P. DÉSORMEAUX, DESPRETZ, FERRY, H. GAULTIER DE CLAUBRY, GOURLIER, T. OLIVIER, PARENT-DUCHATELET, SAINTE-PREUVE, SOULANGE-BODIN, A. TREBUCHET. Accompagné de 1183 figures intercalées dans le texte. *Ouvrage complet.* Paris, 1833-1841. 10 forts volumes in-8. 25 fr.

DICTIONNAIRE DES SCIENCES NATURELLES, dans lequel on traite méthodiquement des différents êtres de la nature, considérés soit en eux-mêmes, d'après l'état actuel de nos connaissances, soit relativement à l'utilité qu'en peuvent retirer la médecine, l'agriculture, le commerce et les arts; par les professeurs du Muséum d'histoire naturelle de Paris, sous la direction de G. et de FR. CUVIER.

Le *Dictionnaire des sciences naturelles* se compose : 1° du texte de 61 vol. in-8; 2° de l'atlas composé de 12 vol., contenant 1220 planches gravées; figures noires. Prix, au lieu de 670 fr. : 175 fr.

— Avec l'atlas, figures coloriées. Prix, au lieu de 1,200 fr. : 350 fr.

Devenus propriétaires du petit nombre d'exemplaires restant de ce bel et bon livre, qui est sans contredit le plus vaste et le plus magnifique monument qui ait été élevé aux sciences naturelles, et dans le désir d'en obtenir l'écoulement rapide, nous nous sommes décidés à l'offrir à un rabais de plus des trois quarts.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE MATIÈRE MÉDICALE ET DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE, contenant l'indication, la description et l'emploi de tous les médicaments connus dans les diverses parties du globe; par F.-V. MÉRAT et A.-J. DELENS, membres de l'Académie impériale de médecine. *Ouvrage complet.* Paris, 1829-1846. 7 vol. in-8. y compris le **supplément**. 20 fr.

Le *Tome VII* ou *Supplément*, Paris, 1846, 1 vol. in-8 de 800 pages, ne se vend pas séparément.

Pour donner une idée du cadre immense qu'ont embrassé les auteurs de ce Dictionnaire, fruit de vingt années de recherches, il nous suffit d'indiquer que, selon l'importance du sujet, l'histoire de chaque médicament comprend:

1° Noms linnéen, officinal, commercial, vulgaire, ancien et moderne dans les diverses langues, définition. 2° Découverte historique: gisement ou lieu natal; extraction ou récolte; état commercial espèces, variétés, sortes, qualités. 3° Description pharmacologique; choix, préparation pharmaceutique; altération, sophistications, substitution. 4° Analyse chimique. 5° Action immédiate et médication chez l'homme et les animaux, dans l'état sain et dans l'état morbide; effets thérapeutiques; doses; formes; mode d'administration, adjuvants et correctifs, indications et contre-indications; inconvénients. 6° Opinions diverses des auteurs; classification. 7° Combinaisons; mélanges; composés pharmaceutiques. 8° Bibliographie, article important qui manque dans les ouvrages analogues.

Cet ouvrage immense contient non seulement l'histoire complète de tous les médicaments des trois règnes sans oublier les agents de la physique, tels que l'air, le calorique, l'électricité, etc., les produits chimiques, les *eaux minérales et artificielles*, décrites au nombre de 1800 (c'est-à-dire le double au moins de ce qu'en contiennent les Traités spéciaux); mais il renferme de plus l'Histoire des poisons, des miasmes, des virus, des venins considérés particulièrement sous le point de vue du traitement spécifique des accidents qu'ils déterminent; enfin celle des aliments envisagés sous le rapport de la diète et du régime dans les maladies; des articles généraux, relatifs aux classes des médicaments et des produits pharmaceutiques, aux familles naturelles et aux genres, animaux et végétaux. Une vaste synonymie embrasse tous les noms scientifiques, officinaux, vulgaires, français et étrangers, celle même *de pays*, c'est-à-dire les noms médicamenteux particulièrement propres à telle ou telle contrée, afin que les voyageurs, cet ouvrage à la main, puissent rapporter à des noms certains les appellations les plus barbares.

DICTIONNAIRE DE MÉDECINE, DE CHIRURGIE, DE PHARMACIE ET DES SCIENCES ACCESSOIRES. *Voyez* NYSTEN, page 36.

DIDAY. Exposition critique et pratique des nouvelles doctrines sur la syphilis, suivie d'un Essai sur de nouveaux moyens préservatifs des maladies vénériennes, par le docteur P. DIDAY, ex-chirurgien en chef de l'Antiquaille, secrétaire général de la Société de médecine de Lyon. Paris, 1858. 1 vol. in-18 jésus de 560 pages. 4 fr.

Cet ouvrage comprend seize lettres dont voici le sujet : Ire lettre. Du virus syphilitique. — IIe lettre. Nature et conséquences de la Blennorrhagie. — IIIe lettre. Thérapeutique de la Blennorrhagie. — IVe lettre. De la Balanite. — Ve lettre. Du Chancre et de ses rapports avec la syphilis constitutionnelle. — VIe lettre. Du Bubon. — VIIe lettre. Du Bubon d'emblée. — VIIIe lettre. Des Végétations. — IXe lettre. Syphilis constitutionnelle. Epoque d'apparition. — Xe lettre. Ordre et succession des symptômes de la syphilis constitutionnelle. — XIe lettre. Unicité de la vérole constitutionnelle dans une existence humaine.— XIIe lettre. De la syphilis congéniale.— XIIIe et XIVe lettres. Transmission des symptômes constitutionnels. — XVe lettre. Des tumeurs testiculaires, suite de maladies vénériennes. — XVIe lettre. Moyens préservatifs des maladies vénériennes.

DONNÉ. Cours de microscopie complémentaire des études médicales : Anatomie microscopique et physiologie des fluides de l'économie ; par le docteur A. DONNÉ, recteur de l'académie de Montpellier, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, professeur de microscopie. Paris, 1844. in-8 de 500 pages. 7 fr. 50

DONNÉ. Atlas du Cours de microscopie, exécuté d'après nature au microscope-daguerréotype, par le docteur A. DONNÉ et L. FOUCAULT. Paris, 1846. In-folio de 20 planches, contenant 80 figures gravées avec le plus grand soin, avec un texte descriptif. 30 fr.

C'est pour la première fois que les auteurs, ne voulant se fier ni à leur propre main, ni à celle d'un dessinateur, ont eu la pensée d'appliquer la merveilleuse découverte du daguerréotype à la représentation des sujets scientifiques; c'est un avantage qui sera apprécié des observateurs, que celui d'avoir pu reproduire les objets tels qu'ils se trouvent disséminés dans le champ microscopique, au lieu de se borner au choix de quelques échantillons, comme on le fait généralement, car dans cet ouvrage tout est reproduit avec une fidélité rigoureuse inconnue jusqu'ici, au moyen des procédés photographiques.

DONNÉ. Conseils aux mères sur l'allaitement et sur la manière d'élever les enfants nouveau-nés, par le docteur A. DONNÉ. *Deuxième édition*, corrigée et augmentée. Paris, 1846, grand in-18. 3 fr.

DUBOIS. Histoire philosophique de l'hypochondrie et de l'hystérie, par F. DUBOIS (d'Amiens), secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1837. In-8. 7 fr. 50

DUBOIS et BURDIN. Histoire académique du magnétisme animal, accompagnée de notes et de remarques critiques sur toutes les observations et expériences faites jusqu'à ce jour, par C. BURDIN et F. DUBOIS (d'Amiens), membres de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1841. in-8 de 700 pages. 8 fr.

DUBREUIL. Des anomalies artérielles considérées dans leur rapport avec la pathologie et les opérations chirurgicales, par le docteur J. DUBREUIL, professeur d'anatomie à la Faculté de médecine de Montpellier. Paris, 1847. 1 vol. in-8 et atlas in-4 de 17 planches coloriées. 20 fr.

DUCHENNE. De l'électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique ; par le docteur DUCHENNE (de Boulogne), lauréat de l'Institut de France. Paris, 1855. 1 vol. in-8 de 939 pages avec 108 figures intercalées dans le texte. 11 fr.

Cet ouvrage est divisé en quatre parties. L'auteur y expose : 1o l'art de localiser la puissance électrique dans les organes; 2o l'étude de la physiologie musculaire éclairée par l'expérimentation électro-physiologique et pathologique; 3o de l'application de l'électrisation localisée à la pathologie; 4o les résultats thérapeutiques de l'électrisation localisée dans le traitement d'un grand nombre d'affections, par exemple : des paralysies cérébrales, des paralysies saturnines, rhumatismales, hystériques, des hyperesthésies, des névralgies; la paralysie et la contracture du diaphragme. l'atrophie musculaire graisseuse progressive, l'atrophie musculaire graisseuse de l'enfance, l'étude électro-physiologique et pathologique des muscles de l'épaule, etc., etc.

DUFOUR. Recherches anatomiques et physiologiques sur les hémiptères, accompagnées de considérations relatives à l'histoire naturelle et à la classification de ces insectes; par LÉON DUFOUR, D. M. P., membre correspondant de l'Institut. Paris, 1833, in-4, avec 19 planches gravées. 25 fr.

DUGAT. Études sur le traité de médecine d'Aboudjafar Ah'Mad, intitulé : *Zad Al Mocafir*, « la Provision du voyageur, » par G. DUGAT, membre de la Société asiatique. Paris, 1853, in-8 de 64 pages. 2 fr. 50

DUGÈS. Mémoire sur la conformité organique dans l'échelle animale, par ANT. DUGÈS. Paris, 1832, in-4, avec 6 planches. 6 fr.

DUGÈS. Recherches sur l'ostéologie et la myologie des **batraciens** à leurs différents âges, par A. DUGÈS. *Ouvrage couronné par l'Institut de France.* Paris, 1834, in-4, avec 20 planches gravées. 10 fr.

DUGÈS. Traité de physiologie comparée de l'homme et des animaux, par A. DUGÈS. Montpellier, 1838. 3 vol. in-8, figures. 18 fr.

DUPUYTREN. Mémoire sur une manière nouvelle de pratiquer l'opération de la pierre; par le baron G. DUPUYTREN, terminé et publié par M. L.-J. SANSON, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, et L.-J. BÉGIN, chirurgien en chef de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Paris, 1836. 1 vol. grand in-folio, accompagné de 10 belles planches lithographiées par Jacob, et représentant l'anatomie chirurgicale des diverses régions intéressées dans cette opération. 12 fr.

« Je lègue à MM. Sanson aîné et Bégin le soin de terminer et de publier un ouvrage déjà en partie imprimé sur la taille de Celse, et d'y ajouter la description d'un moyen nouveau d'arrêter les hémorrhagies. » *Testament de Dupuytren.*

DUTROCHET. Mémoires pour servir à l'histoire anatomique et physiologique des **végétaux et des animaux**, par H. DUTROCHET, membre de l'Institut. *Avec cette épigraphe :* « Je considère comme non avenu tout ce que j'ai publié précédemment sur ces matières qui ne se trouve point reproduit dans cette collection. » Paris, 1837. 2 forts vol. in-8, avec atlas de 30 planches gravées. 12 fr.

Dans cet ouvrage M. Dutrochet a réuni et coordonné l'ensemble de tous ses travaux : il contient non seulement les mémoires publiés à diverses époques, revus, corrigés et appuyés de nouvelles expériences, mais encore un grand nombre de travaux inédits.

ENCYCLOPÉDIE ANATOMIQUE, comprenant l'Anatomie descriptive, l'Anatomie générale, l'Anatomie pathologique, l'histoire du Développement, par G.-T. Bischoff, J. Henle, E. Huschke, S.-T. Sœmmerring, F.-G. Theile, G. Valentin, J. Vogel, G. et E. Weber; traduit de l'allemand, par A.-J.-L. JOURDAN, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1843-1846. 8 forts vol. in-8. Prix de chaque volume (en prenant tout l'ouvrage). 7 fr. 50
Prix des deux atlas in-4 7 fr. 50

On peut se procurer chaque Traité séparément, savoir :

1° **Ostéologie et syndesmologie**, par S.-T. SOEMMERRING. — Mécanique des organes de la locomotion chez l'homme, par G. et E. WEBER. In-8, Atlas in-4 de 17 planches. 12 fr.

2° **Traité de myologie et d'angéiologie**, par F.-G. THEILE. 1 vol. in-8. 7 fr. 50

3° **Traité de névrologie**, par G. VALENTIN. 1 vol. in-8, avec figures. 8 fr.

4° **Traité de splanchnologie des organes des sens**, par E. HUSCHKE. Paris, 1845. In-8 de 850 pages, avec 5 planches gravées. 8 fr. 50

5° **Traité d'anatomie générale**, ou Histoire des tissus de la composition chimique du corps humain, par HENLE. 2 vol. in-8, avec 5 planches gravées. 15 fr.

6° **Traité du développement de l'homme** et des mammifères, suivi d'une *Histoire du développement de l'œuf du lapin*, par le docteur T.-L.-G. BISCHOFF. 1 vol. in-8, avec atlas in-4 de 16 planches. 15 fr.

7° **Anatomie pathologique générale**, par J. VOGEL. Paris, 1846. 1 vol. in-8. 7 fr. 50

Cette *Encyclopédie anatomique*, réunie au *Traité de physiologie* de J. MULLER, forme un ensemble complet des deux sciences sur lesquelles repose l'édifice entier de la médecine.

ESPANET. Études élémentaires d'homœopathie, complétées par des applications pratiques, à l'usage des médecins, des ecclésiastiques, des communautés religieuses, des familles, etc., par le frère Alexis ESPANET. Paris, 1856. In-18 de 380 pages. 4 fr. 50

2

ESQUIROL. Des maladies mentales, considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal, par E. ESQUIROL, médecin en chef de la Maison des aliénés de Charenton, membre de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1838, 2 vol. in-8, avec un atlas de 27 planches gravées. 20 fr.

« L'ouvrage que j'offre au public est le résultat de quarante ans d'études et d'observations. J'ai observé les symptômes de la Folie et j'ai essayé les meilleures méthodes de traitement; j'ai étudié les mœurs, les habitudes et les besoins des aliénés, au milieu desquels j'ai passé ma vie : m'attachant aux faits, je les ai rapprochés par leurs affinités, je les raconte tels que je les ai vus. J'ai rarement cherché à les expliquer, et je me suis arrêté devant les systèmes qui m'ont toujours paru plus séduisants par leur éclat qu'utiles par leur application. » *Extrait de la préface de l'auteur.*

FABRE. Bibliothèque du médecin praticien, *voyez* **Bibliothèque**, page 5.

† **FÉRUSSAC et DESHAYES. Histoire naturelle générale et particulière des mollusques,** tant des espèces qu'on trouve aujourd'hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles qui n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et leurs coquilles ; par M. de FÉRUSSAC et G.-P. DESHAYES. *Ouvrage complet* en 42 livraisons, chacune de 6 planches in-folio, gravées et coloriées d'après nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851. 4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages de texte et 2 volumes contenant 247 planches coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.

— *Le même*, 4 vol. grand in-4, avec 247 planches noires. Au lieu de 600 fr. 200 fr.

Demi-reliure, dos de veau. Prix des 4 vol. in-fol., 40 fr. — Cartonnés. 24 fr.

Dito Prix des 4 vol. gr. in-4, 24 fr. Cartonnés. 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livraisons (jusques et y compris la 34e) pourront se les procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4, figures noires, au lieu de 15 fr., à raison de 6 fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se compose : 1° de 72 pages de texte in-folio ; 2° de 6 planches gravées, imprimées en couleur et retouchées au pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque livraison. 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4, avec les planches en noir. 15 fr.

Ouvrage le plus magnifique qui existe sur l'histoire des mollusques ; la perfection des figures et l'exactitude des descriptions le placent au premier rang des beaux et bons livres qui doivent composer la bibliothèque de tous les amateurs de coquilles. C'est aidé du concours de M. Deshayes que nous avons terminé cette publication. Nous avons pensé que la haute position scientifique de M. Deshayes, dont les travaux font justement autorité en conchyliologie, était la meilleure garantie que nous pussions offrir au public.

M. Deshayes a publié les livraisons 29 à 42 ; elles comprennent :

1° 85 planches qui sont venues combler toutes les lacunes laissées par M. de Férussac dans l'ordre des numéros, en même temps qu'elles complètent plusieurs genres importants et font connaître les espèces de coquilles les plus récentes ;

2° Le texte (tome Ier complet, 402 pages. — Tome II, 1re partie. Nouvelles additions à la famille des Limaces, 24 pages. — Historique, p. 129 à 184. — Tome II, 2e partie, 260 pages). Ce texte de M. Deshayes présente la description de toutes les espèces figurées dans l'ouvrage ;

3° Une table générale alphabétique de l'ouvrage ;

4° Une table de classification des 247 planches, à l'aide de laquelle tous les possesseurs de l'ouvrage pourront vérifier si leur exemplaire est complet ou ce qui lui manque.

† **FÉRUSSAC et D'ORBIGNY. Histoire naturelle générale et particulière des céphalopodes** acétabulifères vivants et fossiles, comprenant la description zoologique et anatomique de ces mollusques, des détails sur leur organisation, leurs mœurs, leurs habitudes et l'histoire des observations dont ils ont été l'objet depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, par M. de FÉRUSSAC et ALC. D'ORBIGNY. Paris, 1836-1848. 2 vol. in-folio dont un de 144 planches coloriées, cartonnés. Prix, au lieu de 500 francs. 120 fr.

— *Le même ouvrage*, 2 vol. grand in-4, dont un de 144 pl. color., cartonnés. 80 fr.

Ce bel ouvrage est complet ; il a été publié en 21 livraisons. Les personnes qui n'auraient pas reçu les dernières livraisons pourront se les procurer séparément, savoir : l'édition in-4, à raison de 6 fr. la livraison ; l'édition in-folio, à raison de 12 fr. la livraison.

FEUCHTERSLEBEN. Hygiène de l'âme, par M. DE FEUCHTERSLEBEN, professeur à la Faculté de médecine de Vienne, ancien ministre de l'instruction publique en Autriche, traduit de l'allemand, sur la *neuvième édition*, par le docteur *Schlesinger-Rahier*. Paris, 1854. 1 vol. in-8 de 190 pages. 2 fr.

L'auteur a voulu, par une alliance de la morale et de l'hygiène, étudier, au point de vue pratique, l'influence de l'âme sur le corps humain et ses maladies. Exposé avec ordre et clarté, et empreint de cette douce philosophie morale qui caractérise les œuvres des penseurs allemands, cet ouvrage n'a pas d'analogue en France; il sera lu et médité par toutes les classes de la société.

FIÉVÉE. Mémoires de médecine pratique, comprenant : 1° De la fièvre typhoïde et de son traitement; 2° De la saignée chez les vieillards comme condition de santé; 3° Considérations étiologiques et thérapeutiques sur les maladies de l'utérus; 4° De la goutte et de son traitement spécifique par les préparations de colchique. Par le docteur FIÉVÉE (de Jeumont), membre de l'Académie royale de médecine de Belgique. Paris, 1845, in-8. 2 fr. 50

FITZ-PATRICK. Traité des avantages de l'équitation, considérée dans ses rapports avec la médecine. Paris, 1838, in-8. 2 fr. 50

FLOURENS. Recherches expérimentales sur les fonctions et les propriétés du système nerveux, par P. FLOURENS, professeur au Muséum d'histoire naturelle et au Collége de France, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de l'Institut, etc. *Deuxième édition augmentée*. Paris, 1842, in-8. 7 fr. 50

FLOURENS. Cours de physiologie comparée. De l'ontologie ou étude des êtres. Leçons professées au Muséum d'histoire naturelle par P. FLOURENS, recueillies et rédigées par CH. ROUX, et revues par le professeur. Paris, 1856, in-8. 3 fr. 50

FLOURENS. Mémoires d'anatomie et de physiologie comparées, contenant des recherches sur 1° les lois de la symétrie dans le règne animal; 2° le mécanisme de la rumination; 3° le mécanisme de la respiration des poissons; 4° les rapports des extrémités antérieures et postérieures de l'homme, les quadrupèdes et les oiseaux; par P. FLOURENS. Paris, 1844; grand in-4, avec 8 planches gravées et coloriées. 18 fr.

FLOURENS. Théorie expérimentale de la formation des os, par P. FLOURENS. Paris, 1847, in-8, avec 7 planches gravées. 7 fr. 50

FLOURENS. Histoire de la découverte de la circulation du sang, par P. FLOURENS, professeur au Muséum d'histoire naturelle et au Collége de France. Paris, 1854, in-12. 3 fr.

FOISSAC. De la météorologie dans ses rapports avec la science de l'homme, et principalement avec la médecine et l'hygiène publique, par le docteur P. FOISSAC, membre de la Société météorologique de France. Paris, 1854. 2 vol. in-8. 15 fr.

FONSSAGRIVES. Traité d'hygiène navale, ou de l'influence des conditions physiques et morales dans lesquelles l'homme de mer est appelé à vivre, et des moyens de conserver sa santé, par le docteur J.-B. FONSSAGRIVES, professeur à l'École de médecine navale de Brest. Paris, 1856, in-8 de 800 pages, illustré de 57 planches intercalées dans le texte. 10 fr.

Cet ouvrage, qui comble une importante lacune dans nos traités d'hygiène professionnelle, est divisé en six livres. LIVRE Ier : Le navire étudié dans ses matériaux de construction, ses approvisionnements, ses chargements et sa topographie. LIVRE II : L'homme de mer envisagé dans ses conditions de recrutement, de profession, de travaux, de mœurs, d'hygiène personnelle, etc. LIVRE III : Influences qui dérivent de l'habitation nautique : mouvements du bâtiment, atmosphère, encombrement, moyens d'assainissement du navire, et hygiène comparative des diverses sortes de bâtiments. LIVRE IV : Influences extérieures au navire, c'est-à-dire influences pélagiennes, climatériques et sidérales, et hygiène des climats excessifs. LIVRE V : Bromatologie nautique : eaux potables, eau distillée, boissons alcooliques, aromatiques, acidules, aliments exotiques. Parmi ces derniers, ceux qui présentent des propriétés vénéneuses permanentes ou accidentelles sont étudiés avec le plus grand soin. LIVRE VI : Influences morales, c'est-à-dire régime moral, disciplinaire et religieux de l'homme de mer.

FORGET. Traité de l'entérite folliculeuse (fièvre typhoïde), par C.-P. FORGET, professeur de clinique médicale à la Faculté de Strasbourg, président des jurys médicaux, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1841, in-8 de 850 pages. 6 fr.

FOURNET. Recherches cliniques sur l'auscultation des organes respiratoires et sur la première période de la phthisie pulmonaire, faites dans le service de M. le professeur ANDRAL, par le docteur J. FOURNET, chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, etc. Paris, 1839. 2 vol. in-8. 8 fr.

FRANK. Traité de médecine pratique de P.-J. FRANK, traduit du latin par J.-M.-C. GOUDAREAU, docteur en médecine; *deuxième édition revue, augmentée* des Observations et Réflexions pratiques contenues dans l'INTERPRETATIONES CLINICÆ, accompagné d'une *Introduction* par M. le docteur DOUBLE, membre de l'Institut, de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1842, 2 forts volumes grand in-8 à deux colonnes. 24 fr.

Le Traité de médecine pratique de J.-P. Frank, résultat de cinquante années d'observations et d'enseignement public dans les chaires de clinique des Universités de Pavie, Vienne et Wilna, a été composé, pour ainsi dire, au lit du malade. Dès son apparition, il a pris rang parmi les livres qui doivent composer la bibliothèque du médecin praticien, à côté des œuvres de Sydenham, de Baillou, de Van-Swiéten, de Stoll, de De Haen, de Cullen, de Borsieri, etc.

FRÉDAULT. Des rapports de la doctrine médicale homœopathique avec le passé de la thérapeutique. par le docteur FRÉDAULT, ancien interne lauréat des hôpitaux civils de Paris, 1852, in-8 de 84 pages. 1 fr. 50

FRÉGIER. Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures; ouvrage récompensé en 1838 par l'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques); par A. FRÉGIER, chef de bureau à la préfecture de la Seine. Paris, 1840, 2 beaux vol. in-8. 14 fr.

L'ouvrage que nous annonçons touche aux intérêts les plus graves de la société: il se rattache tout à la fois à la physiologie, à l'hygiène et à l'économie sociale; car, à côté de la population riche, à côté des classes laborieuses et des classes pauvres, les grandes villes renferment forcément des *classes dangereuses*. L'oisiveté, le jeu, le vagabondage, la prostitution, la misère, grossissent sans cesse le nombre de ceux que la police surveille et que la justice attend. Ils habitent des quartiers particuliers; ils ont un langage, des habitudes, des désordres, une vie qui leur est propre.

FURNARI. Traité pratique des maladies des yeux, contenant : 1° l'histoire de l'ophthalmologie; 2° l'exposition et le traitement raisonné de toutes les maladies de l'œil et de ses annexes; 3° l'indication des moyens hygiéniques pour préserver l'œil de l'action nuisible des agents physiques et chimiques mis en usage dans les diverses professions; les nouveaux procédés et les instruments pour la guérison du strabisme; des instructions pour l'emploi des lunettes et l'application de l'œil artificiel; suivi de conseils hygiéniques et thérapeutiques sur les maladies des yeux, qui affectent particulièrement les hommes d'État, les gens de lettres et tous ceux qui s'occupent de travaux de cabinet et de bureau. Paris, 1841, in-8, avec pl. 6 fr.

GALIEN. Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, traduites sur les textes imprimés et manuscrits; accompagnées de sommaires, de notes, de planches et d'une table des matières, précédées d'une Introduction ou étude biographique littéraire et scientifique sur Galien, par le docteur CH. DAREMBERG, bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine. Paris, 1854-1857. 4 vol. grand in-8.— Tomes I et II gr. in-8 de 800 pages. Prix de chaque. 10 fr.
Tome III sous presse.

Cette importante publication comprend: 1° Études biographiques, littéraires, sur Galien; 2° Traité de l'utilité des parties; 3° Livres inédits des administrations anatomiques; 4° des Lieux affectés; 5° Thérapeutique à Glaucon; 6° des Facultés naturelles; 7° du Mouvement des muscles; 8° Introduction à la médecine; 9° Exhortations à l'étude des arts; 10° des Sectes; 11° le Bon Médecin est philosophe; 12° des Habitudes; 13° des Fragments de divers traités non traduits en entier.

GALL. Sur les fonctions du cerveau et sur celles de chacune de ses parties, avec des observations sur la possibilité de reconnaître les instincts, les penchants, les talents, ou les dispositions morales et intellectuelles des hommes et des animaux, par la configuration de leur cerveau et de leur tête; par le docteur F.-J. GALL. Paris, 1825. 6 forts vol. in-8. 42 fr.

GALTIER. Traité de pharmacologie et de l'art de formuler, par C.-P. GALTIER, docteur en médecine de la Faculté de Paris, professeur de pharmacologie, de matière médicale et de toxicologie, etc. Paris, 1841, in-8. 4 fr. 50

GALTIER. Traité de matière médicale et des indications thérapeutiques des médicaments, par C.-P. GALTIER. Paris, 1841. 2 forts vol. in-8. 10 fr.

GARNIER et HAREL. Des falsifications des substances alimentaires et des moyens chimiques de les reconnaître. Paris, 1844, in-12 de 528 pages. 4 fr. 50

GAUBIL. Catalogue synonymique des Coléoptères d'Europe et d'Algérie, par M. GAUBIL, membre de la Société entomologique de France. Paris, 1849, 1 vol. in-8. 12 fr. *Ouvrage le plus complet et qui offre le plus grand nombre d'espèces nouvelles.*

GAULTIER DE CLAUBRY. De l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde, par le docteur E. GAULTIER DE CLAUBRY, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1844, in-8 de 500 pages. 2 fr.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE. Histoire générale et particulière des **Anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux**, ouvrage comprenant des recherches sur les caractères, la classification, l'influence physiologique et pathologique, les rapports généraux, les lois et causes des **Monstruosités**, des variétés et vices de conformation ou *Traité de tératologie;* par Isid. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, D. M. P., membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle. Paris, 1832-1836. 3 vol. in-8 et atlas de 20 planches lithog. 27 fr.

— Séparément les tomes 2 et 3. 16 fr.

GEORGET. Discussion médico-légale sur la folie ou Aliénation mentale, suivie de l'Examen du procès criminel d'Henriette Cornier et de plusieurs autres procès dans lesquels cette maladie a été alléguée comme moyen de défense, par E. GEORGET, D. M. P. Paris, 1826, in-8. 3 fr. 50

GÉRANDO. De l'éducation des sourds-muets de naissance, par de GÉRANDO, membre de l'Institut, administrateur et président de l'Institution des sourds-muets. Paris, 1827. 2 forts vol. in-8. 16 fr.

GERDY. Traité des bandages, des pansements et de leurs appareils, par le docteur P.-N. GERDY, professeur de chirurgie à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital de la Charité, membre de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1837-1839. 2 vol. in-8 et atlas de 20 planches in-4. 18 fr.

GERDY. Essai de classification naturelle et d'analyse des phénomènes de la vie, par le docteur P.-N. GERDY. Paris, 1823, in-8. 1 fr.

GIRARD. Considérations physiologiques et pathologiques sur les **affections nerveuses**, dites *hystériques*, par H. GIRARD (de Lyon), D. M. P., médecin en chef, directeur de l'hospice des aliénés d'Auxerre, etc. Paris, 1841, in-8. 2 fr.

GODDE. Manuel pratique des maladies vénériennes des hommes, des femmes et des enfants, suivi d'une pharmacopée syphilitique, par M. GODDE, de Liancourt, D. M., membre de plusieurs sociétés savantes. Paris, 1834, in-18. 3 fr.

GORY et PERCHERON. Monographie des Cétoines et genres voisins, formant, dans les familles de Latreille, la division des Scarabées mélitophiles; par H. GORY et A. PERCHERON, membres de la Société entomologique de Paris. Paris, 1832-1836. Ce bel ouvrage est complet : il a été publié en 15 livraisons formant un fort volume in-8, accompagné de 77 planches coloriées avec le plus grand soin. 60 fr.

GRATIOLET. Anatomie comparée du système nerveux. Voyez LEURET et GRATIOLET, page 30.

GRENIER et GODRON. Flore de France, ou description des plantes qui croissent naturellement en France et en Corse; par GRENIER et GODRON, professeurs aux Facultés des sciences de Besançon et de Nancy. Paris, 1848-1856. 3 forts vol. in-8 de chacun 800 pages, publiés en six parties. 42 fr.

GRIESSELICH. Manuel pour servir à l'étude critique de l'homœopathie, par le docteur GRIESSELICH, rédacteur du journal *l'Hygæ*, traduit de l'allemand, par le docteur SCHLESINGER. Paris, 1849. 1 vol. in-12. 5 fr.

GRISOLLE. Traité pratique de la pneumonie aux différents âges et dans ses rapports avec les autres maladies aiguës et chroniques, par A. GRISOLLE, médecin de l'Hôtel-Dieu, professeur de la Faculté de médecine, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1841, in-8 de 750 pages. 8 fr.

GUIBOURT. Histoire naturelle des drogues simples, ou Cours d'histoire naturelle professé à l'École de pharmacie de Paris, par J.-B. GUIBOURT, professeur à l'École de pharmacie, membre de l'Académie impériale de médecine. *Quatrième édition*, corrigée et considérablement augmentée. Paris, 1849-1851. 4 forts volumes in-8, avec 800 figures intercalées dans le texte. 30 fr.

L'Histoire des minéraux a reçu une très grande extension : le tome Ier tout entier est consacré à la *Minéralogie*, et forme un traité complet de cette science considérée dans ses applications aux arts et à la pharmacie ; les tomes II et III comprennent la *Botanique* ou l'Histoire des végétaux ; le tome IV comprend la *Zoologie* ou l'Histoire des animaux et de leurs produits ; il est terminé par une *table générale alphabétique* très étendue. Une addition importante, c'est celle de plus de 800 figures intercalées dans le texte, toutes exécutées avec le plus grand soin.

GUIBOURT. Pharmacopée raisonnée, ou Traité de pharmacie pratique et théorique, par N.-E. HENRY et J.-B. GUIBOURT ; *troisième édition*, revue et considérablement augmentée, par J.-B. GUIBOURT, professeur à l'École de pharmacie, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1847, in-8 de 800 pages à deux colonnes, avec 22 planches. 8 fr.

GUIBOURT. Manuel légal des pharmaciens et des élèves en pharmacie, ou Recueil des lois, arrêtés, règlements et instructions concernant l'enseignement, les études et l'exercice de la pharmacie, et comprenant le Programme des cours de l'École de pharmacie de Paris, par N.-J.-B.-G. GUIBOURT, professeur secrétaire de l'École de pharmacie de Paris, etc. Paris, 1852. 1 vol. in-12 de 230 pages. 2 fr.

Cet ouvrage est divisé en deux parties : la *première* pour les lois et règlements qui ont trait à l'administration des écoles de pharmacie, aux rapports des écoles avec les élèves et les pharmaciens exerçants ; là se trouve naturellement le *Programme des cours de l'École de pharmacie de Paris*, et, sous le titre de *Bibliothèque du Pharmacien*, l'indication des meilleurs ouvrages à consulter ; puis ce qui a rapport au service de santé des hôpitaux et à l'Académie impériale de médecine ; la *seconde partie* pour les lois et règlements qui se rapportent exclusivement à l'exercice de la pharmacie. Le tout accompagné de notes explicatives et de commentaires dont une longue expérience dans la pratique et dans l'enseignement a fait sentir l'utilité.

Dans une *troisième partie* se trouvent résumés les *desiderata*, ou les améliorations généralement réclamées pour une nouvelle organisation de la pharmacie.

GUILLOT. Exposition anatomique de l'organisation du centre nerveux dans les quatre classes d'animaux vertébrés, par le docteur Nat. GUILLOT, médecin de l'hôpital Necker, professeur à la Faculté de médecine de Paris. (Ouvrage couronné par l'Académie royale des sciences de Bruxelles.) Paris, 1844, in-4 de 370 pages avec 18 planches, contenant 224 figures. 16 fr.

GUISLAIN. Leçons orales sur les phrénopathies, ou Traité théorique et pratique sur les maladies mentales. Cours donné à la clinique des établissements d'aliénés de Gand, par le docteur J. GUISLAIN, professeur de l'Université de Gand. 1852, 3 vol. in-8 avec figures. 21 fr.

GUNTHER. Nouveau manuel de médecine vétérinaire homœopathique, ou Traitement homœopathique des maladies du cheval, du bœuf, de la brebis, du porc, de la chèvre et du chien, à l'usage des vétérinaires, des propriétaires ruraux, des fermiers, des officiers de cavalerie et de toutes les personnes chargées du soin des animaux domestiques, par F.-A. GUNTHER. Traduit de l'allemand sur la troisième édition, par P.-J. MARTIN, médecin vétérinaire, ancien élève des écoles vétérinaires. Paris, 1846, in-8. 6 fr.

HAAS. Mémorial du médecin homœopathe, ou Répertoire alphabétique de traitements et d'expériences homœopathiques, pour servir de guide dans l'application de l'homœopathie au lit du malade, par le docteur HAAS. Traduit de l'allemand par A.-J.-L. JOURDAN. *Deuxième édit.*, revue et augmentée. Paris, 1850, in-18. 3 fr.

HAHNEMANN. Exposition de la doctrine médicale homœopathique, ou Organon de l'art de guérir, par S. HAHNEMANN ; traduit de l'allemand, sur la dernière édition, par le docteur A.-J.-L. JOURDAN. *Quatrième édition*, augmentée de **Commentaires** par le docteur LÉON SIMON, et précédée d'une notice sur la vie et les travaux de S. HAHNEMANN, accompagnée de son portrait gravé sur acier. Paris, 1856, 1 vol. in-8, de 568 pages. 8 fr.

HAHNEMANN. Études de médecine homœopathique, par le docteur HAHNEMANN. Opuscules servant de complément à ses œuvres. Paris, 1855. 2 séries publiées chacune en 1 vol. in-8 de 600 pages. Prix de chaque. 7 fr.

Les ouvrages qui composent la PREMIÈRE SÉRIE sont : 1° Traité de la maladie vénérienne; 2° Esprit de la doctrine homœopathique; 3° La médecine de l'expérience; 4° L'observateur en médecine; 5° Esculape dans la balance; 6° Lettres à un médecin de haut rang sur l'urgence d'une réforme en médecine; 7° Valeur des systèmes en médecine, considérés surtout eu égard à la pratique qui en découle; 8° Conseils à un aspirant au doctorat; 9° L'allopathie, un mot d'avertissement aux malades; 10° Réflexions sur les trois méthodes accréditées de traiter les maladies; 11° Les obstacles à la certitude; 12° Examen des sources de la matière médicale ordinaire; 13° Des formules en médecine; 14° Comment se peut-il que de faibles doses de médicaments aussi étendus que ceux dont se sert l'homœopathie aient encore de la force, beaucoup de force? 15° Sur la répétition d'un médicament homœopathique; 16° Quelques exemples de traitements homœopathiques; 17° La belladone, préservatif de la scarlatine; 18° Des effets du café.

DEUXIÈME SÉRIE. — Du choix du médecin. — Essai sur un nouveau principe pour découvrir la vertu curative des substances médicinales. —Antidotes de quelques substances végétales héroïques. — Des fièvres continues et rémittentes. — Les maladies périodiques à types hebdomadaires. — De la préparation et de la dispensation des médicaments par les médecins homœopathes. — Essai historique et médical sur l'ellébore et l'elléborisme. — Un cas de folie. — Traitement du choléra. — Une chambre d'enfants. — De la satisfaction de nos besoins matériels. — Lettres et discours. — Études cliniques, par le docteur HARTUNG, recueil de 116 observations, fruit de vingt-cinq ans d'une grande pratique.

HAHNEMANN. Doctrine et traitement homœopathique des maladies chroniques; par le docteur S. HAHNEMANN; traduit de l'allemand sur la dernière édition, par A.-J.-L. JOURDAN, membre de l'Académie de médecine. *Deuxième édition* entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, 1846. 3 vol. in-8. 23 fr.

Cette seconde édition est en réalité un ouvrage nouveau. Non-seulement l'auteur a refondu l'histoire de chacun des *vingt-deux* médicaments dont se composait la première, et a presque doublé pour chacun d'eux le nombre des symptômes, mais encore il a ajouté *vingt-cinq* substances nouvelles, de sorte que le nombre total des médicaments antipsoriques se trouve porté aujourd'hui à *quarante-sept*.

HARTMANN. Thérapeutique homœopathique des maladies aiguës et des maladies chroniques, par le docteur FR. HARTMANN; traduit de l'allemand sur la *troisième édition*, par A.-J.-L. JOURDAN et SCHLESINGER. Paris, 1847-1850. 2 forts vol. in-8. 16 fr.

Le deuxième et dernier volume. 8 fr.

HARTMANN. Thérapeutique homœopathique des maladies des enfants, par le docteur F. HARTMANN, traduit de l'allemand par le docteur LÉON SIMON fils, membre de la Société gallicane de médecine homœopathique. Paris, 1853. 1 vol. in-8 de 600 pages. 8 fr.

HATIN. Petit traité de médecine opératoire et Recueil de formules à l'usage des sages-femmes. *Deuxième édition*, augmentée. Paris, 1837, in-18, fig. 2 fr. 50

HAUFF. Mémoire sur l'usage des pompes dans la pratique médicale et chirurgicale, par le docteur HAUFF, professeur à l'Université de Gand. Paris, 1836. in-8. 3 fr. 50

HAUSSMANN. Des subsistances de la France, du blutage et du rendement des farines et de la composition du pain de munition; par N.-V. HAUSSMANN, intendant militaire. Paris, 1848, in-8 de 76 pages. 2 fr.

HEIDENHAIN et EHRENBERG. Exposition des méthodes hydriatiques de Priesnitz dans les diverses espèces de maladies, considérées en elles-mêmes et comparées avec celles de la médecine allopathique, par les docteurs H. HEIDENHAIN et H. EHRENBERG. Paris, 1842, in-18 grand papier. 3 fr. 50

HÉRING. Médecine homœopathique domestique, par le docteur B. HÉRING (de Philadelphie), rédigée d'après les meilleurs ouvrages homœopathiques et d'après sa propre expérience, avec additions des docteurs Goulon, Gross et Staff, traduite de l'allemand et publiée par le docteur L. MARCHANT. *Troisième édition*, corrigée et *augmentée*. Paris, 1855. 1 vol. in-12 de 536 pages. 5 fr.

HERPIN. Du pronostic et du traitement curatif de l'épilepsie, par le docteur TH. HERPIN, docteur en médecine de la Faculté de Paris et de Genève, lauréat de la Faculté de médecine de Paris, ancien vice-président de la Faculté de médecine, du Conseil de santé de Genève, etc. *Ouvrage couronné par l'Institut de France.* Paris, 1852. 1 vol. in-8 de 650 pages. 7 fr.

OEUVRES COMPLÈTES D'HIPPOCRATE, traduction nouvelle, *avec le texte grec en regard*, collationné sur les manuscrits et toutes les éditions; accompagnée d'une introduction, de commentaires médicaux, de variantes et de notes philologiques, suivie d'une table des matières, par E. LITTRÉ, membre de l'Institut de France. Paris, 1839-1857. — Cet ouvrage formera 9 forts vol. in-8, de 700 pages chacun. Prix de chaque vol 10 f.

Il a été tiré quelques exemplaires sur jésus vélin. Prix de chaque volume. 20 f.

Les volumes publiés contiennent :

T. I. Préface (16 pag.). — Introduction (554 p.). — De l'ancienne médecine (83 p.).

T. II. Avertissement (56 pages). — Traité des airs, des eaux et des lieux (93 p.). — Le pronostic (100 pages). — Du régime dans les maladies aiguës (337 pages). — Des épidémies, livre I (190 pages).

T. III. Avertissement (46 pages). — Des épidémies, livre III (149 pages). — De plaies de tête (211 pages). — De l'officine du médecin (76 pages). — Des fractures (224 pages).

T. IV. Des articulations (327 pages). — Le mochlique (66 pages). — Aphorismes (150 pages). — Le serment (20 pages). — La loi (20 pages).

V. Des épidémies, livres II, IV, V, VI, VII (469 pages). — Des humeurs (33 pages). — Les Prorrhétiques, livre I (71 pages). — Prénotions coaques (161 pages).

T. VI. de l'art (28 pages). — De la nature de l'homme (31 pages). — Du régime salutaire (27 pages). — Des vents (29 pages). — De l'usage des liquides (22 pages). Des maladies (68 pages). — Des affections (67 pag.). — Des lieux dans l'homme (40 pag.).

Tome VII. Des maladies, livres II, III (162 pages). — Des affections internes (140 pages). — De la nature de la femme (50 pages). — Du fœtus à 7, 8 et 9 mois. De la génération. De la nature de l'enfant (80 pag.). — Des maladies, livre I (76 pag.), etc.

Tome VIII. Maladies des femmes, des jeunes filles, de la superfétation, de l'anatomie, de la dentition, des glandes, des chairs, des semaines, etc.

Le tome IX et dernier est sous presse.

HIPPOCRATE. Aphorismes, traduction nouvelle *avec le texte grec en regard*, collationnée sur les manuscrits et toutes les éditions, précédée d'un argument interpretatif, par E. LITTRÉ, membre de l'Institut de France. Paris, 1844, gr. in-18. 3 f.

HIRSCHEL. Guide du médecin homœopathe au lit du malade, et Répertoire de thérapeutique homœopathique, par le docteur HIRSCHEL, traduit de l'allemand par le docteur LÉON SIMON, fils. Paris, 1858. 1 vol. in-18 jésus.

HODGSON. Traité des maladies des artères et des veines, traduit de l'anglais avec des notes par G. BRESCHET, professeur à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1819. 2 vol. in-8. 13 f.

HOEFER. Nomenclature et classifications chimiques, suivies d'un LEXIQUE historique et synonymique comprenant les noms anciens, les formules, les noms nouveaux, le nom de l'auteur et la date de la découverte des principaux produits de la chimie. Paris, 1845. 1 vol. in-12 avec tableaux. 3 f.

HOFFBAUER. Médecine légale relative aux aliénés, aux sourds-muets, ou les lois appliquées aux désordres de l'intelligence; par HOFFBAUER; traduit de l'allemand par CHAMBEYRON, D.-M.-P., avec des notes, par MM. ESQUIROL et ITARD. Paris, 1827, in-8. 6 f.

HOUDART. Étude historique et critique sur la **Vie** et la **Doctrine d'Hippocrate** et sur l'état de la médecine avant lui : par le docteur HOUDART, membre de l'Académie impériale de médecine. 2e *édition augmentée*. Paris, 1840, in-8. 5 fr.

HOUDART. Histoire de la médecine grecque, depuis Esculape jusqu'à Hippocrate exclusivement, par le docteur M. S. HOUDART. Paris, 1856, in-8 de 320 pages. 6 fr.

HUBERT-VALLEROUX. Mémoire sur le catarrhe de l'oreille et sur la surdité qui en est la suite, avec l'indication d'un nouveau mode de traitement, appuyé d'observations pratiques. *Deuxième* édition augmentée. Paris, 1845, in-8. 2 fr.

HUMBOLDT. De distributione geographica plantarum, secundum cœli temperiem et altitudinem montium. Parisiis, 1817, in-8, avec carte coloriée. 6 fr.

HUNTER. Œuvres complètes de J. Hunter, traduites de l'anglais sur l'édition de J. Palmer, par le docteur G. RICHELOT. Paris, 1843. 4 forts vol. in-8, avec atlas in-4 de 64 planches. 40 fr.

Cet ouvrage comprend : T. I. Vie de Hunter; Leçons de chirurgie. — T. II. Traité des dents avec notes par Ch. Bell et J. Oudet; Traité de la syphilis, annoté par le docteur Ph. Ricord. — T. III. Traité du sang, de l'inflammation et des plaies par les armes à feu; phlébite, anévrysmes. — T. IV. Observations sur certaines parties de l'économie animale; Mémoires d'anatomie, de physiologie, d'anatomie comparée et de zoologie, annotés par R. Owen.

HUNTER. Traité de la maladie vénérienne, par J. HUNTER, traduit de l'anglais par G. RICHELOT, avec de nombreuses annotations par le docteur PH. RICORD, chirurgien de l'hospice des vénériens. *Deuxième édition*, corrigée et augmentée de nouvelles notes. Paris, 1852, in-8 de 800 pages, avec 9 planches. 9 fr.

Parmi les nombreuses additions ajoutées par M. Ricord, nous citerons seulement les suivantes; elles traitent de :

L'inoculation de la syphilis. — Différence d'identité entre la blennorrhagie et le chancre. — Des affections des testicules à la suite de la blennorrhagie. — De la blennorrhagie chez la femme. — Du traitement de la gonorrhée et de l'épididymite. — Des écoulements à l'état chronique. — Des rétrécissements de l'urèthre comme effet de la gonorrhée. — De la cautérisation. — Des bougies. — Des fausses routes de l'urèthre. — Des fistules urinaires. — De l'ulcère syphilitique primitif et du chancre. — Traitement du chancre, de son mode de pansement. — Du phimosis. — Des ulcères phagédeniques. — Des végétations syphilitiques. — Du bubon et de son traitement. — Sur les affections vénériennes de la gorge. — De la syphilis constitutionnelle. — Sur les accidents tertiaires et secondaires de la syphilis. — Des éruptions syphilitiques, de leurs formes, de leurs variétés et de leur traitement. — De la prophylaxie de la syphilis.

ITARD. Traité des maladies de l'oreille et de l'audition, par J.-M. ITARD, médecin de l'institution des Sourds-Muets de Paris. *Deuxième édition*, considérablement augmentée et publiée par les soins de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1842. 2 vol. in-8 avec 3 planches. 14 fr.

Indépendamment des nombreuses additions et de la révision générale, cette seconde édition a été augmentée de deux Mémoires importants, savoir : 1° Mémoire sur le mutisme produit par les lésions des fonctions intellectuelles; 2° De l'éducation d'un homme sauvage, ou des premiers développements physiques et moraux du jeune sauvage de l'Aveyron.

JAHR. Principes et règles qui doivent guider dans la pratique de l'homœopathie. Exposition raisonnée des points essentiels de la doctrine médicale de HAHNEMANN. Paris, 1857, in-8 de 528 pages. 7 fr.

JAHR. Du traitement homœopathique des maladies des femmes, par le docteur G.-H.-G. JAHR. Paris, 1856, 1 vol. in-12. 6 fr.

JAHR. Du traitement homœopathique des affections nerveuses et des maladies mentales. Paris, 1854, un vol. in-12 de 600 pages. 6 fr.

JAHR. Du traitement homœopathique des maladies de la peau et des lésions extérieures en général, par le docteur G.-H.-G. JAHR. Paris, 1850, 1 vol. in-8 de 608 pages. 8 fr.

Cet ouvrage est divisé en trois parties : 1° Thérapeutique des maladies de la peau; 2° Matière médicale : 3° Répertoire symptomatique.

JAHR. Du traitement homœopathique du choléra, avec l'indication des moyens de s'en préserver, pouvant servir de conseils aux familles en l'absence du médecin, par le docteur G.-H.-G. JAHR. Paris, 1848, 1 vol. in-12. 1 fr. 50

JAHR. Nouveau Manuel de médecine homœopathique, ou Résumé des principaux effets des médicaments homœopathiques, avec indication des observations cliniques, divisé en deux parties : 1° *Matière médicale*; 2° *Répertoire symptomatologique et thérapeutique*, par le docteur G.-H.-G. JAHR. *Sixième édition* augmentée. Paris, 1855. 4 vol. grand in-12. 18 fr.

JAHR. Notices élémentaires sur l'homœopathie et la manière de la pratiquer, avec quelques-uns des effets les plus importants de dix des principaux remèdes homœopathiques, à l'usage de tous les hommes de bonne foi qui veulent se convaincre par des essais de la vérité de cette doctrine, par G.-H.-G. JAHR. *Troisième édition*, augmentée. *Paris, 1853, in-18 de 132 pages.* 1 fr. 75

JAHR ET CATELLAN. Nouvelle pharmacopée et posologie homœopathiques, ou histoire naturelle et préparation des médicaments homœopathiques et de l'administration des doses, par le docteur G.-H.-G. JAHR et A. CATELLAN, pharmacien homœopathe. *Nouvelle édition* corrigée et augmentée, accompagnée de 135 planches intercalées dans le texte. Paris, 1853, in-12 de 430 pages. 7 fr.

L'histoire naturelle des substances animales et végétales a reçu une addition importante : c'est celle de 135 figures intercalées dans le texte, offrant la figure des substances médicinales les plus usitées. Enfin nous recommandons la partie dans laquelle les auteurs traitent de l'*administration des doses des médicaments*, et où ils indiquent, suivant les règles, la véritable sphère d'action à chacun des divers modes d'employer les médicaments, tels que l'*olfaction*, les *globules*, les *gouttes*, les *solutions aqueuses*, ainsi que l'usage le plus convenable des diverses *dilutions* dans les différens cas de la maladie.

JOBERT. Traité de chirurgie plastique, par le docteur JOBERT (de Lamballe), professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Institut de France, de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1849. 2 vol. in-8 et atlas de 18 planches in-fol. grav. et color. d'après nature. 30 fr.

Les succès obtenus par M. le docteur Jobert dans les diverses et grandes opérations chirurgicales qui réclament l'autoplastie, et particulièrement dans le traitement des fistules vésico-vaginales, donnent à cet ouvrage une très haute importance; il suffit donc d'indiquer les sujets qui y sont traités. — Des cas qui réclament l'autoplastie, des préparations auxquelles il convient de soumettre les parties intéressées dans l'opération. — Des parties qui doivent entrer dans la composition du lambeau et des tissus propres à le former. — Des méthodes autoplastiques. — Application pratique, autoplastie crânienne, faciale et de l'appareil de la vision. — De la rhinoplastie ou réparation du nez, de la réparation des joues, de la bouche (stomatoplastie). — De la trachéoplastie, de la thoracoplastie. — Autoplastie des membres supérieurs. — Autoplastie du canal intestinal et dans les hernies. — Autoplastie des organes génitaux de l'homme (testicule, fistule urinaire, périnée). — Autoplastie des organes génito-urinaires de la femme, vice de conformation des grandes et petites lèvres, oblitération de la vulve et du vagin. — Autoplastie de l'urèthre et de la vessie chez la femme; fistules vésico-vaginales, chapitre important qui occupe près de 400 pages.

JOBERT. Traités des fistules vésico-utérines, vésico-utéro-vaginales, entéro-vaginales et **recto-vaginales**; par le docteur JOBERT (de Lamballe), chirurgien de l'Hôtel-Dieu. Paris, 1852, in-8 avec 10 figures intercalées dans le texte. 7 fr. 50

Ouvrage *faisant suite* et servant de *Complément* au TRAITÉ DE CHIRURGIE PLASTIQUE.

JOURDAN. Pharmacopée universelle, ou Conspectus des pharmacopées d'Amsterdam, Anvers, Dublin, Edimbourg, Ferrare, Genève, Grèce, Hambourg, Londres, Oldenbourg, Parme, Sleswig, Strasbourg, Turin, Würtzbourg; américaine, autrichienne, batave, belge, danoise, espagnole, finlandaise, française, hanovrienne, hessoise, polonaise, portugaise, prussienne, russe, sarde, saxonne, suédoise et wurtembergeoise; des dispensaires de Brunswick, de Fulde, de la Lippe et du Palatinat; des pharmacopées militaires de Danemark, de France, de Prusse et de Würtzbourg; des formulaires et pharmacopées d'Ammon, Augustin, Béral, Bories, Brera, Brugnatelli, Cadet de Gassicourt, Cottereau, Cox, Ellis, Foy, Giordano, Guibourt, Hufeland, Magendie, Phœbus, Piderit, Pierquin, Radius, Ratier, Saunders, Schubarth, Sainte-Marie, Soubeiran, Spielmann, Swediaur, Taddei et Van Mons; ouvrage contenant les caractères essentiels et la synonymie de toutes les substances citées dans ces recueils, avec l'indication, à chaque préparation, de ceux qui l'ont adoptée, des procédés divers recommandés pour l'exécution, des variantes qu'elle présente dans les différents formulaires, des noms officinaux sous lesquels on la désigne dans divers pays, et des doses auxquelles on l'administre; par A.-J.-L. JOURDAN, membre de l'Académie impériale de médecine. *Deuxième édition entièrement refondue* et considérablement augmentée, *précédée de Tableaux présentant la concordance des divers poids médicinaux de l'Europe entre eux et avec le système décimal*. Paris, 1840. 2 forts volumes in-8 de chacun près de 800 pages, à deux colonnes. 25 fr.

JOURDAN. Dictionnaire raisonné, étymologique, synonymique et polyglotte **des termes usités dans les sciences naturelles**; comprenant l'anatomie, l'histoire naturelle et la physiologie générales; l'astronomie, la botanique, la chimie, la géographie physique, la géologie, la minéralogie, la physique, la zoologie, etc.; par A.-J.-L. JOURDAN, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1834. 2 forts vol. in-8, à deux colonnes. Ga.

KONINCK. Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carbonifère de Belgique, par L. DE KONINCK, professeur de l'Université de Liége, 1844. 2 vol. in-4 dont un de 69 planches. 60 fr.

— Supplément, 1851, in-4 de 76 pages, avec 5 planches. 8 fr.

Cet important ouvrage comprend : 1° les Polypiers, 2° les Radiaires, 3° les Annélides, 4° les Mollusques céphalés et acephales, 5° les Crustacés, 6° les Poissons, divisés en 85 genres et 434 espèces. C'est un des ouvrages que l'on consultera avec le plus d'avantage pour l'étude comparée de la géologie et de la conchyliologie.

LACAUCHIE. Traité d'hydrotomie, ou des Injections d'eau continues dans les recherches anatomiques, par le docteur LACAUCHIE, ancien professeur d'anatomie à l'hôpital du Val-de-Grâce, chirurgien en chef de l'hôpital du Roule. Paris, 1853, in-8, avec 6 planches. 4 fr.

LAFITTE. Symptomatologie homeopathique, ou tableau synoptique de toute la matière pure, à l'aide duquel se trouve immédiatement tout symptôme ou groupe de symptômes cherché ; par P.-J. LAFITTE. Paris, 1844. 1 vol. in-4 de près de 1000 pages. 35 fr.

LALLEMAND. Des pertes séminales involontaires, par F. LALLEMAND, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier, membre de l'Institut. Paris, 1836-1842. 3 vol. in-8, publiés en 5 parties. 25 fr.

On peut se procurer séparément le Tome II, en deux parties. 9 fr.

— Le Tome III, 1842, in-8. 7 fr.

LAMARCK. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres et la citation synonymique des principales espèces qui s'y rapportent ; par J.-B.-P.-A. de LAMARCK, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'Histoire naturelle. *Deuxième édition*, revue et augmentée des faits nouveaux dont la science s'est enrichie jusqu'à ce jour ; par M. G.-P. DESHAYES et H. MILNE EDWARDS. Paris, 1835—1845. 11 forts vol. in-8. 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I, *Introduction, Infusoires ;* T. II, *Polypiers ;* T. III, *Radiaires, Tuniciers, Vers, Organisation des insectes ;* T. IV, *Insectes ;* T. V, *Arachnides, Crustacés, Annélides, Cirrhipèdes.* T. VI, VII, VIII, IX, X, XI, *Histoire des Mollusques.*

Dans cette nouvelle édition M. DESHAYES s'est chargé de revoir et de compléter l'*Introduction*, l'*Histoire des Mollusques* et des *Coquilles ;* M. MILNE EDWARDS, les *Infusoires*, les *Polypiers*, les *Zoophytes*, l'organisation des *Insectes*, les *Arachnides*, les *Crustacés*, les *Annélides*, les *Cirrhipèdes ;* M. F. DUJARDIN, les *Radiaires*, les *Échinodermes* et les *Tuniciers ;* M. NORDMANN (de Berlin), les *Vers*, etc.

Les nombreuses découvertes des voyageurs, les travaux originaux de MM. Milne Edwards et Deshayes, ont rendu les additions tellement importantes, que l'ouvrage de Lamarck a plus que doublé dans plusieurs parties, principalement dans l'**Histoire des Mollusques**, et nous ne craignons pas de présenter cette deuxième édition comme un ouvrage nouveau, devenu de première nécessité pour toute personne qui veut étudier avec succès les sciences naturelles en général, et en particulier, celle des animaux inférieurs.

LAMOTTE. Catalogue des plantes vasculaires de l'Europe centrale, comprenant la France, la Suisse, l'Allemagne, par MARTIAL LAMOTTE. Paris, 1847, in-8 de 104 pages, petit-texte à deux colonnes. 2 fr. 50

Ce catalogue facilitera les échanges entre les botanistes et leur évitera les longues listes de plantes de leurs desiderata et des plantes qu'ils peuvent offrir. — Il servira de catalogue d'herbier, de table pour des ouvrages sur les plantes de France et d'Allemagne ; il sera d'une grande utilité pour recevoir des notes de géographie botanique, pour signaler les espèces qui composent les fleurs des localités circonscrites, pour désigner les plantes utiles et industrielles, les plantes médicinales, les espèces ornementales, pour comparer la végétation arborescente à celle qui est herbacée, les rapports numériques des genres, des espèces, etc.

LANGLEBERT. Guide pratique, scientifique et administratif de l'étudiant en médecine, ou Conseils aux élèves sur la direction qu'ils doivent donner à leurs études; suivi des règlements universitaires, relatifs à l'enseignement de la médecine dans les facultés, les écoles préparatoires, et des conditions d'admission dans le service de santé de l'armée et de la marine; 2e *édition, corrigée et entièrement refondue;* par le docteur ED. LANGLEBERT. Paris, 1852. Un beau vol. in-18 de 340 pag. 2 fr. 50

Dans la *première partie*, M. Langlebert prend l'élève à partir inclusivement du baccalauréat ès sciences, et il le conduit par la longue série des études et des examens jusqu'au doctorat; il lui indique les cours officiels ou particuliers qu'il doit fréquenter, les livres qu'il doit lire ou consulter; de plus, à chacune de ces indications, M. Langlebert ajoute une appréciation des hommes et des choses qu'elle comporte. Il y a de l'indépendance dans ses appréciations; on y sent une vive sympathie pour l'élève, et le désir de lui aplanir les difficultés qu'il rencontre en pénétrant dans nos Ecoles.

La *deuxième partie* est consacrée à l'exposition des règlements et ordonnances relatives à l'état de la médecine actuellement en vigueur; il fait connaître le personnel et l'enseignement des Facultés de Montpellier et de Strasbourg et des écoles préparatoires, etc., etc.

LAWRENCE. Traité pratique sur les maladies des yeux, ou Leçons données à l'infirmerie ophthalmique de Londres sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie de l'œil; par LAWRENCE, chirurgien en chef de cet hôpital, membre du Collége royal des chirurgiens de Londres; traduit de l'anglais avec des notes, et suivi d'un **Précis de l'anatomie pathologique de l'œil,** par C. BILLARD, docteur en médecine de la Faculté de Paris, etc. Paris, 1830, in-8. 7 fr.

LEBERT. Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale, ou description et iconographie pathologique des affections morbides, tant liquides que solides, observées dans le corps humain, par le docteur H. LEBERT, professeur de clinique médicale à l'Université de Zurich, membre des Sociétés anatomique, de biologie, de chirurgie et médicale d'observation de Paris. Paris, 1855-1858.

Ce bel ouvrage se composera de 2 vol. in-folio de texte, et d'environ 200 planches dessinées d'après nature, gravées et la plupart coloriées. Il se publie par livraisons, chacune composée de 30 à 40 pages de texte, sur beau papier vélin, et de 5 planches in-folio gravées et coloriées. Prix de la livraison: 15 fr.

XX livraisons sont en vente.

Cet ouvrage est le fruit de plus de douze années d'observations dans les nombreux hôpitaux de Paris. Aidé du bienveillant concours des médecins et des chirurgiens de ces établissements, trouvant aussi des matériaux précieux et une source féconde dans les communications et les discussions des Sociétés anatomique, de biologie, de chirurgie et médicale d'observation, M. Lebert réunissait tous les éléments pour entreprendre un travail aussi considérable. Placé maintenant à la tête du service médical d'un grand hôpital à Zurich, dans les salles duquel il a constamment cent malades, l'auteur continue à recueillir des faits pour cet ouvrage, vérifie et contrôle les résultats de son observation dans les hôpitaux de Paris par celle des faits nouveaux à mesure qu'ils se produisent sous ses yeux.

LEBERT. Physiologie pathologique, ou Recherches cliniques, expérimentales et microscopiques sur l'inflammation, la tuberculisation, les tumeurs, la formation du cal, etc., par le docteur H. LEBERT, professeur à l'Université de Zurich. Paris, 1845. 2 vol. in-8, avec atlas de 22 planches gravées. 23 fr.

Cet important ouvrage est ainsi divisé:

Dans la *première partie*, l'auteur traite de l'INFLAMMATION dans tous les organes, avec les terminaisons diverses et les modifications que lui impriment les différentes parties dans lesquelles on l'observe. — Dans la *deuxième partie*, il examine la TUBERCULISATION, il en fait connaître les caractères généraux, et dit quels sont les principaux phénomènes qu'elle présente suivant son siége. — Dans la *troisième partie*, qui forme presque en entier le second volume, sont consignées les recherches sur les TUMEURS homœomorphes et hétéromorphes. Il traite d'une manière particulière et avec détails de la nature et de la structure du cancer.

L'ouvrage est terminé par quatre Mémoires: 1° *sur la formation du cal*; 2° *sur les productions végétales que l'on rencontre dans la teigne*; 3° *sur les hydatides du foie renfermant des échinocoques*; 4° *sur la théorie cellulaire et la formation des parties élémentaires qui constituent nos organes à l'état normal et à l'état pathologique.*

LEBERT. Traité pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses, par le docteur H. LEBERT. *Ouvrage couronné par l'Académie impériale de médecine.* Paris, 1849. 1 vol. in-8 de 820 pages. 9 fr.

LEBERT. Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer, par le docteur H. LEBERT. Paris, 1851. 1 vol. in-8 de 892 pages. 9 fr.

LEBLANC et TROUSSEAU. Anatomie chirurgicale des principaux animaux domestiques, ou Recueil de 30 planches représentant : 1° l'anatomie des régions du cheval, du bœuf, du mouton, etc., sur lesquelles on pratique les opérations les plus graves; 2° les divers états des dents du cheval, du bœuf, du mouton, du chien, indiquant l'âge de ces animaux; 3° les instruments de chirurgie vétérinaire; 4° un texte explicatif; par U. LEBLANC, médecin vétérinaire, ancien répétiteur à l'École vétérinaire d'Alfort, et A. TROUSSEAU, professeur à la Faculté de Paris. Paris, 1828, grand in-fol. composé de 30 planches gravées et coloriées avec soin. 42 fr.

Cet atlas est dessiné par Chazal, sur des pièces anatomiques originales, et gravé par Ambr. Tardieu.

LECANU. Cours de pharmacie, Leçons professées à l'École de pharmacie, par L.-R. LECANU, professeur à l'École de pharmacie, membre de l'Académie impériale de médecine et du Conseil de salubrité. Paris, 1842. 2 vol. in-8. 14 fr.

LECANU. Éléments de géologie, par L.-R. LECANU, docteur en médecine, professeur titulaire à l'École supérieure de pharmacie de Paris. *Seconde édition revue et corrigée*. Paris, 1857. 1 vol. in-18 jésus. 3 fr.

LECOQ. Éléments de géographie physique et de météorologie, ou Résumé des notions acquises sur les grandes lois de la nature, servant d'introduction à l'étude de la géologie; par H. LECOQ, professeur d'Histoire naturelle à Clermont-Ferrand. Paris, 1836. 1 fort vol. in-8, avec 4 planches gravées. 9 fr.

LECOQ. Éléments de géologie et d'hydrographie, ou Résumé des notions acquises sur les grandes lois de la nature, faisant suite et servant de complément aux Éléments de géographie physique et de météorologie, par H. LECOQ. Paris, 1838. 2 forts volumes in-8, avec VIII planches gravées. 15 fr.

LECOQ. Études sur la géographie botanique de l'Europe, et en particulier sur la végétation du plateau central de la France, par H. LECOQ, professeur d'Histoire naturelle de la ville de Clermont-Ferrand. Paris, 1854-1857, tomes I à VII. 7 beaux vol. grand in-8, avec 3 planches coloriées. 56 fr.

LECOQ et JUILLET. Dictionnaire raisonné des termes de botanique et des familles naturelles, contenant l'étymologie et la description détaillée de tous les organes, leur synonymie et la définition des adjectifs qui servent à les décrire; suivi d'un vocabulaire des termes grecs et latins les plus généralement employés dans la glossologie botanique; par H. LECOQ et J. JUILLET. Paris, 1831. 1 vol. in-8. 9 fr.

LE GENDRE. Anatomie chirurgicale homalographique, ou Description et figures des principales régions du corps humain représentées de grandeur naturelle et d'après des sections plans faites sur des cadavres congelés, par le docteur E.-Q. LE GENDRE, prosecteur de l'amphithéâtre des hôpitaux, lauréat de l'Institut de France. Paris, 1858, 1 vol. in-fol. de 25 planches dessinées et lithographiées par l'auteur, avec un texte descriptif et raisonné. 20 fr.

LÉLUT. L'Amulette de Pascal, pour servir à l'histoire des hallucinations, par le docteur F. LÉLUT, membre de l'Institut. Paris, 1846, in-8. 6 fr.

Cet ouvrage fixera tout à la fois l'attention des médecins et des philosophes; l'auteur suit Pascal dans toutes les phases de sa vie, la précocité de son génie, sa première maladie, sa nature nerveuse et mélancolique, ses croyances aux miracles et à la diablerie, l'histoire de l'accident du pont de Neuilly, et les hallucinations qui en sont la suite. Pascal compose les *Provinciales*, les *Pensées*; ses relations dans le monde, sa dernière maladie, sa mort et son autopsie. M. Lélut a rattaché à l'*Amulette de Pascal* l'histoire des hallucinations de plusieurs hommes célèbres, telles que la vision de l'abbé de Brienne, le globe de feu de Benvenuto Cellini, l'abîme imaginaire de l'abbé J.-J. Boileau, etc.

LÉLUT. Du démon de Socrate, spécimen d'une application de la science psychologique à celle de l'histoire, par le docteur L.-F. LÉLUT, membre de l'Institut, médecin de l'hospice de la Salpêtrière. *Nouvelle édition* revue, corrigée et augmentée d'une préface. Paris, 1856, in-18 de 348 pages. 3 fr. 50

LÉLUT. Qu'est-ce que la phrénologie? ou Essai sur la signification et la valeur des Systèmes de psychologie en général, et de celui de GALL en particulier, par F. LÉLUT, médecin de l'hospice de la Salpêtrière. Paris, 1836, in-8. 7 fr.

LÉLUT. De l'organe phrénologique de la destruction chez les animaux, ou Examen de cette question : Les animaux carnassiers ou féroces ont-ils, à l'endroit des tempes, le cerveau et par suite le crâne plus large proportionnellement à sa longueur que ne l'ont les animaux d'une nature opposée? par F. LÉLUT. Paris, 1838, in-8, fig. 2 fr. 50

LEMOINE. Du sommeil, au point de vue physiologique et psychologique, par ALBERT LEMOINE, professeur de philosophie à la Faculté des lettres de Bordeaux. *Ouvrage couronné par l'Institut de France (Académie des sciences morales et politiques).* Paris, 1855, in-12 de 410 pages. 3 fr. 50

LEROY. Exposé des divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guérir de la pierre sans avoir recours à l'opération de la taille; par J. LEROY, d'Étiolles, docteur en chirurgie de la Faculté de Paris. Paris, 1825, in-8 avec 5 planches. 4 fr.

LEROY. Histoire de la lithotritie, précédée de réflexions sur la dissolution des calculs urinaires, par J. LEROY, d'Étiolles. Paris, 1839, in-8, fig. 3 fr. 50

LEROY. Médecine maternelle, ou l'Art d'élever et de conserver les enfants, par Alphonse LEROY, professeur de la Faculté de médecine de Paris. Seconde édition. Paris, 1830, in-8. 6 fr.

LESSON. Species des mammifères bimanes et quadrumanes, suivi d'un Mémoire sur les Oryctéropes, par R.-P. LESSON, professeur à l'hôpital de la marine du port de Rochefort, etc. Paris, 1840, in-8. 3 fr.

LESSON. Nouveau tableau du règne animal. Mammifères. Paris, 1842, in-8. 3 fr.

LEURET et GRATIOLET. Anatomie comparée du système nerveux considéré dans ses rapports avec l'intelligence, par FR. LEURET, médecin de l'hospice de Bicêtre, et P. GRATIOLET, aide naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, Paris, 1839-1857. OUVRAGE COMPLET. 2 vol. in-8 et atlas de 32 planches in-fol., dessinées d'après nature, et gravées avec le plus grand soin. Figures noires. 48 fr.

Le même, figures coloriées. 96 fr.

Tome I, par LEURET, comprend la description de l'encéphale et de la moelle rachidienne, le volume, le poids, la structure de ces organes chez les animaux vertébrés, l'histoire du système ganglionnaire des animaux articulés et des mollusques, et l'exposé de la relation qui existe entre la perfection progressive de ces centres nerveux et l'état des facultés instinctives, intellectuelles et morales.

Tome II, par GRATIOLET, comprend l'anatomie du cerveau de l'homme et des singes, des recherches nouvelles sur le développement du crâne et du cerveau, et une analyse comparée des fonctions de l'intelligence humaine.

— Séparément le tome II. Paris, 1857, in-8 de 692 pages, avec atlas de 16 planches dessinées d'après nature, gravées figures noires. 24 fr.

Figures coloriées. 48 fr.

LEURET. Du traitement moral de la folie, par F. LEURET, médecin en chef de l'hospice de Bicêtre. Paris, 1840, in-8. 6 fr.

LEVY. Traité d'hygiène publique et privée; par le docteur Michel LEVY, directeur de l'Ecole impériale de médecine militaire de perfectionnement du Val-de-Grâce, membre de l'Académie impériale de médecine. *Troisième édition*, revue et augmentée. Paris, 1857. 2 vol. in-8. Ensemble, 1500 pages. 17 fr.

L'ouvrage de M. Lévy est non-seulement l'expression la plus complète, la plus avancée de la science hygiénique, mais encore un livre marqué au coin de l'observation, comprenant le plus grand nombre de faits positifs sur les moyens de conserver la santé et de prolonger la vie, rempli d'idées et d'aperçus judicieux, écrit avec cette verve et cette élégante pureté de style qui depuis longtemps ont placé l'auteur parmi les écrivains les plus distingués de la médecine actuelle. Cet ouvrage est en rapport avec les progrès accomplis dans les autres branches de la médecine. La *Troisième édition* a subi une révision générale et reçu de nombreuses additions.

LEVY. Rapport sur le traitement de la gale, adressé au ministre de la guerre par le Conseil de santé des armées, M. LEVY, *rapporteur*. Paris, 1852, in-8. 1 fr. 25

LIEBIG. Manuel pour l'analyse des substances organiques, par G. LIEBIG, professeur de chimie à l'Université de Munich; traduit de l'allemand par A.-J.-L. JOURDAN, suivi de l'Examen critique des procédés et des résultats de l'analyse élémentaire des corps organisés, par F.-V. RASPAIL. Paris, 1838, in-8, figures. 3 fr. 50

Cet ouvrage, déjà si important pour les laboratoires de chimie, et que recommande à un si haut degré la haute réputation d'exactitude de l'auteur, acquiert un nouveau degré d'intérêt par les additions de M. Raspail.

LIND. Essais sur les maladies des Européens dans les pays chauds, et les moyens d'en prévenir les suites. Traduit de l'anglais par THION DE LA CHAUME. Paris, 1785. 2 vol. in-12. 6 fr.

LISLE. Du suicide, statistique, médecine, histoire et législation, par E. LISLE, docteur en médecine, directeur de l'établissement privé d'aliénés du Gros-Caillou, membre de la Société médico-psychologique. *Ouvrage couronné par l'Académie impériale de médecine.* Paris, 1856. 1 vol. in-8 de 488 pages. 7 fr.

LOISELEUR-DESLONCHAMPS. Flora gallica, seu Enumeratio plantarum in Gallia sponte nascentium, secundum Linnæanum systema digestarum, addita familiarum naturalium synopsi; auctore J.-L.-A. LOISELEUR-DESLONCHAMPS. Editio secunda, aucta et emendata, cum tabulis 31. Paris, 1828. 2 vol. in-8. 10 fr.

LONDE. Nouveaux éléments d'hygiène, par le docteur Charles LONDE, membre de l'Académie impériale de médecine, de la Société médicale d'émulation de Paris, etc. *Troisième édition entièrement refondue.* Paris, 1847. 2 vol. in-8. 14 fr.

Cette troisième édition diffère beaucoup de celles qui l'ont précédée. On y trouvera des changements considérables sous le rapport des doctrines et sous celui des faits, beaucoup d'additions, notamment dans la partie consacrée aux préceptes d'hygiène applicables aux facultés intellectuelles et morales, à celles de l'appareil locomoteur, des organes digestifs et des principes alimentaires, à l'hygiène de l'appareil respiratoire, etc.

LOUIS. Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la phthisie, par P.-CH. LOUIS. 2e *édit. considérablement augmentée.* Paris, 1843, in-8. 8 fr.

LOUIS. Recherches sur les effets de la saignée dans quelques maladies inflammatoires, et sur l'action de l'émétique et des vésicatoires dans la pneumonie; par P.-CH. LOUIS. Paris, 1836, in-8. 2 fr. 50

LOUIS. Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies connues sous les noms de FIÈVRE TYPHOÏDE, Putride, Adynamique, Ataxique, Bilieuse, Muqueuse, Entérite folliculeuse, Gastro-Entérite, Dothinentérite, etc., considérée dans ses rapports avec les autres affections aiguës; par P.-Ch. LOUIS, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie impériale de médecine. *Deuxième édition considérablement augmentée.* Paris, 1841. 2 vol. in-8. 13 fr.

LOUIS. Examen de l'examen de M. Broussais, relativement à la phthisie et aux affections typhoïdes; par P.-Ch. LOUIS. Paris, 1834, in-8. 3 fr. 50

LUCAS. Traité physiologique et philosophique de l'hérédité naturelle dans les états de santé et de maladie du système nerveux, avec l'application méthodique des lois de la procréation au traitement général des affections dont elle est le principe. — Ouvrage où la question est considérée dans ses rapports avec les lois primordiales, les théories de la génération, les causes déterminantes de la sexualité, les modifications acquises de la nature originelle des êtres et les diverses formes de névropathie et d'aliénation mentale, par le docteur Pr. LUCAS. Paris, 1847-1850. 2 forts volumes in-8. 16 fr.

Le tome II et dernier. Paris, 1850, in-8 de 936 pages. 8 fr. 50

LUDOVIC-HIRSCHFELD ET LÉVEILLÉ. Névrologie ou Description et Iconographie du système nerveux et des Organes des sens de l'homme, avec leur mode de préparations, par M. le docteur Ludovic HIRSCHFELD, professeur d'anatomie à l'Ecole pratique de la Faculté de Paris, et M. J.-B. LÉVEILLÉ, dessinateur. 1853. *Ouvrage complet,* 1 beau vol. in-4, composé de 400 pages de texte et de 92 planches in-4, dessinées d'après nature et lithographiées par M. Léveillé. (Il a été publié en 10 livraisons, chacune de 9 planches.)

Prix : figures noires. 50 fr.
figures coloriées. 100 fr.
Demi-reliure, dos de maroquin non rogné. En plus. 6 fr.

Les médecins et les étudiants trouveront, dans cet ouvrage, les moyens de se former aux dissections difficiles par l'exposition du meilleur mode de préparation. Il sera pour eux un guide qui leur économisera un temps précieux perdu presque toujours en tâtonnements; ils auront dans les figures des modèles assez détaillés pour les diverses parties qu'ils désireront reproduire sur la nature humaine; enfin il leur aplanira bien des obstacles dans l'étude si difficile et si importante du système nerveux.

LYONET. Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes espèces d'insectes; par L.-L. LYONET, publiées par M. W. de HAAN, conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Leyde. Paris, 1832. 2 vol. in-4, accompagnés de 54 planches gravées. 25 fr.

MAGENDIE. Phénomènes physiques de la vie, Leçons professées au Collége de France, *par M. MAGENDIE,* membre de l'Institut. Paris, 1842. 4 vol. in-8. 10 fr.

MAILLOT. Traité des fièvres ou irritations cérébro-spinales intermittentes, d'après des observations recueillies en France, en Corse et en Afrique; par F.-C. MAILLOT, membre du Conseil de santé des armées, ancien médecin en chef de l'hôpital de Bone. Paris, 1836, in-8. 6 fr. 50

MALGAIGNE. Traité des fractures et des luxations, par J.-F. MALGAIGNE, professeur à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1847-1855. 2 beaux vol. in-8, et atlas de 30 planches in-folio. 33 fr.

Le tome II, *Traité des luxations*, Paris, 1855, in-8 de 1100 pages avec atlas de 14 planches in-folio et le texte explicatif des planches des 2 volumes. 16 fr. 50

Au milieu de tant de travaux éminents sur plusieurs points de la chirurgie, il y avait lieu de s'étonner que les fractures et les luxations n'eussent pas fixé l'attention des chirurgiens; il y avait pourtant urgence de sortir du cadre étroit des traités généraux: tel est le but du nouvel ouvrage de M. Malgaigne, et son livre présente ce caractère, qu'au point de vue historique il a cherché à présenter l'ensemble de toutes les doctrines, de toutes les idées, depuis l'origine de l'art jusqu'à nos jours, en recourant autant qu'il l'a pu aux sources originales. Au point de vue dogmatique, il n'a rien affirmé qui ne fût appuyé par des faits, soit de sa propre expérience, soit de l'expérience des autres. Là où l'observation clinique faisait défaut, il a cherché à y suppléer par des expériences, soit sur le cadavre de l'homme, soit sur les animaux vivants; mais par-dessus tout il a tenu à jeter sur une foule de questions controversées le jour décisif de l'anatomie pathologique, et c'est là l'objet de son bel atlas.

MALLE. Clinique chirurgicale de l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, par le docteur P. MALLE, professeur de cet hôpital. Paris, 1838. 1 vol. in-8 de 700 pages. 8 fr.

MANDL. Anatomie microscopique, par le docteur L. MANDL, professeur de microscopie. Paris, 1838-1857, *ouvrage complet*. 2 vol. in-folio, avec 92 planches. 276 fr.

Le tome Ier, l'HISTOLOGIE, est divisé en deux séries: *Tissus et organes*. — *Liquides organiques*. Est complet en XXVI livraisons, composées chacunes de 5 feuilles de texte et 2 planches lithographiées. Elles prennent: PREMIÈRE SÉRIE: 1° *Muscles*; 2° et 3° *Nerfs et cerveau*; 4° et 5° *Appendices tégumentaires*; 6° *Terminaisons des nerfs*; 7° *Cartilages, Os et Dents*; 8° *Tissus cellulaire et adipeux*; 9° *Tissus séreux, fibreux et élastiques*; 10° *Épiderme et Épithélium*; 11° *Glandes*; 12° *Vaisseaux sanguins*; 13° *Vaisseaux lympathiques*; 14° *Structure du foie et des glandes vasculaires*; 15° *Structure intime des organes de la respiration*; 16° *Structure des organes urinaires*; 17° *Structure des organes génitaux*; 18° *Structure de la peau*; 19° *Membrane muqueuse et organes digestifs*; 20° et 21° *Organes des sens*. DEUXIÈME SÉRIE: 1° *Sang*; 2° *Pus et Mucus*; 3° *Urine et Lait*; 4° et 5° *le Sperme*. Prix de chaque livraison. 6 fr.

Le tome IIe, comprenant l'HISTOGENÈSE ou Recherches sur le Développement, l'accroissement et la reproduction des éléments microscopiques, des tissus et des liquides organiques dans l'œuf, l'embryon et les animaux adultes. *Complet* en XX livraisons. — Prix de chaque 6 fr.

MANDL ET EHRENBERG. Traité pratique du microscope et de son emploi dans l'étude des corps organisés, par le docteur L. MANDL, suivi de **Recherches sur l'organisation des animaux infusoires** par C.-G. EHRENBERG, professeur à l'Université de Berlin. Paris, 1839, in-8, avec 14 planches. 8 fr.

MANEC. Anatomie analytique. Tableau représentant l'axe cérébro-spinal chez l'homme, avec l'origine et les premières divisions des nerfs qui en partent, par M. MANEC, chirurgien des hôpitaux de Paris. Une feuille très grand in-folio. 4 fr. 50

MARC. De la folie considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires, par C.-C.-H. MARC, médecin du roi, médecin assermenté près les tribunaux, membre de l'Académie de médecine. Paris, 1840. 2 volumes in-8. 15 fr.

MARTIN-SAINT-ANGE. Étude de l'appareil reproducteur dans les cinq classes d'animaux vertébrés, au point de vue anatomique, physiologique et zoologique, par le docteur G.-M. MARTIN-SAINT-ANGE, mémoire couronné par l'Institut (Académie des sciences). Paris, 1854, grand in-4 de 234 pages, plus 17 planches gravées dont une coloriée. 25 fr.

MARTIN-SAINT-ANGE. Mémoires sur l'organisation des Cirrhipèdes et sur leurs rapports naturels avec les animaux articulés, par G.-J. MARTIN-SAINT-ANGE, D. M. P. Paris, 1835, in-8, avec planches. 3 fr.

MASSE. Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps humain, par le docteur J.-N. MASSE, professeur d'anatomie. Ouvrage adopté par le Conseil de l'instruction publique. *Quatrième édition*, contenant 112 planches, dont 10 nouvelles et un texte explicatif en regard. Toutes les planches sont dessinées d'après nature, et grav. sur acier. Paris. 1852. 1 vol. in-12, cart. à l'angl., fig. noires. 20 fr.

— Le même ouvrage. Figures coloriées. 36 fr.

Cet atlas peut servir de complément à tous les traités d'anatomie. Les 112 planches qui le composent sont ainsi divisées :

1° Ostéologie	12	5° Splanchnologie	15
2° Syndesmologie	8	6° Angéiologie	28
3° Myologie	18	7° Neviologie	27
4° Aponévrologie	4		

MASSE. Traité pratique d'anatomie descriptive, suivant l'ordre de l'Atlas d'anatomie, par le docteur J.-N. MASSE, professeur d'anatomie. Paris, 1858, 1 vol. in-12 de 700 pages, cartonné à l'anglaise. 7 fr.

Le *Traité* et l'*Atlas* ont un cartonnage uniforme.

L'accueil fait au *Petit atlas d'anatomie descriptive*, tant en France que dans les diverses Écoles de médecine de l'Europe, a prouvé à l'auteur que son livre répondait à un besoin, et cependant ces planches ne sont accompagnées que d'un texte explicatif insuffisant pour l'étude. C'est pourquoi M. Masse, cédant aux demandes qui lui en ont été faites, publie le *Traité pratique d'anatomie descriptive*, suivant l'ordre des Planches de l'atlas. C'est un complément indispensable qui servira dans l'amphithéâtre et dans le cabinet à l'interprétation des figures.

MATHIEU (E.). Études cliniques sur les maladies des femmes appliquées aux affections nerveuses et utérines, et précédées d'essais philosophiques et anthropologiques sur la physiologie et la pathologie, par le docteur E. MATHIEU. Paris, 1850. 1 vol. in-8 de 834 pages. 8 fr.

MAYER. Des rapports conjugaux, considérés sous le triple point de vue de la population, de la santé et de la morale publique, par le docteur ALEX. MAYER, médecin de l'inspection générale de salubrité et de l'hospice impérial des Quinze-Vingts. *Troisième édition* entièrement refondue. Paris, 1857, in-18 jésus de 384 pages. 3 fr.

MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE. Tome I, Paris, 1828. — Tome II, 1832. — Tome III, 1833. — Tome IV, 1835. — Tome V, 1836. — Tome VI, 1837. — Tome VII, 1838. — Tome VIII, 1840. — Tome IX, 1841. — Tome X, 1843. — Tome XI, 1845. — Tome XII, 1846. — Tome XIII, 1848. — Tome XIV, 1849. — Tome XV, 1850. — Tome XVI, 1852. — Tome XVII, 1853. — Tome XVIII, 1854. — Tome XIX, 1855. — Tome XX, 1856. Tome XXI, 1857, 21 forts volumes in-4, avec planches. Prix de la collection complète des 21 *volumes pris ensemble*, au lieu de 400 fr. réduit à : 260 fr.

Le prix de chaque volume pris séparément est de : 20 fr.

Cette nouvelle Collection peut être considérée comme la suite et le complément des *Mémoires de la Société royale de médecine et de l'Académie royale de chirurgie*. Ces deux sociétés célèbres sont représentées dans la nouvelle Académie par ce que la science a de médecins et de chirurgiens distingués, soit à Paris, dans les départements ou à l'étranger. Par cette publication, l'Académie vient de répondre à l'attente de tous les médecins jaloux de suivre les progrès de la science.

Le 1er volume se compose des articles suivants : Ordonnances et règlements de l'Académie, mémoires de MM. Pariset, Double, Itard, Esquirol, Villermé, Léveillé, Larrey, Dupuytren, Dugès, Vauquelin, Laugier, Virey, Chomel, Orfila, Boullay, Lemaire.

Le tome II contient des mémoires de MM. Pariset, Breschet, Lisfranc, Ricord, Itard, Husson, Duval, Duchesne, P. Dubois, Dubois (d'Amiens), Mélier, Hervez de Chégoin, Priou, Toulmouche.

Le tome III contient des mémoires de MM. Breschet, Pariset, Marc, Velpeau, Planche, Pravaz, Chevallier, Lisfranc, Bonastre, Cullerier, Soubeiran, Paul Dubois, Réveillé-Parise, Roux, Chomel, Dugès, Disé, Henry, Villeneuve, Dupuy, Fodéré, Ollivier, André, Goyrand, Sanson, Fleury.

Le tome IV contient des mémoires de MM. Pariset, Bourgeois, Hamont, Girard, Mirault, Lauth, Reynaud, Salmade, Roux, Lepelletier, Pravaz, Ségalas, Civiale, Bouley, Bourdois, Delamotte, Sevin, Silvy, Larrey, P. Dubois, Kampfen, Blanchard.

Le tome V contient des mémoires de MM. Pariset, Gérardin, Goyrand, Pinel, Kérandren, Macartney, Amussat, Stolta, Martin-Solon, Malgaigne, Henri, Boutron-Charlard, Leroy (d'Etiolles), Breschet, Itard, Dubois (d'Amiens), Rousquet, etc.

Le tome VI contient : Rapport sur les épidémies qui ont régné en France de 1830 à 1836, par M. Piorry; Mémoire sur la phthisie laryngée, par MM. Trousseau et Belloc; Influence de l'anatomie pathologique sur les progrès de la médecine, par Risueno d'Amador; Mémoire sur le même sujet, par C. Sancerotte; Recherches sur le sagou, par M. Planche; De la morve et du farcin chez l'homme, par M. P. Rayer.

Le tome VII contient : Éloges de Scarpa et Desgenettes, par M. Pariset; des mémoires par MM. Husson, *Mérat*, Piorry, Gaultier de Claubry, Moutault, Bouvier, Malgaigne, Dupuy, Duval, Gautier Saint-Martin, Leuret, Mirault, Malle, Frorisp, etc.

Le tome VIII contient : Éloge de Laennec, par M. Pariset; Éloge de Itard, par M. Bousquet; des mémoires de MM. Prus, Thorteuson, Souberbielle, Cornuel, Baillarger, J. Pelletan, J. Sédillot, Lecanu, Jobert.

Le tome IX contient : Éloge de Tessier, par M. Pariset; des mémoires de MM. Bricheteau, Bégin, Orfila, Jobert, A. Colson, Deguise, Guetani-Bey, Brierre de Boismont, Cerise, Baciborski, Laurt, Foville, Aubert-Gaillard.

Le tome X contient : Éloges de Huzard, Marc et Lodibert, par M. Pariset; des mémoires par MM. Arnol et Martin, Robert, Bégin, Poitroux, Royer-Collard, Mélier, A. Devergie, Rufz, Foville, Parrot, Rollet, Gibert, Michéa, R. Prus, etc.

Le tome XI contient : Éloge de M. Double, par M. Bousquet; Éloges de Bourdois de la Motte et Esquirol, par M. Pariset; mémoires de MM. Dubois (d'Amiens), Ségalas, Prus, Vallerix, Ginfrey, Ch. Baron, Brierre de Boismont, Payan, Delafond, H. Larrey.

Le tome XII contient : Éloge de Larrey, par M. Pariset; Éloge de Chervin, par M. Dubois (d'Amiens); mémoires par MM. de Castelneau et Ducrest, Bally, Michéa, Baillarger, Jobert de Lamballe, Kervadren, H. Larrey, Jolly, Mélier, etc.

Le tome XIII contient : les Éloges de Jenner, par M. Bousquet; de Pariset, par M. Fr. Dubois (d'Amiens); des mémoires de MM. Malgaigne, Fauconneau-Dufresne, A. Robert, J. Roux, Fleury, Brierre de Boismont, Trousseau, Mélier, Baillarger.

Le tome XIV contient l'Éloge de Broussais, par Fr. Dubois; des mémoires de MM. Goultier de Claubry, Bally, Royer-Collard, Murville, Joret, Arnal, Huguier, Lebert, etc.

Le tome XV (1850) contient l'Éloge d'Antoine Dubois, par Fr. Dubois; des mémoires de MM. Goultier de Claubry, Patissier, Guisard, Second, Piedvache, Sée, Huguier.

Le tome XVI (1852) contient des mémoires de MM. Dubois (d'Amiens), Gibert, Goultier de Claubry, Bouchardat, Henot, H. Larrey, Gosselin, Hutin, Broca.

Le tome XVII (1853) contient des mémoires de MM. Dubois (d'Amiens), Michel Lévy et Goultier de Claubry, J. Guérin, A. Richet, Bouvier, Lereboullet, Depaul, etc.

Le tome XVIII (1854) contient des mémoires de MM. Dubois, Gibert, Cap, Goultier de Claubry, J. Moreau, Aug. Millet, Patissier, Collineau, Bousquet.

Le tome XIX (1855) contient des mémoires de MM. Dubois, Gibert, Goultier de Claubry, Notta, Peixoto, Aubergier, Carrière, E. Marchand, Delioux, Bach, Hutin et Blache.

Le tome XX (1856) contient des mémoires de MM. Fr. Dubois, Depaul, Guérard, Barth, Imbert-Gourbeyre, Rochard, Chapel, Dutroulau, Pinel, Puel, etc.

Le tome XXI contient : Éloge de Roux, par F. Dubois (22 pages). — Rapport général sur le service médical des eaux minérales de la France pendant l'année 1854, par A. Guérard (52 pages). — Rapport sur les maladies qui ont régné en France pendant l'année 1854, par Barth (146 pages). — Histoire anatomo-pathologique des kystes, par Bauchet (106 pages). — Y a-t-il un signe général des altérations du sang dans les maladies, et des signes particuliers pour chacune de ces altérations, par Boyle (8 pages). — De la saignée dans la grossesse, par P. Silbert, d'Aix (126 pages). — Du microscope et de ses applications à l'anatomie pathologique, au diagnostic, et au traitement des maladies, par Michel (202 pages, avec 5 planches). — Études sur la mélancolie et sur le traitement moral de cette maladie, par Poterin du Motel (86 pages). — Mémoire sur la rougeole épidémique qui a régné à Abbeville (Somme) pendant l'année 1853, par Hecquet (70 pages).

MÉRAT. Du Tænia, ou Ver solitaire, et de sa cure radicale par l'écorce de racine de grenadier, précédé de la description du Tænia et du Bothriocéphale ; avec l'indication des anciens traitements employés contre ces vers, par F.-V. MÉRAT, D. M. P., membre de l'Académie de médecine. Paris, 1832, in-8. 3 fr.

MÉRAT et DELENS. Dictionnaire de matière médicale. *Voyez* p. 15.

MILCENT. De la scrofule, de ses formes, des affections diverses qui la caractérisent, de ses causes, de sa nature et de son traitement, par le docteur A. MILCENT, ancien interne des hôpitaux civils. Paris, 1846, in-8. 6 fr.

MILLON. Éléments de chimie organique, comprenant les applications de cette science à la physiologie animale, par le docteur E. MILLON, professeur de chimie à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Paris, 1845-1848. 2 volumes in-8. 6 fr.

MILLON. Recherches chimiques sur le mercure et sur les constitutions salines. Paris, 1846, in-8. 2 fr. 50

MILLON et REISET. Annuaire de chimie. *Voyez* p. 3.

MONFALCON et POLINIÈRE. Traité de la salubrité dans les grandes villes, par MM. les docteurs J.-B. MONFALCON et DE POLINIÈRE, médecins des hôpitaux, membres du conseil de salubrité du Rhône. Paris, 1846, in-8 de 560 pages. 7 fr. 50

Cet ouvrage, qui embrasse toutes les questions qui se rattachent à la santé publique, est destiné aux médecins, aux membres des conseils de salubrité, aux préfets, aux maires, aux membres des conseils généraux, etc.

MONFALCON et TERME. Histoire des enfants trouvés, par MM. TERME, président de l'administration des hôpitaux de Lyon, etc., et J.-B. MONFALCON, membre du conseil de salubrité, etc. Paris, 1840. 1 vol. in-8. 7 fr.

MONTAGNE. Sylloge generum specierumque cryptogamarum quas in variis operibus descriptas iconibusque illustratas, nunc ad diagnosim reductas, nonnullasque novas interjectas, ordine systematico disposuit J.-F.-C. MONTAGNE, Academiæ scientiarum Instituti imperialis Gallici. Parisius, 1856, in-8 de 500 pages. 12 fr.

MOQUIN-TANDON. Monographie de la famille des Hirudinées, par M. MOQUIN-TANDON : professeur d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut de France. *Deuxième édition*, considérablement augmentée. Paris, 1846, in-8 de 450 pages, avec atlas de 14 planches gravées et color. 15 fr.

Cet ouvrage intéresse tout à la fois les médecins, les pharmaciens et les naturalistes. Il est ainsi divisé : *Histoire*, anatomie et physiologie des Hirudinées. — *Description des organes et des fonctions*, systèmes cutané, locomoteur, sensitif, digestif, sécrétoire, circulatoire, respiratoire, système reproducteur, symétrie des organes, durée de la vie et accroissement, habitations, stations. — *Emploi des sangsues en médecine*, pêche des sangsues, conservation des sangsues, multiplication des sangsues, maladies des sangsues, transport et commerce des sangsues, application et réapplication des sangsues. — *Description de la famille, des genres et des espèces d'hirudinées*, hirudinées albionniennes, bdelliennes, siphoniennes, planérienne.

MOQUIN-TANDON. Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de France, contenant des études générales sur leur anatomie et leur physiologie, et la description particulière des genres, des espèces, des variétés, par A. MOQUIN-TANDON, membre de l'Institut (Académie des sciences), professeur d'histoire naturelle médicale à la Faculté de médecine de Paris. *Ouvrage complet*. Paris, 1855. 2 vol. grand in-8 de 450 pages, accompagnés d'un atlas de 54 planches dessinées d'après nature et gravées.

Prix de l'ouvrage complet, avec figures noires. 42 fr.
Avec figures coloriées. 66 fr.
Cartonnage de 3 vol. grand in-8. 4 fr. 50

Le tome Ier comprend les études sur l'anatomie et la physiologie des mollusques. — Le tome II comprend la description particulière des genres, des espèces et des variétés.

M. Moquin-Tandon a joint à son ouvrage un livre spécial sur les *anomalies* qui affectent les Mollusques, un autre sur l'*utilité* de ces animaux, et un troisième sur leur *recherche*, leur *choix*, leur *préparation* et leur *conservation*, enfin une *Bibliographie malacologique*, ou Catalogue de 1256 ouvrages sur les Mollusques terrestres et fluviatiles européens et exotiques. C'est, sans contredit, le recensement le plus étendu que l'on possède.

L'ouvrage de M. Moquin-Tandon est utile non-seulement aux savants, aux professeurs, mais encore aux collecteurs de coquilles, aux simples amateurs.

MOQUIN-TANDON. Éléments de tératologie végétale, ou Histoire des Anomalies de l'organisation dans les végétaux. Paris, 1841, in-8. 6 fr. 50

MOREL. Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives, par le docteur B.-A. MOREL, médecin en chef de l'Asile des aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure), ancien médecin en chef de l'Asile de Maréville (Meurthe), lauréat de l'Institut (Académie des sciences). Paris, 1857. 1 vol. in-8 de 700 pages avec un atlas de XII planches lithographiées in-4. 12 fr.

MULLER. Manuel de physiologie, par J. MULLER, professeur d'anatomie et de physiologie de l'Université de Berlin, etc. ; traduit de l'allemand sur la dernière édition, avec des additions, par A.-J.-L. JOURDAN, membre de l'Académie impériale de médecine. *Deuxième édition revue et annotée* par E. LITTRÉ, membre de l'Institut, de la Société de biologie, etc. Paris, 1851. 2 beaux vol. grand in-8, de chacun 800 pages sur papier fin cavalier, accompagnés de 320 figures intercalées dans le texte. 20 fr.

Les additions importantes faites à cette édition par M. Littré, et dans lesquelles il expose et analyse les derniers travaux publiés en physiologie, feront rechercher particulièrement cette *deuxième édition*, qui devient le *seul livre de physiologie complet* représentant bien l'état actuel de la science.

MULLER. Physiologie du système nerveux, ou recherches et expériences sur les diverses classes d'appareils nerveux, les mouvements, la voix, la parole, les sens et et les facultés intellectuelles, par J. MULLER, traduit de l'allemand par A.-J.-L. JOURDAN, Paris, 1840 2 vol. in-8 avec fig. intercalées dans le texte et 4 pl. 12 fr.

MUNDE. Hydrothérapeutique, ou l'Art de prévenir et de guérir les maladies du corps humain sans le secours des médicaments, par le régime, l'eau, la sueur, l'air, l'exercice et un genre de vie rationnel ; par le Dr Ch. MUNDE. Paris, 1842. 1 vol. gr. in-18. 4 fr. 50

MURE. Doctrine de l'école de Rio-Janeiro et Pathogénésie brésilienne, contenant une exposition méthodique de l'homœopathie, la loi fondamentale du dynamisme vital, la théorie des doses et des maladies chroniques, les machines pharmaceutiques, l'algèbre symptomatologique, etc. Paris, 1849. in-12 de 400 pages avec fig. 7 fr. 50

NAEGELÉ. Des principaux vices de conformation du bassin, et spécialement du rétrécissement oblique, par F.-Ch. NAEGELÉ, professeur d'accouchements à l'Université de Heidelberg; traduit de l'allemand, avec des additions nombreuses par A.-C. DANYAU, professeur et chirurgien de l'hospice de la Maternité. Paris, 1840. 1 vol. grand in-8, avec 16 planches. 8 fr.

NYSTEN. Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des Sciences a cessoires et de l'Art vétérinaire, de P.-H. NYSTEN; *onzième édition*, entièrem refondue par E. LITTRÉ, membre de l'Institut de France, et Ch. ROBIN, profess agrégé à la Faculté de médecine de Paris; ouvrage augmenté de la synonymie *grecq latine, anglaise, allemande, espagnole* et *italienne*, suivie d'un Glossaire de diverses langues; illustré de 500 figures intercalées dans le texte. Paris, 18 1 beau volume grand in-8 de 1500 pages à deux colonnes. 18

Demi-reliure maroquin. 3

Demi-reliure, maroquin à nerfs, très soignée. 4

Les progrès incessants de la science rendaient nécessaires, pour cette *onzième édition*, de n breuses additions, une révision générale de l'ouvrage, et plus d'unité dans l'ensemble des mots en crés aux théories nouvelles et aux faits nouveaux que l'emploi du microscope, les progrès de l'anat générale, normale et pathologique, de la physiologie, de la pathologie, de l'art vétérinaire, etc., créés. C'est M. Littré, connu par sa vaste érudition et par son savoir étendu dans la littérature méd nationale et étrangère, qui s'est chargé de cette tâche importante, avec la collaboration de M docteur Ch. Robin, que de récents travaux ont placé si haut dans la science. Une addition importa qui sera justement appréciée, c'est la Synonymie *grecque, latine, anglaise, allemande, italie espagnole*, qui est ajoutée à cette *onzième édition*, et qui, avec les vocabulaires, en fera un Dic tionnaire polyglotte.

† **ORIBASE (Œuvres d')**, texte grec, en grande partie inédit, collationné sur les ma scrits, traduit pour la première fois en français, avec une introduction, des notes, tables et des planches, par les docteurs BUSSEMAKER et DAREMBERG. Paris, 1 à 1857, tomes I à III, in-8 de 700 pages chacun. Prix du vol. 12

OUDET. De l'accroissement continu des incisives chez les Rongeurs, et de l reproduction, considérés sous le rapport de leur application à l'étude de l'anat comparative des dents; précédés de Recherches nouvelles sur l'origine et le dé loppement des follicules dentaires, par le docteur J.-E. OUDET, membre de l'Acadé impériale de médecine, etc. Paris, 1850, in-8. 2 fr.

OULMONT. Des oblitérations de la veine cave supérieure, par le docteur OULMO médecin des hôpitaux. Paris, 1855, in-8 avec une planche lithogr. 2

OZANAM. Études sur le venin des Arachnides et son emploi en thérapeutique, d'une dissertation sur le tarentisme sporadique et épidémique. Paris, 18 grand in-8. 2 fr.

PALLAS. Réflexions sur l'intermittence considérée chez l'homme dans l'état de sa et dans l'état de maladie. Paris, 1830, in-8. 3

PARCHAPPE. Recherches sur l'encéphale, sa structure, ses fonctions et ses maladi par M. PARCHAPPE, médecin en chef de l'hospice des aliénés de Rouen. Paris, 18 1842, 2 parties in-8. 7

La 1re partie comprend: *Du volume de la tête et de l'encéphale chez l'homme*; 2e partie: *Des altérations de l'encéphale dans l'aliénation mentale*.

PARÉ. Œuvres complètes d'Ambroise Paré, revues et collationnées sur toutes éditions, avec les variantes; ornées de 217 pl. et du portrait de l'auteur; accompagn de notes historiques et critiques, et précédées d'une introduction sur l'origine et progrès de la chirurgie en Occident du VIe au XVIe siècle et sur la vie et les ouvra d'Ambroise Paré, par J.-F. MALGAIGNE, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, p fesseur à la Faculté de Médecine de Paris, etc. Paris, 1840, 3 vol. grand in-8 à d colonnes, avec figures intercalées dans le texte. *Ouvrage complet*. 36

PARENT DUCHATELET. De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration; ouvrage app de documents statistiques puisés dans les archives de la préfecture de police, A.-J.-B. PARENT DUCHATELET, membre du Conseil de salubrité de la ville de Pa *Troisième édition revue, corrigée et complétée par des documents nouveaux et notes*, par MM. A. TREBUCHET et POIRAT-DUVAL, chefs de bureau à la préfect de police, suivie d'un *Précis* HYGIÉNIQUE, STATISTIQUE ET ADMINISTRATIF SUR PROSTITUTION DANS LES PRINCIPALES VILLES DE L'EUROPE. Paris, 1857, 2 forts volum in-8 de chacun 750 pages avec cartes et tableaux. 18

Le *Précis hygiénique, statistique et administratif sur la Prostitution dans les princip villes de l'Europe* comprend pour la FRANCE: Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbou l'Algérie; pour l'ÉTRANGER: l'Angleterre et l'Écosse, Berlin, Berne, Bruxelles, Christiania, Copenha l'Espagne, Hambourg, la Hollande, Rome, Turin.

PARISET. Histoire des membres de l'Académie royale de médecine, ou Recueil des Éloges lus dans les séances publiques, par E. PARISET, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, etc.; *édition complète*, précédée de l'éloge de Pariset, publiée sous les auspices de l'Académie, par F. Dubois (d'Amiens), secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1850. 2 beaux volumes in-12. 7 fr.

Cet ouvrage comprend : — Discours d'ouverture de l'Académie impériale de médecine. — Éloges de Corvisart, — Cadet de Gassicourt, — Berthollet, — Pinel, — Beauchêne, — Bourru, — Percy. — Vauquelin, — G. Cuvier, — Portal, — Chaussier, — Dupuytren, — Scarpa, — Desgenettes, — Laennec, — Tessier, — Huzard, — Marc, — Lodibert, — Bourdois de la Motte, — Esquirol, — Larrey, — Chevreul, — Lerminier, — A. Dubois, — Alibert, — Robiquet, — Double, — Geoffroy Saint-Hilaire, — Ollivier (d'Angers), — Breschet, — Lisfranc, — A. Paré, — Broussais, — Bichat.

PARISET. Mémoire sur les causes de la peste et sur les moyens de la détruire, par E. PARISET. Paris, 1837, in-18. 3 fr. 50

PARISET. Éloge de Dupuytren. Paris, 1836, in-8, avec portrait. 1 fr. 50

PATIN (GUI). Lettres. Nouvelle édition augmentée de lettres inédites, précédée d'une notice biographique, accompagnée de remarques scientifiques, historiques, philosophes et littéraires, par REVEILLÉ PARISE, membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1846. 3 vol. in-8, avec le *portrait* et le fac-simile de GUI PATIN. 21 fr.

Les lettres de Gui Patin sont de ces livres qui ne vieillissent jamais, et quand on les a lues on en conçoit aussitôt la raison. Ces lettres sont, en effet, l'expression la plus pittoresque, la plus vraie, la plus énergique, non-seulement de l'époque où elles ont été écrites, mais du cœur humain, des sentiments et des passions qui l'agitent. Tout à la fois savantes, érudites, spirituelles, profondes, enjouées, elles parlent de tout, mouvements des sciences, hommes et choses, passions sociales et individuelles, révolutions politiques, etc. C'est donc un livre qui s'adresse aux savants, aux médecins, aux érudits, aux gens de lettres, aux moralistes, etc.

PATISSIER. Traité des maladies des artisans et de celles qui résultent des diverses professions, d'après Ramazzini; ouvrage dans lequel on indique les précautions que doivent prendre, sous le rapport de la salubrité publique et particulière, les administrateurs, manufacturiers, fabricants, chefs d'ateliers, artistes, et toutes les personnes qui exercent des professions insalubres; par Ph. PATISSIER, membre de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1822, in-8. 7 fr.

PATISSIER. Rapport sur le service médical des établissements thermaux en France, fait au nom d'une commission de l'Académie impériale de médecine, par Ph. PATISSIER, membre de l'Académie de médecine. Paris, 1852, in-4 de 205 pages. 4 fr. 50

PAULET et LEVEILLÉ. Iconographie des champignons, de PAULET. Recueil de 217 planches dessinées d'après nature, gravées et coloriées, accompagné d'un texte nouveau présentant la description des espèces figurées, leur synonymie, l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses, l'époque et les lieux où elles croissent, par J.-H. LEVEILLÉ, docteur en médecine. Paris, 1855. 1 vol. in-folio de 135 pages, avec 217 planches coloriées, cartonné. 170 fr.

On peut se procurer séparément le texte, par M. Leveillé, petit in-folio de 135 pages. 20 fr.

Séparément les dernières planches in-folio coloriées, au prix de 1 fr. chaque.

PAULET. Flore et Faune de Virgile, ou Histoire naturelle des plantes et des animaux (*reptiles, insectes*), les plus intéressants à connaître et dont ce poëte a fait mention. Paris, 1834, in-8 avec 4 planches gravées et coloriées. 6 fr.

PEISSE. La médecine et les médecins, philosophie, doctrines, institutions, critiques, mœurs et biographies médicales, par Louis PEISSE. Paris, 1857. 2 vol. in-18 jésus. 7 fr.

Cet ouvrage comprend : Esprit, marche et développement des sciences médicales. — Découvertes et découvreurs. — Sciences exactes et sciences non exactes. — Vulgarisation de la médecine. — La méthode numérique. — Le microscope et les microscopistes. — Méthodologie et doctrines. — Comme on pense et ce qu'on fait en médecine à Montpellier. — L'encyclopédisme et le spécialisme en médecine. — Mission sociale de la médecine et du médecin. — Philosophie des sciences naturelles. — La philosophie et les philosophes par-devant les médecins. — L'aliénation mentale et les aliénistes. — Phrénologie : bonnes et mauvaises têtes, grands hommes et grands scélérats. — De l'esprit des bêtes. — Le feuilleton. — L'Académie de médecine. — L'éloquence et l'art à l'Académie de médecine. — Charlatanisme et charlatans. — Influence du théâtre sur la santé. — Médecins poëtes. — Biographie.

PELLETAN. Mémoire statistique sur la **Pleuropneumonie aiguë**, par J. PELLETAN, *médecin des hôpitaux* civils de Paris. Paris, 1840, in-4. 5 fr.

PERCHERON. Bibliographie entomologique, comprenant l'indication par ordre alphabétique des matières et des noms d'auteur : 1° des Ouvrages entomologiques publiés en France et à l'étranger depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ; 2° des Monographies et Mémoires contenus dans les Recueils, Journaux et Collections académiques français et étrangers. Paris, 1837. 2 vol. in-8. 8 fr.

PERRÈVE. Traité des retrécissements organiques de l'urèthre. Emploi méthodique des dilatateurs mécaniques dans le traitement de ces maladies, par Victor PERRÈVE, docteur en médecine de la Faculté de Paris, ancien élève des hôpitaux. Ouvrage placé au premier rang pour le prix d'Argenteuil, sur le rapport d'une commission de l'Académie de médecine. Paris, 1847. 1 vol. in-8 de 340 pages, accompagné de 3 pl. et de 32 figures intercalées dans le texte. 5 fr.

PHARMACOPÉE DE LONDRES, publiée par ordre du gouvernement, *en latin et en français*. Paris, 1837, in-18. 3 fr.

PHILIPEAUX. Traité pratique de la cautérisation, d'après l'enseignement clinique de M. le professeur A. Bonnet (de Lyon), par le docteur B. PHILIPEAUX, ancien interne des hôpitaux civils de Lyon. *Ouvrage couronné par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles.* Paris, 1856. 1 vol. in-8 de 630 pages, avec 67 planches intercalées dans le texte. 8 fr.

PHILLIPS. De la ténotomie sous-cutanée, ou des opérations qui se pratiquent pour la guérison des pieds bots, du torticolis, de la contracture de la main et des doigts, des fausses ankyloses angulaires du genou, du strabisme, de la myopie, du bégaiement, etc., par le docteur CH. PHILLIPS. Paris, 1841, in-8 avec 12 planches. 3 fr.

PICTET. Traité de paléontologie, ou Histoire naturelle des animaux fossiles considérés dans leurs rapports zoologiques et géologiques, par F.-J. PICTET, professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'Académie de Genève, etc. *Deuxième édition*, corrigée et considérablement augmentée. Paris, 1853-1857. OUVRAGE COMPLET, 4 forts volumes in-8, avec un bel atlas de 110 planches grand in-4. 80 fr.

Cet ouvrage est divisé en trois parties ; la *première* comprenant la considération sur la manière dont les fossiles ont été déposés, leurs apparences diverses, l'exposition des méthodes qui doivent diriger dans la détermination et la classification des fossiles ; la *seconde* et la *troisième*, l'histoire spéciale des animaux fossiles ; les caractères de tous les genres y sont indiqués avec soin, les principales espèces y sont énumérées, etc. Les quatre volumes comprennent :

Tome premier (600 pages). — Considérations générales sur la Paléontologie. *Histoire naturelle spéciale des animaux fossiles.* I, Mammifères. — II, Oiseaux. — III, Reptiles.

Tome second (728 pages). — IV, Poissons. — V, Insectes. — VI, Myriapodes. — VII, Arachnides. — VIII, Crustacés. — IX, Annélides. — X, Céphalopodes.

Tome troisième (654 pages). — XI, Mollusques (Gastéropodes, Acéphales).

Tome quatrième (800 pages). — Mollusques. — XII, Echinodermes. — XIII, Zoophytes. — Résumé et table.

PIORRY. Traité de diagnostic et de séméiologie, par le professeur PIORRY. Paris, 1840. 3 vol. in-8. 21 fr.

PLAIES D'ARMES A FEU (Des). Communications à l'Académie impériale de médecine, par MM. les docteurs Baudens, Roux, Malgaigne, Amussat, Blandin, Piorry, Velpeau, Huguier, Jobert (de Lamballe), Bégin, Rochoux, Devergie, etc. Paris, 1849. in-8 de 250 pages. 3 fr. 50

PLÉE. Glossologie botanique, ou Vocabulaire donnant la définition des mots techniques usités dans l'enseignement. Appendice indispensable des livres élémentaires et des traités de botanique, par F. PLÉE, auteur des *Types des familles des plantes de France*. Paris, 1854. 1 vol. in-12. 1 fr. 25

POGGIALE. Traité d'analyse chimique par la méthode des volumes, comprenant l'analyse des Gaz, la Chlorométrie, la Sulphydrométrie, l'Acidémétrie, l'Alcalimétrie, l'Analyse des métaux, la Saccharimétrie, etc., par le docteur POGGIALE, professeur de chimie à l'Ecole impériale de médecine et de pharmacie militaires (Val-de-Grâce), membre de l'Académie impériale de médecine. Paris, 1858, 1 vol. in-8, illustré d'environ 200 figures intercalées dans le texte.

POILROUX. Manuel de médecine légale criminelle à l'usage des médecins et des magistrats chargés de poursuivre ou d'instruire les procédures criminelles. *Seconde édition*. Paris, 1837. In-8. 7 fr.

PORTAL. Observations sur la nature et le traitement de l'hydropisie, par A. PORTAL, membre de l'Institut, président de l'Académie de médecine. Paris, 1824. 2 vol. in-8. 11 fr.

PORTAL. Observations sur la nature et le traitement de l'épilepsie, par A. PORTAL. Paris, 1827. 1 vol. in-8. 8 fr.

POUCHET. Histoire des sciences naturelles au moyen âge, ou Albert le Grand et son époque considérés comme point de départ de l'école expérimentale, par F.-A. POUCHET. Paris, 1853. 1 beau vol. in-8. 9 fr.

POUCHET. Théorie positive de l'ovulation spontanée et de la fécondation dans l'espèce humaine et les mammifères, basée sur l'observation de toute la série animale, par le docteur F.-A. POUCHET, professeur de zoologie au Musée d'histoire naturelle de Rouen. *Ouvrage qui a obtenu le grand prix de physiologie à l'Institut de France.* Paris, 1847. 1 vol. in-8 de 500 pages, avec atlas in-4 de 20 planches renfermant 250 figures dessinées d'après nature, gravées et coloriées. 36 fr.

Dans son rapport à l'Académie, en 1845, la commission s'exprimait ainsi en résumant son opinion sur cet ouvrage : *Le travail de M. Pouchet se distingue par l'importance des résultats, par le soin scrupuleux de l'exactitude, par l'étendue des vues, par une méthode excellente.* L'auteur a eu le courage de repousser tout autre criterium de l'expérimentation, et c'est après avoir successivement confronté les divers phénomènes qu'offre la série animale, et après avoir, en quelque sorte, tout soumis à l'épreuve du scalpel et du microscope, qu'il a formulé ses LOIS PHYSIOLOGIQUES FONDAMENTALES.

PRICHARD. Histoire naturelle de l'homme, comprenant des Recherches sur l'influence des agents physiques et moraux considérés comme cause des variétés qui distinguent entre elles les différentes Races humaines; par J.-C. PRICHARD, membre de la Société royale de Londres, correspondant de l'Institut de France; traduit de l'anglais, par F.-D. ROULIN, sous-bibliothécaire de l'Institut. Paris, 1843. 2 vol. in-8 accompagnés de 40 pl. gravées et coloriées, et de 90 figures intercalées dans le texte. 20 fr.

Cet ouvrage s'adresse non-seulement aux savants, mais à toutes les personnes qui veulent étudier l'anthropologie. C'est dans ce but que l'auteur a indiqué avec soin en traits rapides et distincts : 1° tous les caractères physiques, c'est-à-dire les variétés de couleurs, de physionomie, de proportions corporelles, etc., des différentes races humaines; 2° les particularités morales et intellectuelles qui servent à distinguer ces races les unes des autres; 3° les causes de ces phénomènes de variété. Pour accomplir un aussi vaste plan, il fallait, comme le docteur J.-C. Prichard, être initié à la connaissance des langues, afin de consulter les relations des voyageurs, et de pouvoir décrire les différentes nations dispersées sur la surface du globe.

PRUS. Recherches nouvelles sur la nature et le traitement du cancer de l'estomac, par le docteur RENÉ PRUS. Paris, 1828, in-8. 2 fr.

RACLE. Traité de diagnostic médical, ou Guide clinique pour l'étude des signes caractéristiques des maladies, par le docteur V.-A. RACLE, médecin des hôpitaux, ancien chef de clinique médicale à l'hôpital de la Charité, professeur de diagnostic, etc. Paris, 1854. 1 vol. in-18 de 580 pages. 5 fr.

RANG et SOULEYET. Histoire naturelle des mollusques ptéropodes, par MM. SANDER RANG et SOULEYET, naturalistes voyageurs de la marine. Paris, 1852. 1 vol. grand in-4, avec 15 planches coloriées. 25 fr.

— Le même ouvrage, 1 vol. in-folio cartonné. 40 fr.

Ce bel ouvrage traite une des questions les moins connues de l'Histoire des mollusques. Commencé par M. Sander Rang, une partie des planches avaient été dessinées et lithographiées sous sa direction; par ses études spéciales, M. Souleyet pouvait mieux que personne mener cet important travail à bonne fin.

RASPAIL. Nouveau système de physiologie végétale et botanique, fondé sur les méthodes d'observation développées dans le Nouveau système de chimie organique, par F.-V. RASPAIL, accompagné de 60 planches, contenant près de 1000 figures d'analyse, dessinées d'après nature et gravées avec le plus grand soin. Paris, 1837. 2 forts volumes in-8, et atlas de 60 planches. 30 fr.

— Le même ouvrage, avec planches coloriées. 50 fr.

RASPAIL. Nouveau système de chimie organique, fondé sur de nouvelles méthodes d'observation, précédé d'un Traité complet sur l'art d'observer et de manipuler en grand et en petit dans le laboratoire et sur le porte-objet du microscope, par F.-V. RASPAIL. *Deuxième édition entièrement refondue*, accompagnée d'un atlas in-4 de 20 planches, contenant 400 figures dessinées d'après nature, gravées avec le plus grand soin. Paris, 1838. 3 forts vol. in-8 et atlas in-4. 30 fr.

RAPOU. De la fièvre typhoïde et de son traitement homœopathique, par le docteur A. RAPOU, médecin à Lyon. Paris, 1851, in-8. 3 fr.

Rapport à l'Académie impériale de médecine SUR LA PESTE ET LES QUARANTAINES, fait au nom d'une commission, par le docteur PRUS, accompagné de pièces et documents, et suivi de la discussion au sein de l'Académie. Paris, 1846. 1 vol. in-8 de 2050 pages. 10 fr.

Cet important ouvrage, qui embrasse des questions d'un si haut intérêt pour la santé publique et les relations commerciales, est divisé en trois parties, savoir : 1° Rapport à l'Académie sur la peste et les quarantaines. 2° Pièces et documents à l'appui du rapport. I. Note sur l'antiquité de la peste en Orient et particulièrement en Égypte, par le docteur Daremberg. — II. Lettre de M. le docteur Wirt, médecin en chef de l'armée russe, sur la peste de Valachie et de Moldavie pendant les campagnes de 1828-1829. — III. Notice sur la même épidémie, par le docteur Siedlitz. — IV. Mémoire sur la peste en Algérie depuis 1552 jusqu'en 1819, par Ad. Berbrugger. — V. Mémoire sur la peste en Perse, par le docteur Lachèze. — VI. Correspondance officielle de M. Ferd. de Lesseps, consul de France à Alexandrie, adressée à M. le ministre des affaires étrangères pendant l'épidémie de peste. — VII. Mémoire sur la peste en Orient en 1840, par M. Delaporte. — VIII-XV. Réponses particulières de MM. les docteurs Pruner, Seisson, Perron, Fischer, Duvigneau, Clot-Bey, Grassi, Laidlaw, aux sept questions posées par le ministère anglais en 1839. — XVI. Mémoire sur la quarantaine de Jaffa, depuis la nouvelle possession de la Syrie et de la Palestine par les Osmanlis, par le docteur C. Lasperanza. — XVII-XXIV. Rapports particuliers adressés au conseil de santé du Caire sur la peste qui a régné en 1841 en Égypte, par MM. les docteurs Granet, Ibrahim, Koch, Masserano, Delong, Perron, Penay, Rossi, Mustapha-el-Subki, Seisson. — XXV-XXXI. Procès-verbaux de la commission de l'Académie, communications verbales de MM. Lachèze, Aubert-Roche, Lagasquie, Ségur du Perron, Morpurgo, de Nion, Cholet, Gaetani. — XXXII. Lettre de M. Chevillon sur le lazaret de Marseille. — XXXIII. Tableau général, par ordre de temps et de lieux, des épidémies de peste qui ont affligé le monde depuis trente et un siècles, par le docteur Rossi. — XXXIV. Tableau de la mortalité d'Alexandrie (Égypte), depuis le 1er janvier 1835 jusqu'au 1er janvier 1845, avec l'indication distincte des décès dus à la peste, etc. 3° Discussion dans le sein de l'Académie. Cette savante discussion, qui occupe plus de 400 pages, contient les opinions de MM. Dubois (d'Amiens), — Rochoux, — Castel, Hamont, — Gaultier de Claubry, — Prus, — Ferrus, — Poiseuille, — Desportes, — Londe, — Pariset, — Bégin, — Piorry, — Bricheteau, etc.

RATIER. Nouvelle médecine domestique, contenant : 1° Traité d'hygiène générale; 2° Traité des erreurs populaires ; 3° Manuel des premiers secours dans le cas d'accidents pressants ; 4° Traité de médecine pratique générale et spéciale ; 5° Formulaire pour la préparation et l'administration des médicaments ; 6° Vocabulaire des termes techniques de médecine, par le docteur F.-S. RATIER, membre de plusieurs sociétés savantes. Paris, 1825. 2 vol. in-8. 15 fr.

RATIER. Quelles sont les mesures de police médicale les plus propres à arrêter la **propagation de la maladie vénérienne**? par F.-S. RATIER. *Ouvrage couronné par la Société de médecine de Bruxelles.* Paris, 1836, in-8. 1 fr. 50

RAYER. De la morve et du farcin chez l'homme, par P. RAYER, médecin de l'hôpital de la Charité. Paris, 1837, in-4, figures coloriées. 6 fr.

RAYER. Traité des maladies des reins, et des altérations de la sécrétion urinaire, étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les maladies des uretères, de la vessie, de la prostate, de l'urèthre, etc., par P. RAYER, médecin de l'hôpital de la Charité, membre de l'Institut et de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1839-1841. 3 forts vol. in-8. 24 fr.

RAYER. Atlas du traité des maladies des reins, comprenant l'*Anatomie pathologique* des reins, de la vessie, de la prostate, des uretères, de l'urèthre, etc., ouvrage magnifique contenant 300 figures en 60 planches grand in-folio, dessinées d'après nature, gravées, imprimées en couleur et retouchées au pinceau avec le plus grand soin, avec un texte descriptif. Ce bel ouvrage *est complet ;* il se compose d'un volume grand in-folio de 60 planches. Prix : 192 fr.

CET OUVRAGE EST AINSI DIVISÉ :

1. — Néphrite simple, Néphrite rhumatismale, Néphrite par poison morbide. — Pl. 1, 2, 3, 4, 5.
2. — Néphrite albumineuse (maladies de Bright). — Pl. 6, 7, 8, 9, 10.
3. — Pyélite (inflammation du bassinet et des calices). — Pl. 11, 12, 13, 14, 15.
4. — Pyélo-néphrite, Périnéphrite, Fistules rénales. — Pl. 16, 17, 18, 19, 20.
5. — Hydronéphrose, Kystes urinaires. — Pl. 21, 22, 23, 24, 25.
6. — Kystes séreux, Kystes acéphalocystiques, Vers. — Pl. 26, 27, 28, 29, 30.
7. — Anémie, Hypérémie, Atrophie, Hypertrophie des reins et de la vessie. — Pl. 31, 32, 33, 34, 35.
8. — Hypertrophie, Vices de conformation des reins et des uretères. — Pl. 36, 37, 38, 39, 40.
9. — Tubercules, Mélanoses des reins. — Pl. 41, 42, 43, 44, 45.
10. — Cancer des reins, Maladies des veines rénales. — Pl. 46, 47, 48, 49, 50.
11. — Maladies des tissus élémentaires des reins et de leurs conduits excréteurs. — Pl. 51, 52, 53, 54, 55.
12. — Maladies des capsules surrénales. — Pl. 56, 57, 58, 59, 60.

RAYER. Traité théorique et pratique des maladies de la peau, par P. RAYER, *deuxième édition entièrement refondue.* Paris, 1835. 3 forts vol. in-8, accompagnés d'un bel atlas de 26 planches grand in-4, gravées et coloriées avec le plus grand soin, représentant, en 400 figures, les différentes maladies de la peau et leurs variétés.
Prix du texte seul, 3 vol. in-8. 23 fr.
L'atlas seul, avec explication raisonnée, grand in-4 cartonné. 70 fr.
L'ouvrage complet, 3 vol. in-8 et atlas in-4, cartonné. 88 fr.

L'auteur a réuni, dans un *atlas pratique* entièrement neuf, la généralité des maladies de la peau; il les a groupées dans un ordre systématique pour en faciliter le diagnostic; et leurs diverses formes y ont été représentées avec une fidélité, une exactitude et une perfection qu'on n'avait pas encore atteintes.

RAU. Nouvel organe de la médication spécifique, ou Exposition de l'état actuel de la méthode homœopathique, par le docteur J.-L. RAU; suivi de nouvelles expériences sur les doses dans la pratique de l'homœopathie, par le docteur G. GROSS. Traduit de l'allemand par D.-R. Paris, 1845, in-8. 5 fr.

RENOUARD, Histoire de la médecine depuis son origine jusqu'au XIXe siècle, par le docteur P.-V. RENOUARD, membre de plusieurs sociétés savantes. Paris, 1846. 2 vol. in-8. 12 fr.

Cet ouvrage est divisé en *huit périodes* qui comprennent : I. PÉRIODE PRIMITIVE ou d'instinct, finissant à la ruine de Troie, l'an 1184 avant J.-C.; II. PÉRIODE SACRÉE ou mystique, finissant à la dispersion de la Société pythagoricienne, 500 ans avant J.-C.; III. PÉRIODE PHILOSOPHIQUE, finissant à la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie, 320 ans avant J.-C.; IV. PÉRIODE ANATOMIQUE, finissant à la mort de Galien, l'an 200 de l'ère chrétienne; V. PÉRIODE GRECQUE, finissant à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, l'an 640; VI. PÉRIODE ARABIQUE, finissant à la renaissance des lettres en Europe, l'an 1400; VII. PÉRIODE ÉRUDITE, comprenant le XVe et le XVIe siècle; VIII. PÉRIODE RÉFORMATRICE, comprenant les XVIIe et XVIIIe siècles.

RENOUARD. Lettres philosophiques et historiques sur la médecine au XIXe siècle, par le docteur P.-V. RENOUARD. *Seconde édition revue et corrigée.* Paris, 1857, in-8. 2 fr. 50

REVEILLÉ-PARISE. Traité de la vieillesse, hygiénique, médical et philosophique, ou Recherches sur l'état physiologique, les facultés morales, les maladies de l'âge avancé, et sur les moyens les plus sûrs, les mieux expérimentés, de soutenir et de prolonger l'activité vitale à cette époque de l'existence; par le docteur J.-H. REVEILLÉ-PARISE, membre de l'Académie de médecine, etc. Paris, 1853. 1 volume in-8 de 500 pag. 7 fr.

« Peu de gens savent être vieux. » (LA ROCHEFOUCAULD.)

REVEILLÉ-PARISE. Physiologie et hygiène des hommes livrés aux travaux de l'esprit, ou Recherches sur le physique et le moral, les habitudes, les maladies et le régime des gens de lettres, artistes, savants, hommes d'État, jurisconsultes, administrateurs, etc., par le docteur J.-H. REVEILLÉ-PARISE, membre de l'Académie de médecine, etc. *Quatrième édition*, revue et augmentée. Paris, 1843. 2 vol. in-8. 15 fr.

REVEILLÉ-PARISE. Études de l'homme dans l'état de santé et de maladie, par le docteur J.-H. REVEILLÉ-PARISE. *Deuxième édition.* Paris, 1845. 2 vol. in-8. 15 fr.

REVEILLÉ-PARISE. Guide pratique des goutteux et des rhumatisants, ou Recherches sur les meilleures méthodes de traitements curatives et préservatrices des maladies dont ils sont atteints, par le docteur REVEILLÉ-PARISE. *Troisième édition.* Paris, 1847, in-8. 5 fr.

REYBARD. Mémoires sur le traitement des anus artificiels, des plaies des intestins et des plaies pénétrantes de poitrine. Paris, 1827, in-8 avec 3 planches. 4 fr. 50

REYBARD. Procédé nouveau pour guérir par l'incision les **rétrécissements du canal de l'urèthre.** Paris, 1833, in-8, fig. 3 fr.

RICORD. De la Syphilisation et de la contagion des accidents secondaires de la Syphilis, communications à l'Académie de médecine par MM. Ricord, Bégin, Malgaigne, Velpeau, Depaul, Gibert, Lagneau, Larrey, Michel Lévy, Gerdy, Roux, avec les communications de MM. Auzias-Turenne et C. Spérino, à l'Académie des sciences de Paris et à l'Académie de médecine de Turin. Paris, 1853, in-8 de 384 pag. 5 fr.

ROBIN et VERDEIL. Traité de chimie anatomique et physiologique normale et pathologique, ou des Principes immédiats normaux et morbides qui constituent le corps de l'homme et des mammifères, par CH. ROBIN, docteur en médecine et docteur ès sciences, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, et F. VERDEIL, docteur en médecine, chef des travaux chimiques à l'Institut agricole, professeur de chimie. Paris, 1853. 3 forts volumes in-8, accompagnés d'un atlas de 45 planches dessinées d'après nature, gravées, en partie coloriées. 36 fr.

Le but de cet ouvrage est de mettre les anatomistes et les médecins à portée de connaître exactement la constitution intime ou moléculaire de la substance organisée en ses trois états fondamentaux, liquide, demi-solide et solide. Son sujet est l'examen, fait au point de vue organique, de chacune des espèces de corps ou principes immédiats qui, par leur union molécule à molécule, constituent cette substance.

Ce que font dans cet ouvrage MM. Robin et Verdeil est donc bien de l'anatomie, c'est-à-dire de l'étude de l'organisation, puisqu'ils examinent quelle est la constitution de la matière même des corps. Seulement, au lieu d'être des appareils, organes, systèmes, tissus ou humeurs et éléments anatomiques, parties complexes, composées par d'autres, ce sont les parties mêmes qui les constituent qu'ils étudient; ce sont leurs *principes immédiats* ou parties qui les composent par union moléculaire réciproque, et qu'on en peut extraire de la manière la plus immédiate sans décomposition chimique.

Le bel atlas qui accompagne le *Traité de chimie anatomique et physiologique* renferme les figures de 1 200 formes cristallines environ, choisies parmi les plus ordinaires et les plus caractéristiques de toutes celles que les auteurs ont observées. Toutes ont été faites d'après nature, au fur et à mesure de leur préparation. M. Robin a choisi les exemples représentés parmi 1 700 à 1 800 figures que renferme son album; car il a dû négliger celles de même espèce qui ne différaient que par un volume plus petit ou des différences de formes trop peu considérables.

ROBIN. Histoire naturelle des végétaux parasites qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants, par le docteur CH. ROBIN. Paris, 1853. 1 vol. in-8 de 700 pages, accompagné d'un bel atlas de 15 planches, dessinées d'après nature, gravées, en partie coloriées. 16 fr.

L'auteur a pu examiner son sujet non-seulement en naturaliste, mais en anatomiste, en physiologiste et en médecin. Les végétaux parasites étant tous des végétaux cellulaires, souvent de ceux qui appartiennent aux plus simples, M. Robin a pensé qu'il était indispensable, avant d'en exposer l'histoire, de faire connaître la structure des cellules végétales et même les autres éléments anatomiques, tels que fibres et vaisseaux ou tubes qui dérivent des cellules par métamorphose. Tel est le sujet des *Prolégomènes* de cet ouvrage.

La description ou l'histoire naturelle de chaque espèce de Parasites renferme : 1° Sa diagnose; — 2° Son anatomie; — 3° L'étude du milieu dans lequel elle vit, des conditions extérieures qui en permettent l'accroissement, etc.; — 4° L'étude des phénomènes de nutrition, développement et reproduction qu'elle présente dans ces conditions, ou physiologie de l'espèce; — 4° L'examen de l'action que le parasite exerce sur l'animal même qui le porte et lui sert de milieu ambiant. — On est ainsi conduit à étudier les altérations morbides et les symptômes dont le parasite est la cause, puis l'exposé des moyens à employer pour faire disparaître cette cause, pour détruire ou enlever le végétal, et empêcher qu'il ne se développe de nouveau.

Les planches qui composent l'atlas ont toutes été dessinées d'après nature, et ne laissent rien à désirer pour l'exécution.

ROBIN. Du microscope et des injections dans leurs applications à l'anatomie et à la pathologie, suivi d'une Classification des sciences fondamentales, de celle de la biologie et de l'anatomie en particulier, par le docteur CH. ROBIN, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1849. 1 vol. in-8 de 450 pages, avec 23 fig. intercalées dans le texte et 4 planches gravées. 7 fr.

ROBIN. Tableaux d'anatomie comprenant l'exposé de toutes les parties à étudier dans l'organisme de l'homme et dans celui des animaux, par le docteur CH. ROBIN. Paris, 1851, in-4, 10 tableaux. 3 fr. 50

ROCHE, SANSON et LENOIR. Nouveaux éléments de pathologie médico-chirurgicale, ou Traité théorique et pratique de médecine et de chirurgie, par L.-CH. ROCHE, membre de l'Académie de médecine; J.-L. SANSON, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Paris, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris; A. LENOIR, chirurgien de l'hôpital Necker, professeur agrégé de la Faculté de médecine. *Quatrième édition*, considérablement augmentée. Paris, 1844. 5 vol. in-8 de 700 pages chacun. 36 fr.

ROESCH. De l'abus des boissons spiritueuses, considéré sous le point de vue de la police médicale et de la médecine légale. Paris, 1839, in-8. 3 fr. 50

ROUBAUD. Traité de l'impuissance et de la stérilité chez l'homme et chez la femme, comprenant l'exposition des moyens recommandés pour y remédier, par le docteur FÉLIX ROUBAUD. Paris, 1855. 2 vol. in-8 de 450 pages. 10 fr.

ROUBAUD. Des Hôpitaux, au point de vue de leur origine et de leur utilité, des conditions hygiéniques qu'ils doivent présenter, et de leur administration, par le docteur F. ROUBAUD. Paris, 1853, in-12. 3 fr.

SAINT-HILAIRE. Plantes usuelles des Brésiliens, par A. SAINT-HILAIRE, professeur à la Faculté des sciences de Paris, membre de l'Institut de France. Paris, 1824-1828, in-4 avec 70 planches. Cartonné. 36 fr.

SAINTE-MARIE. De l'huître et de son usage comme aliment et comme remède. Lyon, 1827, in-8. 1 fr. 25

SAINTE-MARIE. Dissertation sur les médecins poëtes. Paris, 1835, in-8. 2 fr.

SALVERTE. Des sciences occultes, ou essai sur la magie, les prodiges et les miracles, par Eusèbe SALVERTE. *Troisième édition*, précédée d'une Introduction par Émile LITTRÉ, de l'Institut. Paris, 1856. 1 vol. grand in-8 de 550 pages. 7 fr. 50

SANSON. Des hémorrhagies traumatiques, par L.-J. SANSON, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital de la Pitié, etc. Paris, 1836, in-8, figures coloriées. 4 fr.

SANSON. De la réunion immédiate des plaies, de ses avantages et de ses inconvénients, par L.-J. SANSON. Paris, 1834, in-8. 2 fr.

SAPPEY. Recherches sur la conformation extérieure et la structure de l'urèthre de l'homme, par Ph.-C. SAPPEY, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1854, in-8. 2 fr. 50

SÉDILLOT. De l'infection purulente, ou Pyoémie, par le docteur Ch. SÉDILLOT, chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Strasbourg, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine, etc. Paris, 1849. 1 vol. in-8, avec 3 planches coloriées. 7 fr. 50

SEGOND. Histoire et systématisation générale de la biologie, principalement destinées à servir d'introduction aux études médicales, par le docteur L.-A. SEGOND, professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris, etc. Paris, 1851, in-12 de 200 pages. 2 fr. 50

SEGUIN. Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et autres enfants arriérés ou retardés dans leur développement, agités de mouvements involontaires, débiles, muets non-sourds, bègues, etc., par *Éd. Séguin*, ex-instituteur des enfants idiots de l'hospice de Bicêtre, etc. Paris, 1846. 1 vol. in-12 de 750 pages. 6 fr.

SERRES Recherches d'anatomie transcendante et pathologique; théorie des formations et des déformations organiques, appliquée à l'anatomie de la duplicité monstrueuse, par E. SERRES, membre de l'Institut de France. Paris, 1832, in-4, accompagné d'un atlas de 20 planches in-folio. 20 fr.

SICHEL. Iconographie ophthalmologique, ou Description et figures coloriées des maladies de l'organe de la vue, comprenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique médico-chirurgicales, par le docteur J. SICHEL, professeur d'ophthalmologie, médecin-oculiste des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, etc. 1852-1858.

Cet ouvrage formera environ 20 livraisons, composées chacune de 28 pages de texte in-4 et de 4 planches dessinées d'après nature, gravées, imprimées en couleur, retouchées au pinceau, avec le plus grand soin. Prix de chaque livraison. 7 fr. 50

Les livraisons 1 *à* 17, 17 *bis et* 18 *sont publiées.*

Le texte se compose d'une exposition théorique et pratique de la science, dans laquelle viennent se grouper les observations cliniques, mises en concordance entre elles, et dont l'ensemble formera un *Traité clinique des maladies de l'organe de la vue*, commenté et complété par une nombreuse série de figures.

Les planches sont aussi parfaites qu'il est possible; elles offrent une fidèle image de la nature; partout les formes, les dimensions, les teintes ont été consciencieusement observées; elles présentent la vérité pathologique dans ses nuances les plus fines, dans ses détails les plus minutieux; gravées par des artistes habiles, imprimées en couleur et souvent avec repère, c'est-à-dire avec une double planche, afin de mieux rendre les diverses variétés des injections vasculaires des membranes externes; toutes les planches sont retouchées au pinceau avec le plus grand soin.

L'auteur a voulu qu'avec cet ouvrage le médecin, comparant les figures et la description, puisse *reconnaître et guérir la maladie représentée* lorsqu'il la rencontrera dans la pratique.

SIMON. Leçons de médecine homœopathique, par le docteur Léon SIMON. Pa 1835, 1 fort vol. in-8. 8

SIMON (MAX). **Hygiène du corps et de l'âme**, ou Conseils sur la direction physiqu morale de la vie, adressés aux ouvriers des villes et des campagnes, par le doct Max SIMON. Paris, 1853, 1 vol. in-18 de 130 pages. 1

SWAN. La Névrologie, ou Description anatomique des nerfs du corps humain, pa docteur J. SWAN; *ouvrage couronné par le Collége royal des chirurgiens de Lond* traduit de l'anglais, avec des additions par E. CHASSAIGNAC, D. M., prosecteur Faculté de médecine de Paris, accompagné de 25 belles planches, gravées à Lond avec le plus grand soin. Paris, 1838, in-4, grand papier vélin cart. 24

TARDIEU. Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou Répertoire de tou les Questions relatives à la santé publique, considérées dans leurs rapports avec Subsistances, les Épidémies, les Professions, les Établissements et institutions d'I giène et de Salubrité, complété par le texte des Lois, Décrets, Arrêtés, Ordonnan et Instructions qui s'y rattachent, par le docteur Ambroise TARDIEU, profess agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux, membre du C seil consultatif d'hygiène publique, médecin assermenté près les tribunaux, Paris, 1852-1854. 3 forts vol. grand in-8. 24

Ouvrage couronné par l'Institut de France.

TARDIEU. Études hygiéniques sur la profession de **mouleur en cuivre**, pour serv l'histoire des professions exposées aux poussières inorganiques, par le doct Ambroise TARDIEU. Paris, 1855, in-12. 1 fr.

TARDIEU. Étude médico-légale sur l'avortement, par A. TARDIEU, professeur agr de la Faculté de médecine de Paris. Paris, 1856, in-8. 2 fr.

TARDIEU. De la morve et du farcin chronique chez l'homme, par le docteur AM TARDIEU. Paris, 1843, in-4. 5

† **TEMMINCK. Monographies de mammologie**, ou Description de quelques genres mammifères, et dont les espèces ont été observées dans les différents musées de l'E rope, par C.-J. TEMMINCK. *Paris* et *Leyde*, 1827-1841, 2 vol. in-4 avec 70 pl. 50

Cet important ouvrage comprend dix sept monographies, savoir: 1° genre Phalanger; 2° ge Sarrigue; 3° genres Dasyure, Thylacines et Phascogales; 4° genre Chat; 5° ordre des Cheiroptè 6° Molosse; 7° Rongeurs, 8° genre Rhinolophe; 9° genre Nyctoclepte; 10° genre Nyctophile; 11° ge Chéiroptères frugivores; 12° genre Singe; 13° genre Chéiroptères vespertilionides; 14° genre Taphi queue en fourreau, queue cachée, queue bivalve; 15 genres Arcticte et Paradoxure; 16° genre Pé maue; 17° genre Mégère.

† **TEMMINCK et LAUGIER. Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux**, po servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, par MM. TE MINCK, directeur du Musée de Leyde, et MEIFFREN-LAUGIER, de Paris.

Ouvrage complet en 102 livraisons. Paris, 1822-1838. 5 vol. grand in-folio av 600 pl. dessinées d'après nature, par Prêtre et Huet, gravées et coloriées. 1000 f

Le même avec 600 planches grand in-4 figures coloriées. 750 f

Demi-reliure, dos de maroquin. Prix des 5 vol. grand in-folio. 90 f

— *dito* — Prix des 5 vol. grand in-4. 60 f

Aquéreur de cette grande et belle publication, l'une des plus importantes et l'un des ouvrages l plus parfaits pour l'étude si intéressante de l'ornithologie, nous venons offrir le *Nouveau recueil planches coloriées d'oiseaux* en souscription en baissant le prix d'un tiers.

Chaque livraison composée de 6 planches gravées et coloriées avec le plus grand soin, et le tex descriptif correspondant. L'ouvrage est *complet* en 102 livraisons.

Prix de la livraison in-folio, figures coloriées, au lieu de 15 fr. 10 fr.

— grand in-4, fig. coloriées, au lieu de 10 fr. 50 7 fr. 50

La dernière livraison contient des tables scientifiques et méthodiques. Les personnes qui n'ont poi retiré les dernières livraisons pourront se les procurer aux prix indiqués ci-dessus.

TENORE. Essai sur la géographie physique et botanique du royaume de Naple Naples, 1827. 1 vol. in-8. 6 fr

TESTE. Le magnétisme animal expliqué, ou Leçons analytiques sur la nature essen tielle du magnétisme, sur ses effets, son histoire, ses applications, les diverses ma nières de le pratiquer, etc., par le docteur A. TESTE. Paris, 1845, in-8. 7 f

TESTE. Manuel pratique de magnétisme animal. Exposition méthodique des procédés employés pour produire les phénomènes magnétiques et leur application à l'étude et au traitement des maladies, par J.-A. TESTE, docteur en médecine de la Faculté de Paris. *Quatrième édition augmentée.* Paris, 1853. 1 vol. in-12. 4 fr.

TESTE. Systématisation pratique de la matière médicale homœopathique, par le docteur A. TESTE, membre de la Société gallicane de médecine homœopathique. Paris, 1853. 1 vol. in-8 de 600 pages. 8 fr.

TESTE. Traité homœopathique des maladies aiguës et chroniques des enfants, par le docteur A. TESTE. *Seconde édition* revue et augmentée. Paris, 1856, in-18 de 420 pages. 4 fr. 50

THIERRY. Quels sont les cas où l'on doit préférer la lithotomie à la lithotritie et réciproquement. Paris, 1842, in-8. 2 fr. 50

THOMSON. Traité médico-chirurgical de l'inflammation; par J. THOMSON, professeur de chirurgie à l'Université d'Edimbourg; traduit de l'anglais et augmenté d'un grand nombre de notes, par A.-J.-L. JOURDAN et F.-G. BOISSEAU. Paris, 1827. 1 fort vol. in-8. 3 fr.

TIEDEMANN et GMELIN. Recherches expérimentales, physiologiques et chimiques sur **la digestion** considérée dans les quatre classes d'animaux vertébrés, par F. TIEDEMANN et L. GMELIN; traduites de l'allemand par A.-J.-L. JOURDAN. Paris, 1827. 2 vol. in-8, avec grand nombre de tableaux. 15 fr.

TIEDEMANN. Traité complet de physiologie, traduit de l'allemand par A.-J.-L. JOURDAN. Paris, 1831. 2 vol. in-8. 7 fr.

TOMMASSINI. Précis de la nouvelle doctrine médicale italienne, ou introduction aux leçons de clinique de l'Université de Bologne, par le professeur J. TOMMASSINI. Traduit de l'italien, avec des notes, par le docteur P.-L. Vander-Linden. Paris, 1822, in-8. 2 fr. 50

TORTI (F.) Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas; nova editio, edentibus et curantibus C.-C.-F. TOMBEUR et O. BRIXHE. D. M. Leodii et Parisiis, 1821. 2 vol. in-8, fig. 16 fr.

TREBUCHET. Jurisprudence de la Médecine, de la Chirurgie et de la Pharmacie en France, comprenant la médecine légale, la police médicale, la responsabilité des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc., l'exposé et la discussion des lois, ordonnances, règlements et instructions concernant l'art de guérir, appuyée des jugements des cours et tribunaux, par A. TREBUCHET, avocat, chef du bureau de la police médicale à la Préfecture de police. Paris, 1834. 1 fort vol. in-8. 9 fr.

TRÉLAT. Recherches historiques sur la folie; par U. TRÉLAT, médecin de l'hospice de la Salpêtrière. Paris, 1839, in-8. 3 fr.

TRIQUET. Traité pratique des maladies de l'oreille, par le docteur E. H. TRIQUET, chirurgien et fondateur du Dispensaire pour les maladies de l'oreille, ancien interne lauréat des hôpitaux de Paris, etc. Paris, 1857. 1 vol. in-8, avec figures intercalées dans le texte. 7 fr. 50

Cet ouvrage est la reproduction des leçons que M. Triquet professe chaque année à l'École pratique de médecine. Ces leçons reçoivent chaque jour leur sanction à la Clinique de son dispensaire, en présence des élèves et des jeunes médecins qui désirent se familiariser avec l'étude pratique des maladies de l'oreille.

TROUSSEAU et BELLOC. Traité pratique de la phthisie laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix, par A. TROUSSEAU, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôtel-Dieu, et H. BELLOC, D. M. P.; *ouvrage couronné par l'Académie de médecine.* Paris, 1837. 1 vol. in-8, accompagné de 9 planches gravées. 7 fr.

— Le même, figures coloriées. 12 fr.

TURCK. De la vieillesse étudiée comme maladie et des moyens de la combattre, par le docteur LÉOPOLD TURCK. *Deuxième édition.* Paris, 1854, in-8. 5 fr.

VALLEIX. Traité des névralgies, ou affections douloureuses des nerfs, par L.-F. VALLEIX. (*Ouvrage auquel l'Académie de médecine accorda le prix Itard, de trois mille francs, comme l'un des plus utiles à la pratique*). Paris, 1841, in-8. 8 fr.

VALLEIX. Guide du médecin praticien, ou Résumé général de pathologie interne de thérapeutique appliquées, par le docteur F.-L.-I. VALLEIX, médecin de l'hôp de la Pitié. *Troisième édition*, revue, corrigée et augmentée. Paris, 1853-18 5 beaux volumes grand in-8 de chacun 750 pages. 45

Cet ouvrage est principalement destiné à tracer les règles du diagnostic et à diriger le praticien le traitement des maladies. Dans ce but, l'auteur non-seulement a exposé le diagnostic en détail, encore l'a résumé dans les tableaux synoptiques qui permettent de saisir d'un coup d'œil les différ les plus caractéristiques des diverses affections. Puis, arrivant au traitement, il l'étudie ch anciens et les modernes, appréciant la valeur de chaque médication, citant les principales form exposant les procédés opératoires, donnant des ordonnances suivant les cas, en un mot allant la rapeutique à la pathologie, de manière qu'elles s'éclairent l'une l'autre.

Séparément les derniers volumes de la *première édition*. Prix de chaque.

VALLEIX. Clinique des maladies des enfants nouveau-nés, par F.-L.-I. VALL Paris, 1838. 1 vol. in-8 avec 2 planches gravées et coloriées représentant le cép lématome *sous-péricrânien* et son mode de formation. 8 fr.

VELPEAU. Nouveaux éléments de médecine opératoire, accompagnés d'un atlas 22 planches in-4, gravées, représentant les principaux procédés opératoires et grand nombre d'instruments de chirurgie, par A.-A. VELPEAU, membre de l'In tut, chirurgien de l'hôpital de la Charité, professeur de clinique chirurgicale à la culté de médecine de Paris. *Deuxième édition entièrement refondue*, et augmen d'un traité de petite chirurgie, avec 191 planches intercalées dans le texte. Pa 1839. 4 forts vol. in-8 de chacun 800 pages et atlas in-4. 40

— Avec les planches de l'atlas coloriées. 60

VELPEAU. Traité complet d'anatomie chirurgicale, générale et topographique corps humain, ou Anatomie considérée dans ses rapports avec la pathologie chir gicale et la médecine opératoire. *Troisième édition*, augmentée en particulier de ce qui concerne les travaux modernes sur les aponévroses, par A.-A. VELPE Paris, 1837. 2 forts vol. in-8, avec atlas de 17 planches in-4 gravées. 20

VELPEAU. Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques **sur les cavi closes** naturelles ou accidentelles de l'économie animale, par A.-A. VELPEAU. Pa 1843, in-8 de 208 pages. 3 fr.

VELPEAU. Des injections médicamenteuses dans les cavités closes. Paris, 18 in-8. 3

VELPEAU. Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons de M. Velpe professeur de clinique chirurgicale à l'hôpital de la Charité, par M. le docteur G. JE SELME. Paris, 1840. 1 fort vol. grand in-18 de 700 pages. 6

VELPEAU. Exposition d'un cas remarquable de maladie cancéreuse avec oblitérati de l'aorte. Paris, 1825, in-8. 2 fr.

VELPEAU. De l'opération du trépan dans les plaies de la tête. Paris, 1834, in-8. 4

VELPEAU. Embryologie ou **Ovologie humaine,** contenant l'histoire descriptive et i nographique de l'œuf humain, par A.-A. VELPEAU, accompagné de 15 planches d sinées d'après nature et lithographiées avec soin. Paris, 1833. 1 vol. in-fol. 12

VERNOIS et BECQUEREL. Du lait chez la femme dans l'état de santé et dans l'état maladie. Mémoire suivi de nouvelles recherches sur la composition du lait chez vache, la jument, la brebis et la chèvre, par MM. les docteurs MAX. VERNOIS et AL BECQUEREL, médecins des hôpitaux. Paris, 1853, in-8 de 200 pages. 3 fr.

VIDAL. Essai sur un traitement méthodique de quelques maladies de la matrice injections vaginales et intra-vaginales; par A. VIDAL (de Cassis). Paris, 184 in-8. 1 fr.

VIDAL. De la cure radicale du varicocèle par l'enroulement des veines du cord spermatique, par VIDAL (de Cassis). *Deuxième édition*, revue et augmentée. Pari 1850, in-8. 2 f

VIDAL. Des hernies ombilicales et épigastriques, par le docteur A. VIDAL (de Cassis chirurgien de l'hôpital du Midi, etc. Paris, 1848, in-8 de 133 pages. 2 fr.

VIDAL. Des inoculations syphilitiques. Lettres médicales par le docteur VIDA (de Cassis). Paris, 1849, in-8. 1 fr.

VIDAL. Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, avec des Résumés d'anatomie des tissus et des régions, par A. VIDAL (de Cassis), chirurgien de l'hôpital du Midi, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, etc. *Quatrième édition*, entièrement refondue et considérablement augmentée. Paris, 1855. 5 vol. grand in-8 de 800 pages avec plus de 600 figures intercalées dans le texte. 40 fr.

Le Traité de pathologie externe de M. Vidal (de Cassis), dès son apparition, a pris rang parmi les livres classiques; il est devenu entre les mains des élèves un guide pour l'étude, et les maîtres le considèrent comme le *Compendium du chirurgien praticien*, parce qu'à un grand talent d'exposition dans la description des maladies, l'auteur joint une puissante force de logique dans la discussion et dans l'appréciation des méthodes et procédés opératoires. La *quatrième édition* a reçu des augmentations tellement importantes, qu'elle doit être considérée comme un ouvrage neuf; et ce qui ajoute à l'*utilité pratique* du *Traité de pathologie externe*, c'est le grand nombre de figures intercalées dans le texte. Qui ne sait que ce qui frappe les yeux se grave plus facilement dans la mémoire? Ce livre est le seul ouvrage complet où soit représenté l'état actuel de la chirurgie.

VIDAL. Du cancer du rectum et des opérations qu'il peut réclamer; parallèle des méthodes de Littre et de Callisen pour l'anus artificiel, par le docteur VIDAL (de Cassis). Paris, 1842, in-8. 2 fr. 50

VIMONT. Traité de phrénologie humaine et comparée, par le docteur J. VIMONT, membre des Sociétés phrénologiques de Paris et de Londres. Paris, 1835, 2 vol. in-4, accompagnés d'un magnifique atlas in-folio de 134 planches contenant plus de 700 figures d'une parfaite exécution.

VIOLETTE et ARCHAMBAULT. Dictionnaire des analyses chimiques ou Répertoire alphabétique des analyses de tous les corps naturels et artificiels depuis la fondation de la chimie, avec l'indication du nom des auteurs et des recueils où elles ont été insérées, par MM. VIOLETTE, directeur des poudres et salpêtres, ancien élève de l'École polytechnique, et ARCHAMBAULT, professeur de l'Université. Paris, 1851. 2 vol. in-8 à deux colonnes. 16 fr.

Les chimistes apprécieront l'importance et la commodité d'un Dictionnaire qui renferme les faits constants relatifs à tous les composés, les formules qui les désignent, et les nombres au moyen desquels ces formules ont été établies. La série chronologique des analyses présente pour chaque corps une sorte de résumé historique où l'on pourra suivre les progrès de la science. Le naturaliste et le médecin trouveront dans ce livre les compositions des tissus d'animaux et de plantes, des produits de l'organisation dans l'état de santé et de maladie. Le géologue y trouvera les analyses des roches et des fossiles, dont l'ingénieur, à son tour, peut tirer un parti avantageux pour la connaissance des localités qu'il exploite ou des matériaux qu'il veut mettre en œuvre. Le fabricant de produits chimiques, le maître de forges, le teinturier, l'agriculteur, qui veulent marcher dans la voie du progrès, trouveront dans le *Dictionnaire des analyses chimiques* un grand nombre de renseignements utiles.

VIREY. Philosophie de l'histoire naturelle, ou Phénomènes de l'organisation des animaux et des végétaux, par J.-J. VIREY, membre de l'Académie impériale de médecine, etc. Paris, 1835, in-8. 7 fr.

VIREY. De la physiologie dans ses rapports avec la philosophie, par J.-J. VIREY. Paris, 1844, in-8. 7 fr.

VOISIN. Des causes morales et physiques des maladies mentales, et de quelques autres affections nerveuses, telles que l'hystérie, la nymphomanie et le satyriasis; par F. VOISIN. Paris, 1826, in-8. 7 fr.

WEBER. Codex des médicaments homœopathiques, ou Pharmacopée pratique et raisonnée à l'usage des médecins et des pharmaciens, par George-P.-F. WEBER, pharmacien homœopathe. Paris, 1854, un beau vol. in-12 de 440 pages. 6 fr.

WEDDELL (H.-A.) Histoire naturelle des quinquinas. Paris, 1849. 1 vol. in-folio accompagné d'une carte et de 32 planches gravées, dont 3 sont coloriées. 60 fr.

YVAREN. Des métamorphoses de la syphilis. Recherches sur le diagnostic des maladies que la syphilis peut simuler, et sur la syphilis à l'état latent, par le docteur P. YVAREN; précédées du Rapport fait à l'Académie impériale de médecine. Paris, 1854, in-8 de 600 pages. 7 fr. 50

ZIMMERMANN. La solitude considérée par rapport aux causes qui en font naître le goût, de ses inconvénients et de ses avantages pour les passions, l'imagination, l'esprit et le cœur, par J.-G. ZIMMERMANN; nouvelle traduction de l'allemand, par A.-J.-L. JOURDAN; *nouvelle édition augmentée d'une notice sur l'auteur*. Paris, 1840. 1 fort vol. in-8. 3 fr. 50

† **LECTURES ON HISTOLOGY**, by J. QUEKETT. London, 1852-1854. 2 vol. in-8 avec figures intercalées dans le texte. 37 fr.

† **A PRACTICAL TREATISE ON THE USE OF THE MICROSCOPE**, including the different methods of preparing and examining animal, vegetable and mineral structures, by John QUEKETT, assistant conservator and demonstrator of minute anatomy at the Royal College of surgeons, avec planches et figures intercalées dans le texte. *Troisième édition, with additions*. London, 1855. 1 vol. in-8. 27 fr.

† **CRYPTOGAMIC BOTANY**, by Rev J.-M. BERKELEY. London, 1857, un beau volume in-8 illustré avec planches. 27 fr.

† **THE ANATOMY OF THE EXTERNAL FORMS OF THE HORSE**, by John GAMGEE. London, 1857, un volume in-8 avec 12 planches in-folio en partie coloriées.

† **PRINCIPLES OF PHYSICS AND METEREOLOGY**, by J. MULLER, professor of physics at the University of Freiburg. London, 1847. 1 vol. in-8, avec 2 planches coloriées et 530 figures intercalées dans le texte. 23 fr. 50

† **PRINCIPLES OF THE MECHANICS OF MACHINERY AND ENGINEERING**, by J. WEISBACH, professor of mechanics and applied-mathematics in the Royal mining-Academy of Freiberg. London, 1847-1848. 2 vol. in-8 avec un grand nombre de figures intercalées dans le texte. 52 fr.

† **MANUAL OF PRACTICAL ASSAYING**, by J. MITCHELL. London, 1854, in-8, avec 360 figures intercalées dans le texte. 27 fr.

† **CHEMISTRY IN ITS APPLICATIONS**, to the arts and to manufactures, by doctors F. KNAPP, RONALDS and RICHARDSON. London, 1855. 3 vol. in-8, avec un grand nombre de figures intercalées dans le texte. 105 fr.

† **ELEMENTS OF CHEMISTRY** including the applications of the sciences in the arts, by Th. GRAHAM. *Seconde édition* revue et augmentée. London, 1850-1857. 2 volumes in-8 de 630 pages avec figures dans le texte. 55 fr.

† **THE ARCHITECTURE OF THE HEAVENS**, by J.-P. NICHOL, professor of astronomy in the University of Glasgow, 9e édition. London, 1851, in-8, fig. 21 fr.

† **NATIVE RACES OF THE INDIAN ARCHIPELAGO**. PAPUANS, by G.-W. EARL London, 1853, in-8, avec 5 planches coloriées et 2 cartes. 13 fr

† **THE NATIVE RACES OF THE RUSSIAN EMPIRE**, by R.-G. LATHAM. London, 1854, petit in-8 avec une grande carte coloriée. 10 fr.

† **THE LONDON JOURNAL OF BOTANY**, containing figures and descriptions of such plants as recommend themselves by their novelty, rarity, history and uses; by sir W-J. HOOKER, director of the Royal botanic garden of Kiew. Londres, 1842 à 1847. 6 forts vol. in-18 avec 24 planches. 150 fr.

† **ICONES PLANTARUM**, or figures ad descriptions of new and rare plants selected from the herbarium, by J.-W. HOOKER. London, 1842-1848. 4 vol. in-8 avec 400 planches. Prix de chaque volume, avec 100 planches. 33 fr.

† **A NATURAL HISTORY OF THE MAMMALIA**, by C.-R. WATERHOUSE, assistant of the British Museum. London, 1846-1848. Tome 1, *Marsupiata*, T. II. *Rodentia*, publiés en 22 livraisons. Prix de chaque volume avec figures noires. 36 fr.
Avec figures coloriées. 44 fr.

† **ON THE DISEASES AND DERANGEMENTS OF THE NERVOUS SYSTEM** in their primary forms and in their modifications by age, sex, constitution, hereditary predisposition, excess, general disorder and organic diseases, by MARSHALL HALL, docteur en médecine. London, 1841, in-8 avec 8 planches. 20 fr.

† **ON THE DIFFERENT FORMS OF INSANITY**, in relatione to jurisprudence; by doctor J.-C. PRICHARD. *Seconde édition*. London, 1847, in-12. 6 fr. 50

† **ODONTOGRAPHY, A TREATISE ON THE COMPARATIVE ANATOMY OF THE TEEHT**, their physiological relations, mode of development and microscopic structure in the vertebrate animals, by Richard OWEN, membre de la Société royale de Londres, 1840-1845. *Ouvrage complet*, publié en trois parties, accompagné de 168 planches gravées, 2 vol grand in-8. 140 fr.

Paris. — Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

T71 Devergie, M.G.A.
D49 Maladies de la peau.
1857 12171

NAME	DATE DUE
T J Sullivan	NOV 9
GOIHMAN	MAR 16 1963

12171